




P.g.b.

A.D.g.t.

R41360

B. 8/8





Viso Specata tesseris
Alessandro Longo M.
coll. Reg. Med. Belin en
Socio do de
Auctor.

Petrópoli.
12^{mo} Setembro
1818

PHARMACOPOEIA CASTRENsis RUTHENICA

A U C T O R E

Jacobo Wylie Equite Baronetto

S. M. Consiliario Status actuali; Ordd. IMP. St. Annæ I cl., St. Wladimiri II cl. magnæ crucis Equite; Austr. Cæsareo-Regii St. Leopoldi II cl.; Regiorum. Boruss. Aquilæ rubræ II cl.; Bavar. et Würtemberg. Commendatore; Franco-gallici: legionis honorariæ officiali; Doctore Medicinæ et Chirurgiæ; S. M. I. Archiatro; supremo Rei medico-chirurgicæ castrensis Inspectore; Curiæ medicæ sub Administr. milita Directore; IMP. medico-chirurg. Academiæ Præside; Academiæ Scient., Consil. med. sub Administr. Rei Eccles. liter. et Polit. varia- rumque erud. Societat. membro.

EDITIO TERTIA AUCTIOR.

Jussu AUGUSTI IMPERATORIS.

PETROPOLI

IN TYPOGRAPHIA MEDICA.

M DCCXVIII.

BIBLIOTH.
COLL. REG.
MED. EDW.

recycles

SERENISSIMO et POTENTISSIMO

PRINCIPI ac DOMINO

ALEXANDRO I

AUGUSTO OMNIUM RUSSIARUM IMPERATORI,

POLONIÆ REGI

etc. etc. etc.

RECTI JUSTIQUE CULTORI;

GENERIS HUMANI AMICO;

MAGNANIMO EUROPÆ PACIFICATORI;

SCIENTIARUM et ARTIUM PROMOTORI,


HANC CASTRENSEM PHARMACOPOEIAM

JUSSU EJUS EDITAM

EA, QUA PAR EST, DEVOTIONE ANIMIQUE SUBMISSIONE

D. D. D.

SUBDITISSIMUS AUCTOR.



P R A E F A T I O.

Posito politicis turbinibus, quibus orbis terraqueus per vi-
cennium et quod excurrit, concussus est, fine, (quum videlicet
victoriosus præpotentis Rutheniae exercitus, porrectis ul-
tro afflictis jacentibusque gentibus, dextris, effecisset, ut aut
Reges earumdem in avita jura postliminio reciperentur, aut
extores patriam reviserent cives,) tandem et mihi, jam e bello
(cui quinques interfui, semper, et itineris comes, et salutis
custos AUGUSTI, vel in ipso dimicantium campo,) Ru-
thenicæ genti, ubique victri ci gloriosissimo, reduci, fidem
(in præfamine editioni secundæ præfixo,) datam, solvere
licuit, atque de adornanda Pharmacopœa castrensis ter-
tia editione cogitare; quid vero in ea, sive consilii ex-
stiterit, sive præstitum fuerit, destinatum est in animo paucis
declarare: desiderabantur, quum in exercitu, tum etiam in taber-
nis, instructioribus licet, librariis, exemplaria priorum editionum;
persæpe autem a Medentibus expetebantur; si quæ autem su-
perfuerunt, ea me absente, inscio et proinde invito, lucri cau-
sa, typis exscripta fuere, infinitis fere, vel correctorum, vel ty-
pophetarum incuria, mendis scatentia, quo factum est, ut summa
elaborandi operis necessitas urserit, cui tanto alacrius sub-
secivas consecravi horas, quod me non fugerit, in exercitu etiam
a quibusdam legionariis desiderari. Pharmacopœa hæc in du-

as diducitur partes, Pharmacologia fusius concinnata, Pharmacopœæ proprie dictæ, præmissa est. Mirum videbitur plerisque hoc consilium meum; sed qui rationem habuerit vastissimæ Rutheniae, dominatricis terrarum facile omnium, per 40 gr. lat. et 190 long. patentium, et norit desiderari bibliopolia, præsertim in remotis a Metropoli provinciis, perfacile palmam ei dabit, me proinde rem opera pretioque haud indignam esse facturum duxi, si hunc defectum, hanc lacunam, explerem elucubratione pharmacologici Enchiridii, quo compendiaria quædam via ostenderetur, qua Medico-chirurgi castrenses, queis, nec per rem familiarem, nec locorum opportunitatem, idem adsequi licet, in exercitio Medicinæ, inoffenso possint pede decurrere. Rem medicinam, rationali empyria nixam, ea, qua par est, simplicitate, exposui, alieno a philosophia naturæ animo, quæ speciosis ingenii argutiis novorumque et obscurorum verborum præstigiis, tantum abest, ut ei prosit, ut potius falsas obtrudendo hypotheses, consectaria errorum plena, in eandem inferat, et Medentium existimationi, et ægrotorum saluti, nocitura. Quum facultates medicaminum, ut **Hippocrates** dicit, non fingendo, aut excogitando; sed vires, quas in corpus nostrum habent exercentque, inveniendo, perpendere oporteat, hinc eas tantum exponendas duxi, quæ gravium auctorum testimoiiis atque auctoritatibus (multiplici experientia) comprobatae sunt, persuasum mihi habens, me non aliter,

aliorum opinioni satisfacere posse. Auctores, ad quos provocavi, ubique expositi sunt, ut lectores, fontes saltem quospicam, e quibus animum ad satietatem explere valeant, indicatos, conspiciant. Britannorum in primis rationem habui, ut eoruindem mendendi rationem Ruthenis familiarem redderem. Quædam, ut **PUNICAM GRANATUM** etc., in priori editione pertractata, consulto omisi, quippe quæ, ut experiundo didicimus, laudibus sibi adstructis, neutquam respondere; si quæ vero minus digna, ut **ALYSMA PLANTAGO** (antilyssa virtute, ut experientia jam docuit, minus pollens,) addidimus, vel nonnulla cursim ac breviter attigimus, ea persuasioni tantum aliorum morem gesturi, recepimus. *Aquas medicatas Russicas*, quarum mihi analysis chemica innotuit, ea, qua par est, brevitate descripti; habui etiam rationem *exoticarum*. Exaciorem et harum et illarum analysin, in tabulis exposui. In elaborando hocce opere quædam e propria etiam observationum penu admensus sum, haud secus ac consilio etiam querundam amicorum usus; sed nomina eorum proferre, si licet et jucundissimum mihi foret et honestissimum; verum eos eo esse pudore intellexi, ut utilitati publicæ silentio, quam suæ famæ palam consulere malent. Quidquid igitur in editione hac profeci, profecisse me plurimum hoc adjutorio lubens agnosco; neque enim tanto, inter continua avocamenta, conatui ullo modo, nisi his alienisque opibus undique collatis confisum, parem es-

VIII

se potuisse, profiteor. Arguar forsitan, quod *medicaminum* farraginem castrenibus Medico-chirurgis proposuerim; sed tales sciant me prolixitate hac parsimoniae studuisse, scilicet, ut Medentes, quum in australioribus imperii oris morari eos contigerit, ea e multis, ibi in usum traherent, quæ, pro ratione cœli, illic indigena sunt, parvoque constant, et vice versa. Ad calcem operis indicem addidi, tum morborum, tum *medicaminum*, ut series materiei pertractatæ uberior elucescat, uno velut obtutu, videnda. Restabunt forte errores, qui correctorum oculos fugerint, quosve, aut nostra prætermisit incuria, aut humana parum cavit natura, eos, ut æqui talium rerum judices ignoscant, obnixe oro, sin minus, animadversiones eorum, nec ægre feram, nec timide defugiam; neque enim adeo mihi placeo, ut ea, quæ publici juris facio, omnibus numeris absoluta esse mihi persuadeam. Nihil præterea, quod heic addam, superest, nisi, ut quo castrenium Medico-chirurgorum rebus consulere volui, conatum boni consulant meum, hic solus et fuit et est scopus et unicus exantlatorum laborum finis, ut ex iis et Medentes et ægri fructum capere queant, et ut, auspice Deo, si largior mihi vitæ hujus usura fuerit concessa, alia quoque in usus eorum moliar. Interea liceat lectorum humanitatem et eruditionem verbis **HORATII ad NUMIDICUM** deposcere: — *Si quid novisti rectius istis,*

Candidus imperti: si non, his utere mecum.

M O N I T A.

Loca natalia *plantarum* respiciunt regionem, clima, solum et terram. Solum *vegetabilium* notandum est; constat enim *aromaticas*, *amaras* *odoriferasque plantas*, e siccis eminentibusque locis, radiisque solaribus expositis, legendas esse; ita **V A L E R I A N A** **O F F I C I N A L I S** varietas; foliis angustioribus (*Valeriana sylv. Blac-
kii Herb.*) in siccioribus crescens, *radice* gaudet efficaciori et gra-
vius olente, quam illa *vulgaris*, in humidis, paludosis, occurrentis,
quae monticolæ merito postponitur. **P O L Y G A L A A M A R A** ex locis
montosis in depressa descendens, omni amaritie destituitur. **Syl-
vestres plantae domesticis præferendæ**, ita **C I C H O R I U M I N T Y B U S**,
D A U C U S C A R O T A, **C O N I U M M A C U L A T U M** *), et **D I G I T A-
L I S P U R P U R E A** in hortis cultæ manipulus, vix æquiparabilis est ef-
ficacia drachmæ in loco natali collectæ *herbae* **;) excipiendæ ta-
men *plantæ*, quas experiundo didicimus, plus odoris efficaciæque
cultura mutuari, ut id in plerisque **V F R T I C I L L A T I S** et **C O M P O S I T I S**
L I N N E I ***) observare licet, puta de **M E N T H A**, **S A L V I A** OFF., **A N-**
T H E M I D E N O B I L I aliisque, ubi horticulturæ fundamentum depen-
det a loco *plantarum*, unde canones et principia artis forman-
da. Recentium *plantarum* partes aridis exhaustisque præponen-
dæ; quod in primis de his intelligendum, quarum activa prin-

*) Umbellatae in siccis, aromaticæ, calefacientes et pellentes (*Angelica*, *Pim-
pinella*, *Daucus*); in aquosis autem venenatae sunt, ut *Cicuta*, *Phellandrium*,
Apium *palustre*, quod cultura penitus mutatur.

**) Memorabile exemplum narrat *Boërhaavius*, de studio, qui venenatissimas
plantas in horto academico Lugduni Batavorum cultas: Atropam Belladonnam, Da-
turam Stramonium, Conium maculatum, citra ullum incommodum devoravit, ab
unico *Hyoscyamo nigro*, extra horti sepimenta crescente, vehementibus con-
vulsionibus corruptus, pœnam fere suæ petulantiae tulit.

***) Verticillatae sunt fragrantes, nervinæ, resolventes et pellentes. Folia vir-
tute pollut. Fragrantissimæ: *Marum*, *Dictamnus*, *Satureja*, *Origanium*, *Majo-
rana*, *Ocimum*, *Pulegium*, *Melissa*, *Lavandula*, *Rosmarinus*. *Syngenesia*
compositorum in Medicina receptissima communiter amara est; *M. Chamomilla*, *A. Cotula*, *Tanacetum*, *Centaurea benedicta*, *A. Absinthium* etc.

cipia constant e saponaceis partibus, ut in **ASPERIFOLIIS**, *) vel cum amaris coalescunt, ut in **CICHORIO INTYBO**, **LEONTODONTE TARAXACO** etc. Huc spectant cum primis **CRUCIFERA** Juss., **SILIQUOS** Lin., **.) ut est **SISYMBRIUM NASTURTIUM**, **COCHLEARIA ARMORACIA** etc. Colligi eas opportet cœlo sudo et sereno, tellure videlicet, sole jam orto, neutiquam rorescente. **Radices** annuarum **plantarum** legendæ sunt accedente efflorescentia proxime; biennes vero et perennes, altero anno, primo vere, rarius autumno. **Ligna** colligenda tempore hyemali, vel ineunte vere. **Stipites** (*ramuli arborum*) colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere. **Turiones** sunt novelli caules, vel rami, qui nondum *folia* protulere, colligendi antequam indurescant. **Gemmae** sunt *foliorum* et *florum* rudimenta, primo vere, decerpenda. **Cortices** tempore vernali desumendi, dum facililime a *ligno* secedunt, aut hyeme. **Herbae** (*caudices* adscendentibus) colligendæ quando incipiunt florere ***). **Folia** legenda, postquam defloruit, sed antequam *semina* maturavit, planta. **Flores** colligendi, quam primum dehiscere incipiunt, ante casum pollinis antherarum. **Antherae** colligendæ, antequam pollinem dimittant. **Fructus** legendi, dum pericarpia sponte sese aperire incipient. **Baccæ**, nisi maturæ, non avellantur. **Semina** colligenda, dum sponte a planta secedant, vel ubi pericarpia aridiora maturescentia, jam sese explicare incipient. Tempus a frondescentia *arborum*, excepto Syrio, ad eorum defoliationem, ab hora 7 matutina ad horam 7 vespertinam. At sedulo enitendum, ut *herbae*, seu *caudices* adscendentibus et *folia* colligantur sereno die, neque irrorata, neque calore flaccida, aut arida, vel decolorata. Ubi odoraria sunt, odore gaudeant sibi proprio. **Folia plantarum** mucosarum le-

*) Asperifoliæ magis minusque oleraceaæ, mucilaginosæ et glutinosæ sunt, Anchusa, Borago, Symphytum etc.

**) Siliquosæ aquosæ, acres, incidentes, abstergentes et diureticæ sunt; exsiccatione immunitur virtus.

***) Venenatissimæ et efficacissimæ herbæ, sœpe in prima estate et ante efflorescentiam infirmæ sunt. Aconiti Napelli tenella herba in alpinis regionibus a capris impune depascitur.

gantur juniora, succulenta. Indigenæ *herbae* quotannis colligendæ, præsertim odoriferæ. Locus siccus sapidiores, succulentus et umbrosus insipidas magis, aquosus sæpius corrosivas reddit; itaque in eadem specie, prior præferendus. *Fructus* *horaet* in humidis et umbrosis austiores, in siccis et soli expositis dulciores evadunt. *Radices* sicut et *herbae* tempore et æstate sicca collectæ, præstantiores sunt et diutius incorruptæ servantur. Etiam non quovis anni tempore, eadem pollutent virtute. Primo vere *radix Leontodontos Turaxaci* amaricata cum *salino* principio, extractum inde paratum nauseam, vel etiam vomitum excitare valet, autumno sapor ejusdem fit dulcis; extractum *syrupo de Saccharo* non dissimile, unde fit, quod sæpe *radices*, accidente efflorescentia penitus inefficaces deviant; vel tamen mutationem aliquam subeant. *Herbae narcoticae*, dementantes, ut *Aconitum*, *Atropa*, *Hyoscyamus*, eo sunt efficaciores, quo propiores temporis florescentiae. Versus autumnum, ex elaboratis *succis*, e biennibus et perennibus *plantis*, multum valent potissimum *rudices*, hoc tempore collectæ, diutius servantur, licet in regionibus borealibus ægrius siccantur. *Cortices arborum resinosarum* melius vere, fruticum autumno, a tenuioribus ramis, deglubendi. *Ligna* *hyeme*, vel vere ab *alburno*, liberanda. *Flores* minores, ut in *ACHILLEA*, *ARTEMISIA*, cum inflorescentia colligendi; *flores* maiores desumuntur efflorescentiæ tempore, absque calyce et pistillo, sola corolla servata, exceptis *aromaticis* et classis *DIDYNAMIÆ GYMNOSPERMIAE*, quorum medicamentosa virtus in calycibus continetur. *Semina* succulenta atque *oleo* abundanta, debent esse recentia, nequaquam rancida et bene nutrita; farinacea autem arida, integra, ponderosa, nec *corticem* habere levem, fragilem, perfacile divisibilem. Continentia *volatile oleum* sint recentia, plena; insipida vero et inodora, vacua rejicienda, nec non *aquæ supernatantia*, ope vibrionis et agitationis, fatua, a ponderosis, facile separanda.

EXSICCATIO ET CONSERVATIO VEGETABILIUM PARTIUM.

Radices lignosae, antequam exsiccentur, lignea parte privandæ, quæve crassæ, succulentæ, fibris epidermide aliisque alienis particulis, intra aquam purgandæ, conscindendæ in segmenta, vel taleolos, in umbra, aut leni calore, siccandæ, servandæ, vel in vitreis vasis, vel in cistis bene clausis. *Corticis et ligna* sint mediæ ætatis, aut findenda, aut radenda. *Herbae et flores*, vel hypocausti, vel communis furni torrefactorii calore, quo citius, eo melius, siccentur, quantitate et caloris gradu, quo id persicile fieri queat; nam ita vires earundem aptissime servantur, cujus indicium est color nativus, quam perfectissime constans. In quibusdam floribus is conservatur optime, si ante solis ortum collecti fuerint, ut in VERBASCO THAPSO, vel, si ad laminam ferream, carboni candenti, impositam, corollæ subito exsiccentur. Exsiccatione cum in omnibus SILIQUOSIS: SISYMBRIO, COCHLEARIA etc., tum in iis subtili materia volatili refertis, virtus imminuatur, vivæ sunt adhibendæ, vel post exsiccationem illico conterantur, ut Conii maculati folia, et vasis vitreis rite obturandis reponantur. In universum non vegetabilium solum, sed et animalium partes, præsertim indigenæ, in aridis conserventur locis, neque in camera cæmentitia, aut lateribus exstructa, utpote situm et humiditatem ex aëre attrahente; sed pro exsiccatione, sine ignis ope, expandendæ, libero aëris accessu siccandæ, radii solis abigendi, in ædificio exsiccatorio, tabulato supremo, spiraculis et valvulis, ferreo tecto, instructo, suis quæque bene clausis receptaculis, ex tabulis doliariis siccis, inodoris factis, reponendæ, vel vitreis vasis, quoad maximam partem, si fieri poterit, contra mucorem et teredinem, muniendæ; Aromate autem et principio acri volatili præditæ, non arido solum loco, sed et frigido servandæ, in vasis plerumque pro aromatis quantitate, vel alterius principii, hermetice clausis. Semina loco ab aëre perflato, sine ignis adminiculo, siccentur, oleosa loco frigido, sicco, capsulis involucra retinentia, his munitis, serventur.

PONDERA et MENSURÆ.

Pondera in pharmaceuticis Ruthenorum civilibus officinis usitata, a castrenibus quoque Pharmacopœis, recepta sunt, eorumque hæc est ratio:

Granum (gr. j.) ponderè granum seminis *Piperis* æquat,

Scrupulus (θj.) grana viginti continet.

Drachma (3j.) scrupulos tres habet.

Sicilicus (3jj) drachmas duas æquat.

Uncia (3j.) drachmas octo recipit.

Libra (libj) medicinali pondus unciarum 12 continetur.

Bilibra (libjj) duplum præcedentis habet.

Semis (β) est medietas alicujus ponderis, ut *semidrachma* (3β), *semuncia* (3β), *selibra* (libβ).

Sesqui est totum et dimidium, ut *sesquidrachma* (3jβ),

Sescuncia (3jβ), *Sesquilibra* (libjβ).

T A B U L A

EXACTIOREM PONDERUM NOTIONEM SISTENS.

	Libra	Seli- bra.	Uncia	Sem- uncia	Drach- ma.	Semi- drach- ma.	Seru- pulus.	Semi- seru- pulus.	Gra- num.
<i>Granum</i> . . .	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	1
<i>Semiscrupulus</i>	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	1	10
<i>Scrupulus</i> . . .	• •	• •	• •	• •	• •	• •	1	2	20
<i>Semidrachma</i>	• •	• •	• •	• •	• •	1	1	3	30
<i>Drachma</i> . . .	• •	• •	• •	• •	1	2	3	6	60
<i>Semuncia</i> . . .	• •	• •	• •	1	4	8	12	24	240
<i>Uncia</i>	• •	• •	1	2	8	16	24	48	480
<i>Selibra</i> . . .	• •	1	6	12	48	96	144	288	2880
<i>Libra</i>	1	2	12	24	96	192	288	576	5760

Hæc pondera *liquidorum* portionibus æque, ac *solidorum* determinandis inserviunt. Pro *liquidis* quidem et in primis *aquosis* mensurandis vasa adhibentur idonea, quæ ita facta sunt, ut libra, et uncia pondere respondeant libræ medicæ divisionibus. Mensurae pro siccis medicamentibus, præsertim vero *herbis*, hucusque apud nos usitatæ fuerunt sequentes:

Fasciculus, seu moles, quæ brachio complicato capitur, manipulos, præter propter, duodecim, æquiparans, selibræ æqualis pondere. *Manipulus*, seu moles, quam manu complecti possumus, pugillis quatuor, vel semunciae, æquivalens. *Pugillus*, seu moles, qua pollice et duobus digitis capi potest, cum drachmæ æquiparabilis; ast hæ mensuræ sunt vagæ, ut proinde satius esset *sicca* æque ac *liquida*, pondere potius, quam mensura, præscribere, ita quidem, ut loco *cochlearis* semuncia, loco *cyathi* unciae duæ, loco *pintæ* unciae sedecim, loco *mensuræ* libræ quatuor etc., aptius sumi queant.


DE DOSIBUS MEDICAMENTORUM.

In præsenti opere medicaminum præbia descripta sunt, qualia ab auctoribus in genere determinata sunt; nihilo tamen minus animadversione dignum est, eadem, pro re nata, augeri, aut diminui posse. Res circumstantes, quæ in remediorum efficaciam influunt, sunt sequentes: *sexus*, *temperamentum*, *consuetudo*, *morbi indoles*, *idiosyncrasia* et *aetas*. Sic v. g. *sexus* sequior in genere minorem cujuslibet medicamenti quantitatem requirit, quam masculinus; homines temperamento, sic dicto sanguineo, prædicti, minorem dosim ferunt ac illi, qui melancholico obnoxii sunt; ita consuetudo, plurium medicaminum in organismum animalem efficaciam, minuere solet, in primis *narcoticorum* et *stimulantium*, quæ et largiori interdum præbio impune capi possunt, eorum nempe usu per longius temporis spatium protracto. Nec minus morbi indoles remedii dosim immutare sæpenumero cogit. Idiosyncrasia tandem plurimum in moderandam *medicaminum* efficaciam influit; nam quædam individua magna pollent receptivitate ad ea remedia, quæ in genere omnino parvum exserunt effectum; quum in aliis maxime activa remedia, ut v. g. *Hydrargyrum*, vix aliquam efficacitatem exerceant. Aetas in determinanda medicaminum dosi certiorem omnino offert regulam, et sequens tabula *remedio-*

rum præbia eidem convenientia indicans, e clarissimi GAUBII operibus deprompta, junioribus Medicis inservire poterit.

<i>Aetas.</i>	<i>Quantitas proportionata.</i>	<i>Dosis relata ad aetatem.</i>
<i>Pro adulto.</i>	<i>Supposito, dosim in genere esse — 1.</i>	<i>Drachma.</i>
Bimestri	Requiritur solummodo $\frac{1}{15}$	gr. quatuor
Septimestri	· · · · · $\frac{1}{12}$	— quinque
Infra annum	· · · · · $\frac{1}{8}$	— sept. et semis
Bimulo	· · · · · $\frac{1}{6}$	— decem
Quadrimo	· · · · · $\frac{1}{4}$	— quindecim
Septenni	· · · · · $\frac{1}{3}$	Scrupulus
14 annorum	· · · · · $\frac{1}{2}$	Semidrachma
17 — — —	· · · · · $\frac{2}{3}$	Duo scrupuli
21 — — —	Dosis communis integra	Drachma.
63 — — —	· · · · · $\frac{11}{12}$	grana LV.
77 — — —	· · · · · $\frac{3}{6}$	scr. duo et semis
100 — — —	· · · · · $\frac{4}{6}$	— duo

Animadversione dignum est, sexaginta guttas aquæ 100 Alcoholis diluti, vel 120 Alcoholis, drachmæ mensuræ æquiparabiles esse.



P A R S . P R I M A

PHARMACOLOGIAM COMPREHENDENS.

*Simplicium medicamentorum et facultatum, quae in eis insunt,
cognitio, non necessaria est, ut sine ea nemo rite medicus queat.*

ORIBASIU.S.

PHARMACOLOGIA.

ACACIA CATECHU. WILDE.

MIMOSA

LINN.

Акація Індійська.

Arbor orientalis Indiæ, provinciæ Bahar familiaris, in montibus Rotas, et Pallamoro supra Bengaliam sita, copiose crescens. Class: Polygam. Ordo: Monoc. O. N. Lomentac. LINN. Leguminos. Juss. Usuale est:

E X T R A C T U M, (*terra Catechu, seu Japonica Pharm: Ross.*) Катеху, сухой Японской сокъ, est succus gummeoresinosus, e ligno arboris interiore, vel prout alii malunt, e nucleis, excocatus, et inspissatus, inæqualis, siccus, durus, friabilis, in fractura nitens, extus nigrescens, interne rubidus, Aceto, Alcohole diluto, et Vino fere omnis solubilis. Styptici *saporis* protinus dulcescentis, dein amaricantis, interdum, quod usui medico non convenit, cum terra punicea, argillacea renidente, commistus, nec Alcohole diluto, nec Aceto, nec Vino solubilis. Paratur etiam in ora Coromandeliana e fructibus Arecae Catechu. Alia etiam vegetabilia similem succum largiuntur; præcipue vero cortex Cassiae auriculatae, Acacie Leucophlaeae, et A. arabicae. *W.*

Q U A L I T A S eiusdem nititur maxima, ac prævalente parte, principio scytodepsico (*coriario, scytodephico, vulgo tannin*) dein extractiva, muco peculiari, et Oxalate Calcariae.

V I R T U S eiusdem adstrictoria; antiseptica; roborans.

U S U S internus in debilitate muscularium fibrarum canalis intestinalis, et hinc provenientibus pertinacibus alvi profluviis: diarrhoea; dysenteria; (senibus rebelli dysenteria vexatis cum successu exhibita est decoctura Oryzae, cuius unciæ 32 continebant extracti semidrachmam. **A L I B E R T.**) fluxu cœliaco; lien-

teria. Laudatur etiam in enuresi (incontinentia urinæ) relaxatione viarum uriniferarum orta, nec non in diabete; nec minus celebratur tanquam adstringens summe proficuum, in variis haemorrhagiis, in primis menorrhagia, ita etiam in hæmoptysi, hæmorrhoida immodica. Enterodynæ etiam plumbeæ (*colicae saturninae*) præsidio fuisse relatum accepimus, nec demum invilem opem præstare fertur in tussi ex raucedine. Alii extractum *Catechu* sincerum, vel *pastillorum* forma *Saccharo* remistum, in gratiam halitus, aut digestionis beneficium, in ore detinent, volvuntque, aut devorant. Pastæ odoriferæ in orientalibus terris componuntur ex extracto eiusdem, *Ambra*, *Moscho*, *mucilagine gummi Astragali Tragacanthæ*, subactis. (HERMBSTAEDT) *Extrinsecus* etiam adhibetur ad compescendas haemorrhagias, ad firmandas marcescentes, laxasque gingivas, in dentium vacillatione, stomachace, vel dentifriciis pulveribus additum, vel electuariis, vel etiam per modum tincturæ. In scorbuticis ulceribus, aliisque astheniæ notas ferentibus, adiicitur unguentis digestivis tinctura, vel ipsummet extractum melle exceptum, in unguentum coctitur, vel idem *gargarismata* repercutientia, anginosa, antiscorbutica, ingreditur.

Dosis a scrupulo ad sicilicum (*drachmas duas*) in substantia.

VIDESIS: *Infusum Catechu*; — — *opiatum*; *Tinctura Catechu*.

A C A C I A V E R A . W.

MIMOSA NILOTICA. L.

Акація Аравійська.

Arbor in Arabia præsertim petræa, Aegypto, in variis mediæ Africæ regionibus, Abyssinia &c. crescens, estque procera, spinosa, cortice rubicundo, spinis stipularibus geminis, digitum longis, foliis bipinnatis, partialibus bijugis, propriis octodecemjugis, glandula inter singula partialium paria, spicis floris globosis, flavis. Cl. et O. præcedentis. Perennis. Usuale est?

GUMMI (*gummi arabicum*, Ph. Ross.) Аравийская камедь, succus mucosus, solis æstu siccatus, in globulis diversæ magnitudinis, pellucidis, albescensibus, vel flavescentibus, rugosis, friabilibus, interne ad modum vitri splendentibus, in coriis e Cairo veniens. Simillimam lacrymam exhibit **ACACIA SENEgal**, amplissimas sylvas, inter fluvios Senegal, et Gambiam; et circa Tombuctu, constituens; vilior vero species, fulva, aut rufa ex **ACACIA ARABICA**, vel **GUMMIFERA** a **BROSSUONETTO** in Africa boreali detecta, provenire videtur, quæ minus pellucida, minusque solubilis est *aqua*. Interdum cum gummi *Pruni domesticae*, et *armeniaca*, majori glutinositate distinguendis, permiscetur. Pars gummi *Acaciae verae* sex partibus aquæ mucilaginem consistentiæ syrapi impertitur, diaphanam, e contra vilior crassiorem gelatinæ similem, mihius pellucidam dat. **ELICHENE ESCULENTO PALLASII**, in australi Russia crescente, parari potest coctione gummi, vix non in omnibus *arabico* conveniens.

Q. nimis mucilaginosa; alimentaria; dulcescens; *inodora*. Cum quadrupla aquæ portione mucilaginem syrapi mole impertitur, quæ e Nitrate Hydrargyri roseum, aut phæniceum colorem obtinet; e Nitrate autem Ferri flavescit, et floccis dein albescentibus præcipitatur. Ope *Acidi nitrisi Acidum oxalicum*, et *Oxalas Calcariae* formantur; Acidum autem citricum evolvitur ope *Acidi muriatici*.

V. eadem est, ac *mucilaginum*, ceterorumque *gummatum*: partes tensas humectat, et mitigat; algemata sopit; imo nutritium est; per sesquimensem enim hoc gummi unice vitam sustentavit in itinere **HASSELQUIST**, atque hoc etiam nomine magni æstimatur ab Æthiopibus Senegambiæ accolis.

U. *interne* in aquosa solutione obponitur: tussi; pertussi; taucitati; stranguriæ; paraphoniæ catarrhali; item non minoris est efficaciæ in morbis, ubi canalis intestinalis muco violenter denudatur, ut in diarrœa, dysenteria, tenesmo, quo in casu spasmos etiam doloresque inde profectos sopit. Mechanico usu valet ad sistendos sanguifluxus, (**OLLENROTH**) lenien-

damque intertriginem, ut e. g. læsis mamillarum papillis, vel inspergendo, vel illinendo *mucilaginem*, mollimentum præstat. Commode etiam, injecto clystere, aut mollimenti, aut nutritus gratia, adhibetur. Adcommodum est hoc *gummi fortioribus medicinis vehiculum*, præscribitur etiam, ut in vehiculis aquosis *camphora*, *resinae*, *balsama* et *olea* iisdem admista, teneantur, et ut pulverulentæ substantiæ *resinosae* massas effingendorum *catapotiorum* subintrare queant, haud secus ac ad terendum, et parumper oxydandum **HYDRARGYRUM**. Scire licet e *gummi Acaciae verae*, *Acidoque oxymuriatico*, justa methodo tractatis, *Acidum citricum* in scorbuto valentissimum, exsurgere; ex *Acido autem citrico*, *Acidum malicum*, *oxalicum*, et *saccharo-lacticum* obtineri posse.

D. in *pulvere*, et *solutum a drachma ad semunciam in octo uncias aquae*. *Mucilago ex aquae libra & gummi uncia crassamentum offert*, palato gratum, plurimisque indicationibus examussim respondens.

V. *Decoctura mucilaginea prima*; —— *secunda*; *Mucilago Acaciae*.

A C H I L L E A M I L L E F O L I U M.

Гулявица тысячелистная; Тысячелистникъ;
Деревей; Крововникъ; Дикая гречка.

Ubivis; in primis vero siccoribus in locis, et ad vias passim occurrens. *Cl.* Syngenes. *O.* superfl. *O.* *N.* Composit. radiat. *L.* Corymbifer. *J.* Perennis. *Usual.* sunt:

FLORES *corymbosi*, vulgo *summitates florentes*, calycibus ovalis, oblongis, imbricatis; *flosculi* radii circiter 4, dilatati. **FOLIA** pilosiuscula, bipinnata: pinnis pinnulisque oblongis, confertis, decussatis, argute dentatis. Aliæ species, uti **ACHILLEA NOBILIS**, **A. AGERATUM**, huic a quibusdam non modo substituuntur; sed etiam præferuntur.

Q. in *oleo volatili*, et *extractivo amaro* residet, **MATRICARIAE CHAMOMILLÆ**, analoga; plus tamen *extractivi*, quam illa-

minus olei continens. Saporis subadstringentis, subamari, cum indiciis, floribus præcipue insidentibus, aromatis.

V. leniter stimulans; peptica; sopiens; spasmos vasorum hæmorrhoidalium sedans, eorumque nimium fluxum, externe: discutiens, (HOFFMANN, STAHL) foliorum: cum primis tonica.

U. In morbis asthenicis, ut in hypochondriasi, hysteria, præeuntibus STAHLIO et HOFFMANNO, invaluit. In hæmorrhagiis pulmonum, vi subadstringente, leniter roborante, et spasmodicos motus sponiente prodest; utilitatem sane promittit in hæmoptysi, si ea a topica partis debilitate provenit, vel congectionibus a remotis partibus, aut sympatheticis nerveis stimulis exorta est, e. g. suppressa hæmorrhoides, aut si status morbi spasmodicus potius, quam inflammatorius urget. In metrorrhagia gravidarum, vel post partum, aut abortum, plurimum vallet, si hysteria laborat, et spasmis, (mobili nervorum systemate), (THOMAS) obnoxia est ægrota, et tum recte additur, FERRUM, vel, pro re nata, Acidum sulphuricum, congrua dosi. Prodest quoque in doloribus spasmodicis post partum, (MÖNCH) nec in nimia hæmorrhoides a debilitate, frustratui habet, (STAHL) quem in finem QUARINUS suadet extracti Millefolii partes quatuor, Ferri limati partem, ut fiant catapotia granorum trium pulvere corticis L. Cinnamomi conspergenda, atque tria, vel plura ter in diem sumenda. Ad hæmorrhoidem mucosam forma infusi haud ingrata, a florū drachmis tribus, cum aquae unciis octo, lacte admisto, mane hauriendi. (JUHLIN) In chronicis pulmonum affectibus, debilitate, accumulatione pituitæ, adenemphraxi (infarctione glandularum) stipatis, aut sub scrofuloso habitu magni cestimatur a MELLINO. Phthisiscentibus convenit, recteque ei tum additur CETRARIA ISLANDICA, aut sub scrofuloso habitu Tussilaginis Farfarae, si praesto sunt, folia. Variolas, per debilitatem retrogradas, usu ejus provocavit MAUMERY. An decoctura ejusdem fortior par sit movendo lotio, atque proliendis calculis, ut MELLINUS adseverat, experiendo discemus. Extrinsecus pro vulnerario habetur, additur

quippe aromaticis *cataplasmaibus* ad curanda impura vulnera, ulcera, contusiones etc, hinc planta *stratiotes* dicta.

D. *Florum unciæ duæ ad sesquilibram aquæ in infuso rite colando. Exhibitetur etiam succus foliorum expressus, aut folia in aqua infusa.*

V. *Extract. Millefolii; Mistura ejusdem.*

ACIDUM ACETICUM DILUTUM IMPURUM.

ACETUM VINI. Уксусъ.

Liquor acidus ex fermentatione vini acida natus, commodeque parabilis ex quovis fluido fermentationis vinosæ capaci, eidemque subjecto, calore (65 ad 75 Fahrenh.) apto. *Acidum aceticum dilutum* ceteris vegetabilibus *acidis* pro usu medico, haud immerito præfertur. Sincerum debet esse limpidum, purum, languide flavum, gustu et odore gratum, tantæque aciditatis, ut duæ unciæ ad saturandam perfecte *Subcarbonatis Potassae* drachmam sufficient. Congelatione fit fortius, et intensioris coloris; distillatione vero cum pulvere *carbonum* debilius quidem, atque gustui minus gratum; sed purius, et decolor redditur, et in primis præparatis pharmaceuticis, adcommodum. Turpilucridi oxypeptæ interdum, ut vim ejus intendant, *Acido sulphurico*, *muriatico*, et acribus quibusdam principiis, ut e *DAPHNE MEZEREO*, *CAPSICO ANNUO* &c. illud adulterare solent; si *Acido sulphurico* yitiatum est, tum adfusa *Barytae ipsius*, vel *Muriatis*, vel *Acetatis Barytae* solutio sedimentum album deponit, haud amplius plene in *Acido nitrico*, solubile. Si *Acido muriatico* adulteretur, tunc solutio *Nitratis Argenti*, subalbicantem turbidamque reddit mutationem. Si vero eidem *DAPHNE MEZEREUM*, aut *CAPSICUM ANNUUM* accessere, tum labio eodem humefacto, ubi evaporavit, ferventem imprimit sensum. Addita ad saturationem usque *Acidi*, *Potassa*, acridinem, si gustetur, manifesto proficit. Subinde præter opinionem *CUPRUM* eidem admistum offenditur, tum adjecto *Ammoniae Subcarbonate liquido*, detegitur colorem cœruleum impertiendo.

Q. Acidum aceticum dilutum impurum continet praeter *Acidum aceticum* et *tartaricum*, *Supertariratem Potassae*, *Saccharum mucosum*, *gluten*, *Alcohol* et *aquam*, atque id, quod ex *melle*, et *fructibus horaeis*, eruitur, *Acidum malicum*.

V. ejusdem, pro ratione concentrationis, partium constitutivarum, variat: modo refrigerans; refocillans nervos; adstrictoria; antiseptica; modo irritans, et excalfaciens, et tum subinde sudorem, rarius urinam ciens. Stomacho, si *cibis* addatur, aptum; vix tamem protracto, si fortius est, usu.

U. Congrue *dilutum* (unciae duæ conciliant *aquaæ* unciis triginta duabus gratum saporem) neurantistasibus sthenicis, (reactionibus vis vitæ præternaturaliter auctis) adcommodum, in primis *synochæ*, (cum vel sine topica affectione) cordis et vasorum præternaturalem energiam deprimendo, calorem ipsum inhibendo, ægrumque recreando, quem in finem antiquitas, *posca*, præcipue *mellis* admistu mitificata, nihil reliquit commendatius. Febribus biliosis vulgo dictis, ejusdem indolis, recte obponitur. Febribus asthenicis minoris gradus, calore sitiique stipatis, si potui detur, prodest; præcipue si stimulantia eidem, pro ratione debilitatis, fuerint adjuncta. Sudori movendo par est, præsertim, si is non neurasthenia, sed ex superante vasorum hæmatophororum actione (sthenica diathesi) suppressus est. Quamobrem in exanthematibus, morbillis, scarlatina, et id genus aliis, imo etiam in catarrho potui datum cum *infuso florum Sambuci n. Oxymelle*, juvat. Aptissimum est, ubi solidorum humorumque, exsuperante (ut quibusdam placet) *carbonico*, in putrefactionem pronitas, oboritur, haud securus in aliis neuroblaciis (reactionibus vis vitæ præternaturaliter imminutis) ut scorbuto etc, in quæ chemice, ad instar ceterorum acidorum, si potui detur, agens, corruptelæ huic adversatur, quem in finem, in sphacelo, et gangrænosis reptatibus, a summis viris commendatur, præcipue cum *cortice Cinchonæ off.* et *Quercus R.* aliisque similibus; aut confluentibus variolis (cum videlicet siccantes livent) per modum *amenti*, adponitur. *Fomenta calida*, cum *Alcoholæ diluto*, arœ-

maticis herbis, *Camphora* &c. in febribus, putridis vulgo dictis, pectori, abdomini, extremis partibus imposita, valent. In peste quoque effectus ejus insignes celebrarunt omnes, qui eadem correptis id exhibuerunt. Nullum adeo universale alexipharmacum antiquiores contra *narcoica venena* laudant, præcipue contra **D A T U R A M S T R A M O N I U M**, **H Y O S C Y A M U M N I G R U M**, **C O N I U M M A C U L A T U M**, **P A P A V E R S O M N I F E R U M**, **A C O N I T U M** etc. Si aceto gargarisetur, valida illa ex **A T R O P A B E L L A D O N N A** (*Ephem: German*), **R A N U N C U L I S** variis etc. in faucibus contractio, tollitur. Languentibus, lethargicis, soporosis, syncopticis, *Acidum aceticum*, naribus, orique admotum, vel in ventriculum ingestum, adcommodum est. In pituitosis glandularum mucosarum œsophagi, et amygdalarum infarctionibus, præstans præbet gargarisma, nec minus utile, in angina, stomachace, aphthis. *Clystere* in typho, herniis incarceratis, aut ascaridibus rectum intestinum occupantibus, injecto, recte subterdatur, nec minus prodest idem in pertinaci obstipatione alvi, æquali aquæ et *Aceti* portione, (*HERZ*) uti etiam in tenesmo dysenterico tepide, et crebro, non siphone, sed vesica, ex uncis duabus *Aceti*, et totidem aquæ commistis, injectus, præsertim, si sphincter ani simul *oleo camphorato* illitus fuerit (*BIRNSTIEL*). Quatenus arteriarum actionem in extremis auget, sanguinis congestionem ad caput imminuit, tum cephalalgiae admotum, præsertim cum *fermento panis nigri*, arteriarum extrema ad contractionem ciendo, sanguini propulso resistit, atque profluvia ejusdem inhibet. Hinc in epistaxi, stomorrhœa, &c. utile, si pars, pro re nata, linteo filatim carpto, *eodem* imbuto, aut *spongia* humectetur, aut *Acetum* injiciatur. Magni sane æstimantur a prægnantibus mulieribus, dum metrorrhagiæ metuunt, sic et ad arctissimum salutis exitiique confinium, nimio lochiorum fluxu perductas, involvere linteis *oxycrato* madefactis, obstetricii Medici solent. Nec in contusionibus, adustis, ecchysibus, irritum. *Acidum aceticum* valet in hæmorrhœa gingivarum, aut faucium scorbuticorum, hæmorrhagia alveoli post dentem evulsum. *Vapores ex Acido acetico* expectora-

tionem promovent, et humorum dissolutionem, nec minus valent ad aëra noxiū, et effluvia putrida contagiosaque corrīgenda; naribus autem adplicando ad refocillandos, sub operationibus chirurgicis, ægros, prosunt. Vis *sinapismorum* adjecto *Aceto* intenditur. Partem corporis, cui *emplastrum Lyttæ vesicatoriae* superdandum est, eodem humefieri expedit, intendendæ actionis causa. In pharmacia, uti solvens materiei activæ multarum substantiarum vegetabilium e. g. *Scillæ maritimæ bulbis* &c. adhibetur.

D. Quum *Acetum* potui datur, sescuncia ejusdem libra *aquaæ* diluta, addita *syrupi* semuncia, per vices, exhibetur. Duæ, quatuor unciae, vel selibra *Aceti* sumitur, et tantundem, aut pro re nata, plus *aquaæ*, *clysteris* injiciendi causa.

V. *Acetum camphor.* — *scillites*; *Acetum aceticum*; — — *dilut.* *Catapl.* *acetat.* *Clyster* — *Foment.* *acidum*; — *commune*; — *discut.* *Oxymel simpl.*

ACIPENSER STELLATUS et STURIO.

Севрюга и Осётръ.

Pisces in hospitalibus Rutheniae æquoribus, ut in hircano, ponto euxino, palude mæotide, lacu Baikal, atque in fluminibus Rha (Volga), Ural, Obi, Irti &c. habitantes. *Cl. Pisces.* *O. Branchiostegi CUVIER.* *Usualis* est:

ICHTHYOCOLLA (*Colla piscium*, рыбной клей) e diversis partibus **ACIPENSERIS** membranosis; præsertim vero ex interna vesicæ natatoriae dictæ, membrana, ratione vulgari, constantique, coctione videlicet, et inspissatione, paratur, atque convoluta varie, interdum in ferri equini formam contorta, venit. Aptissima est medicinæ, quæ ex **A. STURIONE** desumitur, ad quam tamen ea **A. STELLATI** bonitate accedit. Hæc utraque alba est, pellucida, sicca, insigni tenacitate instructa, minime pachiderma, saporis odorisque expers; in *aqua*, et *Alchohole* dissolvitur, & iisdem adfricat viscedinem. Quæ coctione, ut in oppido Gurjew, ex intestinis, pinnis, aliisque partibus harum, & aliarum

A C I P E N S E R I S specierum, ut ex A. H U S O N E (Бѣлуга) A. R U T H E N O (Стерлядь), nec non e S I L U R O G L A D I N E (Сомъ) obtinetur, minus probatur.

Q. Qualitatis est gelatinosæ, nutritoriæ. Centum *Ichthyocollae* grana, secundum cl. НАТСНЕТ, continent materiæ in aqua solubilis 98 & quod excurrit, quo *gelatinam* admodum nutritoriam præberi, nemo infitas ibit.

V. ergo ejus est demulcens; antiscorbutica; lexipyreta. Solutio cl. D A V Y, qua præsentiam *scytodepsici* probat, consistit in 100 granis *Ichthyocollae* in aquæ unciis viginti solutis, quæ, si lege artis, facta sit, ad 50° Fahr. in gelatinam abit.

U. Valenter curare dialeipyras (febres intermitentes) novissime cl. S E G U I N adseverat, quod aliorum experientia probandum est. Eidem usui, præter *Ichthyocollam*, inservit quæcunque alia vilioris pretii gelatina animalis, quæ antea in aqua coctione soluta, rite clarificata, atque *Saccharo* remista sufficiente, sed pro varianti ætate, diversa dosi, sub apyrexia sumi, & devicta dialeypyra, ne recrudescat, per aliquot dies continuari debet. (videsis: BOS TAURUS) *Menstruis* aquosis diluta demulcet, & relaxat, hinc in diarrhoeis, dysuria, asperitate faucium &c. præscribitur. FABRICIUS ab *Ichthyocolla* ope aquæ in formam tenuioris *gelatinæ*, redacta, cuius cochlear jure dilutum, pro dosi exhibebatur, salutiferos in curanda dysenteria, expertus est effectus. *Clysteribus* quoque demulcentibus adjicitur, præsertim in tenesmo & cnesmo. Praeterea ad liquores turbidos clarificandos, & conficiendam telam, sic dictam vulnerarium *Britannicam*, qua vulnera cutis leviora teguntur, saepius usurpatur; nec minus ob viscedinem, quam aquæ impertitur, ad vitra vasaque porcellanea glutinanda adhiberi potest, imo filis sericeis splendorem dare, *vinis* turbidis claritatem, fertur.

D. Semuncia cum libra aquæ decocta, addito, si lubet, lique re vitigeno, *Saccharoque*.

ACONITUM NEOMONTANUM.

Борецъ; Пригридъ; Люпикъ; Прострѣльная трава.

Nascitur in montosis, subalpinis. Occurit in omni Ruthenia, ad Kamtschatcam usque; præsertim vero in australibus Imperii oris. *Cl. Polyandr. O. Trigyn. O. N. Multisiliquæ L. Ranunculac. J. Perennis pl. Usualia sunt:*

FOLIA, nitida, digitato-quinquepartita, laciniis lato lanceolatis, brevissime dentatis, pedunculis glabris, galea convexa, cuculli calcare adunco obtuso, labio lanceolato, revoluto, bifido. *Folia Aconiti Cammari & Delphinii elati interdum ioco horum sumuntur.* Illa sunt quinquepartita, laciniis oblongo cuneiformibus, trifidis, dentatis, galea conica elongata; haec vero subpeltata, tripartita, laciniis multifidis, galea nulla, corolla quinquepetala.

Q. Venenifera, principio acri contenta, ipso odore nauseoso fortique, et acri sapore cognitu perfacilis.

V. Irritans; organismum animalem lacessens; narcotica; (sudorem ceterasque secretiones movens) zooctona. Omnes **Aconiti** species, flore cœruleo, præditæ, haud multum ratione virium, discrepant.

U. Ut nervos irritans, in variis paralyseos speciebus laudatur, ita paraliseos artuum brachii crurisque sinistri ex terrore subortæ, amavroseos &c. exempla leguntur curatæ; tumores quoque in osseam duritiem densatos discussit, **HIDRARGYRO** ipsi et **CONIO** m. immorigeros, haud secus ac glandularum scirrhos dissipavit. In plexus nerveos abdominis & venæ portarum agendo, productas torpore horum dialeipyras (**BURDACH**) uti & intumescentiam leucophlegmaticam, & œdematosam post hanc superstitem curat. In myodynia rheumatica, (rheumatalgia) etiam arthrodynia, ischiade nervosa, anchylosibus, solamen auxiliumque adfert, efficax. Nec in syphiide, psora, herpetibus, scrofulis, trichomate, spina ventosa, ulceribus, quæ cacoëthe vocant, irritum, imo, & ipsi phthisi obpositum.

D. *Foliorum pulvis a granis duobus ad quinque. Succi spissati:* granum mane et vesperi in *pulvere*, vel in *pilulis* ad quatuor, vel plura sensim adscendendo grana. *Hic, si anno vetustior est, fit virtute cassus.* Plantam recentem, incaute sumtam, interjecto brevi tempore, immanes ciere turbas, et quidem insignem imbecillitatem; motus faciei convulsivos; sudorem ejusdem frigidum; paralysin artuum; vomitiones biliosas & lividas; deliquium animi; involuntariam alvi dejectionem; asphyxiam; tandem vero mortem apoplecticam, experiundo dicimus.

V. *Succus Aconiti spissatus; Tinct. Aconiti; — — compos.*

A C O R U S C A L A M U S.

A C O R U S V E R U S Ph. Ross.

А иръ; Иръ; Лепешникъ.

Planta in Russia australi spontanea, scapi mucrone longissimo, foliaceo, in fossis, piscinis, stagnisque creberrima; Cl. Hexandr. O. Monogyn. O. N. Piperitæ. L. Arroideæ. J. Perennis. Usualis est:

RADIX, geniculata, spongiosa, crassitie pollicari, extus rubens, intus alba; primo, ac exeunte vere colligenda. Confusio rhizotomorum cum IRIDE PSEUDOACORO cuius radix intus rubicunda, extus subferruginea (nullo in eam cadente aromate) inodora, sapore acri, adstringenti, evitari facile potest.

Q. *Saporis est aromatici, acrisci, subamari; odorem dissecta fragrantem, præ se fert; destillatione pauxillum olei continet, et haud parum fœculæ largitur.*

V. Præstans, stimulans permanens; tonica; peptica; antisepatica, cum primis abnormitati reproductionis neurasthenia ortæ, succurens.

U. In neurantistasibus, astheniae notas ferentibus, laudatur, ita in myodynia rheumatica (HORN) in arthrodynia (Med. chir.

Zeitung 1808 No 97.) In dialeipyris & febribus remittentibus, typhodibus, rheumatica, catarrhali, aut nervosa complicatione stipatis, haud secus ac in nevroblaciis vitiosa reproductione conspicuis, ut in scorbuto (HOFFMANN), stomacace. (marcescentium gingivarum vitio.) Hunc in finem cerevisia quoque commendatur, addita cado ejusdem adhuc fervidæ selibra *radicis*. Cacostomacham indigestionem juvat. *Extrinsecus* pulvis ejusdem recte inspergitur ulceribus scrofulosis, ichorosis, putescentibus, gangrænescentibus, imo ipsi ossium cariei, vel per se, vel per modum *fetus*, *injectionis*. Odorem cancrosorum ulcerum emendat. (NIEmann) Inter indigena aromata, primum tenet, meritoque pro succedaneo, ceterorum *aromaticorum exoticorum*, majoris dispendii, habetur.

D. *Pulveris radicis* scrupulus, vel duo aliquoties de die cum *Saccharo*, vel sub forma *electuarii*. Datur quoque in *infuso*, vel *decoctura* (præsertim ad roboranda coctionis viscera) vel *decocto-infuso* e. g. *Uncia* decoquitur, atque in *decoctura* hac, semuncia *radicis* per semihoram digeritur, dein addita *Aetheris sulphurici alcoholisati* semuncia, duobus cochlearibus singula hora propinatur. Pulverata *radix* scopo antarthritico a 5 ad 15 grana, a neotericis, impensius hunc in finem laudantibus, propinatur.

V. *Infusum Calami; Tinctura ejusdem.*

ÆSCULUS HIPPOCASTANUM.

Каштанъ дикій.

Arbor Asiæ septentrionalis indigena; in Russia vero australi, ubi facile seminibus, vel sponte delapsis, vel terræ immisis, solo præcipue non nihil humido, propagatur, vulgaris. Cl. Heptandr. O. Monogyn. O. N. Trichilatæ. L. *Acera*. *J. Usualis est:*

Cortex, ramorum juniorum intus subluteus, *extrinsecus* epidermide ex rubro-fusca superinductus. Optimus decerpitur α

ramis trium digitorum crassitie; e *ramis* vero ætate nimis proiectis, vel admodum teneris, collectus, improbatur. Sub deglubendo alburnum simul adhærescit, antea cultro auferendum, ne *corticis* efficaciam minuat.. In pulverem tenuatus, si diu servetur, odorem vappidum, adversum, contrahit, et tum balsamica virtute sua orbatur. *Cortex* saucius stillat *succum balsamicum*, viscidum, *balsamo pineo-laricino*, æmulum.

Q. *Sapor* *corticis* e *ramis* triennibus alburno ablato adstringens, grataeque amarus est, quo ipso ad *corticem Cinchonae off.* proprius accedit, prout et colore non multum ab eo deflectit. Analysis chemica in propatulo est, parem eidem *gummosarum resinosarumque* particularum inesse portionem, neque absimile est vero, principio *scytodepsico* pollere.

V. Adstringens; roborans; lexipyreta.

U. Lexipyreta virtute inclaruit, neque tantum dialeipyras leviores, quales tertianæ, simplices, vernales plerumque sunt, sed etiam graviores hoc cortice sunt profligatae (**SABAROT. JUNGHANS, TURRA, ZANNICHELLI**). Citra ullum incommodum capi perhibetur, ni levem pectoris constricti sensum, quibusdam motum, excipere velis, *ptisanario mucilaginoso*, facile tollendum. (**SABAROT**) Infantili ætati æque, ac adultiori conductit. Alii in vomitu porraceo cum ventris tormentibus sævissimis, in blenorhœa (*gleet*) obstinata, ex atonia partis profecta, salutarem ejus effectum experti sunt, imo in epilepsia tribus, vel quatuor exemplis insultus retardasse visus est (**SABAROT**) Gangrænæ minæ, in crure hydropici obviæ, *Vino cui cortex* incoctus fuit, sublatæ sunt. (**CASTE, WILLEMET.**)

D. Cl. *TURRA* uncias *corticis* duas in duodecim partes æquales dividendas curavit in *pulvere* dari, quarum una, quarta quaque hora, cum *aqua pura* ingesta. **SABAROT** dimidia dosi acquievit, sub iisdem intervallis, capta. *Decociturae* pariter locus est, cui pro norma quodammodo esse potest illa: ex *corticis* unciis duabus, et *Subcarbonatis Potassæ* drachma cum æquac mensura sesquialtera, donec mensura una supersit, coc-

lis, cujus quotidie duo cyathi pro Thea usitati, sunt hausti.
JUNGHANS.

V. Decoctiona Cinchonae succedanea; Pulo. Cinchoñ. succedan.

ALISMA PLANTAGO.

PLANTAGO AQUATICA.

Частуха; Попупникъ водяной; Шильникъ.

Passim in aqua stagnanti, per totam occurrit Europam. Cl. Hexandr. O. Polygyn. O. N. Tripetaloidæ L. Juncic. J. Perennis. Usualis est:

HERBA, foliis ovatis, acutis; fructibus obtuse trigonis; radix bulbosa, perennis, fibrillis albescensibus constans.

Q. Principio acri nititur, atque eodem Ranunculorum simillima a HALLERO esse censemur. Secundum analysin a Prof. NELYUBIN institutam radicis hujus plantæ 1000 part. constant: ex olei volatilis 0,001; resinae propriæ indolis 0,26; Amyli 200; Sacchari mucosi 230; materiae vegeto-albuminosae 220; part. fibros. amyloc. 280; humoris 0,449, partibus. Sapor subdulcis, mucilaginosus, acriculusque.

V. Subadstringens; rubefaciens; venenata.

U. in hydrope, forma decoctionis (v. transact. Philos), in tabie hydrophoba radix commendatur, eique a Ruthenis ruricolis obponitur cum successu, idque sequenti modo: duæ circiter radices in pulverem tenuantur pro uno præbio, quo frustum panis butyro illitum respergitur, præbium tale bis terve iteratur, observato regimine vitæ congruo; in primis vero diæta lactea e. gr. lac vaccinum, vel ovillum, lac ebutyratum (Пахтанье) potui datur, vel alia, quæ præternaturalem erethismum sopiunt. Hydrophobia, certissimo rabiei symptomate, se manifestante, subsidiariam opem ferent Camphora, Moschus, Opium, in pilulis auctiori gradatim dosi propinata; recte quoque clyster injicitur e gummi-resina Asae foetidae, Oleoque hyos.

eyamino. Alii sanguinem ad deliquium animi detrahendum censerent. Hanc plantam a ruricolis adhiberi, et passim pro certissimo rabiei hydrophobæ *antidoto* haberet, certum est, quod quidem, etsi propria mea experientia non probarit; medicinam tamen plurimorum arbitratu efficacem, in Pharmacopoeiam duxi recipiendam, ulterioris experientiæ, capessendæ causa. — Animalia domestica, *boves* præcipue, et *oves* hanc plantam relinquere intactam, atque usu ejusdem gastrodyniam, enterodyniam, in inflammationem transituram, imo præmaturam brevi mortem subsequi, bubulcorum, et oviliorum observatio est.

ALLIUM CEPA.

Лукъ; Цибуля.

Colitur crebro in hortis. *Cl.* Hexandr. *O.* Monogyn. *O.* *N.* Liliaceæ L. Asphodel. *J.* Biennis. *Usualis* est:

RADIX RECENS, bulbus rotundus, depresso-ruber e membranis concentritis conflatus. *Bulbi* flaccidi, maculosi, aut in putredinem nitentes, usui medico alieni.

Q Recentis: *odor* peculiaris, alliaceus dictus, volatilis. *Radix* dissecata vapores lacrymas excientes spargit. *Sapore* est acriculo, subdulci. *Principio acri* nititur. (*Extrait d'un mémoire sur l'analyse chimique de l'oignon par M. Vauquelin. Annales du Mus. V. Ann: X et XI. Cal. 333*).

V. Recentis: stimulans; sudorem lotiumque movens; pituitam ducens; aphrodisiaca, extus rubefaciens. *Radicis coctæ:* extus emolliens, pus maturans; assatae: stimulans, externe per ditibus admotæ: excalefaciens, vesicans.

U. Agit in primis in plexus nerveos abdominis, quo caco-stomachæ indigestioni propere subvenit; spasmis quoque hysteriarum (quas etiam naribus subposita excitat) haud impar est tollendis. Actioni nervorum pulmonalium calcar addit, quo in pituitoso, spasmodicoque asthmate, screatus promovendo, utilis fit. Excretionem lotii intendendo *succus ex-*

pressus pro unciis binis, cum tantillo *Sacchari*, lotium optime provocat, et externe eius excretionem auget. Hydropicis; præcipue vero asciticis calculosisque, (ab his etiam in prophylaxin sumta,) non inutilis esse creditur. (*Ephem. German.*) Forma cataplasmati in pulpam contusa, et cum emollientibus regioni urocystidis superdata, retentioni urinæ, paralysi eiusdem ortæ, succurit; nec in bubonibus, varicibus, *cocca*, laude sua orbatur; in cophosi rheumatica, et susurro aurium, *succus gossypio* exceptus, meatuique auditorio inditus, (etiam irritando) confert; in herpetes vero *aci* suo principio agere videtur. In scorbuto (*cibis addita*) coercendo efficax. Interaneorum animalia, tum *interno usu*, quum injecto *clystere*, pellit. *Contusa*, si corpori admoveatur, irritando producit erythema. Condiendis *cibis* adcommodatissima, præsertim grassantibus contagiosis morbis. Militibus commendari meretur *iuscum caepinum* matutino tempore sorbillandum: bulbis 12 in lebete cum *butyro* ad rubedinem elixatis, ac *farina* denique conspersis, adiicitur *aqua* cum modica *Muriatis Soda*e, et *piperris* quantitate, coctione autem peracta, pauxillum *Aceti*. Haud dissimili virtute pollent: **ALLIUM ASCALONICUM — FISTULOSUM — SCHAEНОTRASUM — SCORODOPRASUM**, quæ rarius adhibentur in Medicina; ast deficiente **ALLIO SATIVO**, et ubi mitius agere expedite, vix sunt hæ species, despiciuntur ducendæ.

V. *Cataplasma maturans II. III; — Tritici caepinum.*

ALLIUM SATIVUM.

Чеснокъ.

Planta in hortis frequentissime culta; in Sicilia spontanea. (*MORISON*) *Cl.* et *O.* præcedentis. Perennis. *Usualis est:*

RADIX RECENS, bulbus subrotundus, membrana communis instructus, e bulbulis pluribus fasciculatim, varia serie, conjunctis, constans, quolibet fasciculo, propria tunica, obvelato. *Succus*

ex eadem elicitus quartam fere radicis partem constituit. Radix in sabulo adservanda; recens vero ob maiorem efficaciam præferenda.

Q. Principio acri, et pauco volatili oleo (ex eius decorticatae libra, olei volatilis drachmam, elicuit SPIELMANNUS) nititur. *Odor* eius est specificus, ingratus, penetralis, liberalius ingestæ, non modo halitum inquinans; sed etiam per lac, lotium, sudorem, (PAULIN) imo etiam per ulcus (KERKING) graveolens, volatilisque ita, ut in maiori etiam cœco diffundatur. *Sapor* acer, subcausticus. Siccatione, nec inodora, nec insipida fit.

V. Præstans: stimulans; pituitam, sudorem, lotiumque movens; pus maturans; rubefaciens; vesicans; antiscorbutica; anthelmintica, haud multum a SCILLA MARITIMA, medicamentosa vi, discrepans.

U. Culinaris uberrimus. *Radicis*, et *succi internus*, in helminthiasi apud plebejos vulgaris, rarius adversus tæniam efficax; inimicior vero lumbricis. Activitatem augendo vasorum lymphaticorum, exhalantiumque membranæ pulmonum mucosæ, asthmati pituitoso obponi posse haud infitior. Inveteratis sencionum catarrhis, (cum et sine radice Scillæ maritimæ) conducit, in tussi sane catarrhali apyreta, radix lacti incocta, atque ad libram mane ac vesperi potui data, adtestante magni nominis viro MURRAYO, profuit. In hydropisi iam dudum laudatur. Est inter exempla pestilentiae offecisse, imo calculosis etiam subvenisse. Dialeipyris autumno grassantibus BERGIUS obposuit, propinato ab initio mane et vesperi, *bulbulo*, (quotidie unum) dein addendo, donec febriens qualibet vice quatuor, vel quinque sumisset. Eodem scopo contusa radix carpis admovebatur, aut plantis pedum adposita excitando pertussim et coma febrile dispulit, eadem per modum *catalplasmatis* variolas asthenicas confluentes retrogradas, teste SYDENHAMO, magnæ existimationis clinico, revocavit; pubi vero adplicata in retentione lctii, paralysi urocystidis orta, molimentum præstitit. *Bombycina succo Allii* imbuta, nec non auris orificio aliquoties de die indita, in cophosi rheumatica

levamen adulit, qui *succus* etiam clavis, herpetibusque non inutilis, haud secus ac *contusa radix*, et cum *suilla adippe* imposta, verrucas extirpare perhibetur. Indigenum, arbitratu quo-rundam, efficax, *gummiresinae Assae foetidae*, et nonnullorum acrium, succedaneum.

D. Drachma, vel duæ non mansæ *radicis* deglutiuntur, vel uncia eiusdem contusæ in *ebullientis libra lactis* infunditur, vasculisque præbetur. Quod *clysteri* etiam adcommodum est, haud secus ac vapores ascaridibus rectum intestinum occupantibus, natibus ægri, in sella familiarica, cacaturientium ritu, incoxatis, in anum adscendentes, proficui.

V. *Clyster alliatus*; *Pilulae alliatae*; *Syrupus alliatus*.

ALOË PERFOLIATA, et SPICATA.

Сабуръ сквозелистной, и колосистной.

Frutex succulentus utriusque Indiæ, et Africæ meridionalis, et etiam in calidioribus Europæ regionibus crescens. Cl. Hæxandr. O. Monogyn. O. N. Liliaceæ L. Asphodel. J. Perennis. Usualis est:

GUMMIRESINA, est *succus* inspissatus, *Ruthenice* Сабуръ, qui si bonus, est *levis*, *splendens*, *pellucidus*, et *nigro-rubens*, comminutusque colorem ex *aureo-fulvum* exhibet, non modo ex hac; sed etiam **ALOË SPICATA** secundum *Cl. THUNBERG* (optimum præbente) obtentus. Ex insula Socotra oceani orientalis, facta optione, præferri debet *hepatica*, vel *barbadensi*. *Caballina* salivariis destinatur. Subinde adulteratur *gummi Acaciae verae*, *succo Glycyrrhizæ glabrae*, et *echinatae*, vel *baccarum Pruni spinosae spissato*, *resina*, et id genus aliis, sed tum *odor* est debilior, *sapor* minus amarus, in pulverem redacta non habet *aureo-lutescentem*, *gratum sinceræ colorem*; vel *succo*, expressione ex insula Barbadoës obtento viliori, vulgo *Aloë hepatica*, vel parte post expressionem residua *Aloë caballina* vulgo dicta, quæ tam *odoris* quam *saporis* sunt molesti, vel *pice*, (*prunis injecta*) semet prodente, proprio *odore*.

Q. Heroica, a principio magis extractivo, quam resinoso derivanda. *Odoris submyrrini*, guttur vellicantis, *saporis amaro* nauseosi.

V. Pro ratione dosis peptica; excalfaciens; cathartica; antihelminтика; menagoga, in vasa præcipue hæmorrhoidalia, et majora intestina agens.

U. In primis in asthenia, et hinc proveniente insensibilitate, laxitateque intestinorum, atque accumulatione in iisdem muci invaluit, ut nevroblacicus status plexum abdominalium organorumque, ad quæ nervi tendunt, tollatur, quem in finem additur, pro re nata, *radix Rhei p. varia Ferri* præparata, *Cucumeris Colocynthidis extractum*, et id genus alia, *Sapo*, *Submuriæ Hydrargyri*, idque adtemperata, vel roborandi, vel alvum ducendi scopo, dosi. Alii ictero, hypochondriasi, hydropisi, rhachitidi, atrophiæ, alvo habitualiter adstrictæ; in iis præsertim, qui sedentariam agunt vitam, et imbecillo laborant stomacho, obponunt eandem. Quid in ciendis sanguinis profluviis valeat, ejus in hæmorrhoida, et menstruis provocandis potestate, liquido perspicitur. Amenorrhœæ profecto opitulatur, si ægra non est mobili nervorum systemate prædita, sed flaccidi habitus, segnis, pallens, atque pituita abundans, præsertim in connubio amarorum, aliorumque catharticorum; prægnantibus ob metum abortus, aliena. *Catharticon* quoque animalia ventris subducens præbet. Notatu dignum est *Tartratis Stibii et Potassae* additione vim ejus catharticam intentiorem reddi. *Extrinsecus* ulceribus atonicis, putescentibus, cariei, otorrhœæ admota, aut epiphoræ (grano oculis inflato) occurrit.

D. Scopo irritandi: granum; eccoprotico: grana duo; cathartico: a quatuor ad decem grana, vel simpliciter per se, vel pro re nata, cum aliis catharticis, vel cum aromaticis, aut cum amaris, vel cum menagogis, *Ferro*, *gummiresina Myrrhae*, vel in solutio-
ne in *Alcohole*, vel in *pilulis*.

V. Clyster Aloës; — — compositus; Pilulae Aloës; Pilulae ejusdem et Stalagmitidis; — Aloës foetidae.

ALTHÆA OFFICINALIS.

Просвирниакъ аптечный.

In Europæ subhumidis, argillosis. Copiose in Chersonesotaurica, et Caucaso, ad rivulos et fossas, crescens. *Cl. Monodelph. O. Polyandr. O. N. Columnifer. L. Malvac. J. Perennis. Usualis est:*

HERBA, foliis tomentosis, oblongo-ovatis, obsolete trilobis, dentatis; **RADIX** crassitie calami scriptorii, et maiori interdum, extus subgrisea, interne alba. Frequenter ei, aut errore, aut dolo, **LAVATERA THURINGIACA**, substituitur; qua tamen medicamentosior est **ALTHÆA**. Prior differt *calyce* exteriore trifido, *foliis* subtomentosis, trilobis.

Q. Mucilaginosa. Dimidia fere *radicis* pars est blanda *mucilago*, quæ coquendo cum *aqua* extrahitur. *Folia* minus *mucilaginis*; plus vero *extractivi principii* habent. *Radix* est *indora*; *gustatu* vero copiam subdulcis *mucilaginis* dimittit.

V. Nutriens; emolliens; demulcens. Agit mechanice, vel stimulos involvendo, vel ab iisdem arcendo organicas partes, aut diluendo acre, debita liquidi, qua præbetur, quantitate.

U. In nevrantistasibus sthenicis, in ophthalmiis siccis, vel illacrymatione acri stipatis, per modum *fomentationis* e *mucilagine* tenui adornandæ, in inflammatione mammularum, et tuberculis hæmorrhoidalibus sensificis. Adhibetur quoque ad resarciendum naturalis *mucilaginis* dispendium, hinc raucis, tussiculosis, hæmoptoicis, phthisiscentibus adcommoda, vel sub forma *decoctus*, vel *pastæ*, vel *syrupi*. In angina gargarismatum e decoctura utile, haud secus ac in blenorragia injectio ex eadem tepefacta, internoque usu adiuta. Ita quoque in diarrœa, et dysenteria laudatur, haud secus ac in dysuria et spasmis urocystidis a calculo, vel venenis. Concise atque *aqua*, vel *lacte* decoctæ emolliendis, maturandisque tumoribus inflammatoriis, haud impar est cataplasma. *Foliorum* eadem ratio; sed minus, ut dictum est, *mucilaginis* continent.

D. Sicilicus, (drachmæ duæ) vel semuncia *radicis*, vel semuncia, aut uncia *herbae* ad dimidias libræ aquæ incoquitur, adjectoque melle exhibetur vasculis, vel selibra *decocturæ* sumitur pro clystere.

V. *Decocitura Althaeæ; Species ejusdem compositæ.*

A M O M U M C A R D A M O M U M.

ELETTARIA CARDAMOMUM (MATON).

Имбирь сплющивающийся; Кардамонъ.

Indiæ orientalis, nominatim Javæ, Ceylonæ, in locis crescens nemorosis ad radices montium sitis. Cl. Monandr. O. Monog. O. N. Scitamin. L. Cannæ. J. Perenn. Usualia sunt:

SEMINA, capsulæ triquetræ utrinque acuminatae, longitudine semipollucari, pericarpio fragili ex luteo subfusco, et seminibus aromaticis nigricantibus instructæ, quæ *Cardamomi minoris fructus* (*Ph. Ross.*) vocantur. Venalibus, interdum vetusta, vermiculosa, semihiantia, marcida, situm redolentia, rei medicinæ aliena, admiscentur.

Q. In volatili præcipue oleo residens. *Sapor acris, aromaticus; odor fragrans, acceptus.*

V. Stimulans permanens; calefaciens; tonica; anthelmintica?

U. In debilitate ventriculi; dyspepsia; cardialgia; enterodysnia flatulenta; chlorosi; tænia? laudantur. Semina masticata fœtentem animam reddunt gratiorem. Sæpius in connubio *amarorum* exhibitur.

D. Pulveris grana quinque ad scrupulum.

V. *Pulvis aromaticus.*

A M O M U M Z I N G I B E R.

Имбирь белый.

Planta in India-Orientali, insula Madagascar, Guinea, et aliis Africæ occidentalis regionibus crescens. Cl. et O. præcedentis. Perennis. *Usualis est:*

RADIX, ramosa, nodosa, compressa, rugosa, ponderosa, *extus* cinerascens, *intus* alba, maculis lutescentibus, subresinosis, fracturæ subfibrillosæ. Decorticata pro usu medico, in umbra cautius siccanda. Levis, vermibus exesa, fragilis, *intus* nigrescens, vetusta, rejicienda.

Q. Præstantissima, atque Cl. NEUMANNO probante in *extractivo*, et *resinoso* principio; non vero, ut quidam volunt, in *oleo volatili* residens. *Odore* aromatico, non ingratu quidem; ast nares ita lacescente, ut pulviculo in superficie separabili, sternutamenta provocare queat. *Sapor* masticatæ *radicis*: peracer, os fervoris sensu adficiens. Alii *oleum volatile* ad nonagesimam sextam sui ponderis partem tenere arbitrantur.

V. Irritans, in primis intestinalem canalem, ejusque peristalticum motum intendens, hinc *pepticarum* auxiliaria, tonicaque. Interdum leniter lotium, et transpirationem auget, rarius, dum masticatur, salivam, neque sic, ut cetera *aromata* excalfacit, eiusque effectus sunt durabiliores.

U. Principio suo acri in organon respirationis agit, hinc *vis ejus* medicamentosa, in accumulatione pituitæ; pertussi; *tussi stomachica*, titillatoria, (*cum melle*) elucet. Uvulae e pituita nimis prolongatæ, justa sedes, et magnitudo *pulvere radicis A. Zingiberis* per manubrium cochlearis admoto, et eadem *cum Supersulphate Aluminæ et Potassæ* adhibito restituitur. Languenti neuroblacia ventriculo calcar addit, hinc in omnibus iis morbis, qui hinc originem ducunt, vel his cum molestiis sunt coniuncti, ex. gr. bradypepsia, anorexia, enterodynbia flatulenta, arthrodynia, tympanitide etc. opitulatur. Materiam arthriticam radice decocta lacte, sumtaque, ad extremitates inferiores relegari nuperrime didicimus. (BANES.) Inter *lexipyrata* referri posse existimabatur, rectius inter *aromata*, *cortici Cinchonae*, ne ventriculum molestet, addi solita, locum occupat. (HEBERDEN). In odontalgia *tinctura ejusdem* gossypio instillata, et gingivis admota, mollimentum, educta saliva, præstitit. (NIEMANN.) Conditum *A. Zingiberis* exoticum, confectum e sicca *radice*, a pistoribus dulciariis in Europa, merito præfertur. In

pulverem redacta, et *Alcohole* humectata, paulum incenso et postea extincto, ut valde rubefaciens, (cum scilicet celer irritatio intenditur), commendari meretur.

D. In pulverem tenuata, a decem ad quindecim grana exhibetur; ventriculo autem viscida colluvie onerato, *Sales neutri* adduntur. Interdum *mel* adjicitur, et tum fit remedium *Zingiberis syrupo* succedaneum.

V. *Syrupus Zingiberis.*

A M Y L U M T R I T I C I N U M.

Крохмаль; Трухмаль.

Principium farinaceum, e *farina seminum Tritici*, aqua frigida, relicto *principio glutinoso*, et *saccharino*, elicitum, vel prævia fermentatione *seminum*, eorum conquassatione, et edulcoratione pulveris præparatum.

Q. Pulvis subtilis, albus, inodorus, *saporis* farinacei adfusa eidem *aqua cocta* in *mucilaginem* (pultem viscidam) solubilis; *frigida* vero solvi nescius, neque colorem *tincturae Parmeliae Roccellae* in rubrum mutans.

V. Obvolvens; glutinans; exsiccans.

U. *Amylum* clystere injectum, in diarrhœa, dysenteria, tenesmo, cholera, enterodynia, et spasmis abdominis, additis præcipue congruis e. g. *opio* valet. Pulvis *Amyli* excoriationibus recte adspergitur; ast comprehendendis catapotiis, ne nimis indurescant, alienus.

D. Sesquidrachma *Amyli* adultis in clystere, in calidæ *aquaæ* libra, rite colata, subterdatur.

V. *Clyster Amyli*; — *nutriend;* — *opiatuſ.*

A N E T H U M F O E N I C U L U M.

F O E N I C U L U M V U L G A R E. H O F F M.

Укропъ; Копръ Волохскій.

In Rutheniae australis rupibus cum primis cretaceis. In planicie provinciæ Schirvan, circa oppidum Schamachi, ita copio-

sum, ut Ruthenicus exercitus, castris, anno 1796, mense Novem-
bri, sub hoc oppido, positis, per octiduum plantæ hujus cau-
libus emarcidis, ferme solis, ligni vice, usus sit. *Cf.* Pentandr. O.
Digyn. O. N. Umbellat. L. Umbellifer. J. Perennis. *Usualia sunt:*

S E M I N A, ovato-oblonga, *hinc* convexa, lincis quinque rotun-
datis, elevatis, pallidis, notata, *inde* plana, bipartibilia, duas li-
neas longa, pallida. Intermixta quandoque inveniuntur *semina*
imnatura, vel et corrupta, odoris et saporis expertia, quæ
rejicienda sunt.

Q. Præstans: in volatili *oleo*, non acri, residens. *Odor* sub-
aromaticus; *sapor* aromaticus dulcescens.

V. Carminativa; bechica; lactifera.

U. Ut leniter irritantia nervos canalis intestinalis, infantibus,
ventriculo perinfirmo, enterodynia, cita alvo, pituita laboran-
tibus, cum *Magnesia*, exhibitentur. In astmate, tussi catarrhali
et pituitosa, screatus levant, præsertim cum *Suboxydo Stibii*
hydrosulphurato etc. vel in *infuso* cum *radice Inulae Helenii*,
Althaeæ officinalis, *Tussilaginis Farfarae*. In Italia copiosissime
colitur **F O E N I C U L U M D U L C E**, et planta junior cum *radice*, et
herba frequenter ibi estur cruda, cum *Muriate Sodæ*, et *pane*,
(**L A B A T.**) Apud nos *semina* pulverata cum *Subcarbonate Ma-*
gnesiae, *cortice* *flavo fructus* *Citri aurantii*, ad lac nutricum,
vel deficiens, vel suppressum, dantur augendum.

D. *Seminam* pulvis a scrupulo ad semidrachmam. Pro *infuso*
drachmæ duæ in selibra *aquæ*. *Olei* volatilis guttæ duæ ad
sex; aquæ vero unciae tres.

V. *Aqua Anethi Fœniculi; Elaeosaccharum—; Oleum— volatile.*

A N G E L I C A A R C H A N G E L I C A.

A R C H A N G E L I C A O F F I C I N A L I S (HOFFM.) **A N G E L I C A S A T I V A.** Ph. Ross.

Дягиль; Дягильникъ; Коровошникъ.

Pl. in Russia boreali, Lapponia, Islandia, plerumque in monto-
sis, et ad ripas fluviorum, iisdem proximorum, crescents.
Cf. Pentandr. O. Digynia. O. N. Umbellat. L. Umbellifer. J.
Biennis. *Usualis est:*

RADIX, fibrosa, rhizomate oblongo, crasso, *extus ex flavo rubens*, in superficiebus segmentorum transversorum alba, maculis numerosis, flavis, *oleo volatili* repletis, punctata. Vernali tempore, foliis radicalibus propulsis, effodienda. Si, ineunte vere, incidatur, *sucuum* flavum fundit, qui siccatus *gummiresinam* præbet, virtutibus *Angelicae* medicamentosis, abunde dotatam. Ab **ANGELICA SYLVESTRIS**, perenni, minus efficaci, quæ interdum *A. Archangelicae* dolose subrogatur, probe distinguenda. **SYLVESTRIS** nascitur in locis subhumidis, habetque flores rubellos, et foliola æqualia ovato-lanceolata, serrata, cum altera floribus gaudeat virescentibus, foliorum impari lobato, ejusque radix sit admodum tenax, multoque fragrantior, exhibeatque copiosa puncta flava, transversim secta. **FOLIA.**

Q. Stirps omnibus partibus aromatica, et *Moschum* quodammodo redolens. *Radix* præter *Camphoram*, *extractivo principio*, *resina*, et *oleo volatili* nititur. *Odor* fragrans; *sapor aromaticus*, acris, excalfaciens.

V. *Raditis*, stimulans, sudorifica; *masticatae*: movens salivam, *foliorum*, secundum experimenta cel. **PRINGLE**: antiseptica.

U. In morbis asthenicis, stimulo egentibus, typhodibus, in primis contagiosis, præsertim ubi actio in cutem e re fore censemur. In paralyticis adfectionibus. In myodynbia rheumatica, ubi transpirationis ratio habenda. Ita in collectionibus pulmonum pituitosis, catarrho chronicō, asthmate, cum *Suboxydo Stibii hydrosulphurato*, *radice Inulae Helenii* etc. Lappones tussi, raucedine aliisque pectoris morbis vexati, *caules Angelicae*, cineribus calidis assatos, edunt. (**SIELLSTROM.**) Ceterum **A. ARCHANGELICA**, **DORSTENIAE CONTRAYERVERAE**, **VALERIANAE OFF.** et **A. SERPENTARIAE** æquivalet, iisque, ubi hæ desunt, apte substituitur.

D. Rarius in pulvere a decem granis ad scrupulum datur, justius infusi aquosi (rubro-purpurascens, nec *Sulphate Ferri* nigrescentis) e semuncia cum *aqua* unciis octo parati, seunda quaque hora, cochlearia duo, exhibentur.

V. *Infusum Angelicae.*

ANTHEMIS NOBILIS.

CHAMOMILLA ROMANA. PH. ROSS.

Ромашка Римская; Пупавка.

Europæ australis, in pratis quoque Rutheniæ temperatorium spontanea; alibi vero hortensis, *foliis bipinnatis, foliolis bipartitis, linearibz subulatis, subvillosis, flore pleno. Cl. Syngenesia. O. superflua. O. N. Composit. radiat. L. Corymbifer. J. Annua. Usuales sunt:*

FLORES, compositi radiati, receptaculo fere plano, paleaceo, floribus *disci*: in spontanea flavis, aromaticis; *radii* vero numerosis, brevibus, fere insipidis.

Q. Egregia in *oleo volatili*, et *extractivo amaro* sita. *Odor suaveolens, sapor amarus.*

V. Tonica; sudorifica; antispasmodica; hystericas grata.

U. In hypochondriasi; hysteria; amenorrhœa; vomitionibus puerarum; doloribus post partum; enterodynias spasmatica ab inflatione. Olim in dialeipyris magni pendebantur, scrupulo eorundem, quarta quaque hora, exhibito. *Extractum admodum amarum variis eiusdem indolis medicinis sub forma pilularum, vel electuarii exhibetur. Oleum est præstans antispasmodicum.*

D. Decem flores, et plus ad libram *bullientis aquae interne, externe* per modum *clysteris, et fomenti. Infusum concentratum multis nauseam movet.*

V. *Extractum Anthemidis nobilis; Oleum — —.*

APIS MELLIFICA.

Пчела.

In Russia ubivis, præsertim in apariis; libentius tamen in australi, quam ceteris Ruthenici Imperii oris. *Cl. Insecta. O. Hymenoptera. Usualia sunt:*

MEL, seu *mucilugo vegetabilis oxydata, spissa, subpellucida, filamentorum instar ductilis, ab apibus e nectariis florum col-*

Iecta, atque in earum corpore quodammodo alterata. a) Habetur ope secretionis, *Mel saccharinum* (*narbonense*) referens substantiam admodum albida, granulosam, suaviter olenem. b) *Mel album*, seu *virgineum* vulgo dictum, sponte e favis juniorum insectorum exstillans. c) *Mel commune* seu *crudum*, calore pressioneque e cellulis apum ceraceis prolicitum. *CERA* materia vegetabilis propriæ indolis, quæ ab apibus collecta, et in aparia deposita, solidam favorum substantiam constituit, iisque, separato antea *melle*, *aqua fervida*, liquefactis, obtinetur, et *Cerae flavae*, vel *crudæ*, nomine insignitur. Ubi vero *cera cruda* per apricationem sub frequenti aquæ adspersione, colore flavo orbata, ac indurata est, *Cera alba*, dicitur. Inter *vegetabilia*, et *animalia olea*, medium tenet *Cera*, illa majori quantitate *oxygenii*; haec vero *carbonici* superans, pro cuius ratione, etiam consistentiam obtinet. *Mel purum* commiscetur interdum cum *impuro*, fermentationem perpresso, acescente, amaricante, humorem redolente, vel *mucido*, bullas e superficie sua emitente, æquaque validius expresso, usui medico minus apto; adulteratur vero *aqua*, et tum cito difflit effusum; ita etiam *radicibus Dauci Carotae*, aliisque *dulcibus succis*, quo in casu turbidum redditur, neque amplius ad modum filamentorum ductile, multumque, mutato jam odore, sedimenti deponit; subinde etiam *Amylo* tenuius contuso, aut *farina miliaria*, aut e *pisis*; sed tum fraus striis albis proditur, et sedimento, solutione aquosa, farinaceo. *Cera*, si *resinis* adulteretur, tum fraus *Alcohole* eas solvente detegitur; si vero aut *farina*, aut *terra* eidem admista sunt, quum liquefit, fundum illa petunt. *Sulphur* adjectum, proprio se, in prunis, prodit odore.

Q. 1. *Mellis*: saccharino-mucilaginosa. *Odor* ejus fragrans, isque haud raro plantas, e quibus legitur, redolet. *ALLIUM URΣINUM* e. g. suum nauseosum cum eo communicat odorem, ita etiam *TILIAE*, et *ROSMARINUS*, sibi proprium. *Mel tauricum* in Russia odoratius, saporeque est proprio dulci. Quod sub torridis zonis e *narcoticis plantis* legitur ab apibus, est veneniferum. *Azaleae ponticae flores* nectare scatent *hydrogeno-carbonico*, unde ve-

penatum mel parari ab apibus, certum est. Mel, acido excepto, quod in eo minus obtunditur, parum a Saccharo discrepans, solvitur, ut hoc, in aqua et Alcohole diluto, nec non sale essentiali pariter, et substantia viscosa-oleosa, teste PLENCKIO, constat. 2. Cera oleosa qualitas: Odoris cera alba expers; flava vero odorem, usi et saporem, melli analogum, prae se fert. Alcohole et Aethere sulphurico ope caloris solvitur ceræ $\frac{1}{20}$, ex qua autem non parum ex post fundum rursus petit. Aqua non multum e cera extrahitur. Principium ceriferum, quod tanquam vernice amicit plures fructus, ut pruna, et observante meritissimo equite ab HUMBOLDT CEROXYLON ANDICOLAM, modo corticis, ambit, apes, praesertim ex polline plantarum, colligunt. Liquescit cera ad 140° F. th.

V. *Mellis*: nutriens; demulcens; deobstruens; expectorans; laxans; diuretica; antiseptica; extrinsecus maturans. *Cerae*: emollientis; involvens, non omni balsamica parte expers. (NIEMANN.)

U. *Mellis*, misturis resolventibus additi, in morbis pulmonum asthenicis, pituitosis, praesertim sine febri, atque substatu catarrhali, in aqua *A. Foeniculi*, adjecto *Suboxydi Stibii hydrosulphurati* tantillo, solutum, huic fini optime respondet. Phthisi confirmatae alienum. Nephralgiae cum *Oleo*, et *Sapone* a quibusdam Britannis obponitur, forsitan et *gas carbonici* ad vias uriniferas, ut quidam volunt, evolutione, proficuum. Hunc in fine partem *Olei olivi*, cum quatuor partibus *Mellis* commiscent, et cochleatim propinant alii. Nec in splanchemphraxi abdominali illaudatum. *Aqua* dilutum, et largissimis haustibus epotum *mel*, ad superandam acrium ingestorum ferociam, per quam efficax esse DIOSCORIDES contendit. Propter facilem fermentationem fatus gignit; digestionem impedit in imbecillis, et alvifluxus ciet. *Extrinsecus* collo inunctum utile esse censetur in variis anginis, tussi catarrhali, asthmate chronicō; uti et abdomini eodem modo applicatum, infarctus hypochondriacorum resolvere, lumbricos enecare fertur. (RHEDY.) In *garganis* et *collutoriis* cum herba *Salviae officinalis*, floribus *Samosci* n. herba *Malvae rotundifoliae*, et *sylvestris*, vel ad maturandos abscessus adhibetur cum radice recenti *Allii Cepae*, *farina*, *stig-*

matibus pistilli Croci salivi, vel ad depuranda ulcera, præsentim scorbutica cuin *gummi resina Myrrhae*, *extracto corticis viridis fructus immaturi Juglandis regiae*, *balsamo pineo-laricino*, vel *clysteribus adjicitur cum sero lactis, infuso florum M. Chamomillae*, vel ad resolvendam mammarum *lacte* turgescentium duritiem cum *Conii m. foliis*, rite in pulverem tenuatis, subterdatur, aut *secalino farre* subactum, forma *emplastri*, vel *capplasmatis* phlegmone, furunculis, admovetur. *Mel* cum *balsamo pineo-laricino* simplicissimum efficit remedium ad ulcera detergenda, vigoremque in eis exsuscitandum. Cum parva *bilis taurinac*, et *Sulphatis Zinci* portione commistum, maculis corneæ; præprimis vero *nephelio*, etc. medetur; neque minus in *Alcoholi diluto* solutum, ossa cariosa denudata sanat. (PLENCK) *Cerae* quoque usus multiplex: *flava* soluta, et excoriationibus interaneorum, diarrhoeis, dysenteriæ (addito, suboriente putrida diathesi, tantillo *Acidi sulphurici*) tenesmo, haemorrhagiæ intestini recti ab acri, obponitur. Suffimen etiam ex ea phthisiscentibus utile esse perhibetur; (BILLARD.) quod tamen inflammatorio statui, et vomicis alienum. (MORIN.) *Pileola* pro obtegendis papillis mammarum excoriatis *ceracea* parvi momenti sunt, cum cito mollescant. Globulis e cera, admotis vasis læsis, haemorrhagia a dente evulso, et ea, quæ paracenthesin insequitur, apte cohibetur.

D. Pro *usu interno* *mellis* drachmæ aliquot exhiberi possunt ad semel; in nephralgia autem duæ etiam unciæ per diem. Pro *clystere* semuncia, vel uncia sufficit. *Scopo electuarii*, pro uncia *pulveris*, binisque unciis *aquaæ*, tres *mellis* unciæ, sumuntur plerumque. *Saccharum*, dum licet, *melli* præferendum; hoc enim interdum enterodyniam, et tormina producit. *Cera* a scrupulo ad semidrachmain pro dosi, nempe cum quatuor *syrupi* partibus colliquefacta, vel cum *solutione gummi Acaciae verae* in *aqua* servefacta commista, vel cum *vitello ovi* contrita, addito quopiam pingui *oleo*, e *mucilaginosa* quavis potionē, v. g. *decoctura polentæ avenaceæ*, sumitur. Alii *ceram* cum *lacte* liquefactam propinant; sed id improbandum.

V. Ceromel; Empl. simplex; Mel despumatum; — rosatum; Mist. Cerae adstringens; Oxymel; Cerata; Emplastra; Unguentaque varia.

A Q U A.

B o d a.

Universale elementum, sicut et *aer*, *qua* habetur, uberrimum, tum propter plantas, tum propter animalia, vitae pabulum. Omnem terrarum orbem circumdat, estque omnibus organicis corporibus, quae absque illa, neque oriri, neque ullo modo existere possent, et pro initio, et pro valido nutrimente. Solvendo praesertim agit, proinde commune omnium rerum menstruum, sicut et omnium, tum mere chemicorum, quum organicorum quoque processuum, maximus dicitur fons, et sedes.

Q. Veteribus pro simplici quodam elemento habita est; adcuratissimis vero LAVOYSIERI investigationibus, et experimentis constare 86,733 Oxygenii, et 13,267 Hydrogenii partibus perhibetur, atque ad corpora composita semiusta merito refertur. A 1° ad 80° Reaum. therm. adparet fluida, mobilis, *insipida* est, si a peregrinis partibus libera, *inodora*, penetrabilis, omnisque elasticitatis expers, continetur autem, quod ad specificum aëris pondus, ut 1: 856. Ad ignem facile effervescit, remotoque calore refrigeratur, in quiete nullum offert sedimentum, *liquore alcalino*, et *solutione Argenti guttatum* infusis, non fit turbida. Sub tribus præcipue diversis formis, *vaporosa* scilicet, *fluida*, et *solida*, ut sub specie *pruinæ*, *nivis*, *grandinis*, *glaciei*, *imbris*, *roris*, *pluviae* in atmosphera occurrit, totumque continentem lavat, et varie illum dividit.

V. *aqua* medica, secundum varium ejus caloris gradum, varia; *frigida* enim adinstar electricæ vis, ut rite Illustr. HUFELANDUS observavit, excitat partes corporis, atque infirmatis robur quoddam ingerit, leviter irritat, comprimit; *tepidæ* autem relaxat, resolvit, concoquit, salivam lotumque movet; sæpe vomitum ciet.

U. *Aqua frigida interiorne* exhibita, ob vim suam comprimentem, sistit haemorrhagias a relaxatione vasorum ortas, haematemesis etiam, haemoptysin, atque ipsam metrorrhagiam, nulla scilicet corruptela, et destructione organica, praesente. In hysteris, atque hypochondriacis, mirum quantum, levaminis praestat; in ictero etiam curando, teste **SUMMAIRE**, magnam ferre opem, neque non prodesse posse, in tenuiæ insultibus, et cruciatu, merito creditur; *tepidam* autem aquam nauseam facere, movere vomitum, et illum facilitare, vel tritissimum est, et larga dosi hocce scopo porrecta, omnium vomifiorum præstantissima jure habetur; leni enim agit modo, nullas producit molestias, et bene dissolutis in intimis ventriculi contentis, faciliorem eorum evacuationem promovet. Præterea optimo plurimorum medicaminum, ad usum internum, quum vehiculo, tum menstruo, inservit, latissimi quoque est, et domestici, et pharmaceutici usus. *Usus aquae* in medicina externus non minoris etiam est amplitudinis: *Lotiones*, et *balnea frigida*, atque *tepidæ* variis modis instituta, non solum munditiem, optimum sanitatis præsidium, conservant, verum etiam, et in multis, vel gravioribus curandis morbis, magni aestimantur. Sic exanthemata, et ulceræ chronica cacoëthea, diu moleste durantia, validisque remediis resistentia, ablutionibus e *frigida* atque *tepidæ aqua* identidem institutis, omnino devicta exterminataque fuisse prædicavit **SMITHIUS**. Sanguinem e partibus corporis externis, post vasorum læsionem, effluentem, *frigida* cito sistit *aqua*, et varias ecchymoses, et sanguineas maculas, ni scilicet scorbuticæ sint indolis, discutere saepissime valet. Gravissimo oppressi neruoso typho, Britannorum suasu, aliquoties in *frigidam* immersi *aquam*, brevi tempore perfectam recuperare sanitatem. Atrox ac rebellis cephalalgia, **MAYERNE** testante, facilime domatur *frigida aqua*, ubertim in caput effusa, vel guttatione in rasam ejus partem stillata. In mania curanda *balnearum frigidissimorum*, nec non *embrocationis* solius, vel supra caput ex alto *fusionis*, aut etiam topicæ, vel totius corporis *ablutionis* simplicis, maxima efficacia passim laudatur.

Lypothimia, vel syncope affecti, aquae frigidae, per vultum et pectus adspersione, facile excitantur, atque sensibus restituuntur. Multa aquae tepidae merita, in plurimis infantum præcipue, tum convulsivis, tum spasmodicis affectionibus, disertissimi auctores: GIRTANNER, LEVRET, ROSENSTEIN et alii testantur. Adhibetur etiam aqua tepida, sicut et frigida, ad clysteres, tum diluentes, tum irritantes, tum ad humidas quoque fomentationes: sic topice applicata topicæ etiam debilitati occurrit, ut vasorum e. g. sanguiferorum atoniæ, encephali etc., atque frequentissimum est quoque remedium, post capitum laesiones, in tumoribus sanguineis; in commotione atque extravasatione cerebri; in phrenitide; apoplexia etc. In enteritide, dysenteria, ischuria, atque aliis multis inflammationibus topicis insigne adfert levamen. In arthrodynia et variis affectibus, spasmorumque modis, incredibile dictu, quam salutarein præstet effectum. Quam largus balneorum usus paucis enarrare difficile est. Dividi illa possent, MARCARIO præunte, in calida et tepida, frigidula et frigida. Prima scilicet nominantur, quorum temperatura caloris gradum in sanguine humano XCVI° apud Fahr. therm. designatum, superant; tepida autem vocantur, quorum temperatura intra XCVI et LXXXV gradum versatur. Frigidulorum nomine, a LXXXV° ad LXV° descendendo, insigniuntur; quæ vero infra sunt, frigida appellantur. Calida balnea relaxant cutem, detegendo aperiendoque poros, transpirationem movent, atque calorem augendo, celeiores reddunt arteriarum micatus, et cum aquæ in corpus instillationi, vasorum ope absorbentium, maxime faveant, humorum igitur dilutionem, et ipsius sanguinis rarefactionem efficiunt; sitim optime frenant, eaque immodice adhibita, perfectæ debilitatis speciem, relinquunt. Frigida balnea ex obposito nervos valde afficiunt, excitant; partes solidas comprimunt; telam cellularem adstringunt, et clausis poris cutaneis, exhalationi obicem ponunt, atque ob imminutum calorem, pulsum insigniter retardant. Nostris temporibus efficax balnei frigidi usus, in pluribus febrilibus affectionibus, cum perver-

sa irritabilitate junctis, frequentissimus. Ill. HUFE LANDUS inter prima diætética neonatorum remedia *balneum frigidulum* refert. Optime autem adhibentur *calida* atque *tepida* illa, universalia sic dicta, in exanthematibus chronicis atque febrilibus, in cutis conspicua ariditate omnibusque affectibus, vel a succore interrupto, vel ab exanthematibus retropulsis, gravatim prodeuntibus, oriundis, in myodynia rheumatica chronica, ileo etc. Partialia autem *bulnea*, ut *manuum*, et *pediluvia* eximiæ sunt utilitatis in sanguinis ad caput congestionibus, in pertinaci cephalalgia alisque ab adcumulatis versus superiora humoribus, affectionum modis, derivandis. *Balneum vaporarium* (ruth. dictum *Баня*), in imperio Ruthenico usitatissimum, calidis illis longe efficacius perhibetur; mirum autem in modum in resolvendis tumoribus frigidis, catarrho pulmonum, myositide rheumatica, præcipue in otalgia, hæmorrhoida et amenorrhœa, (menstruorum suppressione) psora, capitis tinea, achoribus, phthiriasi, et in aliis plurimis morbis, efficax esse, perhibetur.

D. illius pro certo statui non potest; varia enim est, pro vario sitis, et necessitatis, gradu. Usitatissima *praeparata pharmaceutica* atque maxima eorum pars hujus ope *fluidi* commodissime perficiuntur; cum autem *aqua omnino pura* nullibi fere, nisi arte illa, quæ *destillatio* dicitur, præparata, inveniatur, et cum varia ei peregrina admixta corpora, multiformiter illam permuttere, atque temperare soleant, permagni igitur intererit, si singulis sub speciebus, formisque, anquisitus de illa disseremus.

V. *Aqua depurata*; — *destillata*, etc.

A Q U A C I D U L A.

Воды кисловатыя минеральные.

- a) *Pogromnenses*, in primis in Nertshinsensi circulo Irkutiensis provinciæ prope flumen Udam dictum, trans lacum Baical.
- b) *Hypocaucaseæ acidulae*, vulgo Кисловодскія воды vocatae.
- c) *Kutomarenses acidulae aquæ*, prope fluvium Cutomaram Irkutiensis parter (in Sieveria vulgo Sibiria) provinciæ.

Q. Partes illarum sub littera a et c designatarum, constitu-

tivæ, haud satis adcurate investigatæ sunt; in *hypocaucae searum* autem acidularum aquarum viginti libris, teste cl. SCHWENSONIO, inveniuntur: 87 grana Carbonatis Calcariae, 53¹₂ Sulphatis Sodaæ, 41¹₂ Sulphatis Calcariae, 27¹₂ Sulphatis Magnesiae, 27¹₂ Muriatis Sodaæ, 12²₃ Subcarbonatis Magnesiae, 2³₄ Carbonatis Ferri, 2³₄ Muriatis Magnesiae, $\frac{1}{2}$ quoque grani principii extra iis; præterea gas acidum carbonicum 580 unc. cubic. in illarum oanubio sæpiissime deprehenditur. Color prorsus desideratur. Subtilem et suffocantem spargunt odorem. Sapor acescens, leniter stimulans. Gravitas specifica est 1: 1,025. Temperatura + 10° Ream. therm.

V. interne refocillans; refrigerans; sitim restinguens, lotiumque movens, et quod præcipuum est, nauseam vomitumque compensens, externe: excitans; alterans; relaxans.

U. aquarum earum *Selteranas*, sic dictæ, simillimus. Nunquam, nisi frigidae, adhibentur, ob præcipuam in iis *Acidi carbonici* vim agentem, quæ in primas præsertim vias, nec non vasa sanguifera, nutrientia et secernentia organa sese exserit: excitant nempe, et refocillant ventriculum, et intestina, succurrunt digestioni, augent motum peristalticum. In vitiis pulmonum et renum corrigendis optime expedient; sedando autem orgasmum sanguinis, energiam vasorum febrilem, et prohibendo destructivam partium suppurationem, maxime prosunt in phthisi pituitosa, scrofulosa et purulenta; egregio præsertim cum effectu adhibentur in vomitu pertinaci, atque chronicō; in dysenteria; in febribus gastricis putridæ indolis; in hæmorrhoidē refractaria suppressa; in fœditatibus quoque cutis chronicis, et ipsa podagria; ad urolithiasin denique debelandam, ischuriam et dysuriam levandam curandamque maxime convenient. Externe applicatæ fomentationum forma, optime chronicis, inveteratis, sarcoinatosis atque scirrhosis mendentur ulceribus, limitant atque tollunt putredinem corporis partiale, absorbent et prohibent fœtidum odorem. Forma injectionum, in vagina uteri adhibitæ, leucorrhœæ obponuntur, et suppressa reserant menstrua. Clysteres ex iis subteruati intestina blande excitant, ideoque in hæmorrhoidē mucosa com-

mendantur. Ipsæ denique in his fontibus *immersiones* ob propria illis, *carbonico acido*, continuo sese ibi evolvente, redundantem atmosphærā non raro gravibus profuisse morbis dicuntur.

D. a libra ad tres et quatuor etiam, de die exhibentur.

A Q U Ā A M A R Ā.

Воды горькосоляные.

Eximiæ sunt: 1) *Fons Catharinae*, Sareptensis, præcipue *Sulphate Magnesiae*, insignis, prope flumen Rha, seu Volgam.

2. *Pattenhoffiae*, quæ provinciam Livoniam percurrent, et continent in 20 lb, *Sulphatis Sodaे* 66, *Carbonatis Calcariae* 18, *Subcarbonatis Magnesiae* 14, *Aluminae* 4, *principii resinosi* 8, *Subcarbonatis Sodaе* 3, *terrae siliceae* 3. g.

Color in genere atque *odor* prorsus desiderantur; *sapor* intense amarus, salinus: *pondus specificum*, ut 1 : 1,0144. Nulla constans, quantum observare licuit, *temperatura*.

V. eximia resolvens; cathartica; diuretica; sedans; *Epsomensem*, *Sedlitzensem* et *Seidschützensem aquarum* etc. æmula.

U. Ob purgantes præcipue, quibus pollent, effectus, optime adhibentur: in colluvie mucosa atque primarum viarum sordibus, recte etiam obponuntur congestionibus versus superiora, neque solum vermes pellunt; verum etiam inucum, in quo nidulantur illi, resolvunt atque deponunt; refrigerando autem et sedando, in plurimis catarrhalibus, pituitosis atque rheumaticis curandis adfectionibus, validissime agunt: cum autem non debilitent, quod *salibus mediis* proprium est, maxime igitur hominibus nimia præditis irritabilitate convenient, plethoricis nunquam satis commendandæ. Ob eximiam denique leniter resolventem potentiam laudantur in glandularum indurationibus, atque vitiis scrofulosis, pulmonum catarrho ac splanchnemphraxi, ictero, urolithiasi, in viscerum abdominalium exulcerationibus, earumque comite, febri quoque hectica, et aliis. Cutis etiam vitia cito corrigere dicuntur: exanthematibus denique præcipue faciei chronicis, plethoricas in primis mulierculas infestantibus, ut usu cognitum est, optime medentur.

D. a libra usque ad tres et quatuor, partitis vicibus, de die, sumenda.

A Q U A E F E R R A T A E

Воды желѣзистыя.

- a) *Lipsienses*, (Липецкія желѣз. воды.) Tambowiensis Gubernii.
- b) *Twerenses*, (Тверскія желѣзистыя воды) a Twer dictæ.
- c) *Wisokoenses aquae*, (Высоцкія желѣзистыя воды) a vicu-
lo Высокое, dictæ, in Twerensis Gubernii, circulo Kaschinensi.
- d) *Andreapolitanae*, (Андр. ж. в.) in districtu Ostaschewiensi.
- e) *Kashinenses denique ferratae aquae*, (Кашинскія желѣзи-
стые воды), in oppido cognomini (Кашинъ) Twerensis Gubernii.
- f) *Kortsewenses ferratae aquae* (Корчевскія желѣзистыя воды)
ab oppidulo Kortsewa Twerensis Gubernii, dictæ.
- g) *Simeonowienses ferratae aquae* (Семеновскія желѣзистыя
воды) in Serpuchowiensi circulo Mosquensis Gubernii.
- h) *Mosquenses ferratae aquae prope plateam Pokrowka.*

Q. Quæ in Lipetzk florent, continent secundum cl. SCHWEN-
SONIUM in libra, *Acidi Carbonici* $3\frac{7}{8}$ cubic. unc. $\frac{129}{230}$ partes
grani *Muriatis Magnesiae*, $\frac{247}{624}$ *Muriatis Soda*e, $1\frac{13}{65}$ *Oxydi Fer-
ri*, $\frac{107}{360}$ *Sulphatis Calcariae*, $2\frac{7}{23}$ *Carbonatis Calcariae*, $\frac{11}{23}$ *Sulphatis Soda*e, $\frac{3}{5}$ principii resinosi, $\frac{37}{660}$ principii extractivi grani par-
tes. Temperatura earum est $\pm 5^{\circ}$, R. therm. Quæ circa Tweri-
am labuntur, continent, cl. REUSSIO te tante, 10,66 gasis
acidi carbonici cubic. unc. 1,33 Nitrogenii gasis,
0,39 Oxydi Ferri, 2,81 Subcarbonatis Potassae, 3,08 Car-
bonatis Calcariae, 0,22 Subcarbonatis Magnesiae, 1,88 Muria-
tis Soda, 0,40 Muriatis Potassae, tum denique 0,31 Siliceae
terrae, 0,02 Aluminæ, 0,85 principii extractivi partes. Tem-
peratura earum notanda $\pm 6^{\circ}$ R. therm. In *Wisocoensibus*
aquis, idem cl. REUSSIUS invenit, in libra, gasis acidi carboni-
ci 2,25, gasis nitrogenii 0,66, gasis oxygenii autem 0,04 unc.
cubic. Præterea inest illis 0,04 Ferri et Mangani Oxyai, 0,23
Subcarbonatis Potassae, 200 Calcariae Carbonatis, 0,05 Sulpha-
tis Potassae, 0,05 Calcariae Muriatis, 0,23 Siliceae terraæ et

0,01 *Aluminae*, 0,11 denique *principii extractivi* p. Apud *Andreae politanas* autem, ill. **SEVERGINO** teste, in 1 lb sunt: *Oxydi Ferri* gr. 2, *Calcuriae* 1 gr. *Sulphatis Calcariae* $\frac{1}{2}$ gr., *principii extractivi* $\frac{1}{2}$; *Magnesiae*, et *Sulphatis Magnesiae* $\frac{1}{4}$ gr. **REUSSIO** attestante, in libra 0,09 *gasis acidi carbonici*, atque 0,0238 *nitrogenii* partes; *Ferri* autem et *Manganis oxyda* ad 0,08 grani partem: præterea continent illæ 1,87 *Carbonatis Calcariae*, 0,06 *Carbonatis* et 0,03 *Muriatis Potassae*, 0,17 *principii extractivi*, 0,22 *terrae siliceae* et *Aluminae* 0,01 grani partes. Temperatura est $\pm 4^{\circ}$ R. therm. *Kortsewenses* continent, teste cl. **REUSSIO** *Carbonatis Ferri* circiter 0,15 gr. in 1 lb. *Simeonowienses* teste **REUSSIO** continent in uncii 16 *Carbonatis Ferri* 0,125 gr. *Carbonatis Calcariae* 0,5811, *Subcarbonatis Magnesiae* 0,167, *Sulphatis Calcariae* 0,211, *Sulphatis Magnesiae*, materiæ *extractivæ aqua solubilis* 0,138, materiæ *resinosæ* et *Muriatis alcalini* 0,029, *siliceae* 0,102 gr. *A. acidi carbonici* 0,0296 de volumine aquæ, *A. azotici* 0,0184, *A. oxygenii* 0,0009. *Mosquenses*, teste cl. **REUSSIO**, circiter 0,5 *Ferri* in 1 lb continent, et tantundem *A. carbonici*, ut paululum acidulæ sint. *Casimirenses* vero aquæ sic, ut et *Olonetzenses*, prope pagum Bujhovam, atque aliæ plures nondum satis adcurate sunt investigatæ, et minus dignæ memoratu esse perhibentur. *Aqua ferrata frigida* omnino coloris expers; calida vero fuscum in rubrum vergentem sistit: *Odor subtilis* et suffocanti halitu molestus; *sapor austerus*, eum atramenti scriptorii simulans. *Pondus specificum* ut 1: 10426. Temperatura a $\pm 6^{\circ} - 12^{\circ}$ R. therm.

V. Irritans; tonum et functionem augens vitalem; vasa aimatopöetica incitans; calefaciens; anthelmintica.

U. In medicina latissimus; cum *Ferrum*, in *aquis* his contentum, tantæ sit efficaciæ, ut granum illius majorem ferat opem, quam scrupulum ejusdem alia forma exhibiti; falsam ideoque esse patet eorum opinionem, qui ab illius in *aquis* hisce quantitate ipsarum actionem in corpus humanum deducendam esse statuerunt. *Aquæ ferratae* multimodis in varias corporis

constitutiones agunt; aliis enim valde competunt hominibus, ab aliis ægre feruntur. Phlegmaticis præcipue nunquam sat is commendandæ, et iis, quorum fibræ molles sunt et laxæ, habitus corporis flaccidus, atque pallidus, qui sæpius congestionibus serosis atque fluxu mucoso laborant. Alienæ autem esse videntur plethoricis et cholericæ constitutionis hominibus, qui fibras habent rigidas et ad congestiones inflammationesque sunt proclives. Actionem illa exercent validam in digestiva, nutrientia et genitalia organa, præsertim autem in sanguifera vasa et musculos; rite igitur adhibentur in fibrarum muscularium inertia, cruris atque lymphæ defectu; in hæmorrhagia a laxatione vasorum sanguiferorum, præeunte, in debilitate etiam ventriculi, dyspepsia, cardialgia chronica, veribus, in hæmorrhoida quoque mucosa, in vasorum etiam lymphaticorum asthenia et glandularum irritabilitate, in diathesi scrofulosa, rhachitide, atrophy, arthrodynia et podagra astheniæ notas ferentibus, in tabe dorsali, leucorrhœa inveterata, chlorosi, in debilitate post morbos atque partus crebriores prægressos, sanguinis ubiores jacturas, ac immodicum veneris usum; in qualibet omnino corporis exinanitione, ex onanismo, in gonorrhœa (stillicidio genituræ); in vitiis etiam oculorum a mea debilitate pendentibus. Impotentiæ quoque virili eas optimè succurrere, ac fœmineam sterilitatem tollere posse vulgarissima fert opinio. Gravidæ vero haud raro has respuunt aquas, quippe quæ abortum post se trahere creditæ sunt.

D. A libra ad bilibram et tres libras de die, vicibus partitis. Externe adhibentur forma balneariorum magno cum successu.

A Q U Ä F L U V I A L E S.

Воды рѣчины.

Superficiem terræ scindunt, supraque illam, ad communem aquarum fundum, tendunt.

Q. Continent in primis aërem atmosphaericum, carbonicum acidum et minimam saltem Carbonatis Calcariae Muriatisque Sodaæ partem; atque, si lectis sabulo superstratis effluunt, puriores fon-

tana evadunt, si antea supra lutum volvuntur, saepissime *Aluminam* mechanico modo eis junctam videbis. *Color* earum subturbidus, ceterum sunt *inodora*. *insipidae*.

V. *externe*: tonica; adstringens; *interne* vero aperiens lotiumque movens, atque sitim restinguens.

U. amplissimus tum *diaeteticus*, quum etiam *pharmaceuticus*: pro conficiendis quippe cibis et medicamentorum præparatio-nibus adprime utiles sunt. *Extrinsecus* autem *aqua* hæc *b lnei* forma, rite admota, longe majorem et salutarem efficaciam exserit: frequentissimæ sunt in flaviis, tempore aestivo, *immer-siones*, atque maxime convenient in systematis nervosi atque glandularum atonia, in perversa vasorum sanguiferorum inci-tabilitate, in debilitate totius corporis, seu nonnullarum illius partium: ut in paraplegia, impotentia virili, uracratia, scro-fulis, rhachitide, atrophia infantum, rheumatica myodynia chronica, et in aliis pluribus morbis.

V. *Aqua destillata etc.*

A Q U Ä F O N T A N Ä.

Воды ключевые.

E fundo terræ stillant, et montibus delabuntur, prata plerumque permeantes, lavantesque.

Q. Atmosphaericus eis aër cum *Acido carbonico* et *Calcariae Carbonate*, *Muriateque Soda*e ingestus est. Non raro etiam *Culcariae Muriate*, *Sulphate Potassae*, *Carbonate Soda*e et *terra silicea*, tametsi paucissima in quantitate, (secundum BERGMANNUM enim 0,00004 solummodo illius parte) scatere eas compertum sit. Qualitas sane præstans. *Aqua fontanea* claritate sua crystallum æmularunt, si frigida est; calida vero in turbidum colorem ver-git. *Odor* nullus; *sapor* subausterus, vix sensibilis; *gravitas* illius specifica, ut 1 : 1,0002; *temperatura* a + 6—8° circiter R. therm.

V. Refrigerans; lotium alvumque movens; *externe*: exci-tans, adstringens.

U. tum *externus*, tum *internus*, præcedenti similis. Cum autem longe majori vi aperitiva prædita illa sit, optime igi-

tur in colluvie intestinorum sordida, organorum in primis chylopoëticorum adhibetur. Poculum *frigidae aquae fontanae*, matutino tempore jejuno ventriculo illatum, unam vel plures depositions alvinas producit, turbasque verminosas compescit.

V. *Aqua destillata etc.*

A Q U A E G L A C I A L E S , e t N I V A L E S .

Воды ледяная и снѣжная.

Dicuntur illae, quæ glacie, aut nive liquefacta, obtinentur.

Q. Hucusque saltem nulla aërifermia corpora in iis recenter liquefactis (nullum acidum carbonicum) deprehendebantur. Quibusdam *Muriatem Calcariae* cum exiguis *Acidi nitrici* vestigiis invenisse placuit. *Odor nullus; sapor aquam destillatam æmulans; gravitas specifica in temperatura + 15° R. = 1,0000 $\frac{1}{2}$.*

V. *Frigidae aquae* diluens; excitans; adstringens; lotiumque movens; *calidae* autem sedans; relaxans; antispasmodica, atque diuretica.

U. Amplissimus, sicuti jam de *aqua* in genere prædicavimus. Præterea *MICHELLOTUS* laudat eam in atonia et irritabilitate aucta intestinorum; præprimis autem organorum chylopoëticorum, in pertinaci vomitu, hæmatemesi. Quid? In dialeipryis etiam ante et post paroxysmum sumendam, optimaque statuit *HANCOSE*. *Tepidam autem aquam* istam, præter multos spasmodicos intestinorum adfectus, ob illius vim diaphoreticam et diureticam, morbis etiam catarrhalibus bene convenire, pro comperto exploratoque habetur. Præter frequentissimum illius usum externum, quem, cum de *aqua* in genere sermo fuit, indicavimus, laudatur etiam in ophthalmite sthenicæ indolis, in pulmonum debilitate, herniis incarceratis, in primis stercoreæ accumulationi junctis, (*RICHTER*) in meteорismis febrium putridarum, (*VOGEL*) in epistaxi, metorrhagia, hæmorrhagia vulnerum, in tumoribus frigidis articulorumque fungis, ubi a *CALLISENO* præcipue *stillicidium* commendatur. *Maniluvia* et fomenta *frigida* genitalium, in omni febre putrida validissima esse ad vires excitandas laudat *VOGEL*,

in paralysi denique a HOYERO et BERNARDO, maxime commendata sunt, ob summam, qua pollent, efficaciam.

A Q U A E M A R I N A E.

Воды морскія.

Q. Marinis aquis Acidum carbonicum præcipue inhæret et nonnulla Salia, ut Murias Sodæ et Magnesiae, atque Sulphas ejusdem, ipsa Calcaria etiam et Carbonas Calcariae et Magnesiae Subcarbonas. Exuberant præterea substantiis ex animalium marinorum et vegetabilium digestione productis. Bonam istam valitudinem, qua navigatores atque littorales incolæ fruuntur, ab Acido muriatico e mari evaporante et atmosphæræ maritimæ sese immiscente derivasse HERMBSTÆDTIO visum est. Claritas earum sæpissime subturbida, paululum opalescens, proprio sunt præditæ odore. Sapor salino-amarus, acriculus; specifica gravitas ut 1:1,02. Temperatura anni temporibus ac plagæ cuique adcommodata.

V. Stimulans; eccoprotica; resolvens; lotiumque movens.

U. Internus præcipue morbis ab atonia, vel partiali, vel universali, oriundis, adcommodatissimus, ut in adenemphraxi, splanchemphraxi, scrofulis præsertim et rhachitide a GAUBIO, in ulceribus scrofulosis malignis a RICCARO, RUSSELIO, commendatus: in obstructione porro hepatis, lienis, pancreatis, mesentericorum vasorum et uteri; in morbis chronicis deinde, et quidem ascitide, hypochondriasi et in hysteralgia, si nempe mere nervosæ sint illæ indolis, multoque vitio in visceribus latente nutrientur, in amenorrhœa refractaria, nephritide pituitoso-sabulosa, nec non in dialeipyris etiam quartanis atque ictero. Usus externus balneorum, immersionum atque lotionum forma, eximios produxisse effectus in variis præcipue cutaneis affectionibus, ut lepra, ozæna inveterata, psora nec non ophthalmitide chronica vulgatissime creditus est. Ad scorbutum denique sanandum, maximam illius vim RUSSELIUS testatur. In spasmodicis deinde singularis organi, vel totius systematis convulsivisque morbis, ut catalepsi, prosopalgia, scelotyrbæ,

sardonico risu, trismo nec non podagra, myodynbia rheumati-
ca chronica, cardialgia, lumbagine, ischiade &c. in epilepsia
vero, atrocissimo malo, ut sumnum ab HUFE LANDIO prædica-
tur remedium.

A Q U E P A L U S T R E S.

Воды болотные.

Aqua palustres, multam terræ superficiem, occupantes.

Q. Præter animalium atque vegetabilium reliquias, bituminosas
et extractivæ materiæ particulis, nec non gase carbonico; in pri-
mis vero hydrogenio carbonato uberioris eas satiatas contamina-
tasque reperies; sunt etiam, quæ *Oxydi Ferri* majori, vel mino-
ri quantitate, repletæ inveniuntur. Color fuscus in rubedinem
vergens; odor foetidus; sapor austerus amaro-ingratus; gravitas
specifica, ut 1: 1,00148. Temperatura totum per annum
atmosphæræ sequitur vicissitudines.

V. *Aquis stagnantibus* multo efficaciores atque utiliores sunt.

U. Earum ab agyrtis et rusticis maxime comprobatus. Artis
medicæ periti parum ad eas attenderunt; sed plurimis malis
vulgo illæ mederi putantur: cachexiæ in primis universæ cor-
poris, paresi, contracturis atque membrorum anchylosibus, ery-
sipelati solari, idque forma *balnei*, vel *immersionum*, tempore
aestivo, quid? ipsorum *limorum palustrium* ad partes adfectas
applicatio egregios producere effectus fama fert superstes,
proinde in lepra, capitis tinea, achoribus, scorbuticis ulceri-
bus atque inveteratis fomentationum modo adhibita, haud raro
felicissimam eorum sanationem procurasse, vulgi opinio est.

A Q U E P L U V I A L E S.

Воды дождевые.

E nubibus et vaporibus, ut notum est, coalescentes.

Q. Præter atmosphæricum aërem, *oxygénio* præsatiatum, *car-
bonicum Acidum*, *Carbonatemque Calcariae* continent, nonnunquam

etiam *Calcariae Nitratis* atque *Muriatis*, nonnunquam et *Sulphatis* vestigia, a quibusdam observati, præ se ferunt.

V. A *nivali pluviatilis* vix differt, citius tamen corrumpitur: cum vegetabilibus mixta, citius in fermentationem abit, ideoque ad *Acidum aceticum* præparandum aptior esse existimatur.

U. Tam *frigidae*, quam *calidae*, sicut et *nivalis* idem. A veteribus præterea vim ei aliquam specificam attributam fuisse accepimus; quorum tamen opinioni nequaquam subscribimus.

A Q U Ä P U T E A L E S.

Воды колодезные.

In profundis terræ sinubus, libero aëris influxu prohibito, degunt.

Q. Mephiticis eas substantiis nonnunquam esse nuptas facile arbitreris; quapropter multis in locis vim earum noxifera audies; sunt etiam, qui, præter multas morbificas degenerationes, strumarum eis originem in nonnullis regionibus imputarunt. *Puteanarum aquarum* observantur: a) *duriusculae*, quibus major *Carbonici acidi*, ac in fontanis *fluviatilibusque illis*, quantitas inest, quæque multa *Salia*, ut *Calcariae Sulphatem* et *Carbonatem Muriatemque Sodaem* præcipue continent; b) *molles omnino aquis fontanis simillimæ*. Qualitas illarum, si peregrinis corporum partibus non sint infectæ, *fontanae aquæ*, similis. Podus specificum ut 1: 1,0003. Temperatura a +8—10° R. therm.

V. Sat efficax, nec omnino despiciatur ducenda.

U. *domesticus* atque *medicatus* per amplius quoque, in præparationibus autem pharmaceuticis præcedentibus quibusdam inferior merito habetur. *Putealem hanc aquam eximum esse volunt remedium* in multis viscerum abdominalium affectibus, vomitu inconsueto, cardialgia, singultu, gastricas sordibus, et aliis, ab alvina pendentibus obstructione, moliminibus. *Externum* in *gargarisationum forma*, et faciei, totiusque capitis *lotionum*, ut remedium prophylacticum, in multis, catarrhalibus in primis, et rheumaticis morbis, jam comprobatum esse, volunt.

V. *Aqua destillata* etc.

A Q U A E S A L I N A E.

Воды соляные.

Quae præcipue Sulphatem Sodaæ continent et sunt meliores:

1. Orelenses circa fluvium cognominem (Орелъ) in Constantinopolitano circulo (Константиноградскій уѣздъ) Poltawiensis Gubernii, quarum sunt duo fontes.

2. Dubovogryadenses aquæ, a pago дубовыя гряды dictæ, pariter duobus conspicuæ fontibus.

3. Bycowcenses denique in Isyumensi districtu, qui ad Charcowiense Gubernium pertinet, a viculo Быковка, ita dictæ.

Q. Partes illarum, secundum notam analysin, sunt constitutivæ:

	Sulphat. Sodaæ.	Sulphat. Magnesiaæ.	Sulphat. Calcar.	Muriat. Sodaæ.	Muriat. Calcar.	Muriat. Magnesiaæ.	Carbonat. Calcar.	Carbonat. Magnesiaæ.	Principii resimosi.	Principii ex tractivi.
Sub. No 1.										
a)	6 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	3	1 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	4
b)	27 $\frac{1}{2}$	3	8 $\frac{3}{4}$	11	2 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$.
— No 2.										
a)	14	7	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	2	.
b)	12	6 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	2	1	1 $\frac{1}{2}$	2	1	1 $\frac{1}{2}$.
— No 3.										
	31	10 $\frac{1}{2}$	5	4 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2

Qualitas aquæ frigidae, ut claritate sua crystalla simulet. Odore nullo prædicta. Sapor lixiviosus; gravitas specifica ut 1:1,004; temperatura cuivis fonti propria.

V. Carolinarum et Teplitzianarum thermarum (in Bohemia) adinstar, egregia; nituntur enim virtute resolvente; leniter irritante; eccoprotica; acida rancidaque absorbente; zooctona etc.

U. Cum aquæ hæ in organa præcipue chylopoëtica, renes, lichenem, vasa lymphatica, glandularum atque mucosarum mem-

branarum systema vim suam exerceant, quapropter magno cum fructu adhibentur *interne* in splanchemphraxi, urolithiasi, calculis ductus choledochi, et sabulo vias uropoéticas obsidente, in glandularum indurationibus, rhachitide, scrofulis atque arthrodynia, nec non in acore primarum viarum, soda, vomiturationibus, et sic porro; hypochondriacis hominibus atque hystericis fœminis, vel maxime commendantur; minus autem in scorbuto, hydropisi hectica, cachexia et in universo corporis statu asthenico convenientiunt. *Externus* illarum usus eximius: *balnea* ex tepidis aut calidis salinis aquis parata magni aestimantur contra myodyniam rheumaticam, arthrodynamam, spasmos, tumores, indurations, artuum contracturas, ut vulnerum apud veterans armigeros sanatorum, frequentissimas sequelas.

D. A libra ad bilibram, et tres libras, repetitis vicibus, dantur.

AQUÆ STAGNANTES et LACUSTRES.

Воды стоячія и озера.

Regionibus in demissis frequentissimæ, haud raro sedimentum quoddam terrestre deponentes.

Q. Cum autem e pluviatili, fontana atque fluviatili aqua constent; facile statues eas iisdem peregrinis partibus obnoxias esse, quæ apud illas deprehenduntur, præterea haud raro etiam reperies, tum animalium, tum vegetabilium corporum, ibi putrescentium, partibus sæpiissime infectas esse. Non facile diaphanæ occurruunt; odor vix sensibilis, putidiusculus; sapor subausterus, ingratus; pondus specificum ut 1: 1,0012. Quod ad earum temperaturam spectat, sæpiissime illae atmosphæræ vicissitudines sequuntur.

V. dynamica; puteana aqua, præstantior et efficacior.

U. etiam præsertim *externus*, parum abest, ut a præcedentibus, fluviatilis scilicet et putalis aquæ usu, differat.

AQUÆ SULPHURATÆ.

Воды водоворно-сърные.

Accedunt denique aquæ sulphuratae (*hydrothionicae dictæ*) quatuor sequentes sunt in Ruthenico Imperio notissimæ:

a) *Bargusinenses*, vel potius *Turcenses*, (Туркинскія водотворно-сѣрныя воды) circa lacum Baycal, a Ruthenis mare sanctum, съятое море, dictum, in provincia Ircutiensi, et in aliis pluribus locis, nondum satis sunt a Chemicis exploratæ *).

b) *Baldohnenses*, *Barbenenses* et *Libawienses* in provincia Curonia.

c) *Sergiewienses*, (Сергіевскія водотворно-сѣрныя воды,) in Buguruslanensi circulo Orenburgensis provinciæ.

d) *Constantinomontanae*, circa fortalitium *Constantinomontanum* (Константиногорскъ) omnibus exoticis, ob efficaciam suam, merito præferendæ; antea rapacibus *Caucasigenis* fuerunt expositæ.

e) *Smordonianae*, ad rivulum Birzha in Lithuania, et aliae plures, quæ adhuc nondum satis, lege artis, exploratæ sunt.

Q. Continent autem illæ secundum notam auctorum analysin:

	Gas. hydro-sulph.	Gas. carbonicæ.	Sulph. Calcar.	Muri. Mag. nesie.	Muri. Soda.	Sulph. Magn.	Sub carb. Magn.	Carbonat Calcariæ.	Sulph. Soda.	Temperatura.
Baldon. in 1 ½	1 4 — 10	2 — 10	14	6 — 7	11 — 14	1 — 2	7 — 30	11 — 2	2 — 15	6 R. therm.
Barben. — 1 —	10 1 — 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10
— 10 —	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10	— 10
Libaw. — 12 —	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12
Sergiew. — 1 —	2	1	9,52	6,60	— 10	0,39	— 10	1,06	0,63	7 R.
Const. — 20 —	80	106 2 — 3	31 2 — 3	1 1 — 2	136 7 — 13	63 8 — 13	17	99 2 — 5	101 80 — 37	36 R. th.

*) *Bargusinenses* seu *Turcenses* thermæ adeo calent, ut adnatantem ad eas *Cyprinum Alburnum* (уклейка,) perimere ferantur.

Claritas turbida, transitum lucis impediens. Odorem putridorum ovorum, et pulveris pyrii deflagrantis præbent. Sapor lixiviosus, salinus, ingratus. Pondus specificum ut 1: 1,0023. Temperatura a 5—36° Reaum, therm.

V. Excitans; diaphoretica; calefaciens; resolvens; zoothonæ.

U. Cum effectus sulphuratarum aquarum a gase hydrogenio sulphurato, continuo sese in illis evolente, præsertim derivari debeant, facile igitur latissimum earum inveniet usum is, qui Sulphur in remediis pollere, haud iverit infitias. Sed sulphuratas hasce aquas, ipso Sulphure multo efficaciores esse, ubi illud in tam subtili, ac volatili reperitur forma, ut omnem chemicæ artis imitationem facile excedat, ad curatior jam indago docuit. Valde enim excitant primarum viarum irritabilitatem, augent secretionem atque excretionem, irritant systema sanguiferum, accelerant cordis actionem et pulsuum numerum augent, respirationem facilitant et sudorem pellunt, lympham discutunt stagnantem, et congestionibus in venæ portarum systemate valde sese obponunt, coercent proinde symptomata hæmorrhoidalia, et penetrando vasa secernentia atque in cutem præcipue agendo, varias evacuationes salubres promovent. Venena denique metallica non solum moderare, verum etiam effectus illorum omnino tollere saepissime valent. Egregio proinde cum fructu adhibentur in omnibus hæmorrhoidibus moliminibus, vitiis menstrui fluxus, ejusque suppressione, in catarrho pulmonum, leucorrhœa, arthrodynia chronica, lumbagine, ischiade nervosa, prosopalgia; in primis vero in syphilide inveterata, exostosi scilicet, hyperostosi, tophis, nodis, gummatibus, nec non in ossium carie, in eorum necrosis, phagedænis præcipue, ubi HYDRARGYRUM citra ullum exhibetur effectum, in morbo etiam mercuriali ex abuso HYDRARGYRI orto, omnibus metallicis venenis lente agentibus, eximum præbent antidotum. Indicantur quoque in membrorum debilitate, prægressis asthenicis morbis, vel post humorum jacturam, oborta, item in hypochondriasi, splanchemphraxi, paralysi, psora retrograda, podagra retropulsa, aliisque similibus.

D. a selibra ad libram de die partitis vicibus. *Externe: partialium et universalium balneariorum forma, pro re nata, repetendorum.*

ARBUTUS UVA URSSI.

Ампрыкъ; Толокнянка.

Fruticulus Rutheniae septentrionalis, in collibus arenosis spontaneus. Cl. Decandr. O. Monogyn. O. N. Bicornes L. Ericeæ. J. Usualia sunt:

FOLIA, integerrima, ovata, carnosa, subtus venosa, a foliis *Vaccinii vitis idaeæ*, subtus punctatis, reticulo venoso, facile distinguenda.

Q. Principio extractivo, amaro, scytodepsicoque nititur. *Folia sicca* sunt odore similia radici *Glycyrrhizæ*. Sapor stypticus, grate amarus, amarities in gummosis partibus eorum latet.

V. Diuretica quidem, nec directe lithontriptica; adstringens; tonica.

U. *Folia* vi adstringente et tonica commendantur in cystorrhœa, menorragia, leucorrhœa, diabete, enuresi, lienteria, phthisi pituitosa, urolithiasi, præsertim in copula *baccarum Juniperi*, variisque asthenicis morbis et dyspepsia urolithiasin comitante, secretionem muci minuendo, aut acidi in ventriculo genesi officiendo.

D. In forma *pulveris* subtilioris cum *Saccharo*, aut alio congruo, a scrupulo ad duos, bis terve, de die; pro decoctura unciarum decem, *foliorum* semuncia, ad integrum, sumi solet, æque in *infuso* dari potest.

ARCTIUM LAPPA et BARDANA.

Лапушникъ; Репейникъ.

In locis incultis, maceriisque, ubivis per frequens. **A R C T I U M L A P P A** calycibus glabris, **A. B A R D A N A** calycibus tomentosis. *Cl. Syngenes. O. Polygamia æqualis. O. N. Comp. capitatae L. Cynarocephalæ. J. Biennis. Usualia sunt:*

RADIX, fusiformis, ramosa, lœvis, spongiosa, extus nigricans, intus alba. **FOLIA; SEMINA.**

Q. *Radix* est ex acri subdulcis; *odoris* nauseosi. *Seminum: sapor* valde amarus, lotium decolorans.

V. *Radicis* sudorifica; diuretica; alterans; blande resolvens; *Seminum* cathartica.

U. Morbi cutis. syphilis? alopecia? myodynia rheumatica? Lochiiis movendis non esse imparem puerpararum usus evicit. *Semina* calculosis profuisse est inter exempla. *Folia viridia* genuum tumores dissipasse, dolores a carcinomate podagræ pacasse perhibentur. *Succus* eorundem (teste HUFELANDO) valentior. A quibusdam A. LAPPÆ, SMILACI SARSAPARILLÆ præfertur; ast immerito. Potiori, meo arbitratu, jure, in locum hujus subrogari posset: **BIDENS TRIPARTITA** (Череда) felicissimo in fœditatibus cutis, et in primis syphilide, usu Ruthenicarum anicularum, tum in Sieveria, tum alibi, incluta. *Radix Lappæ* junior, tenera est, esculenta, ut *radix Scorzonerae h.* Primo vere colliguntur *caules juniores*, et modo turionum *Asparagi* in culinis præparantur.

D. *Radicis* semuncia in libra aquæ fontis, ad colaturam unciarum octo decocta, admista Mellis semuncia, exhibetur per diem.

V. *Decoctura Lappæ.*

A R G E N T U M N A T I V U M.

С е р е б р о с а м о р о д н о е .

ARGENTUM NATIVUM ET MINERALISATUM, in Russia præcipue in mîneris Colivanensibus, et quidem in monte serpentino sic dicto (Змѣевская гора) invenitur, datur porro in variis locis Sieveriae, in Norvegia, Hungaria, Saxonia, Gallia, Hispania et in primis in Peru et Mexico.

Q. *Metallum perfectum*, candidum, nitoris eximii; gravitatis specificæ secundum KLAAPROTH, ut 10,478; cusum vero, ut 10,609. Post AURUM, quo levius est, maxima ductilitate gaudet, sat violentum (ultra 999°) ut liquetur, ignem postulans,

atque dein in tetraëdras abiens crystallos, nec nisi intensissimo caloris gradu sicca via oxydabile, *oxydatum* cum *Acido muriatico* indissolubile connubium contrahens, *Acido nitrico*, solubile. Quum in vita communi vix occurrat **ARGENTUM**, ab omni labe cuprea liberum, hinc cognoscitur *inquinatum* cœruleo colore, quo ex solutione in *Acido nitrico*, *Ammonia liquida* præcipitatur, eoque facilius, quo aliquanto plus, quam ad totius solutæ quantitatis præcipitationem requiritur, *Ammonia* adfunditur. Ut *purum* pro usu pharmaceutico habeatur (methodo cel. HILDEBRANDT) ex parte una *Muriatis Argenti* adhibitis *Subcarbonatis Potassae partibus duabus*, reducatur.

U. Primi Arabes **ARGENTUM** ad usus medicatos adhibuerunt, atque ex eo easdem, ac ex **AURO**, quod etiam ad salutarem nobis professionem traxere, virtutes sibi spoponderunt, vel huic quoque, tam ratione, quam experientia, refragantibus. *Argentum foliatum*, id est *argentum purum*, in laminas tenuissimas redactum, pro obducendis, ornamenti causa, catapotiis, creberrimi fuit usus; sed et hic mos obsolevit, neque proinde major ejus commendatio est, quam quod ad *chirurgica instrumenta*, catheterismo præcipue et cavo oris destinata, atque etiam *cupellatum* pro parando *Nitrate Argenti* adhibeatur.

V. *Nitras Argenti.*

ARIES DOMESTICUS FISCHERI.

OVIS ARIES L. Баранъ; Овенъ; Овца.

VERVEX. Кладеный Баранъ.

Ubivis in Russia, præcipue vero in temperationibus ejusdem oris, frequentissimum animal. *Cl. Mammalia. O. Bisulca. (Ruminantia. Pecora L.) Usualis est:*

CARO OVILLINA; ADEPS OVILLINA, (Sevum ovillum Ph. Ross.) pinguedo, scilicet solida, ex omento, nec non ex adiposis capsulis, præsertim renalibus, atque lumbalibus animalium horum eliquata. Dum *Adeps* recens est, et pura, tum est *indorum*, albi coloris, blandi *saporis*, firmiorisque consistentiae,

eaque usui medico aptissima; cum vero venalis non semper talis sit, peropus est, ut, si modo recens est, membranis, *venulis*, fibrisque omnibus demtis, tamdiu abluatur *aqua*, donec nil amplius cruenti effluxerit, deum concisa in frustula, liquefacienda atque per linteum colanda. Ob albedinem suam, atque consistentiam magis concretam variis in casibus præferri meretur *bovillæ* (*Sevo bovino Ph. Ross.* сало говяжье) unguinosiori; *rancida* vero, coloris flavescentis, vel a vasis cupreis viridescens, rei medicinæ, inepta.

V. uti et ceterarum *adipis* specierum: emolliens; relaxans, atque lubricans.

U. Quibusdam *juscula vervecina* contractiora, imo et *adeps*, *lacte tepido liquefacta*, cui certæ portio *Amyli triticini* admiscentur, inter domestica habentur adversus dysenteriam remedia. *Externe Adeps* per se adhibetur, ut vulnera ulceraque ab influxu aëris arceantur, præsertim si pura sunt, nullisque universalibus juncta malis, neque adest laxitas magna, et partium ad dissolutionem proclivitas. Communius tamen inservit ad paranda *unguenta*, *emplastræ*, *linimenta* etc. et in militum curatione ad omnes pene usus loco *Olei expressi fructuum Theobromæ Cacao* concreti, utiliter adcommodatur, et si rariores sunt, recte eidem substituitur *Adeps bovilla*, aut plerumque *suilla*.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA.

SERPENTARIA VIRGINIANA.

Кирказонъ змѣиный; Змѣевникъ Виргинскій.

Planta Virginiae et Carolinæ, caule flexuoso, volubili, *Cf.* Gynandr. *O.* Hexandr. *O.* *N.* Sarmentac. *L.* Aristolochiae. *J.* Perennis. *Usualis est:*

RADIX, fibrosa, ex viridi-lutescens, fibris tenuissimis inter se tricatis. Huic substitui radicem *Asari virginici nigram* mouuit **SANDE** et **SCHLEGEL**.

Q. *Camphoraceo - aethereo - oleosa* cum *extractivo* et *resina*. Continet radix ¹ *olei* *volatilis* nimis aromatici, aurantiaci

odoris, Oleo foliorum Melaleucae Leucadendri similis; ast fragrantioris. (JUCH.) *Odor fragrans, camphoratus, VALERIANAM OFF.* redolens, gravior tamen et fortior; *sapor aromaticus, acris, amaricans.*

V. Excitans; nervina; volatilis; *camphorae* non dispar; constantia tamen eandem superans; sudorifica; sanguinem movens, cum augmento caloris, sat conspicuo.

U. Insigni pollet efficacia in dialeipyris, præcipue, ut adju-trix *corticis Cinchonae officinalis*, item, ubi movendorum sudorum ratio habenda, detritis viribus, et pronitate in putredinem, malignis, idque illas erigendo, hanc vero coërcendo. In putridis vulgo dictis tertio stadio, quum pulsus est debilis, submissus, accedentibus stupore etiam, apathia, deliramentis, petechiis, (minante quibusdam partibus, sub reliqua funestorum symptomatum syndrome, gangræna,) optime hoc remedio vi vitali consultetur. Ita etiam in angina atonica, gangrænosa, gargarisando prodit, et ipsi gangrænæ adcommoda. In pneumonide asthenica, exanthematibus atonicis, retrogradis Præstans ejusdem his in casibus miscela cum *cortice Cinchonae off.* (LETTSON.) Imo et *Camphora*, pro re nata, subsidiariam opem fert. Laudatur quoque in diarrhœa, dysenteria, (sine febre) uti etiam in myodynæ rheumatica etc. Morsuræ venenatissimi Boiciningæ (DALE) plantam masticando, succum deglutiendo, foliaque contusa vulneri admovendo (GEOFFROY) proficia exstitit; quem in finem nunc quoque ab indigenis Americæ confederatæ incolis adhibetur.

D. Rarius in pulvere a granis decem ad scrupulum datur, commodius in *infuso aquoso* (drachmæ duæ cum selibra aquæ bullientis) interdum decoctura *Cinchonae* additur, vel admisetur eidem *Valeriana off.* *Angelica A.* infusum etiam vinosum commodum cum *cort. Cinchonae off.* *fructus Citri Aurantii.* Decocitura, ut usu cognitum, virtute orbatur.

V. *Infusum Serpentariae.*

ARNICA MONTANA.

Баранникъ; Баранья трава.

Planta in pratis alpinis, ericetosis, montosis, humidis, sylvaticis, apricis Europæ septentrionalis. Filamenta coroll. rad. antherifera. Recept. a seminibus pedicellatis papposum. Cl. Syngenesia. O. Polygam. superfl. O. N. Composit. radiat. L. Corymbiferae. J. Perennis. Usuales sunt:

FLORES, sine calyce, compositi lutei ex acri amari, digitis confricati sternutamenta proritantes, squamulis calycinis brevioribus lanceolatis non setosis, apice purpureis. **RADIX**, varie contorta, fibrosa, subamara, acris, fuscâ. **Florcs**, radice fficaciores. Huic substitui alias herbas iterata saepius querela fuit. **INULAM DYSENTERICAM**, — **SALICINAM**, **HYPOCHEERIDEM MACULATAM** adhiberi monuit LINNAEUS. Inulae d. *caulis ramosus*, *folia* caulinâ plura inordinatim posita, amplexicaulia; *antherae* vero ad basin in duas terminantur setas. *Hypochoeridis caulis* subnudus: ramo solitario, *foliis* ovato-oblongis, integris, dentatis. *Floribus* admisceri *flores Hieracii*, notat HOPPE; *flores* vero *Tussilaginis Farfarae* vedit admistos SCHÄUB, qui a veris facile discernuntur. **Planta** hæc, in hortis culta, est ferre iners.

Q. *Florum* egregia, principio *acri*, extractivo, et *resina*, parvaque *volatilis olei* quantitate nitens. *Sapor aromaticus*, *acris cum amaricie*; *trita odorem aromaticum virosum spargit*.

V. *Florum*, nervos erigens; actionem vasorum sanguineorum incitans; resolvens; menagoga; errhina; *radicis eadem*, magis tamen tonica, atque facilius vomitum ciens. (MOENCH)

U. Ut nervos irritans, eorumque actionem præ arteriis intensdens, valet (adhibentur *flores*, rarius *radix*) in typho variisque ejus formis. In febri, vulgo putrida dicta, vis eorum cum primis elucet. In peste eos PEARSONIUS ex voto tentavit. A quibusdam contra dialeipyras cum successu exhibiti. In morbis spasticis, vel convulsivis, ita in epilepsia, vel paralysi extre-

mitatum, linguæ, colli, urocystidis, ischuria paralytica, nervorum organi visus, amaurosi, hemiplegia, paraplegia, plausum tulit. Irritando plexus nerveos abdominales, et venam portarum, reserant splanchemphraxes, hinc in infarctibus lienis, pancreatis, ictero emphractico, atrophia, et id genus aliis, de-prædicantur. Agunt in vasa, eorumque torpidam incitationem, secretionemque. Minuendo arteriosam, et intendendo venosam actionem, hæmorrhagiis (vi extrinsecus illata ortis) asthenicis propere subveniunt; actione vero sua in pulmones, et obscœna, metrorrhagiæ, prægresso in primis abortu, et hæmoptysi proficui. Laudantur etiam in suppressione sanguifluxuum, ne-vroblacia partium orta, ita in mensibus post febres suppressis, obstructis, (*Act. Berol.*) in lochiorum (*Comm. nov.*) cata-meniorum retentione, immo etiam hæmorrhoides suppressa. Majori venarum incitatione, hæsitationibus effusi ad cava sanguinis, et congestionibus, inflammationibus asthenicis prosunt, ideo etiam in doloribus extrinsecus illatis, suborta cruoris suffusione, sugillationibus, contusionibus, (*COZZIN*) per modum fomenti, commendantur. Magnam promittunt utilitatem in pulmonibus, effusione sanguinea, læsis, corundem actionem inten-dendo, ita etiam in ultima pneumonitidis periodo; catarrho; pituitosa phthisi; dyspnæa; pleuride spuria vulgo dicta; tus-si humorali, vere et autumno recrudescente, adhibentur. Irritan-do intestinorum nervos et venas, limitando succi enterici se-cretionem atque antiperistalticum canalis motum producendo, diarrhœæ asthenicæ, (*STOLL*) rheumaticæ et dysenteriæ oc-curunt.

D. *Flores Arnicae* a quinque granis ad semiscrupulum dantur cum melle, vel syrupo simplici per modum electuaris. *Pulveris* forma incommoda; aptius in *infuso* ebullientis aquæ a scrupulo vel drachma, ad silibram vel plus aquæ, quod bi-nis vel pluribus, secunda quoque hora, cochlæambus datur, vel *infusi* florum in sacculo suspencorum, drachmæ duæ, tres, ad libram aquæ dantur, idque sit in copula *Valerianæ* off. *Aco-ri Calami*, etc. vel *decocturae Cinchonæ* ad finem adjicitur

Arnica. Additamenta stimulantia volatilia, ut *Aetheris sulphurici*, ejusdem alcoholisati, vel *tincturae Opii*, sunt adcommoda. Nervos abdominales irritat, ideo æquo majores doses, molestiam abdominalis, nauseam, vomitum movent, anxietates creant, diarrhoeam, tormina, vi autem se ad sensorium commune exserente, cephalalgiam, vertiginem; irritando vero dermaticos nervos, sensum formicationis, dolores lacinantes, urentes, et interdum succussions, quasi a scintilla electrica provocatas. Hoc in statu, *Acetum* succurrit efficaciter. *Radix* in pulverem tenuata, a quinque ad decem grana, datur in *infuso*.

V. Infusum florum Arnicae — radicis ejusdem.

ARTEMISIA ABSINTHIUM.

ABSINTHIUM VULGARE Ph. Ross.

П о л ы н ь .

Ubique spontanea in ruderatis, apricis. *Cf. Syngenes. O. Superfl. O. N. Comp. discoid. L. Corymbifer. J. Perennis. Usualis est:*

HERBA FLORENS, amaro-aromatica; *foliis sericeo-incanis* compositis multifidis; *floribus globosis*, pedunculatis, nutantibus. *Summitates s. inflorescentia.*

Q. Præstans, in paucō *oleo* volatili, et *extractivo amaro* sita; nil vero, ut quidam volunt, *narcotici* tenet. *Odor* nidorosus, mora et siccatione evanidus fere; *sapor* valde et pure pute amarus. *Folia floribus* amariora.

V. Roborans; antiseptica; anthelmintica.

U. In imbecillitate stomachi, et canalis intestinalis; dyspepsia; hypochondriasi; hepatemphraxi; ictero, (*propinato cum sapone*, in *pilulis, extracto*) sic etiam in hydropisi, podagra, (**HALLER**) calculo, commendabatur. In scorbutum etiam efficaciam suam exserit; *aqua, cerevisia* vel *vino* incocta, contra dialeipyras, vermes, tineam, achores, gangrænam, suetum fuit remedium. *Extrinsecus*, forma *catalplasmatis*,

*fotus, imo et herba recens cedematibus discutiendi ergo admo-
ta, non officit. Ob vim putredinem coercendi, gangraenam
aquaee marinae incocita subegit BARTHOLINUS.*

D. Rarius in substantia a semidrachma ad drachmam, quam
in *infuso* ab uncia ad sesquilibram bullientis aquae. *Infusum*
lacteum a quibusdam adhibitum, ut anthelminticon, vel pro
foto, vel *clysteribus*. *Infusum semivinosum* efficacissimum, *Sulpha-
te Ferri* nigrescit.

V. *Cerevisia amara; Extractum Absinthii; — amarum; Infusum*
Absinthii; Oleum ejusdem; Species aromaticae.

ARTEMISIA JUDAICA W.

— — — — — CONTRA L.

Чернобыльникъ пропицеглисный.

Frutex in Palæstina, Arabia, Numidia crescents, in Aleppo
optimæ notæ. *Cl. et O. præcedentis. Perennis. Usuales sunt:*

SUMMITATES *ramulorum cum semine* (*Semen Cinae sive Santonici Ph. Ross.* Цыпварное семя). *Semina* sunt exigua, oblonga, ex flavo viridula, quæ etiam ex *A. SANTONICA* et *A. CONTRA*, (in salsis Russiæ desertis ad mare hircanum spontanea,) secundum quosdam desumuntur. Adulterantur interdum ea, *A. Abrotani* et *Tanaceti vulgaris* seminibus, imo etiam pulvis *radicis Aspidii Filicis maris* iisdem, teste **SCHAU-
BIO**, lucri causa, substituitur.

Q. *Præstans, in oleo volatili posita. Saporis amaro acris; odo-
ris aromatici, nauseosi.*

V. *Anthelmintica.*

U. *Irritando nervos canalis intestinalis dyspepsiæ opitulan-
tur et collectiones pituitæ refrenant; in primis vero zoothono*
*principio lumbricos teretes, imo interdum, præsertim apud in-
fantes, Taeniam solium* necuisse perhibentur, vel per se
data, vel cum *Valeriana* off. *Sulphate Ferri, Allio sativo* etc.

D. *Infantibus a dimidio ad integrum scrupulum, adultis a
drachma ad duas in pulvere, vel cum melle, oxymelle scillino,*

pulpa prunorum, per modum electuarii, vel *infuso lactis*, interpolando post aliquot dies *catharticum*, vel ab initio *radix Rhei*, *Jalappae*, *Submuriæ Hydrargyri*, *Sulphas Ferri*, vel *Muriæ Ammoniae* iisdem adduntur. Iniesto etiam *extrinsecus clystere* juvant, recteque conjuguntur cum *Allio s. Valeriana off.* etc.

ASPIDIUM FILIX MAS. W.

POLYPODIUM FILIX MAS. L.

Аспидникъ; Папоротникъ мужескій.

Ubique per omnem Russiam in sylvaticis spontanea. Fron-dibus subbipinnatis, pinnulis oblongis, obtusis, serratis, stipite aridis membranaceisque squamis, obtecto. Cl. Cryptog. O. Filices. O. N. Filices L. et J. Perennis. Usualis est:

RADIX, horizontalis, *extus nigro-fusca*, *interne flavo-albescens*; oblonga, squamis obsita. A *squamis suis* perfecte purificata, et vasis bene clavis asservanda. Adulteratur radice *Pteridis aquilinae*, *Aspidi Filicis faeminae*, *A. spinulosi* W. quarum *prima est* longior, tenuior, ramosa, repens, *extus nigra*, *interne albescens*; *secunda perpendicularis*, atris fibrillis obsita, *saporis mucilaginosi amari*; *tertiae rhizoma minus*, *stipites residui*, tenuiores, valde sicci, *sapor sine ulla acreidine*.

Q. *Sapor*, initio dulcis, dein nauseose-amarus; subacris; stypticus.

V. Permanenter stimulans; anthelmintica.

U. Contra omnes species animalium, in tractu intestinali nidulantium, ut *lumbricos*, *taeniam latam*, *cucurbitinam* etc. interna pars *radicis*, dosi sufficienti propinata, est validum re-medium. Tertia jam die quandoque sola per se data, (*diæta salina adjuta*,) hos inimicos corporis humani, expulit. Excretione eorum tardante, subsidium in *catharticis*, præsertim in *Oleo Ricini communis*, vel nucum *Juglandis regiae*, et similibus quærendum. Recens radix semper *vetustæ* præferenda.

D. *Pulveris grana* triginta ad drachmam, infantibus, vel forma *electuarii*. Drachmæ duæ, tres, usque ad unciam, adultis.

V. *Decoctura Aspidii composita; Pulvis ejusdem compositus.*

A T R O P A B E L L A D O N N A.

Красавица; Одурникъ; Сонная одурь.

Caule herbaceo, brachiato, in sylvis plerumque cœduis Rutheniae australis, locisque desertis, umbrosis, nascens; alibi vero hortensis. *Cl.* Pentandr: *O.* Monogyn. *O. N.* Solanac. *L.* Solaneæ. *J.* Perennis. *Usualia sunt:*

FOLIA, magna, petiolata, ovato-acuminata, intense viridia, lurida, *odoris* narcotici. **RADIX**, sublignosa, ramosa, geniculata, e cinereo-flavescens. Potentior est *foliis*. **BACCÆ**, atræ, subrotundæ, utut interdum opem tulisse ferantur, a medicaminum censu a plerisque Medicis amotæ, quippe quæ dolosa sua speciositate, dulcedine saporis, splendidoque nitore suo adridentes, perniciosissimi effectus pericula, occultant. In vicem hujus inscii **HYOSCYAMUM SCOPOLIAM**, vel **SOLANUM NIGRUM** injuriose substituunt; quod postremum locis incultis, ruderatis, crescents, *foliis* est longius petiolatis, ovatis, obtusis, dentatis.

Q. heroica. **VAUQUELINUS** analysi chemica invenit nitram substantia *amara*, in *Alcohole* solubili, cum *principio scytodepsico* juncta, e qua ignis *Ammoniam* elicit, quæ proinde accedit ad *acidum borussicum*. *Odor virosus; sapor acris, substypticus.*

V. *Narcotica; sæpius somnifera; auctiori præcipue dosi irritans; organismo animali inimica; zooctona.*

U. *Ejus in neurantistases esse commendabilem certum est,* huc in primis spectant spasticæ, ut epilepsia, præsertim habitualis, scelotyrbe, adfectibus animi orta, vel *succum ejus spissatum* exhibendo a grano, vel *folia*; pertussis quoque usu ejus curata fertur, ita, ad tollendam diuturnam myodyniam rheumaticam, arthrodyniam, ischiadem utiliter adhibetur. *Ad oculi inflammations, jam dudum a WILSCHIO commendatur.* *Succum cum albumine ovi* in oculis inflammatiis, lacrymantibus

cum successu adhibuere quidam. Irritando organismum animalem ad reactionem potenter sollicitat, ac proinde nevroblacias quasdam curat; ita utilis fuit, in nervorum resolutione, quæ apoplexiam sequi solet, interdum, vel *radix*, vel *herba*, vel *succus* etiam e recenti herba expressus et spissatus. *Infusum* etiam *foliorum* (scrupulus cum uncii decem aquae) commendatur, cujus unciae duæ per die in consummuntur. Commendatur in melancholia et mania *pulvis foliorum* cum *radice Rhei* ad grana duo vel tria, vel *raditis* ad granum initio, adscendendo ad grana sex aut octo, neque desiderantur exempla, hæc mala cessise. In quosdam congeneres morbos, potentiam morbificam tollendo, specifice agere videtur, ita obponitur psoræ, herpetibus, syphilidi (cum *Submuriate Hydrargyri*,) carcinomati. Duritias resolvit, discutitque, ita scirrhoma, glossocarcinoma minitans, et mammarum cancrum, *infuso ex foliolo A. Belladonnae* et quatuor aquæ calidae cyathis parato, atque cyatho quovis mane exhibito, se plus simplici vice discussisse adseverat **D E G N E R U S**. Scirrhosum linguæ tuberculum usu *A. Belladonnae*, et *Nitratis Argenti fusi* contactu, sanavit **T I M M E R M A N N U S**. In scirrho etiam intestinorum inveterato, *interne* cum effectu adhibita. Non dubitant quidam cum veteribus *interne* cum emolumento adhiberi posse in cacoëtheis ulceribus, in primis phagedænicis, verminosis, ex erysipelate natis; *extus* vero in gangraena, ulceribus carcinomatosis. In exulcerationibus uteri *succum* injectum expedire, in malignis quibusvis *radicem* commendant. *Fotu foliorum* ulcera mammarum sanavit **Q U E R**. Nodos dolorosos, et pertinaces post puerperium, et neglectam lactationem ortos, usus *pulveris* ex granis duobus, et denis *Sacchari* per plures menses continuatus, secuta suppuratione, et *lactis* novo adfluxu, teste **L E N T I N**, sustulit. *Succus baccarum* expressus, atque in consistentiam *syrupi*, adjecto *Sacchari* coctus, parvi cochlearis mensura, singula vice dysentericis cum successu est propinatus. Morsibus aspidum, (**M Ü N C H**) ictibus scorpionum aranearumque mederi *folio* cum *oleo trito* **P L I N I U S**, **A P U L E J U S**que memoriae prodiderunt. Nec in

lue bovilla, equina, ovillina, laude sua frustranda *A. Belladonna*. Infusum ejusdem ante operationem cataractæ, ad prævertendam pupillæ constrictionem oculo instillare RAIMARUS suadet.

D. Prudentis Medici est, cum ratione potius timide, quam cum suo, et ægrorum periculo, animose progredi. Pulveris proinde foliorum, aut radicis siccatae granum, gradatim adscendendo, ad quina de die adultis recte datur. Infantibus gr. $\frac{1}{8}$, gr. $\frac{1}{4}$ ad duo. MÜNCH clericus Hannoveranus ad præveniendam aut curandam rabiem hydrophobam, radicem secundo quoque die, in *calida aqua*, vel *cerevisia* dedit, et quidem adultis grana decem; sexenibus pueris grana quinque; quadrimis grana tria. *Foliorum siccatorum* adultis grana duodecim, quindecim, et post 48 horas grana decem, duodecim. Eorumdem scrupulum pro *infuso aquoso* (quod tamen minus adcommodum est) ad uncias decem *aquaæ ferverfactæ*, hujusque unciae duæ adultis dantur primis diebus, dein quotidie augendo dosin, donec siccitas tensioque faucium, vertigo et pupilla dilatata adpareat. *Extrinsecus*, *fornæ* *pulveris*, aut *cataplasmati* adhibetur. Præpostere atque inscite ingestam esse *A. Belladonnam* produnt: ineptatio, conquassatio capitis, cachinni, sitis inexplebilis, molestissima, deliria, anxietas præcordiorum, nitus vomendi subinde irritus, furor cum stridore dentium, et convulsionibus, pupilla, palpebris diductis, prostante immobili, pseudoblepsis, vel coecitas temporaria, ut vix ac ne vix quidem obversantem ægroti manum advertant, aut nictitent, trismus, nervorum distensiones, spasmus mandibulæ, anhelitus difficilis cum succussionibus crebris, suffocatio, apoplexia lethalis; quæ omnia rem conflictantis in præcipiti esse denotant, præsidiumque, cum a mora sumnum pendeat periculum, quanto oxyus querendum urgent. Celebratissima *antidotus* est *Acidum aceticum dilutum impurum*. Hujus cochleare majus singulo quinto minuto dandum est, *clysterque* ex eodem singulo horæ quadrante injiciendus; in primis, si simul idem naribus offeratur, vel *vapor* ejusdem ex *Ferro ardenti* iisdem excipiatur. Operæ pretium pariter fa-

cient succi alii *vegetabiles acidi*, ut *Citri medicae*. etc. Juvat porro potio ex *Acido nitrico et aqua*, *adspersio aquae frigidae* in faciem, *pulvis N. Tabaci* naribus immissus, *frictio plantarum pedum* setis peragenda. *Lac tepidum cum Oleo nucleorum Amygdali communis*, si præsto est, largiter haustum. Alii *decocturam Coffeae saturatam*, ut auxilium offerunt. Si *venenum adhuc in primis latibulatur viis, vomificia præsentaneo sunt remedio*, si jam in intestinis, *potulenta multa*, si ad intestina *crassa transmigravit, catharticis, vel clysteribus subducendum*, idque missa omni cunctatione. At, si sensu et irritabili ventriculi natura, *deletis*, nullæ vomitiones provocari queant, tum *titillatio faucium per plumam oleo intinctam*, id præstat.

V. *Succus Belladonnae spissatus*.

A V E N A S A T I V A.

Овесь обыкновенный.

Gramen, quod per universam seritur Russiam, locisque montosis, et macilentis bene viget; in Sicilia vero, et in insula Juan-Fernandez versus Chili sponte procrescere *Anson inuit*. *Cl. Triandr. O. Digynia. O. N. Gramina. L. Gramineæ J. Annua. Usualia sunt*:

SEMINA, oblonga utrinque extenuata, altero extremo latiori, sulco uno medio longitudinali distincta, *cortice subangulato nucleo villoso, eaque decorticata, ustilagine vitiata, rejiciuntur*.

Q. *Insipida*; farinacea.

V. *Nutritoria; emolliens; demulcens*.

U. *Decoctura Avenae* in febribus adcommodatissima, restituendo deperdito muco, involvendis acribus; hinc utilitas ejus in primis in catarrhalibus m. diarrhoea, dysenteria, blenorragia emicat, nec minus ad deprimendam præternaturalem irritabilitatem in macie, haemoptysi adhibetur, præsertim *acidulata*, imo etiam *clystere injecto*, si inflammatorium statum tollere lubet, omnino prodest. Subterdatur etiam sub vulgari, *olei unguinosi*, et pro re nata, *Muriatis Soda*, connubio. Puls aqua facta et tepide admota ad emollien-

dos maturandosque tumores e. gr. mammarium a lacte coagulato aptissima. *Apozema Avenae excorticatae* cito acescit. *Panis avenaceus* est omnino nutriens, isque a Carpato-Russis, juga alpium, incolentibus, sub gentico nomine *овсяникъ* esitatur. Ad farinam e *seminibus Avenae* vulgo *млеко* dictam, Ruthenis usitatam, rite parandam, oportet semina cribri ope a s. *Spergulae arvensis* (торица) purificata, aqua bullienti infundere, ebullitionem aliquot carentibus lapidibus sustinere, vase, ita operto, ne minima etiam vaporum quantitas avolare queat. Semina hac ratione emolita de novo in calenti furno super cribrum posita siccentur, contundantur, purifcentur a palea, (плева; кострица) atque demum molis fracta et in tenuissimam farinam mutata, vulgare *млеко*, *Far avenaceum* (*polentam avenaceam*) præbent, variis, ut supra dictum, morbis adcommodum. Optimum est *Uglitshense* in Jaroslawiensi Gubernio. Farina avenacea tosta in erysipelatosis, aliisque mitioribus tumoribus discutiendi ergo superdata, egregie valet.

D. Pro decoctura, *Avenae uncia*, et bilibra aquae, sumitur.

V. *Cataplasma avenaceum*; — maturans; Decocitura *Avenae*; Pulvis absorbens.

B E T U L A . A L B A .

Б е р е з а .

Arbor in sylvis crescens; frequentissima. Cl. Monœc. O. Tetrandr. O. N. Amentac. L. et J. Usualia sunt:

FOLIA, ovata, acuminata, serrata. Tenella præferuntur. **CORTEX INTERIOR**; **SUCCUS BETULINUS**, Березовый сокъ; carpato-russice: Березовка, perforatis terebra truncis, vel ramis, ineunte vere, ante, et sub frondescentiam, instar *lymphæ*, stillans. Præfertur superiorum ramorum, tres circiter digitos, crassorum.

Q. Principio gummeo-resinoso, alioque volatili empyreumatico, et aromate nititur. *Foliorum*: odor balsameus; *sapor amaro-adstringens*. *Succi betulini*: *sapor dulciculus*.

V. *Foliorum*: reactionem exhalantium vasorum excitans;

lotium, sudoremque leniter ciens; calefaciens. Succi betulinis: antiporica; antiscorbutica.

U. *Folia in infuso theaeformi* adversus arthodyniam commendantur, (DAREL) eadem *decocta extrinsecus* psoræ obponuntur, vel in vicem horum *ramuli* concisi decoquuntur; (PAULI) recentia vero *folia calefacta*, partibus corporis, hydropysi, tumescentibus, post præviam *frictionem*, superdantur; atque sudore, quem proliquant, prodesse existimantur. Ruricolis in Svecia evporiston contra myodyniam rheumaticam, et arthodyniam sternere foliis lectum, ægroti, totum, præter caput, corpus, foliis obtegere, quo factum est, ut moto ubertim sudore, convaluerint plerique. (BERGIUS.) An in paralysi valeant, ut quibusdam placet, experiundum est. *Balnea ex iisdem infantibus rhachiticis, scrofulosis, pustulosis, profuisse perhibentur.* *Succus betulinus*, si ad alvi solutionem potetur, ascarides subducit; præconia quoque priscorum tulit in urolithiasi, vel præcavendo illi, vel dolores mitigando, quem in finem cerevisia etiam coquebatur. (HELMONTIUS.) Alii eundem diabeti, retrogradæ psoræ, scorbuto, etc. obposuere. Paratur ex eo fermentatione *potio vinosa*, sat accepta, quæ gase carbonico abundans, addito *Saccharo, fermentoque*, atque etiam, si lubet, adjectis *seminibus Amomi Cardamomi, et cortice L. Cinnamomi*, gravior fit, vel, prout alii malunt, *fructus siccatae Vitis viniferae*, et *Alcohol dilutum (Spiritus Vini gallicus)* sumuntur, atque protracta fermentatione, fit fortior, *Vinum Campanum Galliæ, æmulans.* Ad hunc fere modum est: **AQUA BETULINA VINOSA.** *Cortex interior* adversus dialeipyras, præsertim, si scorbutica labe stipantur, item ad ulcera externa in decoctura ad libram laudatur. Rustici Scandinaviae eundem calceis immittunt ad revocandum sudorem pedum, suppressum. An is cum tritis glandibus *Quercus R. commistus*, pani, urgente annonæ caritate, ut id in ea Russiæ rubræ parte, quæ Podolia vocitatur, factum est, substitui queat, dubito sane de altrice ejus facultate. In Russia **OLEUM EMPYREUMATICUM BETULINUM**, aut etiam *epidermidis Betulae nigrum* vel *Ruthenicum* (Лёгомъ) audit, e cortice ubi deglubitur is,

elicitur, præter vulgares usus, ungendis vehiculorum rotis, inserviens; alhibitum etiam in hæ norrhoide. Alii exhiberi cum fructu posse in splancheinphræxi; ictero; amenorrhœa; hydropisi; diabete; fœlita ibis cutis; psora; herpes ibis, quo carcinomate ipso (PURMANN) existimant. Liudatur etiam in pestilentia, si videlicet vestimenta betulino oleo imbuantur, tamenque eodem corpus illinatur, sandalarios a molo immunes reddi, experientia haud æquivoca docuit. In typhis pestilentialibus plantis pedum et volis manuum infriuntur, aut ope lintei, eodem madefacti, adinovetur. Contra vermes etiam valere dicitur. Ruthenica plebs utitur eodem contra bleumarhœam, et extrinsecus cum Superacetate Plumbi ad ulcera syphilistica.

D. Succi betulini bis vel ter de die selibra; præcipue in urolithiasi; Oleum betulinum a guttis duabus ad sex datur, aut forma pilularum a guttis totidem ad decem et ultra cum sapone oleoso, pulvere radicis Glycyrrhizae glabrae, aut Saccharo.

V. Aqua betulina vinosa; Unguentum betulinum:

BISMUTHUM NATIVUM HAUY:

Висмутъ самородный.

Occurrit *nativum* in metallifodinis Sieveriæ Colivano-Voscer-senscensibus, nec non in monte Adontschelon in Dauria; maximus vero ejusdem preventus est in Saxonia, præterea inventitur etiam mineralisatum cum SULPHURE sub nomine *Bismuthi sulphurati*, (сърный Висмутъ,) et commistum etiam cum aliis metallis, CUPRO videlicet, PLUMBO, NICOLIO, et TELLURIO in metallifodinis Berezowiensibus prope Aecatherino, olon, (notum sub nomine: *Bismuth sulphure plumbo-cuprijere Hauy*, (Висмутовая руда) ita etiam mineralisatum cum SULPHURE (сърный Висмутъ) et tantummodo mixtum cum CUPRO sub nomine (блѣдо-красная или золотистая мѣдь) et tandem oxydatum (окись Висмутовая.) Perraro omnis Arsenici, Cobalti et Argentum exprimit obvium, hac metallica forma nunquam in usum medicum trahitur:

Q. Est metallum durum, fragile, ut pulverari queat, nitoris argentei, ut tamen color paulisper in rubicundum vergat, aëri expositum variis iridis coloribus, ludens, leni igne ante candescentiam (ad 400° F.) liquecens, flamma flagrans cœrulea, et sub refrigeratione, forma lamellarum coiens; intensiori autem igne partim avolans, partim oxydabile; cum effervescentia *Acido nitrico* solubile. Pondus specificum 9,670 : 9,822.

V. *Nitras Bismuthi.*

BOLETUS IGNIA RIUS.

AGARICUS CHIRURGORUM Ph. Ross.

Губка древесная; трупъ.

Putrescentibus *Betulae*, *Fagi*, *Juglandis*, *Quercus*, *Tiliae* etc. caudicibus insidet, alte in ligneam compagem penetrans. Cl. Cryptogam. O. Fungi O. N. Fungi L. et J. Usualis:

Ad finem æstatis collectus.

Q. Tenuissime porosus, superne cinereus, margine albescens, inferne albidus. *Odoris* æque ac *saporis* expers.

U. Intensiori siccatus igne, atque in subtilem pulverem tenuatus, sudorem phthisicorum, a granis decem ad scrupulum, e quovis apto vehiculo porrectus, cohibere fertur.

V. *Boletus igniarius praeparatus.*

BOS T A U R U S.

BOS, VACCA, VITULUS.

Быкъ; Корова; Теленокъ.

In tota Europa, præprimis autem in Helvetia, neque minus in Americæ meridionalis partibus nonnullis, uti est Terra firma. Cl. Mammalia. O. Bisulca. (*Pecora*. L). Usualia sunt:

CARO *bubula*, *vitulina* cum *ossibus*, e qua et e *pedibus vitulinis* coctione parantur *juscula* et *gelatinæ*. LAC; SERUM (pars ejusdem *cascosis butyraceis* partibus orbata, *aquosa*,) vel spontaneum, vel factitium. Postremum varia nomina, pro ratione adhibiti coaguli, sortitur; ideo *Serum lactis acetosum*, — *aluminatum*, — *sinapinum* etc. audit. CASEUS; SACCHARUM

LACTIS, e sero evaporatione atque crystallisatione, idque in Helvetia et Lotharingia magnis in fabricis paratur. **BUTYRUM INSULSUM**, pars *oleosa* e *lacte* vaccino, arte obtenta. **SERUM BUBULUM**, pinguedo e capsulis adiposis cordis, renum et maxime omentorum, aliquata. **ADEPS TAURI PEDUM**, coccione pedum, unguis et cute denudatorum et collectione eliquaininis, juscule innatantis, parabilis. **BILIS TAURINA RECENS**, vesicularum fellearum; communius vero spissatu in vase figulinio, vulgo *Fel Tauri inspissatum*; nobis vero: **BILIS TAURINA SPISSATA**, dicta. *Caro* in usum medicum adhibenda debet esse recens, ubi gelatinam parare lubet, fibrosae *carnis* partes ventriculum mechanice irritantes removeantur. *Sevum bubulum* aliaque, ut: *hircinum*, et *ovillum*, quae, alterum pro altero, sumi possunt, ranciditate, *odore* et heterogeneo quodam admisto, sint libera.

Q. *Carnis* in principio ipsius glutinoso sita est. *Odor*: si *recens*, nullus; *sapor* proprius animalis. *Lac*, *Serum* ejusdem, *Caseus*, *Butyrum*, *Sevum*, *Adeps* eandem fere possident qualitatem in *oleosis*, *aluminosis* et aliis nutritoriis partibus quærendam. *Odor* et *sapor* proprius animalis; *Butyri* tamen *sapor* blandus. *Saccharum lactis*, refert massam crystallinam, albi coloris, *inodoram*, *saporis* subdulcis, estque *Saccharum*, cui *caseosae* et *oleosae* partes adhaerent. octo partibus *aquaæ*; minime vero *Alcohol*, solubile. *Bilis*, extracti formam habet, e fusco-virescentis, proprii *odoris* et intense amari *saporis*. *Aqua* plane solvit *Bilis taurina*; ex solutione autem in *Alcohol* facta deponitur principium *aluminosum*, peramarum. Nec cum *Kalinis* effervescit, nec cum *acidis*, sed posterioribus densatur. *Oleis* unguinosis exacte unitur, nec itidem volatilibus. Destillatione ex *bile* educuntur: *liquor aquosus*, cito putrescens, *gas carbonium* et *Hydrogenii carbonati*, *Ammonium*, *Oleum empyreumaticum* et *carbo ex Soda et Subphosphate Calcariae* compositus.

V. *Lactis*, *Sacchari* ejusdem, *Butyri*: nutriendis; involvens; relaxans. *Seri lactis* et *lactis ebutyrati*: attenuans; diluens; antiseptica. *Gelatinae*: nutriendis, quin irritet ventriculum, lexiptyreta.

Bilis: stomachica; antacida; anthelminthica; motum intestinorum tardiorem accelerans. (NIEMANN)

U. Juscula, et gelatinæ, in tabe, sub febre hectica, maxime commendantur, ita etiam in scorbuto, et tempore reconvalescentiae. Cl. SEGUIN, primus gelatinam optato cum successu in dialeipyris tentavit. *Lac vaccinum*, ut nutriens, commendatur in tabe, phthisi, febre hectica, scorbuto, atque in aliis morbis, pravam nutritionem arguentibus; porro utile est ad diluenda obtundendaque deglutita *venena acria*, in enterodynia plumbea, quibus in casibus magna in quantitate porrigitur; datur quoque, pro re nata, per modum *clysteris*, haud secus, ac ad *cataplasmata emollientia additur*. *Lac ebutyratum*, non malum præbet refrigerans, nutriensque remedium, non solum in morbis inflammatoriis, sed etiam in hecticis et aliis infirmitatibus. *Serum lactis* virtutibus fere convenit cum *lacte*, hisdemque, uti hoc commendatur in casibus, præterea laudatur a quibusdam in protractis catarrhis, in hæmoptysi, hæmorrhoides, nec non mesenteremphraxi. Ftsi non tam facile, ut *lac*, in ventriculo acescat; ob magnam tamen fluidi copiam, sæpe interanea haud parum relaxat, variaque inde dependentia mala producit, ad quæ prævertenda, non male adduntur eidem frustula quædam *corticis C. Aurantii*. Interdum eo variæ plantæ infunduntur, puta: **SISYMBRIUM NASTURTIUM, LEONTODON TARAXACUM, CICORIUM INTYBUS** et similia, ac si temporis ratio fert, *succus* quoque ex hisce plantis expressus, apte additur adversus splanchemphraxin. *Saccharum lactis* idem promittit, quod *Serum*, (naturalis *Sacchari* hujus solutio;) notare tamen expedit, hoc cacostomachis magis convenire, dum aquæ superflua potest evitari quantitas. *Butyrum insulsum*, intrinsecus adhibetur ad obtundenda, et involvenda *venena acria metallica*, deglutita. In tenesmo, dysenteria et aliis in casibus, ubi satius est *clysterem injec-* tum per aliquod tempus in intestino recto hærere, præstat vegetabilibus *oleis*. *Externe* ad varios usus. parangaque *unguenta inservit*. *Sevum bubulum*, uti etiam *hincinum* et *ovillinum* ad *emplastrum unguentumque* paranda usurpantur. *Sevum bubulum* huic scopo suf-

ficeret, sed si æque facile unumquodque adquiri possit, hæc varietas copia, alterum alteri præferenti, libenter concedatur *Adeps Tauri pedum: unguentis opthalmicis commodissimum est constituenta, fluidam utpote semper formam servans et ne post annum quidem rancedinem sentiens. In vicem Olei olivi in tempore, rigiditate ex contractura artuum, optime lubricat volas, vel digitos fricantis, atque medicamentis absorptionis causa inungendis, nullissimum est vehiculum. Bilis taurina recens, in qualibet aromatico aqua soluta, dysenteriae præ idio est, (HORN;) convenit pariter debili stomacho, hypochondriacis, hystericas, verminosis, chloroticis. Externe: maculas corneaæ superficiales dissipare posse existimatur.*

D. *Gelatinæ* semunciam; pari aquæ portione, ad lenem solutam ignem, mox ante paroxysmum dialeipyrarum propinavit **SEGUINUS**, atque, tum intervallis decem minutorum hæcce præbia bis iterari voluit, ita, ut in toto ante paroxysmum sumta fuerit sescuncia; sub paroxysmo autem omnis potio præcipue acida, ægris negaretur; finito autem illo eadem dosis iterum porrigebatur aliquoties, nec non, etsi rarius, apyreticis diebus. Addi aquam aromaticam, vel Aetheris sulphurici pauxillum, esse esse censetur. Dosis *vaccini lactis* pro ratione morbi, aliarumque concurrentium rerum, variat. Ubi id magnis præbiis dari expedit, juvat, ne in ventriculo acesceret, aut ad corrigendum, si quem suscepere acorem, adjici quidpiam *Magnesiae*, quod in becillo præcipue stomacho aptum. *Serum lacis* solum a selbra ad sesquilibram, vel etiam tres libras præscribitur interdum, ut excipiens, vel, ut constituens, in quarundam potionum, aliorumque remediiorum præparacione. *Sacchari lacis* in pulvere, cum (vel sine) Nitrate Potassae, drachma, ter quaterve de die, vel semuncia in seri libra, aut bilibra aquæ servidae soluta de die. *Bilis recens* porrigitur aliquoties de die ad semunciam cum aromatico quapiam aqua; spissata vero a scrupulo ad drachmam cum sapone oleoso; extractis amaris, Ferro limato, in pilulis. Ceteris amaris vix præstat.

V. *Bilis taurina spissata*; *Clyster nutriend*; *Gelatina animalis*; *Linimentum bilis salinum I*; —— *II*; *Serum lactis*; —— *absinatum*; —— *sinapinum*.

B R A S S I C A N A P U S.

Капуста рѣпчатая; дикая Рѣпа.

Planta copiosissime cultura crescens. Cl. Tetrodyn. O. Siliquos. O. N. Siliquos. L. Crucifer. J. Biennis. Usualia sunt:

S E M I N A, rotunda, bruna, nucleos albos, oleo farctos, in-cludentia, amariuscula, acricula. **R A D I X**.

Q. *Oleosa*. Tertiam partem ponderis *olei unguinosi* erogant; immatura vero *semina* dant vilius, et parcus.

V. eadem, quae ceterorum *oleorum*. Videsis: **O L E U M E U R O P E A M.**

U. *Oleum napinum*, (рѣпное масло) e *seminibus B. Napi*, ubi probe maturuerunt, expressum, in militari praxi aliis oleis, pretii carioris, substitui potest, præcipue depuratum, in enervandis etiam *venenis*, ut fertur, proficuum. *Saponi* insuper viliori, et opificiis laneis crudum inservit, præterea ad lampades adhibetur; ardens tamen, fuligine sua, pectus gravare, supellectilem inquinare, stupaque, dum extinguitur, graviter fœtere, prohibetur. *Radices napinae* in Gotlandia, sponte edules, et sapidæ, etsi graciliores, quam cultæ. Ob dulcem *succum* eas levare tussim, haud est absimile vero; scorbuticis prosunt. **B E R C I U S**.

V. *Ceratum simplex*; *Oleum napinum*.

B U B O N G A L B A N U M.

Галбанникъ Африканскій.

Suffrutex in India orientali, Arabia, Syria, Mauritania, sponte crescens. Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellat. L. Umbellifer. J. Perennis. Usualis est:

G U M M I - R E S I N A (*Gummi Galbani Ph. Ross.* Галбанъ,) granis ex albo-lutescentibus, sibi invicem, vel adglutinatis, vel massæ molliori luteæ, immistis, composita, e trunco prope *radicem* transversim secto, fluens, mox indurescens. In granis ad-

lata semipellucidis, albicantibus, vel flavo-rubellis, optima habetur. Aliis adulterata gummiresinis, est immunda, fusco-lividi coloris, minorisque odoris etc. Si aliæ ei admistæ sunt substantiæ, tum solutione in Aethere nitrico alcoholisato fraus detegitur.

Q. aethereo-oleoso-gummeo-resinosa. Sapor amarus, acer; odor gravis, ingratus, fere alliaceus.

V. Stimulans; resolvens; expectorans; menagogia; antispasmodica.

U. In obscænas sequioris sexus partes agendo, menstrua reserat, debilitate individuali suppressa, hinc etiam hysteriæ, eadem de causa ortæ, opitulatur. Flatus dissipat, doloresque inde ortos, et spasmos pacat. Pollet etiam anthelmintica vi. In universum cautionem injungunt arteriarum micatus accelerati, et febrile molimen; secus fertur melius. *Extrinsecus* vim resolventem exserit: hinc in myodynia rheumatica, arthrodynia, in variis inflammationibus, astheniæ notas ferentibus, ita in contusionibus, fracturis, ulceribus mali moris, tuberculis hæmorrhoidalibus; (ad moto linteo, tinctura ejus imbuto) pernionibus (per modum emplastri in copula resinæ pineo-sylvestris empyreumaticæ, Acetatis Cupri, Muriatis Ammoniae.) Abscessus forma emplastri ad maturationem perducit, partesque abscedentes, vel duras (ut clavos) emollit.

D. Vel forma pilularum eddito quopiam congruo pulvere, vel emulsionis (duabus drachmis gummiresinae hujus, vitello ovi, drachma gummi Acaciae verae, et selibra aquæ constantis,) vel solutionis in Aceto, vel eodem scillite, vel Acetate Ammoniae liquido, vel in Aethere sulphurico alcoholisato etc. a granis decem ad scrupulum.

V. Emplastrum Galbani stibiatum; — gummi-resinosum.

CALLICOCCA IPECACUANHA BROTERO.

СЕРНАËЛИС — — — — — W.

Ипекакуанникъ.

Planta proveniens in australioribus Brasiliæ locis: in Pernam-

buquia, Bahia, Riojanæria, Paulensia, Mariannia aliisque Brasiliæ provinciis. Cl. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Aggregatae L. Rubiaceæ. J. Perennis. *Usualis* est:

RADIX, (vulgo *radix Ipecacuanhae*, рвотный корень) subcylindrica, flexuosa, tenuis, digitali, et quo l excurrit, longitudine, crassitie perinæ anserinæ, vel minoris, annulis eminentibus, inæqualibus, numerosis cincta, ex substantia constans exteriori, mellei, vel grisei coloris, fragili, a naro-acri; et nauseosa, epidermide testa cinerea, vel nigricante, atque ex parte intima centrali lignea, tenaciori, subflavescente, insipidaque; filo percursa lignoso, æquali, albo, fere insipido, mucilagineo, a quo facile in plures annulos fissæ, contiguos et inæquales, fissuris laevibus, separantur. Characteribus heic descriptis a radicibus *Violæ* et *Apocyni*, fibra instructis centrali e fusco-rubescente, aliisque emeticis: ut a **PSYCHOTRIA EMETICA**, **PÉRIPLOCA EMETICA**, **EUPHORBIA IPECACUANHA**, **TRIOSTEO PÉRFOLIATO**, **PSORALEA GLANDULOSA**, **PODOPHYLLO PELTATO**, **CYNANCHO IPECACUANHA** etc. de promtis, perfacile distinguitur.

Q. Principio nititur *resinoso*, *cinchonino* (DUNCAN.) *Odor* mucus, nauseabilis pulveratæ *radicis*; cortex ejusdem inodorus; *sapor* amarus, acrillus, purgens.

V. Stimulans, majori dosi vomificia; minori vero sudorifica; sublevando vasorum (membranæ pulmonum mucosæ) exhalantium constrictionem, sputum movens; interdum liquans album; antispasmodica, in substantia præcipue corticali sita.

U. Inter præstantia jure refertur *vomificia*, ususque ejusdem in multivariis morbis, ubi per *emesin* ventriculum exinaniri juvat, increbuit, nec infantibus tenellis repudiandus, nec præsente febre, quum citra calorem operetur, incongruus. Satius tamen duco, quod de omni *eva uante* in universum valet, exacerbationum tempus vitare; ita ante accessionem febris intermittentis præmissa integra apyrexias hora, vel subsidente jam febri, sub stadio frigoris, rectissime datur. Febribus continuis non nisi incipientibus, opportunum *emeticon*. Spasmos

dosi refracta sopire variis elucet documentis, sic non vulgaris est efficaciam in asthmate spasmodico, cui hypochondriaci et hystericae matronae, persæpe sunt obnoxiae et feminæ mensium obstructione laborantes, vel termino, quo cessant, propiores. Ita in tussi catarrhalis respondit pluries sputa levando, opemque absque evacuatione sensibili ferendo. Nec in pertussi, epilepsia, imo etiam ictero inutilis. Magna in existimatione in alvi profluvii fuit, sacraque vocabatur anchora, qua nullum præstantius, tutiusque remedium esse existimabatur. Nec nunc fama ejus cecidit, licet limatus judicium, morbi stadium, cui conveniat postliminio curatius discernere didicerit. In dysenteria plurimi fit, sed morbi initio datur optimæ, quum vires adhuc sufficiunt, viscera adhuc firma, præcipue sub vomendi conatu, cardialgia, borborygmis etc. Nec suo in cohibendis hæmorrhagiis pretio defraudanda est, ita in immoderato catameniorum, aut hæmorrhoidis fluxu, hæmoptysi, metrorrhagia, parva, sed frequentius repetita dosi. In hæmaturia quoque teste DAHLBERGIO, profuit. Exanthematis, ubi subito disparuere, revocandis, adcommodum remedium, nec minus utile in testiculi induratione, vomitionibus, discutienda. Haud desunt, qui melancholiæ et maniæ obposuerunt. Usus ejusdem, ut vomificti, phthisiscentibus, herniosis, hæmorrhagiis et congestione sanguinis ad caput laborantibus, alienus. Ut C. IPECACUANHÆ abnormis actio, vel imminuitur, vel sufflaminatur *Opio*, ita vicissim illa, par est effectui *Opii*, æquo majori, infringendo.

D. Pulveris grana duo, tria, scopo emetico, infantibus; adulstis grana quindecim ad viginti, addito interdum grano *Tartratis Stibii* et *Potassae*. In ceteris morbis pro re nata variat.

V. Pulvis *Ipecacuanhae*; — *opiatus*; — *stibiatus*; *Vinum Ipecacuanhae*.

C A N N A B I S S A T I V A.

К онопля.

Planta Indiae, in Russia ad 66°, et quod excedit, ut
P A R S I.

in Lapponia Kemensi, semina maturescunt; in Perside vero, imo etiam apud nos ad Wolgam, Achtubam, et fl. Török etc. spontanea. *Cl.* Dioecia. *O.* Pentandr. *O. N.* Scabridæ Annua. *Usualia sunt:*

S E M I N A, rotunda, glabra, binis valvis, *oleoso-mucilaginosa.* Immatura, impura, quandoque et rancida, improbantur.

Q. In *oleoso, mucilaginoso*que principio residens. *Odoris virosi.*

V. Demulcens; sedans; nutritius.

U. Seminum *oleoso - mucilaginosorum* scopo involvendi in diarrhoeis, stranguria ab inflammatione viarum uriniferarum, sic in blennorrhagia, vel urolithiasi. Immo etiam in ictero spasmatico, tussi catarrhali profusse feruntur. Arabes, teste SIMEONE SETGI exprimunt succum ex foliis inebriantem, *cacumina* item cum *melle* comedunt, (*LISTER,*) ad propitiandam animi domesticam sollicitudinem, quod occasionem, ut verosimile est, dedit, succum *Cannabis sativa* in *Opii* locum proponendi. (*Journal v. Hufeland.*) Caffri loco *Nicotianae* fumant.

D. Uncia *seminum*, cum libra *bullientis aquae* conteritur, atque colatur, ut fiat *emulsio*; vel semuncia *seminum* libra *bullientis aquae* infunditur. Interdum addere expediet *Althaeam off.* vel similia. Semina contusa, laciique incocata, pro cataplasmate adhibentur.

V. *Infusum Cannabis; Oleum cannabinum.*

C A P S I C U M . A N N U U M.

P I P E R I N D I C U M , s e u H I S P A N I C U M .

Перецъ годичный спирчковый; Тишинский;—Турецкий.

Planta caule herbaceo, pedunculis solitariis, fructibus oblongis, pendulis; Americæ meridionalis, Indiæ utriusque; in vaporariis apud Ruthenos colitur. *Cl.* Pentandr. *O.* Monogyn. *O. N.* Solanac. *L.* Solaneæ J. Annua. *Usualis est:*

F R U C T U S, capsularis, ruber, nitidus, **conicus**, incurvatus,

seminibus subrotundis, compressis, albidis refertus. *Fructus Capsici baccati* non est adeo acer, nec proinde huic substituendus.

Q. Præstans, in *resinous* residens principio. *Sapor piperi analogus*, *acris*, *fervidus*, diu in ore remanens.

V. Stimulans; peptica; *extus*: rubefaciens.

U. In dyspepsia a torpiditate, muci adcumulatione, parvis præbiis adhibetur. In febribus intermittentibus protractis et repullulantibus cum successu præscripsit BERGIUS, et quidem formula sequenti: *seminum Capsici annui* grana sex, *draparum Lauri nobilis* drachmas duas, pulveratas in tres partes æquales divisit, quarum prima, incipiente primo vigore, secunda postridie eadem hora, tertia vero tertio die sumebatur, et sic febres propulsatas sine relapsu refert. Laudatur quoque in typho, vi vitali submissa, paralysi, aut pronitate humorum in putredinem minante. In vomitu nigro, quo febris flava ægrotos adoriri solet, cum successu exhibitæ sunt *pilulae* e *fructus Capsici annui* drachma, *farinae secalinae* granis quinque et *aquaæ* sufficiente quantitate factæ, duodecim, quarum una, secunda quaque hora propinabatur. Nec in paralysi extremitatum irrita medela. In nostalgia, teste MAKITRICK (qua in primis apud nos parvo-Russi laborant, quum in borealis oris militare coguntur) scarlatina anginosa caute (WRIGHT,) febribus tropicis, apathia, comate stipatis, superdato cataplasmate. *Sucus baccarum exsuccarum recentium Capsici* in ophthalmiis asthenicis majorem in modum laudatur, uti nec *infusum Capsici* in gutta serena, guttatim oculis instillatum inefficax (*granum* in uncia *aquaæ* trihorio infunditur), protracto præsertim usu, utile. *Hydropi* cum *ferratis* obponitur. Et *tægminis* et *seminum* creber in Jamaica usus est pro orexi cienda, digestioneque adjuvanda. *Condimentum Anglice Cayenne pepper* dictum, quod ex Cayena in America transferatur, atque a Britannis medicinæ loco adhibetur, e *seminibus Capsici baccati* (*bird pepper*) mola contritis, *farina triticea*, et *fermento panis* componitur. Massa in furnis siccata in pulverem tenuatur.

D. In *pulvere* a duobus ad sex grana cum *ligno Quassiae amarae*.

V. *Cataplasma sinapinum acerrimum*.

CARBONAS CALCARIÆ NATIVUS.

Углекислая известнь; мѣль; крейда.

In variis Rutheniae oris reperitur, imo circa Moskvam; ast uberrimus ejusdem melioris notæ proventus est in cretaceis collibus circa Tanaim, Volgam, Borysthenem, Tyram, Hypanim etc. In primis vero penes oppidum Bielgorod, et Schigri Cursensis Gubernii. *Marmor album*; *Creta alba*; *Testae Ostreeæ edulis*; (*Conchæ*;) *Lapides*, seu oculi *Cancri Astaci*; *Testae ovorum avium* etc. referunt quæcunque Carbonatæ *Calcariae*, plus minusve purum, (recteque alterum pro altero sumi potest;) postrema tamen concrementa animalia, aliquo modo animalisata, *gelatinam nimirum animalem* continentia, qua facilius redditur connubium cum humoribus animalibus, usui interno aptiora esse videntur, crudioribus e minerali regno desumti, quæ iterum pharmaceutico scopo, ad paranda scilicet alia remedia, dum pura fuerint, præferri merentur.

Q. *Carbonas Calcariae aqua non solvit*, ubi tamen superat quantitas *Acidi carbonici*, pars ejus redditur solubilis, quod in variis mineralibus aquis locum habet. *Acida ei adfusa effervescentiam causant*, *gas acidum carbonicum expellendo*; quod etiam igne fieri potest. Centenarius constat *Acidi carbonici* partibus tredecim, *Calcariae* partibus triginta duabus, et *aquaæ* partibus duodecim.

V. *Aqua Acidi carbonici*; — *acidula artefacta*; *Carbonas Calcariae praeparatus*; *Gas carbonicum*; *Murias Calcariae*; *Pulvis absorbens*.

CAREX ARENARIA.

Осока песочная.

In arenoso solo, præsertim mobili, per totam Russiam, crescens, in sabuletis vero circa Wolgam copiosissima. *Cl. Monœc.*

O. Triandr. O. N. Calamariæ L. Cyperoideæ J. Perennis.

Usualis est:

RADIX, prælonga, repens, articulata, nodosa, *extus rubens, intus alba.* Cum CARICE HIRTA et SPICATA, priori ex nodis et interstitiis, fibras emitente, spicis omnibus oblongis, fœmineis, remotis, vaginatis, vaginis lanato villosis, caps: hirtis, uti etiam cum C. DISTICHA et INTERMEDIA neutiquam confundenda: differt a CARICE ARENARIA. spica foliorum oblonga, acutiuscula, spiculis plurimis terminalibus masculis, inferioribus fœmineis, capsulis marginatis, membranaceis.

Q. In volatili oleo residens. Odor resinoso-terebinthinaceus; sapor subdulcis, farinaceus.

V. Sudorifica; diuretica; radici Smilacis Sarsaparillæ analoga.

U. Est remedium leniter agens, morbidæ reproductioni accommodatum in syphilide cumprimis, et fœditatibus cutis celebratum. Pro succedanea habetur radici Smilacis Sarsaparillæ, eique, quum etiam levioris pretii sit, præfertur a quibusdam.

D. Concisæ radicis uncia in aquæ libra decoquitur ad sellibram, atque sic vasculis præbetur.

C A R U M C A R V I.

Тминъ; Тимонъ.

Planta, caule ramoso, vaginis foliorum ventricosis, involucro partiali nullo, in pratis Russiæ australis spontanea. Cl. Pentand. O. Digyn. O. N. Umbellatae L. Umbelliferæ J. Biennis. Usualia sunt:

SEMINA, ovato-oblonga, ex fusco-subincana, striata, aromaticæ.

Q. In volatili residens oleo; odor aromaticus, subgravis; sapor moderate calidus; subamarus.

V. Stimulans; peptica; resolvens; lactifera.

U. Inter indigena non spernendum stimulans, nervos in primis abdominis. In dyspepsia præcipue infantum, flatuum

molestiis, enterodynbia flatulenta, spasmodica vomitione etc. præsertim, si hæc incommoda apud adultos perfrictione, vel usu ciborum, vel male habente hypochondriasi, vel hysteria, sunt orta. Lac etiam nutricum auget, (DAREL.) Infusum cum melle mucum pulmonum resolvit. (BLAIR.)

D. Vel masticantur *semina*, vel in *pulvere cochlearibus parvis*, vel in *jusculis adhibentur*. *Decoctura concentrata in pulte* vel *clysteris forma extrinsecus* in enterodynbia flatulenta, haud inepta. *Oleum tam interno*, quam *externo usu idoneum*. *Interne* ad quinque propinatur guttas cum *Saccharo*; *externe*, vel *perse*, vel cum *linimento Ammoniae*. Pro frictione *Olei semidrachma*, *linimenti Ammoniae uncia*; pro *clystere decem*, viginti guttæ, in *tantillo Alcoholis soluti et cum tepida aqua permisti*, adhibentur.

V. *Aqua Carvi; Oleum—; Elaeosaccharum—*.

CASSIA SENNA et LANCEOLATA. (FORSKOL.)

Кассия ланцетовидная; Египетская Сенна.

Planta fruticosa Africæ, Nubiæ et Arabiæ incola. Cl. Decandri: O. Monogyn. O. N. Lomentaceæ L. Leguminosæ J. Usualia sunt:

FOLIA, pinnata, bijuga; *foliol:* subovatis, obtusis, longitudine pollicis, *petiolis* eglandulatis. Optima sunt *Alexandrina*, (*foliis quadrijugis*, ovato lanceolatis, acutis) glandula supra basin petiolorum prædita, Александрийскій листвѣ, ruthenice dicta. Hæc folia teste (NECTOUX) a CASSIA LANCEOLATA et CYNANCHO OLEIFOLIO desumuntur. *Tripolitana* grandiora et obtusiora, læte virentia, scabriuscula, minoris æstimantur. In Arabia circa Mocham provenientia sunt longiora, magis acuminata, atque *Alexandrinis* inferiora habentur. Quæ in Italia et Gallo-provincia gignuntur, forsitan ab Oriente advenæ, Tripolitanis maxime respondentes, eminentiores tamen habent *costas*, facilius in miculas abeunt, atque enumeratis virtute cedunt. Ut C. Sennæ *foliorum* in locum, *folia Coluteae arborescentis et frutescentis*, fraude substituta fuissent, id dissimili eorum forma perspecta, ratius factum esse, recentiores arbitrantur.

Q. *Odor* non prorsus gratus, nauseosus; *sopor* nauseabilis, amaricans, subacris, in principio *volatili* residens, partibus *gummiosis* et *mucilaginosis*, *resinosas* et *aethereo-oleosas*, non parum superantibus.

V. Cathartica, actionem vasorum exhalantium, motumque intestinorum peristalticum intendendo.

U. Hoc *catharticon* adcommodum ægris minus irritabilibus, vulgo phlegmaticis dictis, ubi nullus inflammatorius status, nullæ congestiones, majori dosi in nevroblacia, et muci accumulatione; minori vero in habituali obstipatione.

D. *Pulveris* forma perraro dantur a semidrachma ad drachmam; justius tamen, ne (quod fieri adsolet) tormina excitent, a quinque ad quindecim grana, aliis *catharticis* adduntur. In *electuario* a decem granis ad scrupulum de die in habituali obstipatione. Si alvus rite ducenda est, tum secunda quaque hora, donec responderit, exhibentur. In hæmorrhoida, *Sulphur sublimatum* recte eidem additur. *Infusum bulliente semel aqua factum optimam formam constituit.* *Petioli (stipites) foliis* interdum intermisti, non aliter torminum, quæ sub usu oboriuntur, dici possunt causa, quam, si verum esset, quod HORN habet, quod illi *foliis* ditiores essent, et ad hæc talis casus incideret, ut et *stipites* in data portione *folia* superarent, et intempestiva, si *infusum* pararetur illius parandi diligentia, partes *resinosae* una solverentur, quod vero ex simplici *calidae transfusione*, vel secundum BOUILLON LA GRANGE diuturniore frigide fieri nequit, quippe qua partes tantummodo magis volatiles solvuntur; sic *infusum*, si recte paratur in se ipso eas quoque partes, *gummosas* scilicet *mucilaginosas aetherreas* continet, quæ vim *resinosarum* infringunt. Alii, ut enterodyniae prævertant, (sicilico aut semunciae *foliorum* pro collatura selibræ *liquidi*, sub *syrupi* cūjusdam grati connubio, præscribunt, et hujus partitas doses, donec effectus contigerit desideratus, capere expedit) suadent *corticem L. Cinnamomi, semina A. Cardamomi, Coriandri sativi, Cari Carvi, radicem A. Zingiberis, Aetherem sulphuricum alcoholisatum addi*, alii sub

spasmodico statu *Opium*, vel sub debilitate canalis intestinalis, radicem *Gentianae luteae* et flores *M. Chamomillae*, vel sub statu inflammatorio *Nitratem*, vel *Supertartratem Potassae*.

V. *Clyster catharticus; Electuarium Sennae; Infusum —; — salinum.*

CASTOR FIBER.

Б о б р ь.

Animal Europæ borealis in locis desertis, nemorosis, ad littora marium, fluminaque habitans. Cl. Mammal. O. N. Neclopoda. Palmipeda. (*Glires L.*) Usuale est:

CASTOREUM, Ruthenice Бобровая смесь, seu substantia unguinosa, in folliculis excretoriis quatuor utriusque sexus, inter anum et genitalia sitis, ovi gallinacei magnitudinem æquantibus, intertexta membranulis tenuioribus. Ruthenicum Pruthenico, Polonico, Germanico præferendum; Canadense Americæ vilipenditur; utriculis venit minoribus et tenuioribus. Primum est ponderosum, magnis turgescentibus folliculis inclusum, membranulis tenuibus intertextum, friabile; haud vero totum exsuccum, hepatici coloris.

Q. Præstans ab *Oleo volatili* repetenda. *Odoris* est virosi, ingrati, penetrantis; *saporis acris*, amaricantis.

V. Ejusdem stimulans; nervina; antispasmodica; menagogia; aphrodisiaca; similis *Moscho*. Volatilem fugacemque præbet systemati sensifero stimulum, qui remissionem præcedentium turbarum infert; cum tamen majorem, quam *Moschus resinae* copiam contineat, multo diutius incitat, vasa in primis sanguifera adficiendo.

U. In typho nervoso, directa asthenia, orto, pulsu arteriarum debili, tremulo, intermittenti, cum deliriis, stipato, in febribus intermittentibus, neuroblacia conspicuis, item in hypochondriaseos et hysteriae symptomatis, irritabilitate præternaturali, citra tamen nauseam, et vomendi conatus, molestis, imo in enterodynbia spastica, cum flatuum copia juncta, est eximia

efficacitatis. Multum præstat in spasticis motibus apyretis, quibus hystericae a menstruis defectæ vexantur, utut delicatulae minus ferant, quam rurales. Tulit etiam præconia in spasmodico astmate, lypothimiis, vertigine, insultibus hystericalium apoplecticis, epilepsia etc. Stimulando uterum exhibetur cum fructu adversus spasticos puerperarum dolores, aut catameniorum suppressionem.

D. *Pulveris* forma ad grana quinque ad semiscrupulum, vel etiam scrupulum, cum *Saccharo*, *Magnesia*, aut *gummi Acaciae verae* datur, adjunctis, pro re nata, *radice Valerianæ* off. *Camphora* et *Opio*. *Pilulae* etiam fiunt ex eodem, extracto *Marrubii vulgaris*, *Menyanthidis trifoliatae*, *gummiresina F. Assae foetidae*, et *pulvere radicis Rhei palmati*. Pro *clysteribus* drachma sufficit.

C E N T A U R E A B E N E D I C T A.

CARDUUS BENEDICTUS Ph. Ross.

Волчецъ кудрявый; Стоголовникъ.

Planta in Europa australiore, præcipue in insulis Archipelagi frequens; in hortis vulgo culta. *Cl. Syngen. O. Frustranea. O. N.* Compositæ capitatae L. *Cinarocephalæ J. Annua. Usualia sunt:*

H E R B A F L O R E N S, peramara, floribus compositis, tubulosis, croceis, calyce cum foliis adjacentibus ope texturæ arachnoidæ cohærente. **S E M I N A**, oblonga, leviter incurva, basi ad latus exsecta, striata, supra margine serrato coronata, cortice griseo amaro vestita, intra quem medulla alba, dulcis.

Q. Præstans; *sapor herbae* pure et intense amarus, inhærens; *seminum* dulcis mucilaginosus; *odor ingratus herbae*. Extractivo amaro nititur.

V. Stomachica; antacida; sudorem blande movens. Vomitum ob amaritatem nauseosam aliquoties movit.

U. In infirmitate stomachi, pituita gravati, et bradypepsia

hinc orta, præsentanei effectus, bilem corrigendo, digestionem firmando, stases pituitosas solvendo, ipsi vermium genesi officiens. In febris intermittentibus diurnis, splanchemphræxi stipatis expedit extractum, cum extracto *Matricariae Chamomillæ*, *Fumariae* off. *Triticæ repens*, addito *Acetate Petasæ liquido*; valentius vero adversus stases diurnas reserandas, quam potentiora stimulantia agit. In ipsis febris remittentibus, ubi ventriculus et intestina humoribus viscidis scatent, extractum plurimi pensum cum *Tinctura Valerianæ* off. ex *infuso Serpentariae Virginianæ* mixtum. Alia laus est in malignis, quin in ipsa pestilentiali. (МАТНІОЛ.) In morbis pulmonum, ad solvendas stagnationes in glandulis pulmonalibus, movendos screatus, a quibusdam laudatur. In tabe, et hydroperibus eximium est adminiculum aliorum, *Scillæ m.* exemplo et *gummi resinae Stalagmitidis Cambogioidis*, quibus officit, quo minus ventriculo insidias struant. Denique ulceræ tibiæ ad ossa usque profunda, persanata fuisse feruntur *emplastro*, quod *folia Centaureæ* exceptit. (ARNOLD.) Semina ad sudorem movendum data sunt cum successu, item ad eruptionem variolarum et morbillorum accelerandam.

D. Exhibetur in aqua bulliente infusa herba, vel extractum aquosum: hoc frequentius et commodius illa. Extractum a granis decem ad scrupulum exhibetur in pilularum forma. In *infuso* ad aquæ bullientis unciarum octo semuncia *herbae*. *Seminum emulsionis* forma convenientissima; opus vero habet ad minimum decuplo aquæ, et grisea evadit.

V. Extractum *Centaureæ benedictæ*.

C E N T A U R E A C A L C I T R A P A.

CARDUUS STELLATUS s. CALCITRAPA. (БАУН.)

Чертополохъ звѣздчатый или хохлатый; Приворотникъ; татариче: Копаль.

Planta in australibus Rutheniæ oris, in primis vero Chersonesi tauricæ atque Iberiæ, in locis incultis, et ad vias copio-

se crescens. *Cf.* Syngenesia. *O.* Frustranea. *O. N.* Compositæ capitatae *L.* Cinarocephalæ *J.* Annua. *Usualis est:*

HERBA, foliis pinnatifidis, linearibus, dentatis, caule piloso, calycibus subduplicato-spinosis, sessilibus, corollis radii purpureis, disci albidis.

Q. In principio extractivo amaro residet.

V. Deobstruens; lexipyreta; diuretica; *seminum* præcipue adstrictoria.

U. Ab incolis Chersonesi tauricæ decoctura herbae in profluviis alvi asthenicis cum successu adhibetur. In splanchemphraxis etiam valet, quo in casu succo Leont. Taraxaci, Fumariae off. etc. videtur esse analoga *GILBERT.* Laudatur quoque in febris intermitentibus, in iis, ut verosimile est, quarum proxima causa in visceribus infarctis latet. Calculosis utilem esse plura exstant documenta.

D. Exhibitetur plerumque forma decocturæ e siccuncia herbae siccatae et concisæ in aquæ libris tribus et semis ad remanentiam bilibræ, paratæ, idque ter, quaterve de die, poccello capit. Pulveri pariter locus est, cuius scrupuli duo aliquoties in die sumuntur. Succi foliorum recenter expressi, in qualibet aqua aromatica soluti, drachma, vel sicilicus, per diem bibitur.

C E R V U S E L A P H U S.

О л е н ь.

In tota septentrionali regione, præprimis autem in Kamtschatka. Aestivo tempore gregarie sylvas ac montes elatiiores; hyemali vero, depressa muscosaque loca inhabitare solet. *Cf.* Mammalia *O.* Bisulca. (*Ruminantia.*) *Usualia sunt:*

CORNUA, solida, ramosa, ab aliorum ruminantium cornubus facile distinguenda. Datur in officinis, præter integra cornua, rusura cornu Cervi, seu *C. C. raspatum*, griseo-albicans, fragile. SEVUM, quod ex capsulis adiposis præsertim renalibus animalis hujus aliquatur. Rasura Cornu Corvi solet aliquando a turpilucridis lignea scobe falsificari, sed fraus colore al-

bussimo, ac difficiili fragilitate detegitur. *Sevum flavescens*, ran-
cidum, amaricans, minus aptum est usui medico.

*Q. Cornu: mucilaginosa. Odor et sapor nullus. Prunis insper-
sa rasura hæc fœtidum spargit odorem. C. C. rasum, cum aqua
diutius in vasis clausis excoctum, præbet liquorem, qui re-
frigeratus *Gelatina cornu Cervi* dicitur. Sevi: oleosa. Odor, si
probe depuratum est, nullus; sapor autem blandus.*

*V. Gelatinæ cornu extractæ: nutriendi; involvens. Sevi:
emolliens.*

*U. Gelatinæ: morbi asthenici, colliquativi, phthises, tabes,
febres hecticæ etc. Semper tamen præcipue in praxi militari
huic gelatinæ substitui potest illa recens ex ossibus bubulis
parata (Vide: Bos TAURUS) plane iisdem virtutibus gaudens,
dum cornu Cervi, præter id, quod carioris sit pretii, haud raro
est vetustum, atque tum parum bonæ gelatinæ continens. Sevi
usus solummodo est externus, in abscessibus, quoties pus
nondum ad maturitatem pervenit; in rigiditate muscularum et
quæ sunt alia similia mala; componendis item unguentis, em-
plastris etc. inservire potest. *Calcinata cornua, Subphosphatæ
Calcariae* referunt.*

*D. Gelatinæ in libra ptyasanarii alicujus, vel syrapi solutæ
ad semunciam. Sevi pro re nata variat.*

*V. Decocitura mucilaginea II; *Gelatina cornu Cervi; Oleum pyro-
animale;* — — depuratum; *Subphosphas Calcariae;* — — stibiatus.*

C E T R A R I A I S L A N D I C A. W.

L I C H E N I S L A N D I C U S. L.

Исландский мохъ.

In borealibus Russiæ, præcipue ericetis, saxetis, perfre-
quens. *Cl. Cryptogam. O. Lichenes. O. N. Algæ, L. et J.
Perennis. Usualis est:*

*Frons, ex viridi-castanea, coriacea, membranacea, multi-
fida, lobis erectis, canaliculatis, plicatis, scutellis ad margi-
nem liberis, vix marginatis.*

Q. Eximia, a principio *extractivo*, *mucilaginoso* et *scytodepsico* derivanda, subamara, *odore nullo*.

V. Nutritia; subadstringens; roborans.

U. In morbis pulmonum asthenicis, tussi, haemoptysi, catarrho asthenico (chronico), in omni tabis genere, ut phthisi, atrophia &c. in diarrhoea quoque, lienteria, dysenteria. *Pani* quoque additur; in Islandia vero ob sterilitatem soli ab incolis in quotidianum usum adsumitur, cum *lacte decocta*, atque inter meliora ibi refertur *edulia*. MACKENZIE: (*Travels in Iceland*; МОНРС: *Islandske Naturhistorie. Kjöbenhavn.*)

D. Perraro adhibetur in *pulvere* propter levitatem a semi-drachma ad drachmam; ast potissimum, vel *lacte decocta*, (prius tamen in grossum pulverem redacta,) vel a duabus drachmis ad unciam in selibra, vel libra *aquae*. Sapidior fit *decoctura*, si paulum *chocolatae* adjicitur, nisi forte morbus hoc additamenti genus recuset. *Gelatina* quoque fit ex *eadem* co-chleatim administranda.

V. *Decocitura Cetrariae; Gelatina —.*

C H E L Y D O N I U M M A J U S.

Чистюпель великорослый; Чистякъ большой; Ласповичная
права.

In locis ruderatis et ad sepes copiosissima. *Cl.* Polyandr. *O.* Monogyn. *O.* *N.* Rhœadeæ *L.* Papaveraceæ *J.* Perennis. *Usuales sunt:*

H E R B A *recens*, pedunculis umbellatis, foliis quinquelobatis, lobis angustis acute laciniatis. **R A D I X** ramosa, dum *recens*, bruno-rubicunda, siccata nigra.

Q. Præstans, principio *volatile acri* exuberans, **S C I L L E M.** **D I G I T A L I P.** **A C O N I T O N A P E L L O** aliisque similibus, analogo, siccatione mitescenti. *Odor* totius stirpis nauseosus, ingrate gravis, præcipue *radicis*; arefactæ vero vix aliquis; *sapor amarus*, *acris*; scatet *succo crocei coloris*, saturationi tamen in *radice*.

V. Radicis recentis: resolvens, sudorem et lotium movens, alvum subinde ducens.

U. In splanchemphraxy morbisque ab ea provenientibus, ita in ictero emphractico, obstructione splenis, glandularum mesenterii, pancreatis, in infarctu pulmonum (cum *Aceto scilite.*) *Succus* recenter *expressus*, organorum abdominalium et systematis venae portarum actionem intendit, astheniam extre-
morum arteriarum tollit, atque obstructiones reserat; a scrupulo ad semidrachmam propinatur. In eundem finem, vel *radicis* vel *foliorum infusum aquosum*, vel *radicis pulvis* ad se-
midrachmam exhibetur. Ab aliis *Serum lactis*, in quo *folia* fri-
gide macerata sint, adjecto *Supertartratis Potassae* tantillo, com-
mendatur. Aptissimus est *succus ejusdem spissatus* a decem gra-
nis ad duodecim per diem offerendus, *aqua destillata*, solutus. Oedematosis tumoribus pedum *folia recentia* admoventur.
Hydropisi methysticæ herbae et *radicis ex Cerevisia infusum* cum
successu oppositum est. An in scorbuto, herpetibus, oculorum
adfectionibus, dialeipyris (**LINNAEUS**) sit efficax, experiendum
est. *Ruricolæ herbam recentem* plantis pedum cum *Muriate Sodaæ* et *pipere* ante paroxysmum dialeipyrae optato interdum
cum successu admoverunt. Contra syphilidem a cl. **HECHTEL**,
RAU, **KAPP**, optimo cum successu adhibebatur (Vides: **PLULAS CHELYDONIUM.**) a duabus pilulis (ad XX) incipiendo,
duas iterum descendendo. Si ægri cita alvo laborant, ad tem-
pus supersedendum iis. **WENDTIUS** auctor est, ut ineunte æsta-
te *succus e radice & herba expressus*, pari *mellis* portioni et
aquæ remistus, ab initio cochleari parvo, sensim dein sensim-
que auctiori dosi, magno, administretur. Laus ejusdem in de-
purandis sanandisque ulceribus ad vetustiora pariter, ac serio-
ra tempora pertinet. *Succus moliores verrucas*, iisdem illitus
exest (**HEISTER**, **PLATNER.**)

D. *Succus expressus* a scrupulo ad semidrachmam; *spissatus*
ad decem grana in *misturis*.

V. *Mistura Chelydonii m; Pilulae ——; —— compositæ;*
Succus ejusdem spissatus.

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES.

Марь Мексиканская благовонная.

In Mexico, et Lusitania spontanea; in Russia vero, hinc inde, hortensis. *Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Oleraceæ L. Atriplices J. Annua. Usualis est:*

H E R B A florens, racemis foliatis, simplicibus, foliis lanceolatis, dentatis, in officinis sub nomine *Botryos Mexicanæ*, veniens; **S E M I N A**.

Q. Eximia, principio *aromatico camphoroso*, *oleo volatili* partibusque *gummeo-resinosis* nititur. Recens *odorem* fragrantissimum ambrosiacum spargit; *saporem* vero edit aromaticum.

V. *Herbae*: nervina; stimulans; secretionem cutis, renum et pulmonum augens; *seminum*: carminativa; anthelmintica.

U. *Herba* in nevrasthenia, et paralysi præprimis celebratur. Ita non desunt exempla glossoplegia, prægressa apoplexia, ortæ, et paralyseos pedum, curatæ. (RUDOLPH in BALDING. n. Magaz. für Aerzte vol. 5. p. 496.) His tamen *tinctura* adcommodatior esse fertur (LENTINUS.) Celebratur quoque in spasmodicis affectionibus, in *infuso* propinata, præcipue in asthmate spasmodico, et in scelotyrbe (PLENCK.) *Infusum fervidum* eximia pollet vi calefaciendi, nervos præcipue ventriculi mulcendi, vasaque capillaria ad secretiones incitandi. Hinc in infirmitate ventriculi, in inæquabili imponderabilium conductione, dyspepsia, flatulentia, adminiculatur. A quibusdam aduersus helminthiasin adhibebatur. Olim loco *Theae Boheæ foliorum* apud Teutones, ut Svevos, Bavaros (LOCHNER) in usu fuit, ast promiscua et quotidiana sorbillatione vix extra incommodum sumi potest.

D. *Cl. PLENCKIUS* ter eam de die a scrupulo ad semidrachmam propinavit in *substantia*, vel in *infuso* sicilicum ejusdem quotidie ad semunciam, in deceim communis aquæ unciis. Quibusdam electurii forma placet.

V. *Infusum Chenopodii.*

C I C H O R I U M I N T Y B U S.

Цихорій дикий; Солнцева сесія; Петровы башоги.

In Russia meridionali ad margines agrorum viarumque sponte crescens, alibi in hortis culta. *Cl. Syngenesia. O. æqualis. O. N. Compositæ Semiflosculosæ L. Cichoraceæ J. Perennis. Usuales sunt:*

RADIX, fusiformis, subflava, crassitie pollicis, lactescens. **HERBA**, floribus axillaribus, geminis, subsessilibus, foliis runcinatis. Variat planta flore albo, rubro, cauleque complanata. **Radix** eligatur carnosa, et rejiciatur lignosa.

Q. Recentis in succo lachrymato (toti plantæ inest succus lacrymatus amarus, in fera amarior, quam in culta) intense amaro residens. **Radix saporis americanæ;** herba vero amari, subacris.

V. Organa, quæ digestione præsumunt, incitante; déobstruente; diuretica.

U. In splanchemphraxy, ictero, hypochondriasi, dyspepsia, scorbuto. **Radix** tosta, in vicem Coffeæ arabicae, haud raro cocta, præ aliis, **semen peregrinum** supplementibus, peculiari similitudine, hucusque incassum quæsita, non eminet.

D. **Radicis** exsiccatæ semuncia cum aquæ libra, ad uncias octo, decocta; succi vero recentis unciae duæ cum juscili libra.

V. Extractum Cichorii. Intybi.

C I N C H O N A O F F I C I N A L I S.

CONDAMINE (HUMBOLDT.)

Лихорадочникъ аптечный; Хина.

Arbor Americæ meridionalis, præsertim in regni Peruviani præfecturæ Guito montibus copiosa, tractum ultra quinquaginta milliaria extensem, occupans. *Cl. Pentand. O. Monog. O. N. Contortæ L. Rubiaceæ J. Usualis est:*

CORTEX, (*Cortex Chinæ,—peruvianus Ph. Ross., Лихорадочная корка,*) convolutus, siccus, ponderosus, friabilis, extus asper,

et *Lichene albo* vestitus, interne glaber, fuscus, vel ferrugineus, vel intense cinnamomeus, ab $\frac{1}{3}$ usque ad integrum lineam crassus; fragilis, fractura leviuscula, vel fibroso-sabra. *Cortex* externe glaber, nigrescens, verinibus exesus, crassus, non convolutus, levis, pallide-flavens, vel aurei coloris, tenax, spongiosus, interne albens, in fractura fibrosus, in farinam facile mutabilis, peramarus, vel peradstringens, vel plane insipidus, mucilaginosus, vel lignosus, rejiciendus. Tum fraude, quam incuria eorum, quibus decorticatio creditur, alienos e.g. e **WINTERANA GRENADENSIS** et **WEINMANNIIS** intermisceri, certum est, haud raro etiam fallacie causa, *cortices* illi ab aromatariis, *infuso ligni brasiliani*, tinguntur. Ita quoque alias arboris *cortex* erronee substituitur a **CRATÆGO** desumptus, qui *extus* albidior, *intus* rubicundior est, saporis adstricterii magis, quam amari. Hanc quidem substitutionem non concedit **MENCHIUS**, adtamen **GRENIUS** adfirmat *corticem Cinchonae off.* saepius cum aliis commisceri, iisdemque, *gummiresina Aloës* admista, amarum saporem conciliari. **SCHAUBIUS** pulveri *corticis Cinchonae*, pulverem *radicis Gentianae luteae*, admistum vidit. Alii amore lucri stimulati, *corticem Clutiae Elutheriae*, pretio longe viliorem, in vicem ejus vendebant. Quamobrem *Cinchonae* ab exteris adlatum pulverem, tanquam bonum fideque dignum medicamen, dispensare non licet.

Q. Omnes *Cinchonae* species secundum experimenta cl. **REUSSI**, praeter materiam ligni continent: 1) *Materiam amaram, aqua et Alcohole solubilem, salia Ferri colore viridi, laeto, tingentem, infuso gallarum quernarum coagulabilem, quam analyseos ope e CINCHONA extraxit et amarum cinchoninum dictum esse voluit.* 2) *Materiam tingentem (matière colorante) rubram vel fuscam, insipidam Alcohole multo magis, quam aqua solubilem, cum amaro cinchonino facile sociabilem, oxygenii accessu, ita, ut insolubilis fiat, mutabilem, Ribrum cinchoninum.* 3) *Materiam scytodepsicam.* 4) *Mucum vegetabilem insipidum.* 5) *Calcariae Cinchonatem, seu cinchonicam Calcariam, salem neutrum ex Acido Cinchonae peculiari (cinchonico) et Calcaria composi-*

tum. *Odor corticis* leviter aromaticus, specifice mucidus, pulvere aqua bulliente adsperso, sensibilior; *sapor amarus* cum vestigiis mitissimi *aromatis*, simulque subacidus, austerus, substypticus.

V. eximia, specifice lexipyreta; adstringens, penitiore et constantiore stimulo corroborans; antiseptica; in *amaro rubro-que cinchonino* et *materia scytodepsica*, proportione certa, inter se sociatis, residens. Nihil ad illum, vel perparum conferre potest *mucus vegetabilis* et *Cinchonas Calcariae*.

U. **CINCHONÆ** genus recentiori ætate, plurimis ditatum est novis speciebus. LINNEUS duas duntaxat species, OFFICINALEM et CARIBÆAM JAQUINI noverat, VAHLIUS novem recenset, a SWARTZIO, FORSTERO et MOTIS, detectas. Dein LAMBERTUS undecim enumeravit, et cl. PERSOON usque 21 species distinctas; si autem cum *illustri HUMBOLDTIO* genus COSMI BUENÆ cum CINCHONA conjungere lubet, et simul addere species novissime indagatas, videlicet EXCELSAM ROXBURGHII; HUMBOLDTII SCROBICULATAM, CADUCIFLORAM et OVALIFOLIAM, nec non WILDENOWII BRASILIENSEM, numerus specierum rite notarum, usque ad 26 adscendit. Dispar de salubritate et effectu *corticis* judicium, et est, et fuit. Causa obtrectationis maxima ex parte, in confusionem specierum conjicienda est; multæ enim plantæ ex Rubiaceis generi CINCHONÆ adnumeratae sunt. Pro usu medico illæ CINCHONARUM species, reliquis sunt præferendæ, quæ *materia amara* magis abundant; atque, vel masticatæ, vel aqua infusæ, sive elixatæ, insig-nem præ se ferunt amaritatem, quæve simul solubiliorem continent *materiam rubram*. CINCHONA CORDIFOLIA, cuius *cortex* pallidus est, merito præfertur, estque foliis orbiculato-ovatis, saepè subcordatis, subtus tomentosis, supra pubescen-tibus. CINCHONA CONDAMINEA, corollæ tubo hirto, foliis ovato-lanceolatis, utrinque glaberrimis, in axillis nervorum inferne scrobiculatis. Virtute CONDAMINEÆ proxima est CINCHONA LANCIFOLIA, foliis lanceolatis, acutis, utrinque glaberrimis. Facta efficacioris copia, *cortex Cinchonæ* inter robo-

rantia, quorum virtus late patet, spectat; quamobrem in omnibus morborum formis, asthenia systematis musculosi conspicuis, cum neurasthenia minoris gradus conjunctis, utilitatem promittit, si autem vigente musculara actione fuerit datus, aut febrim aut inflammationem ciet, ac proinde tanto minus unquam in febri exquisite inflammatoria quadrat, ut omnino cavendum sit sedulo, ne calcaribus utamur, cum opus sit fræno (HUXHAM.) Neurastheniæ majori vix proderit, cum non sufficienter irritet nervosum systema, haud secus ac gastricis sordibus, ac debilitatis organis digestionis, cum neutiquam adsimilari queat, ac proinde *scytodepsica* sua *materiæ* in canalem intestinalem incongrue agendo, aut comprimit pertinaciter, aut solvit alvum, alienus. Sub exaltata irritabilitate debilitateque venæ portarum, stagnationes, et splanchemphraxes causat. Stimulo suo in sistema arteriosum agendo, ejusque muscularam intendendo actionem, febribus asthenicis fit adcommodatissimus; ubi pure pute arteriosa actio relative exsuperat, ubi, infracto organismo, periphericum systema vasorum transpirationis, et digestionis succumbit. Primo quidem et præcipue omnium observata est, et celebrata virtus, qua dialeipyras profligat, pro herculeo habendus *lexipyreto*. Si morbus citra abnormitatem systematis venæ portarum, splanchemphraxes abdominales, gastricas sordes, spasmodicam tensionem, aridam cutim, debilitatem pulmonum, sthenicam diathesin, pure pute dynamicus est, ex adverso, si aliquid horum præsto est, etsi formam mali typumque intermittentem mutet, chronica haud raro mala, hydroïpin, hecticam febrim etc. post se trahit. In plerisque omnibus casibus, hic quoque sub initium morbi vix convenit, nec nisi, abnormitatibus illorum organorum correctis, porrigenitus, quod, pro re nata, fit, vel per *sales neutros*, vel per *amara extracta*, modo per *stibiana*, modo *volatilia stimulantia*, vel *mercurialia* etc. (*unguento*, *pilulis coeruleis*, *Submur. Hydrarg.*) levioribus morbi gradibus alienus est, ubi remedia *extractivo*, vel *scytodepsica* *materiæ* scantentia paria sunt propulsando malo, vel febri in sthenicam

inclinanti, hinc autumno grassantibus febribus adcommodatior est, quam vernalibus. In dialeipyris (febribus intermittentibus) malignis, veterno, aliisque abnormis nerveæ actionis symptomatibus mali ominis stipatis, magni aestimatur, et hic, prout alibi, ubi paroxysmi rem febrentis esse in pæcipiti indicant, quanto ocyus administrari debet. Plerumque apyrexias tempore exhibetur, eoque majoribus præbiis, quo breviores observantur apyrexiae, quanquam, sub longiori apyrexia, major quantitas; crebrioribus tamen præbiis, ab aliis quibus exhibeatur. Alii hora, vel duabus horis, præmissis, ante paroxysmi accessionem, exhibent. Propulsata febri, recidivis, continuato ejusdem usu, occurendum; scire enim licet, paroxysmum; quamvis deletus esse videatur, secunda hebdomade saepius recrudescere in tertianis, tertia autem in quotidianis, et quartanis, resumtoque remedio, paroxysmi reversioni præcaveri. In typho, continenti typo, vel remittenti conspicuo, non est alienus *Cinchonae cortex*, præsertim, si febris notabilioribus remissionibus distincta est, ita quidem, ut accessionum ratione ad dialeipras inclinet, vel hecticam æmularitur, aut debilitas muscularis systematis præsto est, aut pronitas in putredinem urget, ex adverso officit, in primo talium acutorum morborum stadio, durante sic dicta cruditatis periodo, sub spastica diathesi, ariditate cutis, linguæ, difficultate spiritus, angore, tensione in scrobiculo cordis, et in hypochondriis etc. In febribus quoque putridis, sub iisdem conditionibus, valet. Nec pesti alienus, præcipue in connubio *Camphorae, vini, acidolorum*, (**SAMOLOVITSCH.**) In sic dictis inflammatoriis putridis in connubio *stibiatorum, Muriatis Ammoniae* etc. datur. In typho cum inflammatione secunda periodo prodest, haud secus ac in pneumonitide typhode, angina gangrenosa etc. etficacem se præstitit. Intellectum velim de typho exanthematico, urgentibus videlicet variolis confluentibus putridis, petechiisque comitatis, ita morbillis, rubeola, febri scarlatina, aphthis etc. In hæmorrhoeis (hæmorrhagiis passivis) sub diatnesi in putredinem prona, et notabili arteriarum

laxitate, magna est *corticis* auctoritas. In hæmorrhagia ventriculi cum *lacte* et *mucilaginosis*, in hæmoptysi *praeparata* tunctaxat lenissima *Cinchonae* e re sunt, e. g. *infusum ejusdem frigidum*, in metrorrhagia cum *Ferro*, *acidis mineralibus*, *cortice Lauri Cinnamomi* etc. In aliis quoque morbis periodice redeuntibus, ut cephalæa periodica (*MORTON.*) mania (*WILLEMS.*) mastocarcinomate, periodicis doloribus stipato (*de HAEN.*) ophthalmalgia profuit. Nec minus utilis in variis convulsivis spastisque morbis, qui exaltatæ nervorum irritabilitati cum debilitate muscularum conjunctæ, natales debent; repudiatur tamen sub paroxysmo a *WERLHOFIO*; conceditur vero tantum in remissione, vel intermissione, hinc præconia tulit in epilepsia (*VAN SWIETEN.*) in primis vero magni fecit *corticem* hunc in finem *MEAD.*, sub connubio *radicis Valerianæ off.* Numiam infantum ad convulsiones proclivitatem, idem cum *balneis frigidis* vincit (*TISSOT.*) laudatur quoque in scelotyrebe, catalepsi, risu - rdonico (*OLIVIER.*) tetano (*BISSET.*) asthmate nervoso (*FLOYER.*) etc. in copula *praeparatorum* e *Zinco*, *Cupro*, *Hydroargyro* vel *aethereo-oleosorum* remediorum, e g. *Moschi*, *gummiresinae F. Assae foetidae*, *radicis Valerianæ off.* vel *Aetheris*, *Opii*. Magna in fide est apud *clar. MILLAR* (*On asthma and hooping-cough*) adversus pertussim, sed ultimis ejusdem periodis adcommodatior esse videtur, ad robur videlicet fibrarum restituendum potius, quam malum in sua radice subigendum. In affectionibus hypochondriacis et hysterics valet, (*WHYTT*, *TISSOT.*) musculares canalis intestinalis fibras roborando, additis præsertim iis, quæ *scytodepsicam corticis* materiam imminuere queunt, qualia sunt *aromatica*, *extractivo scatentia principio*, virtus ejus cum primis emicat. Laudatur proinde in segnitie, duritie habitualique obstipatione alvi, quæ incommoda pure pute musculari debilitate; non vero a spasmis et gastricis sordibus orta sunt Prodest in diarrhoea asthenica, diutius protracta (*KLEIN.*) in dysenteria ejusdem indolis, præsertim pronitate, fractis ægri viribus, in putredinem stipata aut febri (inflammatorio statu sublatu) notabiliter

remittente. Tum, pro re nata, *mucilaginosa, narcotica, aromatica,* vel *scytodepsicam* materiem tenentia, si addantur, haud sunt aliena. Valuit et contra tenesmos, *clyster e decocturae corticis saturatae* unciis quatuor et aliquot *Opii granis*, aliquoties de die repetitis, (HUNTER.) In Cholera, in copula *Rhei p. radicis, neutrorum salium*, juvat. In helminthiasi etiam locum obtinet, laudante impensis RAMAZZINO, in verminatione febris epidemicæ, et adstipulante LANZONIO duobus casibus, primo sine febri, altero cum eadem conjuneto, ast aptior est, eductis vermisbus, genesi novorum obice in ponendo. Abnormitati secretio-
nis cum asthenia musculara conjunctæ obponitur; hinc in ma-
joribus ulceribus, ubi laxitas notabilem puris proventum, su-
stinet, quo in casu non modo pus corrigit, sed etiam febrim
hecticam imminuit. In phthisi pulmonum ulcerosa, si nulla
comes inflammatio est, in catarrhis protractis, screatibus cruentis, tenaci, purulenta pituita, stipatis, Præter *internum usum extrinsecus* quoque admovetur, e. g. conjunctim cum *aqua Calcariae*, ulceribus, pus tenui fundentibus, scrofulosæ, syphiliticæ scorbuticæque naturæ, muscularique laxitate sustentatis. Cariei et canceraticis ulceribus efficaciter renititur. Interne in variis universalibus reproductionis abnormalitatibus, cum mu-
scularis systematis asthenia conjunctis, adhibetur, ita in scrofulis sub initium (FORDYCE,) rhachitide, scorbuto (LIND,) sto-
macace, in cutis fœditatibus, psora, tinea, herpetibus, lepra, (HEBERDEN) in syphilide, ubi musculare sistema usu HY-
DRARGYRI debilitatum est, vel ubi illud scrofulosa aut scorbu-
tica diathesi marcescit, vel ubi debilitas effectus est mali longius protracti. SLOANE illam in gangræna tentavit, cui præsidio esse plurimi (DOUGLASS, SHIPTON, GOOLDEN, PAISLEY etc.) documentis comprobarunt. In atrophia, marasmo senili, tabe dorsali (TISSOT,) et id genus aliis, ubi universa actio reproductiva, per potentias pure debilitantes, (per vehe-
mentem animi intentionem, jacturam humorum, vel morbos etc.) adeo fracta est, ut omne inter reproductionem, secretio-
nem et excretionem æquilibrium tollatur, vel ubi materiales

causæ nullæ adsunt, *cortex* hic præcipuum est remedium. Etsi nullum CINCHONÆ succedaneum verum inventum sit, omnia enim, quæ, vel Medici, vel Chemici substituerunt medicamenta, nihil continent de materiis CINCHONÆ peculiaribus, et essentialibus, (*amaro et rubro cinchonino;*) nihilo tamen minus substituenda sunt alia eidem opportuna, adjectis ubi opus est, stimulantibus, præsertim, cum certum sit, *corticis Cinchonae officinalis* venalis 100 libras ad nos adlatas, vix decem genuinas, ut experientia haud æquivoca docet, præbere. Pro succedaneis CINCHONÆ habentur: *Gelatina animalis* (SEGUIN,) *Carbo lignarius*, *cortex Aesculi Hippocastani*, *Clutiae Elutheriae*, *Cuspariae febrifugae* (HUMBOLDT,) *Fraxini excelsioris ramulorum*, *Liriodendri Tulipiferae*, *Pruni Padi* (COSTE,) *Quercus Roboris*, *Rhois Cotini* (ZSOLDOS,) *Salicis capreae*, *latifoliae*, *Swieteniae febrifugae*, herba *Lepidii ruderale*, *Teucrii Chamaedris*, *Lichen parietinus*, *lignum limatum* quodvis? (AUTENRIETH,) *Quassiae amarae*, *nuclei Amygdali communis*, *radix Gei urbani* (BUCHHAVE), *Acori Calami*, *Polygoni Bistortae* (pari utriusque portione cum pauxillo radicis *Amomi Zingiberis*) *Krameriae triandrae* (Ratanhiae,) *semina Coffeae cruda* (GRINDEL,) *tosta* (AUDON,) *Oxydum Arsenici album*, *Subsulphas Cupri et Ammoniae*, *Sulphas Zinci, tela arancarum.*

D. Forma pulveris cum aromate et radice Glycyrrhizae glabrae mixti et in *vino*, ubi licet sumti, optima est in dialeipyris, eaque in primis convenit, ubi irritabilitas non est admodum exaltata, neque pronitas in inflammationem urget. Spinæ dorsi febrentis, subsidii ergo, spiritum quemdam aromaticum bis in die inficari jubet cl. NIEMANN. Intervalla ab una dosi ad alteram pendent a spatio apyrexias, sicut singulum præbium, quod communiter ex duobus scrupulis pro adultis constat. Debiles sumto *cortice* interdum gravamen quoddam in ventriculo et anxietates sentiunt, quo in casu tantillum *Aetheris sulphurici alcoholisati*, vel additur, vel præmittitur; ubi vero ventriculus, quod interdum evenit, *corticem*, utut *Opio*, et *aromate* mixtum, nullatenus perferre, aut æger eum ob

fastidium plane deglutire nequit, tum *decoctura* ano tripla dosi, ast repartita, injici debet, quod addita *Opio tinctura*, firmitius, et diutius althæret, atque longiori remora certiores edit effectus (NIEMANN.) Causa vero, quæ efficit, ut interdum æ gri **CINCHONAM** non solum fastidiant, verum etiam eandem nullo modo, quomodo cunque præparata, et *aromatibus*, *vinosis*, aliisque ventriculi vires incitantibus remedii sociata fuerit ferre et assimilare sibi possint, secundum observationes cl. REUSSI in *rubro cinchonico* residet, quod propter imperfectionem suam solubilitatem integras vires digestivas et assimilatrices requirere videtur. Hinc in asthenia nervosa cum ventriculi debilitate conjuncta, sæpe *decocturae* præstat *infusum*, cum *aqua frigida* paratum, quæ nempe amari partem plurimam, *rubri* vero per exiguum suscipit. Ubi vero in tali casu ad curationem largis opus est *Cinchonae* dosibus, propinanda est *decoctura* fortissima, *rubro* omni per præcipitationem privato, ea, quam, **D E C O C T U R A E C L A R I F I C A T A E**, articulo, indicabimus, ratione, quæ quidem, ut ut cariori pretio parabilis, militaris præfectis vix neganda. Si minoribus præbiis, alvum ducat, addito *Opio*, administrandus est *cortex*. *Acidum carbonicum vomitum* avertendi causa vel *coriex L.* *Cinnamomi* etc. adjicitur. Si alvum comprimit *radix Rhei p.* vel *Supertartras Potassæ* additus, non neglectis *clysteribus* prodest; si vero, quod interdum evenit, importunæ primarum viarum sordes, prohibent, quominus *Cinchona* adhiberi queat, tum additus *Tartras Stibii* et *Potassæ*, suasu cl. PEKEN, huic incommodo succurrit. Octo unciiis decocturæ adduntur duo grana *Tartratis Stibii* et *Potassæ*. In febribus intermittentibus nervosis et in genere, ubi cito effectum exseri e re est, pulvis *Cinchonæ a semidrachma* ad drachmam, imo ad sesquidrachmam propinatur. In morbis chronicis scrupulus ad semidrachmam pro vice datur. Quo citra incommodum faciliusque sumi queat pulvis, alii in massam redigi eundem suadent. Ceterum in *aqua etiam* et *lacte* non male datur. Adhibetur denique pulvis iis in casibus, ubi interne minus commode sumi potest, ita e. g.

quum infantes, vel delicati laborant, per modum fomenti, vel *cataplasmatis* admovetur. Massa fit ex *corticis* aliquot unciis et certa *aqua*, vel *vinū* quantitate, eaque, urgente typho, regi-*oni* ventriculi admovetur, per intervalla, decoctura *Cinchonae*, humectanda, vel, ut ill. HUFELANDUS auctor est, *aromaticis*, *amaris herbis*, ut *Artemisiae Absinthii*, *Menthae crispae*, fl. *Matr. Chamomillae* etc. *herbis*, *lacti*, *vino*, *cerevisiae*, ad modum *cataplasmatis*, jungitur. Si in forma electuarii detur, *mellis* vel *syrupi* tribus unciis, uncia *corticis Cinchonae* admiscetur. Efficax substantia e *Cinchona* non sine detrimento per *aquam* extrahitur. Si enim frigida adhibetur, enormi opus est illius quantitate (partibus 240 ad 360 pro una parte *corticis*;) si vero cum *cortice* coquitur, *rubri* pars, per *oxygenii* ex aëre trans *aquam* accessum insolubilis facta, brevi excutitur, et medica-*ta* virtute, ut plurimum orbatur. Idem multo magis fit, cum vel *infusum* frigidum, vel *decoctura* evaporatione inspissatur. Ea de causa ex officinis proscribendum esset *Cinchonae extractum aquosum*. Menstruum ad elixandum *corticem* aptissi-*mum*, *Alcohol* est, quod etsi *mucum vegetabilem* et *Cinchonatem Calcariae* intacta in *cortice* relinquat, multo tamen facilius, quam *aqua*, *amarum*, cum *rubro cinchonino* sociatum, excipit, et *oxygenio* minus facilem pro alterando *rubro* accessum conce-*dit*, ergo omne, quod *Cinchonae* inest, medicamentosum, non solum facile extrahit, verum immutatum reddit. Itaque *aquosō* longe præferendum *extractum Cinchonae alcoholēum*. Requiruntur vero pro elixatione *corticis*, ex maxima parte perficienda, circiter 24 *Alcoholis* partes. Scilicet *Cinchonae flavae* unciæ duæ cum *Alcoholis* (*Spiritus rectificatissimi*, *alcoholis* partes 0, 75 continentis) libris duabus coctæ ill. REUSSIO dederunt *extracti* sicci gr. 164, eadem cum eadem *spiritus* portione ite-*rum* coctæ exhibuerunt *extracti* gr. 47, sed tertia decoctura non nisi decem grana *extracti* relinquit. Suadet autem, ut nisi *extracto* sicco, vel spissiori opus sit, nunquam eousque elixa-*tio* *alcoholēa* producatur, quippe illa rubri partem insolubi-*lem* reddit; plurimum vero commendat *Tincturam Cinchonae*

contractam vel concentratam, quæ ut bona sit et grata, cum *Alcohole (vini)* vero paranda est. Talis commode plerumque potest adhiberi, ubi *Cinchonam* liquida forma pæbere oportet. *Uncia* vel duæ cum octo vel duodecim unciosis aquæ mixtæ optime substitui possunt decocturæ *Cinchonæ* communi, et plus quam illa, in febrium curatione præstant. Præcipue hæc præparatio commendabilis esse videtur, valetudinariis militaribus, pro curandis illis ægrotis, quibus *Cinchona cruda* non conductit. Nil perditur de medicamento pretioso, ita præparato, atque sine detrimento adservari et qualibet dosi præscribi potest. *Aqua tincturæ* admista materiae rubrae partem excutit, quippe *rubrum cinchoninum aqua* minus, quam *Alcohole* solubile. Sed inevitabilis hæc præcipitatio, vix quidquam effectui salutari potest detrahere. Effectum eximium, quem *Cinchonæ extractum alcoholeum (siccum) Aethere sulphurico* solutum ill. REUSSIO teste præsticit, experiri oportet.

V. *Decoction Cinchonæ; — clarificata; Extractum Cinchonæ; Haustus —; Mistura —; Tinctura —; — composita.*

C I T R U S A U R A N T I U M.

Померанцовое дерево.

Indiæ orientalis et occidentalis, (Americæ meridionalis) incola. In australibus Rutheniae oris cultura alitur. Cl. Polyadelphia. O. Icosandria. O. N. Pomaceæ L. Aurantia J. Arborea. Usualis est:

FRUCTUS RECENS, (*Malum Aurantiorum Ph. Ross.* Помаранецъ) globosus, utrinque nonnihil compressus, umbilicatus. Curassao fragrantissima mala profert. CORTEX ejusdem extrinsecus flavus, inæqualis, poris pertusus copiosus; interne albus fungosus. FOLIA, ovata, appendice cordata, ad basin acuta. FLORES, (vulgo *Naphæ*) corollæ recentium albæ, succulentæ. Lenissimo calore siccatae vitro probe clauso serventur. Cum foliis *Citri medicae*, quæ gaudent petiolis linearibus, non confundantur, folia quippe *Citri Aurantii* petiolis sunt alatis.

Q. *Corticis flavi fructus: odor fragrans; sapor aromaticus, amarus, non ingratus. Foliorum, odor debilius fragrans, gravisculus, sapor aromaticus, amaricans, calidiusculus. Succi pomorum: sapor dulcacidus, vel amarodulcis. Florum: sapor amaricans; recentium odor suavissimus, siccatorum vix ullus.*

V. *Corticis fructus: stimulans; nervina; roborans; stomacho idonea; puluae æque ac succi: frigerans; antiscorbutica. Foliorum: tonica; cardiaca. Florum: analeptica.*

U. *Fructus recens atque maturus, potissimum in usu est. Sucus, quo pulpa scatet, grato acore, quum febribus inflammatoriis, tum aliis, ad cohibendum calorem, sitimque leniendam, ita quoque ad avertendam propensionem humorum in putredinem, per modum potionis aquosae adhibetur. Hoc etiam fine efficax esse potest scorbuti medela. Cortex flavus fructus, agit uti cortex L. Cinnamomi et quoniam plus extractivi possidet, ac hic, actio ejus in officinam digestionis efficacior esse existimatur. Gratum amarorem, cum aromate sapido et fragrante, præ se ferens, astheniæ canalis intestinalis, accumulatione muci, flatus molestiis, nausea, enterodynbia, stipatae convenit, nec minus hypochondriacis, hysterics, haud secus ac pharmacis anthelminticis, congruum est additamentum. In organa sexus, contiguasque iis partes agendo, metrorrhagiæ ad instar corticis L. Cinnamomi succurrit. Folia minus olei, quam cortex, continentia, actionem suam magis in universum sistema nerveum exserunt. In universalis asthenia auctiori irritabilitate, aut sensibilitate, spasmis, convulsionibus, hysteria, comitata, juvant. In epilepsia pæsertim cynædorum, a viris magni nominis laudata, quan etsi non semper curent, multum tamen levaminis adferunt. Folia in epilepsia verminosa, per modum pulveris et infusi data, teste illustri de HÆN, in remediis pollent.*

D. *Cortex flavus ad ventriculum roborandum in pulvere datur a semidrachma ad drachmam, in infuso semuncia in libra aquæ, vel vini cyathis per intervalla bibendo. Folia pulverata a semidrachma ad drachmam ter, quaterve de die, vel perse, vel copulative cum radice Valerianæ off. Gei urbani, cor-*

tice Lauri Cinnamomi, Subsulphate Cupri et Ammoniae, Oxydo Znci etc. immo etiam cum Syrupo cort. *C. aurantii* in electuaria aduersus epilepsiam dantur. In infuso uncia foliorum cum libra aquae bullientis, immo etiam vinorum est idoneum. Decocitura fit e manipulo concisorum foliorum in libra aquae ad diuidiam consumtionem decocto, colata dein pro unico præbio mane sumitur, addito, si lubet, syrupo.

V. *Aqua Citri Aurantii; Extractum --; Oleum --; Syrupus --.*

C I T R U S M E D I C A.

Лимонное дерево.

Arbor semperfiriens in Perside, et imprimis in Media sponte crescens. Cl. et O. præcedentis. Perennis. Usualis est:

F R U C T U S, лимонъ, (*ejusque succus*) oblongam præ se ferens figuram, altero extremo in papillam desinens, altero obtusior, cui adhærent calyculi reliquiæ; cortex fructus externus, ab interiori alba, spongiosa velut parte separatus, vulgo in officinis *flavedo* dictus, post maturationem flavus, folliculis numerosis oleiferis distinctus, superficiem inæqualem redditibus, ibidemque numerosissimis poris hiantibus. Corruptus quoquo modo fructus usui medico ineptus. *Succus Citri* interdum *succo uvarum immaturarum adulteratur, subinde amaritie nauseosus fit, enata, incauta expressione.*

Q. *Fructus: sapor acidus; corticis: amarus, aromaticus. Corticis efficacia ab oleo volatili pendet.*

V. *Succi: refrigerans; antiseptica; antiscorbutica eximia; corticis: stimulans; stomachica.*

U. *Succi in febris sthenicis et asthenicis perfreqens, in quibus refrigerat, sitim mitigat; si biliosa diathesis subest, hanc refrenat egregie, nec minus in coercenda pronitate in putredinem valet. Explorata acoris ejusdem, et salis concreti in scorbuti curatione, eminens efficacia, haud secus ac cortices Citri, marcescentibus ab eadem causa gingivis, continuo*

admoti, respondent examussim. Hinc facultas ejus antiseptica saturando cum *Muriate Soda* omnino intenditur (WRIGHT;) et tum fit dysenteriae, febribus intermittentibus, scarlatinæ anginosæ, et imprimis diabeti et lienteriae maxime idoneum medicamen In vomitu inhibendo, acidum cum *Subcarbonate Potassae* rite mistum, ebullitionis tempore administratur. *Flavus cortex* in enterodynia flatulenta, torminibus ventris spasticis, *aqua* infusus adhiberi solet purus, vel aliis remediis admistus. *Succus* in itineribus maritimis a corruptela defenditur adfusa quinta, vel sexta parte *Alcoholis diluti (Spiritus vini galliri)*, quo quidem natura acidi paululum alteratur. Itaque rectius frigore condensatur, quo ad octavam partem reducitur, aut saturatione cum *Calcaria*, *Acido sulphurico* dein dissoluta: *Coxwells concrete salt of limons*.

D. *Succi* duæ unciæ, cum octo unciis *aquaæ*, pro potu propinantur.

V. *Acidum citricum concretum*; *Aqua Citri medicae*; *Oleum* — —.

C L U T I A E L U T H E R I A.

CROTON ELEUTHERIA (SWARTZ.)

Кашкариль.

In America meridionali, in Jamaica (WRIGHT,) in insulis Bahamicis, (præcipue in Eleutheria) Floridæ vicinis, obvia. *Cl. Monœcia*. *O. Monadelphia*. *O. N. Tricoccæ* L. *Euphorbiæ J. Arborea*. *Usualis est*:

C O R T E X, (*Cortex Cascarillæ Ph. Ross.* Кашкарилльная корка) durus, *extus* cinereus, *subtus* e fusco ferrugineus, subrugosus, lineis transversalibus sparsis et *Lichenibus* (*LICHEN VARUGUS*, — *CASCARILLE*, — *GLANDIFER*, — *SPHÆRIA*, — *ARGUS* etc.) obductus, fragilis et in fractura nitens. Alii eum e *CROTON ELEUTHERIA* deponi putant. Tempore corruptus et ex gravioribus *ramis*, seu e *trunko* collectus, improbatur.

Q. In *volatili oleo*, atque *resinous extractivo amaro residens*. Gustatus saporem prodit *amarum cum aromate junctum*, quo os, durabili impressione incalescit; prunis injectus gratum spargit *odorem*, perfacile accenditur, flagratque vivida flamma; illico tamen, si ab igne removeatur, extinguibili; fumat, fumo grato in *Ambram* incidente.

V. Stimulans; roborans; peptica; interdum, ob resinam, excalfaciens.

U. In imbecillitate ventriculi valet, et *extractivo exsuperante*, *aromaticis* jure præfertur; imprimis vero alvo habitu-liter liquida, opportunum remedium. Ita in diarrhoea et dysenteria, illam nempe sistit, laxati vero ventris, post exan-tlatas dysenterias, egregie subvenit. In chronicis diarrhoeis per modum *infuso-decoctus* cum *Opio*, *Aethere sulphurico*, aliisque analogis, utilem esse experiundo didicimus. In febribus quo-que intermittentibus, suadentibus *STAHLII* adseclis, *Cinchona* *cortici* cum successu substituitur, præsertim, ubi hujus *cincho-ninum principium* minus adcommodum esse existimatur. In pulmonum etiam debilitate proficuus, hinc vis ejus in tussi asthenica, asthmate, febribus hecticis (*HOFFMANN*) elucet. Con-valescentibus ex morbo, cum *liquore vitigeno* et *amaris*, viri-bus socialiis, calcar, subdit.

D. Forma *pulveris* a granis decem ad scrupulum, semidrach-mam datur. Addito *extracti amari* duplo in *pilulas* cogitur. Pro *infuso aquoso* vel *vinoso*, drachma ad libram vehiculi alteru-trius. *Extracti* grana quinque ad decem.

V. *Extractum Clutiae Elutheriae*.

COCCIONELLA SEPTEMPUNCTATA. FABRICII.

Козявка семипочечная.

Coleopteris rubris; punctis nigris, septem elytrorum punc-tis in triangulum positis. Habitat in Europæ plantis frequens.
Cl. Insecta. O. Coleoptera.

Q. Principio *volatili acri*, occisis insectis evanido, nititur, aliis quoque insectis, ut *COCCTIONELLA BISPUNCTATA*

CARABO CHRYSOCEPHALO, — FERRUGINEO (FABRICII,) proprio, vix autem, ut quibusdam placet, narcotico, scatentibus.

V. Anodyna.

U. In odontalgia cum primis celebratur a **HIRSCHIO** aliisque; scilicet insectum inter pollicem, et indicem eousque teritur, donec digitorum apices incalescant; dein iisdem dens et gingiva dolens, tangatur, idque pro re nata, aliquoties repetatur. Orto in affecta parte frigoris sensu, dolores cessant. Dentibus, carie affectis, minus adcommodum, haud secus ac inflammatorio statui, alienum. Interdum, mota saliva, dolorem sedat. **TINCTURA COCCIONELLÆ SEPTEMPUNCTATÆ** a **SAUTERO** proposita aestimatur in cephalalgia, hæmicrania, prosopalgia, myodynæ rheumatica, ostealgia (doloribus osteocopis), stranguria (facta e *lactis* tepefacti selibra et 50 guttis, injectione, in urinæ iter.) *Opio* succedaneum est remedium.

CURCULIO ANTIDONTALGICUS, CARABUS FERRUGINEUS, CHRYSOMELA POPULI & SANGUINOLENTA, COCCIONELLA BISPUNCTATA aliaque ex *Eleutheratis* similem vim exercent.

D. Tinctura a viginti ad triginta guttulas datur.

V. *Tinctura Coccionellæ septempunctatae.*

COCHLEARIA ARMORACIA.

RAPHANUS RUSTICANUS.

X p ē n ь.

Planta, *silicula* emarginata, scabra; *foliis* radicalibus lanceolatis, crenatis, caulinis incisis; Europæ, ad ripas crescens, uti et hortensis. Cl. Tetradyne. O. Siliculos. O. N. Siliquosæ L. Cruciferæ J. Perennis. *Usualis* est:

RADIX, fusiformis, crassitie antibrachii sæpius, ramosa, extus fusca, intus alba, recens, ejusque **SUCCUS** expressus. Radix siccata, virtute cassa fere.

Q. Eximia, ab *oleo volatili hydrothionico* repetenda. *Sapor* acris; *odor* sternutationes, et lacrymas exciens.

V. Stimulans; sudorem, pituitamque movens; diuretica; antiscorbutica.

U. In scorbuto infunditur *vino*, vel *cerevisia* sola. In *hydropo*, post dialeipyras superstite, *succus radicis claret*, *Saccharo*, vel *Vino* remistus. In asthmate pituitoso, paralysi, arthrodynia, paraphonia, utilem esse perhibent. *Syrupus* in raucedine valet. *Rasa recens radix*, atque cuti ad semunciam impo-sita, epispastica eminent efficacia. Unciae duæ, quatuor, *pediluvium* reddunt irritans et in delicatulis rubefaciens. *Infusum radicis cum Aceto* lentigines discutit.

D. *Radicis rasae* drachma ad semunciam et amplius. *Succi expressi* semidrachma, in haustu *Vini*.

V. *Cerevisia antiscorbutica*; *Infusum Cochleariae Armoraciae*; *Succus ejusdem compositus*.

C O C H L E A R I A O F F I C I N A L I S.

Ложечникъ; ложечная трава.

In aggeribus, collibusque maritimis frequens, ex cultura etiam crescens. *Cl.* et *O* præcedentis. Annua. *Usualis est*:

H E R B A R E C E N S, siliculis globosis, foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis, subsinuatis. *Succus expressus*. Cum aliis *siliculosis*, interdum cum **R A N U N C U L O F I C A R I A** permutatur.

Q. *Herbae recentis*: egregia, ab *oleo volatili hydrothionico* repetenda; sapor acris, amari ans, non ingratus. Principium *acre*, lingua, percipi solitum, destillatione cum pauxillo *olei volatilis* adscendit.

V. Leniter stimulans; diuretica; antiscorbutica, multiplici usu, comprobata.

U. *Herbae et succi*: scorbutos. *Extus* etiam applicata, ulcera scorbutica sanat; morborum oris et gingivarum suetum remedium.

D. *Succi in connubio amarorum*: *Fumariae off. Menyanthidis trifoliatae* et similiū, ad unciam et plus.

V. *Catapl. sinap. acerr.* — — *acre*; *Succ. Cochl. comp.*

C O L O M B A.

MENISPERMUM HIRSUTUM? BROTERO.

Луносъменникъ щепинистой.

In insula Ceylonia, prope urbem Colombo, unde nomen accepit, crescere falso existimabatur, nunc vero pro certo scimus eam in terra Caffrorum Africæ prope Mozambicam provinciæ Tranquebar inveniri. *Usualis est:*

RADIX (vulgo *radix Colombo*, корень Колумбы dicta) lignosa, lutea, subfuscæ extus, intus in taleolas transversim secta, lutea ex viridi. *Bryoniae radicem* esse cel. **WILLDENOWIUS** existimat; cuius tamen speciei, non est exploratum. Interdum **radix COSTI SPECIOSI** (vulgo *Costus amarus*) pro *radice Columbae* venditur; habet enim utraque magnam similitudinem; *Costi* vero *radix* masticata, saporem relinquit singularem *radici Jridis florentinae*, fere analogum. Subinde ex avaricie magis, quam ignorantia *radix Bryoniae albae* ei substituitur. *Genuina autem radix*, diu hærens, amaritie sua orbatur, per facile a vermis perroditur, cariosaque evadens, fit usui inepta, ideo sollicite in vitro vesica bubula muniendo, locoque frigidiusculo est custodienda.

Q. In *Cinchonino principio*, *Amylo* et magna *mucilaginis* quantitate residet. *Sapor amarulentus*, *acriculus*. *Odor* subaromaticus, non ingratus, peculiaris, balsamicus, ad odorem *seminis Cumini sativi* nonnihil accedens, mox vero, si *radix* non rite servetur, decrescens.

V. Stimulans, in vitalitatem permanenter agens: systemati musculari ventriculi, et intestinorum energiam impertiens, hanc ob causam imminutam *bilis secretionem* promovens, abnormem vero inhibens; digestioni *ciborum* proficia.

U. Diarhoeæ, dysenteriæ, in primis asthenicæ, cholerae, febri biliosæ remittenti, vomitionibus habitualibus auctiori ventriculi irritabilitate ortis, dispepsiæ, uti et affectionibus ventriculi tubique intestinalis, ubi bilis prædominatur, recte sub-

venit. Adversus hypochondriasis et hysteriam potest. Extrinsecus ulcera inspergendo asthenica curat.

D. Pulveris *radicis* scrupulus ad semidrachmam secunda, tertia, vel quarta quavis hora per se, vel in connubio *Magnesiae*, *Opii*, cui interdum *aromatica*, vel *amara* quoque: *Corticem Citri Aurantii*, *Quassiam*, *radicem Rhei palmati*, *Ferrum*, addere, non erit alienum. *Infusa* quoque *aqua destillata*: *Infusum aquosum Colombae* citius corruptelam init, quam alia ex *amaris plantis* parata; *aqua* tamen facile medicamentosæ ejus partes extrahuntur (vel *aqua Menthae piperitae*, vel *Alcohole*, vel *vino*.) *Vinum* cum *radice digestum*, mediocriter fit amarum. *Radicis semuncia* ex *aqua fontis* uncis decem, ad colaturam selibræ, decocta, quavis hora cochleatim præbetur.

V. Extractum *Colombæ*.

C O N I U M M A C U L A T U M .

C I C U T A M A J O R .

Болиголовъ пятнистый; Омегъ пестрый; Мутникъ.

Pl. caule ramosissimo maculato, seminibus subglobosis, striatis: striis crenulatis, involucellis dimidiatis, subtriphyllis, connatis; in australi Russia crescens, locis incultis, ruderatis. Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatae L. Umbelliferæ J. Bennis. Usualis est:

H E R B A (*h. Cicutae Ph. Ross.*) foliis compositis, foliolis lanceolatis, incisis, glabris. Cauda a **CHÆROPHYLLO BULBOSE**, **TEMULENTO** et **SYLVESTRI**, haud secus, ac ab **AETHUSA CYNAPIO**, **CICUTA VIROSA**, **TORDYLIO ANTHRISCO** et **SCANDICE ODORATA**, cum quibus interdum permutatur, distinguenda. *Chaerophylli bulbosi caulis* est maculatus, geniculis tumidis, basi et foliorum petiolis nervisque hirtis. *Chaerophylli sylvestris caulis* striatus, genicula tumidiuscula, semina oblonga laevia; *Aethusae caulis* sulcatus, folia pinnata, foliola pinnatifida, nitida, sature viridia; involucella pendula, dimidiata, triphylla, inter digitos trita, odorem fere alliaceum excitant. *Cicuta virosa*, caulem habet non maculatum, foliorum pinnatorum

foliolis lanceolatis, ternatis, acute serratis; *radice* tuberosa cavernosa, succo croceo plena, nec non, loco natali in paludibus profundis, ab omnibus distinguitur.

Q. Recentis venenata, *narcotico* et *exsuperanti acri principio* contenta. *Odor* putidulus, teter; *sapor* acris, nauseam movens.

V. Irritans; organismo animali inimica, zooctona; *narcotica*.

U. Ut nervos irritans, variis nevroblaciis occurrit, ut paralysi etc. in curatione etiam amavroseos elucet. Venas et vasa absorbentia irritando scirrhos mammarum, uteri etc. præsertim, vi extrinsecus illata, ortos, usu tam *externo*, quam *interno*, reserat. Ita in adenemphraxi mesenterica infantum, efficacissimum prædicat, *succum foliorum spissatum*, **Roseanteinius**, ad grana quatuor per diem datum, superbibito quavis vice, vel *sero lactis*, vel *tenui hydromelle*. In tumoribus glandularum syphiliticis, induratione prostatae, testiculi, in *Hydrargyri* conubio, eundem fere exserit effectum, quem *Opium*, quin alvum comprimat; est enim *Opii auxiliatrix*. Valet etiam in scrofulosis glandularum tumoribus, parotide (cum rhachitide et atrophia) *Hydrargo*, *sapone stibiato*, *gummiresina Ferulae Assae foetidae*, vel aliis congruis adjutum. In tumore jecinoris lienisque nevroblacio, icteri et hydropiseos non raro causa, *Conium interne* datur, *emplastro extus admoto*, nec in osteophymatibus, pernionibus etc. spernendæ efficaciæ. Strumas quoque discutit, nec electuarium e *Conio maculato* in connubio carbonis *Spongiae off.* frustratui habet. Si tumores resolvendi sunt admodum duri et inflammati, tum *Conium sub forma cataplasmati* adhibetur. Laudatur quoque in myodynbia rheumatica, arthrodynia, prosopalgia (cum *gummiresina F. Assae foet. Guajaci off* etc.) Suppurationem corrigit, hinc in ulceribus cancrois, syphiliticis faucium, vel admotu *externo* (*succo foliorum spissato cum melle et aqua Calcuriae*, vel *collutione oris* (per modum *infusi*,) in scrofulosis etiam, spina ventosa, carie, blennorrhœa, (WICKARD,) leucorrhœa, *lotionibus* (ex *infuso Conii*, juncto ejusdem *interno* usu (BERGIUS) laudatur, haud *secus* ac in tinea, psora, a BALDINGERO, in pertussi a BUTTERO.

D. Pulveris vel succi spissati granum, adscendendo gradatim ad scrupulum de die. Folia recentia contusa extrinsecus admoventur, siccata adhibentur pro fotu externo. Succus seminum spissatus citius causat vertiginem, quam foliorum: is proinde a semigrano sub initium porrigendus est.

V. Cataplasma Conii ammoniatum; Emplastrum Conii; --- compositum; Succus ejusdem spissatus; Unguentum Conii.

C O N V O L V U L U S J A L A P P A.

Ялаппа; Вьюнокъ.

Pl. caule volubili, foliis ovatis subcordatis, obtusis, pedunculis unifloris, Americæ, præsertim Indiæ occidentalis, Mexicana; Carolinæ et Floridæ incola. *Cl. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Campanaceæ L. Convolvul. J. Perennis. Usualis est:*

RADIX, (Ялапный корень) crassior, fusiformis, tuberosa, subglobosa, rugosa, *extus fusca*, transversim secta, circulis notata concentricis, fusco-nigricantibus, textu intermedio celluloso, subfuscō, distinctis. Integra, fusiformi-pyriformis sine radiculis, vel in taleolos, trium circiter linearum crassitie, dissecta ad nos venit. Bonæ indolis, sit ponderosa, compacta, et in fractura particulis interspersa micantibus resinosis; igni admota, flammam suscipiat, et contusa, non admodum difficulter in pulverem redigatur. Interdum ejus loco *radicem Convolvuli Mechoacanuae, Mirabilem Jalappam, et dichotomam usurpatam* fuisse notarunt multi, sed differentia facile notescit, hæc enim in taleolos secta, colore pallidior, levior, spongiosa, facile friabilis et in superficie circulis notata. Nonnunquam etiam *radix*, resinosa parte orbata, atque ideo etiam virtute cassa venit; hinc ipsa *radicis frusta* et quidenz ponderosa et dura, non pulvis ab aromatariis emi debet. *Radix Bryoniae albae*, quæ interdum eidem permiscetur, itidem colore pallidiori, textura spongiosa, minori gravitate, majori fragilitate, tum et annulis et radiis in interna substantia di-

scruminatur. Ipsius *C. Jalappae radicis* frusta, pallidi coloris, fragilia, levia, foraminibusque pertusa, rejicienda sunt.

Q. In principio *resinoso acri residens* (*resinam ad sextam usque ponderis partem tenet*) leviter linguam *gustata* pungit, magis autem fauces; *odor* ingratus.

V. Cathartica; hydragoga; *resinae*: drastica; anthelminthica.

U. Ut nerveos plexus abdominales irritans, adhibetur *radix* in nevroblacia abdominali, in bradypepsia, obstipatione, præsertim cum *bile taurina spissata*, *amaris*, quod etiam de collectione muci, his causis, orti, intelligendum, seu refractis dosibus irritandi scopo, seu cathartico. In asthmate etiam humido vulgo dicto, in connubio *Suboxydi Stibii hydrosulphurati*, in rhachitide, atrophia, pancreatemphraxi (cum *sapone* et *bile taurina spissata*), laudatur. *Hydropi*, sub abdominali stagnatione, præsertim, si etiam alvum duci expediet, cum *Supertartrate Potassae*, *Scilla m.* *Suboxydo Stibii hydrosulphurato* etc. conjuncta, stimulum intestinis imprimendo, medetur. Febribus intermittentibus, etiam morbis cutaneis, lumbricis, imo tæniae opposita. Majoribus præbiis, cruditates mucumque, quo interdum canalis intestinalis scatet, subducit; verum, ut usus ejus inflammatorio statui, plethoricis congestionibus, spasmis abdominalibus laborantibus, in hæmorrhagias pronis, hæmorrhoidis, alienus est, ita robustis, minus irritabilibus, vulgo phlegmaticis dictis, opportunus. Minus excalfacit, quam *gummire-sina Aloës*, neque ita alvum, ut *Rhei p. radix*, post catharticum effectum, adstringit. *Resina C. Jalappae* cautissime utendum, ne sese ventriculi et intestinorum plicis adfigens, per molestas cieat turbas, tormina videlicet, hypercatharsin, quin inflammationem, aliaque adhuc diriora mala.

D. Si duntaxat, nerveos plexus irritare lubet, tum *radix* a duobus ad quatuor grana infantibus; adultis vero a quatuor ad sex exhibetur, congrua remediorum copula. Movendæ leniter alvi gratia infantibus a quinque ad sex grana, adultis a sex ad decem dantur. Scopo *cathartico* adultis scrupulus ad semidrachmam sufficit. Forma pulveris est adcommo-

da neque spernendum est consilium, ut *pulverata radix cum Saccharo* conteratur, ne tenax *resina*, interaneorum lacunis adhæreat, et ut ad præpedienda tornina, paulum *aromatici* adjiciatur. Vulgaris quoque miscela est cum *Supertartrate Potassae*, aut alio quopiam *Sale neutro* (quæ regula observanda est in præscriptione omnium remediorum, quorum cathartica vis a *resinoso* derivatur principio) *radice Rhei palmati*; *foliis C. Sennae*, *Submuriate Hydrargyri*. Etiam in *pilulis* exhibetur.

V. *Emulsio resinosa composita*; *Pilulae cathartico-diureticas*; *Pulvis Jalappae compositus*; *Pulvis ejusdem*, et *Submuriatis Hydrargyri*.

CONVOLVULUS SCAMMONIA.

Скаммонія.

Planta in jugis montium, inde ab Antiochia usque ad Libanon sese extendentium, in monte etiam Tauro, uti et in Syria crescens. Cl. Pentandria. O. Monogynia. O. N. Campanaceæ L. Convolv. J. Perennis. Usualis est:

GUMMIRESINA (*Scammonium*, Скаммонія смола Ph. R.) substantia cinerea, levis, friabilis, acris, fracturæ splendentis, aqua, si solvatur, lactea, in viride vergens. Optima incisione radicis; vilior expressione, aut decoctione plantæ obtenta, cæterum eo melior est, quo aqua solubilior. Præferenda est, quæ ex Alepo adfertur, Antiochena, seu Smyrnæa vilipenditur, estque *succus lactescens* coctione inspissatus e *Cynancho Monspeliano*, qui et gravior, et nigrescens, et debilius purgans est.

Q. In *succo lacteo*, *acri* et *principio resinoso*, cum paucō *gummoso*, residens. *Saporis* initio haud satis fortis, sed postea amari, nauseosi, acris; *odoris* valde ingrati. Virtus ejus drastico-cathartica sub caloris augmento.

U. In ægris tenacioribus, et morbis, qui cathartica exigunt. In torpore melancholico, et hydropico convenit.

D. Trituratur *gummiresina* cum *Saccharo*, vel *Elaeosaccharo*

Citri, vel *Cinnamomi*, vel *nucleis Amygdali communis*, ut facilius in pulverem tenuetur, vel cum *radice Amomi Zingiberis*, aut *A. Cardamomi seminibus*, aut *Supertartrate Potassae* juncta, ita exhibetur, ut grana duo, vel quatuor pro dosi dentur. Largius æquo ingesta, non solum alvus vehementer cietur, sed etiam tormina, nervorumque distentiones exoriuntur.

C U C U M I S C O L O C Y N T H I S.

Колоцинщъ; горькая тыква.

In Syria, circa Alepum, in Arabia petræa, item in insula Cypro, spontanea. *Cl. Monoec. O. Digynia. O. N. Cucurbitaceæ L. et J. Annua. Usualis est:*

F R U C T U S, seu *pepo globosus*, ad pugni quandoque magnitudinem accedens, albidus, levis compagis fungosæ, intra celulas copiosas, semina oblonga, plana, includens. **P U L P A** ejusdem.

Q. Principium, quo nititur prævalens, est *saponaceo-resinosum*, *Alcohol* nimirum et *aqua* extrahendum, et præter id, *mucilago* multa, quæ superfuso *Alcohol* diluto, tincturam turbidam reddit. *Sapore amarissimo, acri et nauseoso; odore subdulci et nauseoso.*

V. Drastico-cathartica, cum torminibus haud raro, dejecti-
nibusque sanguinolentis.

U. In variis nervorum chronicis morbis; a neotericis vero in paralysi commendatur, haud secus ab aliis in *splanchemphraxi*, *hydrothorace*, imo ipsa epilepsia.

D. sit minuta: $\frac{1}{2}$ ad duo grana. *Pulpæ* grana triginta in se-libra *aquæ* decocta pro *clystere*. *Colocynthide* largius æquo ingesta, tormina, tenesmi, sanguinis cursus, et ipsæ interaneorum inflammations exoriuntur, et tum in *clysteribus* et *oleo*, ingerendo, præsidium est. *Camphora* etiam pro antidoto habetur.

V. *Decoctura Colocynthidis; Extractum — ; — — compositum;*
Pilulae ejusdem ferratae; — — stibiatae.

112
C U P R U M.

A E S.

M ѣ d ь.

CUPRUM *nativum*, et *mineralisatum*, vel *oxydatum* invenitur copiose multis in locis Russiæ: In Nertczinsk, Alpibus Uralensisbus et Altaicis, præprimis vero (magnis glebis) in Werchotursk; reperitur etiam in sic dicta insula cuprea, (Мѣдный островъ;) in Moldavia, Germania, Hungaria, Gallia et aliis in regionibus.

Metallum, rubedine sui generis conspicuum, in aëre tardius, quam **FERRUM** adtracto carbonico acido, aeruginem contrahens, cœruleo viridem; ductile; minus tamen **ARGENTO**, ad 1500° F. modo deliquescens, atque tum in crystallos tetraedras duplices coiens. Pondus **CUPRI** specificum 7,788. Si fricitur *odorem* distinctum sui generis emitit, saporemque metallicum, nauseolam moventem, vix ex ore, et lingua delebilem, præ se fert. Si in usum medicum adhibetur, omnino purissimum præsto esse debet, quod fiet præcipitatione **FERRI** ex solutione in *Acido sulphurico*.

V. Zooctona, et pro ratione præparatorum, multiplex.

U. Plerique Medentes a **CUPRO** vi venenata infami abhorrent (**FOTHERGILL**), alii vix externum ejus usum admittunt, quidam audaciores, varia illud forma indutum, debita cum circumscriptione, in difficilioribus casibus *intrinsecus* etiam adhibuerunt, rati atrocerem quoque *pharmaci* virulentiam cauto tempestivoque usu, aut aptis additamentis cicuratam, in salutarem converti posse efficaciam. *Limati Cupri* grana tria, quatuor mox initio rabiei hydrophobæ cum *pane butyrato* per triduum propinata, absque noxiis medicamenti symptomatis, respondisse **COHENIUS** memoriæ prodidit. Horrendas ab eo strages variæ recensent: **CUPRUM** quacumque forma deglutitum turbas ciet, cum primis in digestionis officina conspiucas, sic saporem teturum, aeruginosum, vix ex ore et lingua

delebilem; fastidium cibi; nauseam producit continuam. Stomachus in vomitiones effunditur; accedunt dolores, modo ad ardoris, modo ad punctionis sensationem proprius accedentes, jam regionem epigastricam, aut cartilaginis ensiformis, modo abdomen, modo pectus adficienes, aut enterodynbia cum perpetua, ad agrypniam usque, animi agitatione, ægri tandem sub labentium virium signis, deliramenta loquentes, aut convulsi, vel paralysi, hemiplegia, vel apoplexia tacti, erumpente rarius exanthemate, æmulo lepræ, ineluctabili fato, cedunt. Offert CUPRUM, consuetam ahenis materiam, in quibus alia atque alia, tum medicamenta, tum alimenta et potulenta parantur, coquuntur, adservantur, quæculinaris suppellex, ni ad usus domesticos rite STANNO obducatur, vel aliis indumentis, quæ a quibusdam e PLATINA, ARGENTO, et FERRO proponuntur, prædicta fuerit, perfacile labem contentis communicat fitque perniciosa, ni oxydationem hac ratione superficie metalli, atque sic noxam arcere voluerimus. Antidotum ejusdem: Oxydum, aut Sal Cupri ingesta, plerumque moto vomitu, eo ipso, rejiciuntur, magis etiam potu aquæ tepefactæ copioso, naturæ conatus sublevantur; acritas vero veneni, butyro, oleis unguinosis, lacte, mucilagine, obtundenda. Rejecta potiori massa, salium cuprum particulæ superstites, Kalinis et Sulpureto Calcariae hebetiores redduntur magisque innocuae.

V. Acetas Cupri; Supersulphas ejusdem.

DAPHNE MEZEREUM et LAUREOLA.

Волчникъ; ягодки волчыи; волчье лыко.

In Sieveria: дикой Перецъ.

Frutex sylvaticus, floribus sessilibus, foliolis ternis, caulinis, foliis lanceolatis, deciduis, in borealibus et australibus Rutheniacrescens, per Sieveriam ad Ieniseam usque obvius, unde sensim deficit. Copiosissimus ad Cumam et in sylvosis montium Uralensium et Verchoturiensium. Cl. Octandr. O. Monogyn. O. N. Vepreculæ L. Thymelææ J. Usualis est:

Cortex, tenuis, striatus, subluteus, epidermide e viridi-fuca tectus, primis, ineuntis veris, diebus, e trunko, vel majoribus ramis, aut potius, ut plerisque placet, e radice deglubendus. Interdum cum *Daphnes Gnidii*, *D. Laureolae*, *D. Thymelaeae* corticibus, forma, proprietate, virtute, usuque, convenientibus, permutatur.

Q. Venenata, a principio acri derivanda. Acritas insignis, tam gustatu, quam externo ejusdem admotu, cutem erodente, abunde declaratur.

V. Irritans; parva dosi resolvens; sudorifica; diuretica; majori, drastico cathartica; emetica; arrodens. *Extrinsecus*: cutem erodens; vesicans.

U. Priua *corticis instrinsecus* sumti laus in curanda syphilitide, improbante tamen **P E A R S O N**, increbuit: egregias ejus virtutes in nodis syphiliticis ex periosteo et ligamentis incrassatis, et ostealgia syphilitica nocturna **R U S S E L** numerosis periculis confirmatin ulceribus etiam syphiliticis, **H Y D R A R G Y R O** refractariis, efficacem se praestitisse *dcocturam* **C U L L E N U S** auctor locupletissimus refert. Exstitit quoque medela psoræ, herpetum, ulcerum asthenicorum, ichore sublivido mali moris scatentium, praesertim *tonicis*, *stibialis*, *mercurialis* aliisque congruis, pro re nata, additis, vel praemissis. Plurimum vallet in scirrhis recentibus, nec minus in tonsillarum tumoribus. Scite in Svecia recenter derasus, vulneri a venenato serpente inflicto, admovebatur (**L I N N E U S.**) *Extrinsecus* salutare fit exuatorum, et, ut rubefaciens, vesiculas excitandi ergo, *fonticulorum*, *vesicantium* vices explet. *Cortices ramorum* crassorum potentius agunt, quam tenuiorum. Sumitur autem hunc in finem *recens cortex*, vel si id nequit fieri, *vetustior*, atque *Aceto* tantisper maceratus, aut pars, cui admoveere eum expediet, *Aceto* humefit. Tria fragmenta longitudine fere dimidii pollicis, interjecto aliquot linearum spatio, prope insertionem musculi deltoidei *emplastro*, aut fascia circulari brachio affiguntur, vel nuchæ, femoribus, et suris. Bis de die mane et vesperi, vel, pro re nata, semel, vel alternis diebus, recentibus

commutantur, et in indolentioribus prima excoriatio *emplastrum* *Lyttae* fieri potest. Secundo vel tertio die cutis rubet, et hinc inde punctis sudantibus notatur, quarto vel quinto die epidermis secedit et effluxus secreti humoris, succosæ cujuslibet plantæ foliis puta: *Brassicae oleraceae*, *Hederae Helicis*, *Plantaginis latifoliae* sustinetur, isque justo major coërcetur, superdata tela cerata. Dolore nimis urgente, *Ceratum simplex*, loco *corticis* superdandum, ne, quod interdum evenit, humorum dolorifica accumulatio, sub partibus erosionis, oriatur. *Drupae D. Mezerei* (vulgo semina *Coccognidii*) parva dosi intritæ potui, a ruricolis Ruthenis adversus pertussim adhibentur; adjectæ autem a mangonibus *Aceto baccae*, illud acrius quidem, ast damnosum reddunt. Adsumto *cortice* æquo majori præbio, exoriuntur turbæ: dolor ventriculi, vomitus vel diarrhoea, convulsiones, et id genus alia, quæ *Camphora*, antidoto hoc in casu, celebratissima, debellantur. Phthisiscentibus et monogrammis alienus *corticis* usus.

D. Drachmæ duæ *corticis radicis* cum pari portione *radicis Glycyrrhizæ gl. concisi*, in libris tribus *aquaæ* decoquendo ad colaturam bilibræ, exhibentur.

V. Decoctura *Mezerei*.

D A U C U S C A R O T A.

D A U C U S S A T I V U S.

М о р к о в ь.

Planta foliorum lacinii linearibus, acutis, petiolis subtus nervosis, in campis pratisque crescit; in hortis colitur. Cl. Pentandr. O. Digynia. O. N. Umbellatae L. Umbelliferæ J. Biennis. Usualis est:

RADIX, fusiformis, perpendicularis, simplex, recens. *Sepmina* subrotunda, grisea, aspera, marginibus costisque setosis, aromaticæ, fragrantia. Radices exsuccæ improbantur.

Q. Radicis a mucilaginoso, saccharino principio derivanda;

sapor dulcis. Seminum: odor fragrans; sapor aromaticus, subamarus.

V. *Radicis: nutriens; demulcens; antiseptica; seminum: stimulans; diureticaque esse censemur.*

U. *Succus e radice emollita coctione expressus, et ad justam consistentiam spissatus fit melluginis species, loco Sacchari, vel Mellis, vel Syrupi, edulcorandis eduliis idoneus, nec in phthisi, tussi acri, (PIDERIT) raucedine et vermis infantum spernendus. Ab infantibus, infestis ascaridibus, cruda radix, jejuno ventriculo utiliter estur. In aphthis oris, decoctura, vel succus ex decoctis radicibus expressus, et pauxillo mellis rosati mistus, penicillo illinitur, vel in aphthis internis ad cochlear parvum commode datur; calculosis quoque profuisse accepimus. Radicis rasae formæ cataplasmatis (e. g. unciis ejus duabus, herbae Conii m. uncia et scrupulo gummi-resinae Ferulae Assae foetidae secundum МОНЧУ) ulcera phagedænica, cacoethica, putrida, herpetica, cancrosa, minuendo dolorem, suppurationem, fætoremque, margines eorundem duros emolliendo. Quassatae radices, recens adustis superdatæ, juvant, DAREL.*

D. *Radices duæ, tres (et plus) exhibentur.*

V. *Cataplasma Carotæ; — — compositum; Roob Carotæ.*

D I G I T A L I S P U R P U R E A.

Наперстянка; Наперсточная трава.

Planta, corolla campanulata, ventricosa, quinquefida, in campis australis Russiæ apricis per frequens, nec minus in hortis culta. Cl. Didynam. O. Angiosperm. O. N. Solanaceæ L. Solaneæ J. Biennis. Usualia sunt:

FOLIA, ovato-lanceolata, rugosa, hirsuta, margine serrata. Optime colliguntur in montibus nemorosis, aut locis glareosis, elationibus tamen et arborum opacitate in umbratis; crescent enim interdum herba in pingui humo, profundaque ulagine, aut in calcarea terra, aut in hortos soli natura diversissimos

e vicinia natalium locorum transducta, afflatuque liberioris auræ exposita plurimum virtutis amittit. Usui commode servantur, si petiolis cum media costa abjectis, pars reliqua foliorum eousque exsiccatur, quo in pulverem tenuari queat. Siccentur vero in conclavi vento pervio, nec solis lucem transmittente MACLEANUS (*Physical and Medical Journal by D. Bradley and D. Willich*) præcaveri jubet, ne vicissim ex umbra, aut aprico, aut igni, aut calori exponantur, vires hac ratione, perditura. Folia siccata, ponderis quintam partem herbae recentis habentia, et colore viridi, fœnique odore conspicua, vasis vitreis inclusa reponantur, in locis quam minime humidis, eaque solum pars, quæ brevi tempore consumenda est, in pulverem redigatur. Inutilis ejus loco POTENTILLA REPTANS vendita fuisse fertur, majori tamen errore, aut fraude e LILIO MARTAGON extractum paratum atque huic DIGITALIS nomen impositum fuisse adseverat GOETLINGIUS. Quidam Symphiti off. folia ex inscitia magis, quam fraude, loco ejus, colligunt, cum charactere generico, tum foliis ova-to-lanceolatis decurrentibus, toto coelo, dissimilis.

Q. Venenosa. Omnes plantæ partes, ut nares fœdo offendunt odore, ita ingratam amaritem, nec exiguae acrimoniæ sensum, in ore jam produnt, quid quod majori copia deglutitæ, œsophagum etiam, vicinumque dein ventriculum annoidunt exasperantque.

V. Nerveum systema, vasa absorbentia, venas, renes et pulmones excitans, musculosam vero actionem, et irritabilitatem nominatiū cordis, et arteriarum antagonistice minuens; retardans; dosi refracta diuretica; majori drastico-cathartica; nauseam cum anxietate excitans; pulsum retardans; nimia vomitum ciens, et cardialgiam, et singultum.

U. In primis in morbis systematis nervi. Nervos irritando efficacem se præstitit in variis neurantistasibus, sic in epilepsia (WHYTERING, MACLEAN,) hydrocephalica, vel scrofulosa diathesi stipata (BURDACH,) ecclampsia gravidarum et puerperarum (DUNCAN,) in variis pectoris adfectibus, ut an-

gina ejusdem, cynanche tracheali, seu stridula, aut polyposis
 Anglis *Croup* dicta, asthmate spasmodico cum opio (**FERRI-**
AR.) pertussi (**HAROLD.**) imo in spasticis etiam constrictioni-
 bus ejus utilitas emicat, per experimenta, quibus herniae in-
 carceratae profuit (**HUFFLAND,** **DUNNING.**) Ita vehementem
 hæmicraniam, ut veri simile, hydrocephalicam, per resorptio-
 nem serosæ ecchyseos **MACLEAN** curavit, quamobrem in cæ-
 teris quoque cephalalgiæ speciebus commendari meretur si-
 mulac vel ecchysin (extravasationem) in carnis cerebri, vel
 hydrocystidem (hydatidem) suspicari licet. Ut cerebrum sti-
 mulans, mentis alienationibus opponitur (**NORD.**) puta me-
 lancholiæ, maniæ (**PATTERSON.**) vel imminuta venarum ce-
 rebralium actione, aut serosa ecchysi, ortæ. In morbis va-
 sculosi systematis, et quidem in nervos stimulum augendo, in
 musculos vero vasorum et præcipue pulmonum eundem mi-
 nuendo, agens, efficacem exserit vim, in plerisque illis casi-
 bus, ubi hyperpracticam periergam exaltatamque irritabilita-
 tem vasculosi systematis, asthenia nixam, submittere e re est,
 hinc vis ejus in inflammationibus asthenicis, ex. gr. in typho,
 cum angina membranacea, aut auctiori, ceteris paribus, arte-
 riosi systematis incitabilitate, atque hinc proveniente cardio-
 tromo, cardiopalmo (palpitatione cordis) etc. elucet. Anginam
 membranaceam, datis quarta quaque hora, quinque guttis *tinc-*
turæ, plus simplici vice idque citra relapsum, **CUSTANCIUS**,
 pneumonitidem vero, laterum doloribus, angustia pectoris sti-
 patam, morbillosam autem vehementem febrim congestione
 sanguinis ad pectus, tassi, difficultate spiritus comitatum **MA-**
CLEANUS curavit. Nec rheumaticæ inflammationis a Britannis
 curatae desiderantur exempla (**HENRY.**) Laudatur in aneuris-
 mate aortæ, sed simulac micatus ad 54 fuerint, suborta ma-
 jori diuresi, usu remedii supersedendum est. Irritando vena
 profluvia sanguinea cohibet, ita hæmorrhagias sthenicas (**CAR-**
SON.) epistaxis, hæmoptysis (**CURRIE.**) angiorrhagicam, me-
 trorrhagiam (**DRAKE.**) cum periculo imminentis abortus, (**CAR-**
SON.) hæmaturiam (mictum cruentum) cum urgentibus dysuria-

ncommodis, (MACLEAN) hæmorrhoidem. Phthisis etiam fe-
ici ausu, sæpe *Digitali* tollitur, (DARVIN, BEDDOES;) ast
subdolis specieque lenitatis haud raro fallentibus ejusdem ini-
iis adcommodatior ea est, quam inveteratæ, aut ulcerosæ,
sed et hac adfectos lenimen et tolerabiliorem lucrari vitam,
experiundo didicimus, ut proinde minime mirum sit, eandem
a cl. SIMMONS resorptionem puris moliente, in abscessibus
internis commendari enixius. Non minus catarrhus, qui præ-
postero consilio curatus, crebriter in phthisin transit, ea dis-
cutitur (MOSMAN,) in morbis systematis lymphatici, et
glandularum. Irritando vasa lymphatica adenemphraxibus ob-
ponitur, ita pancreatemphraxy et trahenti hinc originem atro-
phiæ. Tritam, ac superdatam, succumque in unguento strumas
dissipare PARKINSON notavit, atque de *linimento e floribus*
dem testatus est BATE. In scrofulis humidis, et manantibus
commodam esse, cl. HULSE, magnæ existimationis clinicus
observavit; eandem tamen in siccis improbans. In lymphati-
cis tumoribus vasorum a paralysi immunitum, functioni calcar
ubdit. In scirrhomatibus, neuroblacia plexuum, vasorumque
lymphaticorum sustentatis, recte datur interne. In hydrope
cumprimis celebratur, atque auctiori tum resorptione, tum
liuresi medetur; detritis tamen ad modum, viribus, atque ir-
ritabili ventriculo aliena: ita prostant exempla curati hydro-
horacis, vitiosa vasorum exhalantium sedulitate, pravaque re-
orbentium inertia orti (LENTIN;) hydrops articuli, (BRAN-
DISIUS,) apoplexiæ hydrocephalicæ, (dato pulvere *Digitalis*
cum *Submuriate Hydrargyri*, nuchæ autem *vesicatorio*, tempori-
busque admotis *hyrudinibus*) (GARNET.) Pulveris instar semi-
ia minutissima, quæ sicuti alia similium plantarum, summum
virium in compendium jungunt, in hydropiseos præcipue usum
commendat SCHERWEN. *Exrinsecus:* forma *lotionis*, *injectio-*
nis, *unguenti* adhibetur, ad curandam psoram (ANDERSON,)
impetiginem et tineam squamosam (MACLEAN, FERRIAR.)
lepram scorbuticam (VICAT,) scrofulam usu *unguenti succique*
recenter expressi (PARKINSON,) stramam unguento *ex succo*

recenti THILENIUS, aliaque mala. Cl. BRERA DIGITALI PURA
PUREA, D. LÆVIGATAM præfert.

D. Variis illa modis in remedii usum præscribitur a Medicis. Aut in *pulveris forma*, quæ aliis merito antecellit, ægris exhibentur *folia* a dimidio grano ad granum, sesquigranum, duo, vel etiam tria vel *aqua* superfunduntur. Fit quoque mitius infusum drachmæ unius siccatorum *foliorum* ad uncias octo *fervidae aquae*, per quadrihorium rite digerendum, addita, hoc facto, colaturæ uncia *aromaticæ* cujusdam *aquaæ*; suinitur bis de die semuncia, vel etiam uncia, quæ est do sis media pro adulto. *Decoctione* vires *plantæ* hebescunt, qua propter *infusum* prævalet; sed et id caute adhibendum; sunt enim exempla non omnibus profuisse, imo causam subitæ mortis quondam, exstissee. Ab aliis *tinctura* datur, sed minime reticendum est, *solutiones spirituosas*, non respondere morbis in quibus sanguinis velocitatem cohibere laboramus, juvante meminisse, effectum DIGITALIS sat diu perdurare, atque illo clare manifestato, usu ejusdem esse supersedendum, (HAHNEMANN.) Si præscripta dosis per plures continuetur dies, pulsuum remedio ad initium retardatorum frequentia redit, iisque non modo duriores, sed et compressi fiunt, calor vitalis sensim corpus deserere incipit, extremæque partes ad tactum frigescere sentiuntur. Auctior dosis, micatus arteriarum iterum retardat, et nauseam, vomitum, subinde spasticam fauicium constrictionem cum singultu, et in sensibilioribus hæmoptysin, nonnunquam vero diarrhoeam movet, aut urinæ secretionem auget. Præterea visum hebetat, rebusque oculo oblatis, flavi viridisque coloris speciem, et coruscantes fulgores addit, ita, ut ægro aer crebris micare ignibus, globique rotuli circumvolvi videantur, subsequente dein perfecta visus orbitate. Interdum ægri de dolore palpitate in bulbo oculi queruntur; subinde alienatione mentis corripiuntur, non tam verborum ineptiis, quam pertinacia, in obstinato animo, se prodente. Tandem fit, sed infausto plerumque omne, ut muscularum convulsiones concitentur, quas pede pressim mors

omnium malorum finis excipit. Ut noxæ hæ, quas **DIGITALIS** incaute sumta adfert, averruncentur, varia a Medicis proposita sunt adjumenta, ita alvo soluta, *Opium WITHERINGIUS*, **DIGITALI** addidit, aut *Sal Alcali HAHNEMANNUS*, eadem tarda, rad. *C. Jalappæ*, vel potius *Supertartratem Potassæ*. Actione nervorum debilitata, excitantia remedia, ex. gr. *Castoreum*, *Opium* adjicere, et deficientibus viribus, eupeptis, roborantibus succurrere juvat. In hebetudine visus, aut obscuratione, oculos *vino* lavandos esse, aut minimam *C. Ipecacuanhae* dosin admisceri suadent. Nausea facta, *infuso Menthae*, *Opio*, *Acidis vegetabilium*, veluti *Aceto* et *succo Citri medicae*, nec non **WITHERINGII** suasu, vesicantibus restinguuntur. Haud sunt prætereunda tacito antidota, interne *lac*, in quo semina *Tigonellæ Foeni graeci* cocta sunt, *Opium* etc., item *extrinsecus* vesicantia.

V. *Infusum Digitalis*; *Pilulae ejusdem*; *Pulvis Supertartratis Potassæ et Digitalis*; *Tinctura Digitalis*; — — *composita*.

EUCALYPTUS RESINIFERA. SMITH.

Ершеникъ смолистой.

Arbor Africæ interioris circa fluvium Gambiam, imo etiam in Botany-bay crescens. *Cl. Icosandria. O. Monog. O. N. Hesperideæ L. Myrti J. Usualis est:*

SUCCUS CONCRETUS, (*Gummi Kino, seu Gambiense Ph. Regni Polon.*) est substantia dura, friabilis, opaca, e rubronigricans, *aqua* et *Alcohole* solubilis. Alii esse *extractum Coccolobae uviferæ* censem, (*Ic. Catesb. Carol. 2. t. 96*) alii *sucum* hunc e *Butea frondosa* manare. (*Ic. pl. Corom.*) Permutatur quandoque hic importatius *succus concretus* cum *extracto Tormentillæ et resina Dracaenæ Draconis*, (*Sangvine Draconis Ph. Regn. Polon.*) quæ non est tam austero sapore, neque etiam *aqua* solubilis, estque specifico odore.

Q. **Præstans**: in principio *scytodepsico acidulo* residens, cui $\frac{1}{2}$ circiter pars *gummi* admista est. Plus *mucilaginis*, minus

vero resinae, quam extractum *Acaciae Catechu* tenet, hinc eo facilius aqua solvitur. Est odoris expers; saporem præ se fert pure pute adstritorium.

V. Valde adstringens; antiseptica; roborans; crispans musculares fibras.

U. In asthenico canalis intestinalis statu, ejusque relaxatione adhibetur; ita in habitualibus diarrhoeis, dysenteriis, lienteria, *intrinsecus* datur. In abnormi secretione viarum uriniferarum, blennorrhœa, leucorrhœa, injecta ejusdem, in aqua *Calcariae*, solutione (THILENIUS,) vel *spongiis* eadem imbutis, parti admotis. Sic etiam in asthenicis sanguinis profluviis, in catameniis, plus æquo profluentibus, (FOTHERGILL, CULLEN.) *Amaris* sociatus dialeipyras propulsat. *Extrinsecus* injectione ulceribus saniosis medetur; imo etiam sanguifluxum, si obo ritur, sistit.

D. Fulveris a scrupulo ad semidrachmam, vel in emulsione ex. gr. cum G. *Acaciae verae* et quapiam aromaticâ aqua. Tincturae, drachmæ duæ (ad semunciam) exhibentur.

V. *Tinctura Eucalypti.*

EUGENIA CARYOPHYLLATA. THUNB.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS L.

ГВОЗДИЧНИКЪ.

Arbor Indiæ orientalis, in insulis Moluccis, præsertim Nova Guinea crescens Cl. Icosandria O. Monogyn. O. N. Hesperideæ L. Myrti J. Usuales sunt:

FLORES cum pericarpio immaturo, (*Caryophylli aromatici Ph. Ross.* Гвоздика), claviculis forma similes, oleo volatili turgent, leniter siccati ex fusco nigrant; calyce infundibuliformi, quadridifo; petal. 4; drupa seu bacca sicca, ovata, laciniis calycis coronata. Eligantur sat fusti, grandes, ponderosi, e quibus ungue pressis olti aliquid exsudet.

Q. Continent oleum volatile, (sextam ponderis partem), si recens est destillatum, blandi saporis et pallidi coloris, qui dein

in flavidum vertitur, præterea tertiam partem ponderis *extra-*
ti resinosi, quod *Alcoholē diluto* solutum, venali *oleo* additur,
 unde *fucus color*, et pungens indoles exponuntur. *Odoris* sunt
 grati, fragrantis, penetrantis; *saporis* aromatici, acris, calidi, diu
 in lingua perseverantis, cum levi amaricie.

V. Stimulans; exæstuans; stomachica; menagoga; masticati
 copiam salivæ prolixiunt.

U. Flores adhibentur, ut sapor remediorum, quæ interne
 sumuntur, emendetur, haud secus ac *cortici Cinchonae offici-*
nalis, in *infusis* et *pulvere*, ut melius digeratur, addi solent.
 Nulli *aromati* cedunt vi stimulandi nervos fibrasque muscu-
 lares, et instar *condimenti*, quum cibis adduntur, languenti ven-
 triculo suppetias ferunt. *Externa* eorum adplicatio efficax cen-
 setur, instar stomachici, item ad dentes servandos in *pulveri-*
bust et *electuaris*. In India mos est in paralysi, uti *balneo*,
 quod *flores* excipit, vel *linimento ex oleo*, cui iidem incociti
 sunt. *Odoramentis* præterea inserviunt, et *balsamis*, *pomatis*,
pulveri cyprio et *fumali* addi solent. *Oleum Eugeniae gossypio*
 exceptum, atque cariosis dentibus inditum, potenti stimulo,
 odontalgiam cohibet; idem in natali arboris solo remedium
 est in paralysi suetum.

D. Semiscrupulus ad drachmam in *pulvere*, aut *infuso aquo-*
so, vel *vinoso*, porrigitur.

V. *Oleum Eugeniae caryophyllatae*.

F E R R U M.

Ж е л ѣ з о.

FERRUM raro invenitur *nativum* apud nos; inventum tamei
 est in Sieweria ab ill. PALLASIO ad verticem montis schi-
 stosi circa flumen Jeniseum prope Krasnojarsciam, sed com-
 muniter in montibus Russiæ occurrit *oxydatum*, et *minerali-*
satum, (vulgo *pyrites*, Колчеданъ,) aut sub nomine *Ferri ochra-*
cei, vel *argillacei*, unde eliquatur crudum (*Ferrum fusum*, Чу-
 гунъ,) quod ulteriori tractatione in *Ferrum ductile*, imo etiam

in chalybem convertitur. In novissimis terræ formationibus pariter, ac in antiquissimis saxis reperitur, in paludibus etiam uliginosis, et scaturiginibus videmus ochream deponi, quo in aprico est, id quotidie denuo e natura generari; imo humani croris partem centesimam vigesimam esse *Ferrum, Soda nuptum, nuperrima docuere experimenta.*

Q. Metallum tenacitate, et duritie insigni, post *STANNUM, levissimum, gravitate specifica, ut 7,788, colore cinereo-nigriscente, vel obscuriori in cæsium vergente, nitore minus constanti, ut aëri potissimum humido expositum perfacile ferruginem (rubiginem ferri) contrahat; maximam enim habet erga oxygenes adfinitatem, si a solo recesseris *ZINCO, ad Silicem* scintillat, *Magnete* adtrahitur, igne, trituque candescit, difficulter funditur ingenti colorum nitidorum varietate, (quam variis gradibus lenioris ignis tortum in superficie exhibet), conspicuum, tum emollitur adeo, ut ferruminari possit, ad 1616 F. liquefit, dum refrigerat, in duplices tetraëdras coit. In omnibus *acidis* solvitur, et ex solutione, *acido gallico* et *hydrogenio sulphurato*, nigro; *acido autem borussico*, saturate cœruleo præcipitatur colore. *Oxyda eius sunt: Oxydum Ferri nigrum, (VAUQUELIN,) (Aethiops martialis Ph. Ross.), fuscum, vulgo Crocus Martis aperitivus; luteum, vulgo rubigo.* Usui medico inservit *Ferrum ductile*, idque metallica forma *limatum*; quod tamen, cum ab opificibus vix citra *cupream* labem haberi possit, neque etiam separatio ejus ope *Magnetis* sat secura est, a Pharmacopœis parari expedit.*

V. *Ferrum limatum; Suboxydum Ferri praeparatum; Tinctura Muriatis Ferri.*

F E R U L A A S S A F O E T I D A.

Дурнопахучникъ; Аза вонючая.

In campis Persiæ montosis crescens. Cl. Pentandr. O. Di-gyn. O. N. Umbellatae L. Umbellifer. J. Perennis. *Usualis est: GUMMIRESINA, seu succus gummeo-resinosus (vulgo вонючая камедь Ruthenice dictus,) e radice plantæ, transversim*

secta lactis instar stillans, in superficie sauciata, atque vi solaris caloris, aut contactu aëris in massam sicciam, concrescens, grumos flavescentes, vel e fusco-roseos, referentem, maculis variegata albis, dentibusque subacta tenacitatem, prodentem. Frusta madentia, inquinantia continent multum arenæ, quod, vel solutione, vel microscopio detegitur; ceterum admissentur ei et aliæ gummiresinae, resina alba succo *Allii sativi* inquinata. Ex simili planta, *Ferula persica*, colligitur, forsitan eadem gummiresina, (HOPE.)

Q. In principio gummeo-resinoso (e $\frac{2}{3}$ gummi et $\frac{1}{3}$ resinae) oleoque volutili sita; sapor ex acri amaricans est; odor vero maxime nauseosus, *Allium* cum alio foetoris intolerabilis genere redolens.

V. Excitans; resolvens; pituitam movens; sedans; antiseptica, (PRINGLE,) anthelmintica; menagoga.

U. In nevroblacia universalis, atque hinc proveniente anxietate, vertigine, lypothimia, cephalalgia, ataxia, hypochondriasi, hysteria, epilepsia etc. In canalem intestinalem agendo, flatus intestinales dissipat, enterodyniam, vitio ventriculi flatulento, ortam sedat, unde etiam in tympanitide ejus vis efficax. Commodum hoc in casu præstat auxilium in *clystere*. In dyspepsia, acido ventriculi, aliisque ejusdem a debilitate incommodis, conjungitur cum *bile taurina*, *amarisque extractis*. Alvum habitualiter, vel ob spasmum, vel ob imminutam irritabilitatem, obstructam, solvit, recteque his in casibus *catharticis* *clysteribus* additur. Ob nidorem, contra interaneorum animalia cum successu adhibita, præsertim in connubio zootonorum, puta: *Valerianæ off.* *Aspidii Filicis maris*, *Olei pineo-laricini*, *Conv. Jalappæ*, *Sulphatis Ferri*, *Artemisiae Judaicae seminum*, *extracti Tanaci vulg.* etc. In genitalia agendo membra, suppressis spastice catameniis, (citra tamen plethoram et inflammatorium statum, opitulatur. Sic in amenorrhœa, dysmenorrhœa et chlorosi juvat. Actionem pulmonum, nevroblacia, vel muci adcumulatione, aut spasmo oborto, segnem, intendit, atque per hoc screatus movet, hinc vis ejus in tussi,

asthmate convulsivo, caduco pulmonum, arthritico (MILLAR.) pertussi, quo in casu recte eidem additur gummiresina *Heraclei gummiferi*, *Scillae m. radix*, *Acetas Ammoniae liquidus* etc. Imo etiam in tracheitide (*Cynanche tracheali*, vulgo *croup dicta*) præstantissimum fertur esse remedium, præsertim, si ea spasmodicæ indolis est (ODIER.) Vasorum hæmatophororum extrema adficiendo, effectus asthenia eorundem productos tollit, vel secretionem corrigit, hinc opem fert in hepatemphræxi, ictero, hydropisi, enterodynæ hæmorrhoidali, melancholia etc., præsertim *extractis amaris*, *mercurialibus*, *stibiatis* etc., adjuta. In myodynæ, arthrodynæ, prosopalgia, adjunctis *Camphora*, *Submuriate Hydrargyri*, *Conio maculato* (THILENIUS), haud secus ac in carie mali moris, ulceribus præsertim rheumaticæ, herpeticæ, scrofulosæ indolis, imo etiam in ipsis scrofulis (*interno usu*) laudatur. In adenemphraxibus, scirrho, tum interno quum externo usu, proficua, præsertim in copula *Hydrargyri*, *Conii m.* etc.

D. *Pulveris* grana quinque, decem, viginti, ter quaterve de die per se, vel in connubio aliorum; exhibetur quoque in *pilulis*, et *soluta* infra duas drachmas ad dimidium scrupuli, quæ dosis augetur ab una ad drachmas tres, si in usum *clysteris* detur. Ob graveolentiam repugnanter a quibusdam sumitur, hinc, ut plurimum sub forma *pilarum* præscribitur; ubi vero adhibenda est *soluta*, ut semper fit, in *clysteribus*, utendum est *vitello ovi*, aut *mucilagine congrua*.

V. *Clyster Assæ foetidae*; — — *opiatus*; *Mistura Assæ foetidae*; — — — *composita*; *Pilulae Aloës foetidae*; *Pilulae Assæ foetidae compositæ*; *Pilulae gummiresinosæ foetidae*; *Solutio Assæ foetidae*; *Tinctura Assæ ammoniata*.

F I C U S C A R I C A

СМОКОВНИЦА.

Europæ australis, in primis vero Græciæ, apud nos in Chersoneso taurica transalpina circa Alupkam, Aluschtam etc., ad

Caucasum prope fluvium Anticetan, (Kubany,) in Astrachanen-i provincia circa fluvium Soanam, (Török), in saxosis etiam Iberiae calidioris, in Albania iberica, (Cachetia,) Armenia iberica, (Somchetia,) partim colitur, partim spontanea. *Cl. Polygam.* *O. Diœcia.* *O. N. Scabridæ L.* *Urticeæ J.* *Arborea.* *Usu-*
lis est:

FRUCTUS, (*Carica pingvis Ph. Ross.* Смоква, винная яго-
да,) est pericarpium turbinatum, carnosum, succulentum,
connivens; occultans semina exigua, lenticularia. Majores, qui
Smirna adferuntur fructus dulcissimi, insularum Balearium, et
Melitenses omnino delicatissimi sunt; duri vero, insectis vitia-
ti, nigrescentes, aciduli, habentur despiciatui.

Q. Dulcis, mucilaginosa, saccharina. *Odor* recentium vix ullus.

V. Nutriens; emolliens; maturans.

U. Decoctionae internus in raucitate, tussi, enterodynbia satur-
rina. Extus lacte decocti fructus utilitatem promittunt in pa-
ulide; vel assati, forma cataplasmati in cynanche, bubone,
mthrace, abscessibus maturandis et mariscis haemorrhoidalibus
curandis. Ano inditi, suppositorii vices gerunt. *Succus folio-*
rum expressus verrucas delere fertur.

V. Decoctiona *Althaeæ.*

F U M A R I A O F F I C I N A L I S.

Дымянка аптечная; Чистякъ меньшой; земляной дымъ.

Planta in hortis et agris sponte copiosissima, *Cl. Diadelphia.*
O. Hexandria. *O. N. Corydales L.* *Papaveraceæ J.* annua. *Usu-*
lis est:

HERBA, caule ramoso, diffuso, siliquis (fructibus) globosis,
et uscis, fol. supradecompositis, foliol: cuneiformi-lanceolatis,
ncisis. Cum **FUMARIA BULBOSA** permutatur.

Q. Inodora, sed tota stirps scatet *succo* intense amaro, salino.

V. Stomachica; leniter secretiones naturales movens.

U. Herbae *succus*, obstructionibus, viscerumque infarctibus
eserandis, scorbuto, veterum æque, ac recentiorum consensu

unanimi, par esse existimatur, et tum cum succo *Sisymbrii Nasturtii, Scandicis Cerefolii. Leont. Taraxaci, Cochleariae off. Sero, lactu, Aqua Selterana* etc. aptissime conjungitur. In psora non spernendum remedium est *herba*, vel sero *lactis infusa*, vel cum *Zytha decocta*, a cl. STRANDBERG magni nominis Clinico; in herpetibus quoque, uti a LEIDENFROST, et THOMSON, in leprosis adfectionibus amplissima tulit præconia. Ictericis et calculosis utilem esse, BICKER auctor est. Hepatemphraxeos laudatum ab excellentissimo ROGERSON remedium. An melancholiæ sit par discutiendæ, ut quidam contendunt, dubito.

D. *Succi recentis vasculum, duo, tria, per nychthemeron.*

V. *Extractum Fumariae.*

GENTIANA CENTAURIUM.

CHIRONIA CENTAURIUM. CURTIS.

CENTAUREUM MINUS PH. ROSS.

Золотошысячникъ.

Pl. corollis quinquefidis, infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici, in locis montosis, apricis, aut sabulosis præsertim marinis Russiæ temperatae spontanea. Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Rotac. L. Gentianæ J. Annua. Usualis est:

HERBA florens, floribus rubentibus, foliis ovatis.

Q. Intense et pure amara. *Alcohol unice amaras partes aqua vero simul mucilaginosas extrahit.*

V. Roborans; resolvens; anthelmintica; antiseptica.

U. In febribus intermittentibus, splanchemphraxi, leucophlegmatia, chlorosi, helminthiasi, dyspepsia in primis, laudatur **Adversus furfures**, et crustosam scabiem capitis oppositum est cum successu *brodium e pisis* cum *herba decoctum pro lotione*; in ulceribus etiam sordidis valet.

D. Pro *infuso drachmæ duæ cum aquæ unciis quatuor sumuntur.*

V. *Cerevisia amara; Species resolventes.*

GENTIANA LUTEA.

Генциана; Горечавка желтая.

In alpibus et subalpinis temperatæ Russiæ **crescens**. *Cf.*
Pentandr. O. Digyn. O. N. Rotaceæ L. Gentianæ J. Perennis.
Usualis est:

RADIX, (vulgo r. *Gentianæ rubrae*) pedalis, et quod excurrit, crassitie digitæ, saepe pollicis et ultra, rugosa, rugis annularibus adproximatis, extus ex rubro fusca, intus aurantiaca. Huic interdum substituitur radix *Gentianæ purpureæ*. **Ranunculi Thoræ** cum eadem fuisse mistam radicem vidit **HILL**, ejusque usu pessima observavit symptomata. **R. Thoræ** radix externo nigro colore et deficiente luteo interno, *odoreque* virus olente cognoscitur.

Q. Amarulenta, cum leni *aromate*, *oleoque* volatili.

V. Stomacho apta, peptica, antiseptica, anthelmintica, lechipyretæta.

U. Ventriculi et intestinorum debilitati medetur, bilis inertiae, juncta saponi, subvenit, acorem succi gastrici frangit; hinc suetum in dyspepsia remedium. Irritabilitate auctiori præditis, ut hypochondriacis et hysterics etc. conducibilis. Febres intermittentes, in connubio adstringentium, propulsat; denique in splanchemphraxi abdominali, ictero, leucophlegmaia, chlotrosi, arthrodynia, et imprimis in helminthiasi, merito commendabilis, sub miscela *aromatica* grati, *menstruoque vino*, vel *spirituoso* soluta, efficacior, meliusque fertur. **Extus:** ulceribus pute scentibus non inepta.

D. Radicis a granis decem, ad scrupulum, duo.

V. Extractum *Gentianæ l.*; Infusum *Gentianæ compositum*; Tinctura ejusdem composita.

GEUM URBANUM.

Гравилапъ; Гвоздичникъ; Гребникъ.

Planta floribus erectis, aristis uncinatis nudis, foliis caulinis ternatis, radicalibus lyrato-pinnatis, ad sepes et in locis

umbrosis, vulgatissima. In nostris regionibus frequentius G. *intermedium*. Cl. Icosandr. O. Polyg. O. N. Senticosæ L. Rosaceæ. J. Perennis. Usualis est:

RADIX, (*rad. Caryophyllatae Ph. Ross.*) fibrosa, fusca, intus rubens; recens odorem gemmarum floriferarum *Eugeniae caryophyllatae* quodammodo spirans, aromaticum. Sapore simili est, austeritate tamen et amaritudine prævalente, vere novo e sicco solo, dum herba progerminat, effodienda est, nam florescentiæ tempore illa *odore* aromatico, multo inferior est. A radice *Gei rivalis*, quæ inodora est, humida loca amat, caulemque habet rotundum, et flores nutantes, distinguenda est. *Radix Gei urbani* habet caulem quasi quadrangulum.

Q. Præstans. *Sapor amaricans*, substypticus siccae.

V. Vis eidem adstrictoria est, antiseptica, roborans, lexi-pyreta, eaque principio nititur *scytodepsico* cum paucō *volatile oleo*.

U. *Radix* inter indigenas *Cinchonae succedaneas* primatum tenet. Compertum eam maxime prodesse: morbis asthenicis; nominatim vero dialeipyris (BUCHHAUSE) levioris notæ, neque in veteratis, præcipue ubi abnormitates systematis venæ portarum neutiquam sopitæ sunt, *Cinchona valentior*, haud secus ac typhodibus nervosis levioris gradus, nervorum systematē parum energiæ exserente, neque stimulantia fortiora ferente, ut in sequiori sexu, vel ineunte ætate non male cedere in connubio *stimulantium*, vel simplicium *acidorum* administratam, magnæ existimationis viri adseverant. Profluviis asthenicis, ut diarrhoeæ asthenicæ et dysenteriæ ejusdem indolis, *radix* sub finem data, profusse fertur. Metrorrhagiis sistendis et sua et cl. TRENDLEENBURGI experientia esse parem, WEBERUS confirmavit. Esse nevroblaciis, ut hypochondriasi et hysteriæ, ut etiam chlorosi, diathesi scrofulosæ, scorbuto et gingivæ rum laxitati adcommodam luculentí scriptores perhibent.

D. Optime datur à scrupulo ad drachmam in *pulverem* tenuata *radix* ter in diem et sæpius, vel cum *melle* forma *electuarii*. Unciæ ejusdem sesquilibra aquæ fervefactæ, vel *vini*

ubi id levi pretio venit, infusa binis cochlearibus secunda
quaque hora exhibetur.

V. *Pulvis Cinchonae succedaneus; Tinctura Gei urbani; Decocuræ
Cinchonæ succedanea.*

GLYCRRHIZA GLABRA.

GLANDULIFERA (WALDSTEIN
et KITABEL pl. rar. Hungar.)

Лакричникъ гладкій и желѣзистый.

Planta in Europa australiore, et ad Jaicum Rutheniae sponte crescens. **GLANDULIFERA** et **ECHINATA** in australiori deserto ad Tanaim circa oppidum Tscherkask (Rutheniae) obvia. *Cl. Diadelph. O. Decandr. O. N. Papilionac. L. Leguminos. J. Perennis. Usualis est:*

RADIX, (*Radix Liquiritiae*, солодковой корень) teres, longa, repens, crassitie digitii, et ultra, *extus fusco flavescentia*, *interna* flava, sicca, admodum rugosa.

Q. a principio peculiari *extractivo glycyon* dicto derivanda. *Odor crudus*, exakte *leguminum* recentium *Phaseoli vulgaris*; sapor intense dulcis, simul in *legumen Pisi sativi* incidens, idque parte in primis corticali, et nonnihil mucilaginosus, diutius masticata leviusculam præ se fert amaritudinem.

V. *Demulcens, bechica.*

U. In morbis pectoris, raucitate, tussi, catarrho, paraphonia, etc. ita etiam in affectionibus viarum uriniferarum, urolithiasi, stranguria, nephritide, blenorragia etc. in diarrhœa, dysenteria etc. ubique fere, ubi deficit mucus naturalis. Siti etiam restinguendæ, præsertim apud hydropicos par. Additur quoque eadem aliis ad celandum eorundem ingratum saporem, ut *pilulis pulvis*, vel eo inspergitur fine, vel ideo, ne inter se cohærescant. Ita etiam *decocuris* ad conciliandam iisdem gratiam, idque sub finem. Quem in finem aptius addi-

tur sicilicus *extracti*, loco unciæ *Sacchari*. Corrigit optime sal-sedinet nauseosam *Muriatis Ammoniae*, eamque obnubilat. *Extractum radicis* in tussi acri tanquam eximium bechicon lambendo etiam sumi potest.

D. Pro additamento ad *pulveres semiscrupulus*, *scrupulus*. *Pro ptisanis drachma et ultra*. Potest etiam uncia ejusdem in libra *aquaæ* per horam digeri, atque hoc *infusum misturis salinæ*, *decocturis Cinchonaæ* etc. addi. Ad restinguendam sitim, *radix* manditur.

V. *Extractum Glycyrrhizæ.*

G R A T I O L A O F F I C I N A L I S.

Авранъ аптечный; Благодать; Божія милость.

Planta in udis pratis meridionalis Rutheniae crescens, *Ct. Diandr. O. Monogyn. O. N. Personatæ L. Scrofulariæ J. Perennis. Usualis est:*

H E R B A amaro-acris, foliis lanceolatis, serratis, glabris, floribus ringentibus, subalbidis, diandris. **R A D I X** cylindrica, calatum crassa, geniculata, alba, valde amara, acris. Confunditur interdum cum *Scutellaria galericulata*.

Q. Efficacia ejus residet in substantia *resinoso-saponacea*, quæ tum *Alcoholæ*, tum ob admistos *sales*, *Malatem Potassæ*, et *Muriatæ Sodaæ*, *aqua fervefacta*, extrahitur; quapropter *resinoidem* vocat hanc *substantiam* **V O Q U E L I N U S**. *Sapor* herbæ intense amarus, nauseosus; *odor* nauseosus.

V. Cathartica, haud raro simul emetica, anthelmintica, refracta dosi, diuretica.

U- In plerisque morbis, ubi cathartica ē re sunt, locus est *Gratiolæ*. Ita in hydrope: ascite, (*HELVICH*), anasarca (*HARTMANN*), præsertim stasibus diuturnis abdominalibus junctis, (*S R E N G E L*), ubi *gummiresina Stalagmitidis Cambogioidis* nubitur, haud secus ac verminoso malo, colluvie pituitosa, stipato, prodesse potest eadem copula, imo est inter exempla *taeniam solium* ē penetralibus corporis fuisse extorrem redditam, aut

herba, aut extracto cum gummiresina F. Assae foetidae, et Submuriate Hydrargyri, porrecto. Mentis alienationibus, sublatis, quibus originem debebant, stasibus, cum successu opponebatur. *Folia*, vel recentia, vel in *pulvere* vulneribus admota, constat ad consolidationem eorum fecisse; in ulceribus vero recentibus, fomenti instar calidi, contulisse.

D. *Herba pulverata* exhibetur ad grana tria, aut scrupulum dimidium, vel *extractum* eadem dosi in *aqua aromatica* solutum, vel denique *decoctura* ad drachmas tres *herbae siccatae* in selibra aquæ.

V. Extractum Gratiotas.

G U A J A C U M O F F I C I N A L E

Б а к а у мъ.

Arbos procera, foliis bijugis, obtusis, in Hispaniola, Iamai-
ca, Barbadoës, Brasilia, aliisque regionibus Americæ meridi-
onalis spontanea. *Cl.* Decandria. *O.* Monog. *O.* *N.* Gruinales
L. Rutaceæ *J.* Perennis. *Usualia* sunt:

GUMMRESINA, subpellucida, friabilis, e fusco-vire-
scens, diffracta splendens; si vero in *pulverem* tenuetur, fit illa
primo albida, dein subviridis, estque succus gummeo-resinosus
impurus ex *arboris cortice* exsudans, aut incisione exstillance,
ac dein condensatus, partim e recenti *ligno*, aut *decoctione* in
aqua, aut *digestione* in *Alcoholè diluto*, extractus. Sponte pro-
veniens præstabilior censemur merito, arte prolico. In *Alcoholè*
diluto aethereisque oleis solubilis est fere omnis. **LIGNUM**,
ponderosum, compactum, fusco-ferrugineum, *aqua* specifice fe-
re gravius, resinosum. Alburnum *coloris* multo dilutioris, albi-
di. *Gummiresina* admisto interdum et colliquefacto *colophonio*
seu *resina balsami pineo-sylvestris*, factitia conflatur. Ut hæc dete-
gatur *fraus*, caloris ope in certa quantitate *Alcoholis* solvitur,
dein *solutio* haec, debita *aquaæ* quantitate itidem decomponitur
et instillatis lente aliquot *liquidae Potassæ* guttis, quod præ-
cipitatum est, iterum dissolvitur. Quod ubi evenit, *Potassa* li-

quida iterato addenda. Si *gummiresina*, cuius sinceritas explorabatur, non est adulterata, tum omnis illa *solutio* clara manet et inturbata; si vero vel minima illi intermixta est *colophonii* quantitas, id quod præcipitatum est, massam *gummeo-resinosam*, saponaceam, ægre solubilem, præ se fert: *Colophonium* nempe cum *Potassa saponem gummeoresinosum* format, in *Potassa liquida* insolubilem, dum *gummiresina* simili modo solubilem produceret. Alii *gummiresinae* bonitatem ope *Olei pineo-laricini* explorandam esse perhibent. Massæ tenaces opacæque, e granis compositæ et *colore* fusco vel griseo variegatæ, damnantur.

Q. Præstans, *gummeo-resinosa*; *corticis* et *ligni*: *sapor amari-cans*, *subacris*. *Gummiresinae*: *sapor acris*, pungens. *Ligni scobis*: *odor debilis*, resinosus, haud ingratus; *sapor masticatæ subamarus*, acriculus. *Gummiresina*, *prunis candardibus injec-ta*, *odorem spirat* haud ingratum.

V. *Guajuci irritans*, eximia, *gummiresina aethereo-oleosa* in nervos vasorum hæmatophororum agens, ac proinde sumta præ-postere, sanguinis congestiones, neurantistases sthenicas; in primis vero febres excitat. Aegroto calidius cooperto est sudorifera, eodem vero frigidius servato diuretica. Usu protracto salivam movet, majoribus vero propinata præbiis alvum subducit. *Principio suo acri urentem* faucibus sensationem imprimit, atque oris siccitatem, sitim, nauseam, anxietatem, caloris sensum in stomacho, dolores, calore totius corporis auctiori, et sanguinis circulatione accelerata, imo subinde ipsum soporem inducit.

U. *Neurantistasibus sthenicis*, ut variis algematibus, (doloribus) febribus, inflammationibus etc. potentia reagendi conspicuis, ut etiam mobili nervorum systemate præditis, aut organicis intrinsecus vitiis laborantibus, phthisiscentibus, asthmaticis etc. aut siburra in primis viis hærente, esse *Guajacum alienum*, virtus ejusdem medicata declarat; proficuum vero esse morbis asthenicis, ut diversis pruritus speciebus, puta psorico (scabiei) herpetico, achorico, aliisque congeneribus, seu acri suo principio vellicantem potentiam tollendo, vel eandem ad cutem promo-

rendo, additis præsertim *Sulphure sublimato*, *Hydrargyro*, *stipibus Solani Dulcamarae*, ceterisque zooctona virtute nobilibus. Nec mirum sublato exulcerante acoro organismi animalis reproductioni favere. An in syphilidem eadem polleat efficacitate, quam eidem N. POLL et eques HUTTENUS, ad propriam provocantes experientiam, adtribuunt, dubito; persuasum tamen mi est, licet per se virus non tollat, ut auxiliarium tamen, præsertim juxta usum *Hydrargyri*, levamen conciliare posse. Algematibus quibusdam, ut myodynæ rheumaticæ, arthrodyniæ ejusdem indolis, recte opponitur et prodesse videtur, vel sudorem eliciendo, vel cutim saltem perspirationi opportunam reddendo. Prosopalgiae, vel *tinctura Guajaci* obponitur per se, vel *succo Conii spissato* in eadem soluto, adjuta. Alii eandem cum gummiresina F. Assae foetidae, aut *succo Aconiti spissato* propinrant. In enterodynia rheumatica ab ill. SELLIO laudata, nec in hydropisi vaga RICHTERI, præcipue, si vel rheumatica, vel arthritica constitutio malum prodit, ob salutarem suam in cutem et renes actionem, laudibus sibi adstructis orbari debet; utilius tamen in duritie ligamentorum et periostii, post usum mercurialium superstite, suasu ill. DUNCANI adhibetur. In phthisi catarrhalis asthenica, valere, DOUBLE auctor est. In asthmate convulsivo, arthritica, vel rheumatica ad pectus conversa acrimonia, Opio, radici *Valerianae* off. gummiresinae F. Assae foetidae etc. juncta, profuisse perhibetur; in primis vero sub emulsionis aquosae forma; in urolithiasi ob actionem ejus in renes utilitatem promittere, præsertim cum *sapone*, *aqua Calcariae* etc. luculenti scriptores adseverant. Gummiresina in iisdem, atque *lignum* morbis, efficacitate longe commendabilior; cendum tamen a protractiori ejusdem usu, utpote ventriculo insidiias struente.

D. Lignum in *infuso*, vel leni *decoctura* præberi solet, vix tamen optata cum efficacitate; resina enim pars constitutiva, non nisi minima quantitate in *aqua* solubilis est, vix ac ne vix quidem potest exserere vim, quam præstituimus, medicam. Persæpe aliis additur *decoctionibus*; sed cum per se adhibetur,

paulum radicis *Glycyrrhizae* gl. ut quibusdam placet, adjici expedit. In collutorio quoque, aut ipsa per se decoctio; aut additis congruis remediorum adminiculis commendatur. Gummiresina, vel in pulverem tenuata a quinque ad quindecim grana cum Supertartrate Potassae, Submuriate Hydrurgyri, Suboxydo Stibii hydrosulphurato propinatur, vel per modum pilularum, cum sapone (vel per infirmo ventriculo) cum extractis amaris et aromaticis, vel pro vario morborum comitantium satellitio cum succo Conii spissato. aut gummiresina F. Assae foetidae, vel forma emulsionis, mucilaginosorum ope parandæ e. g. e drachma, gummiresinae, scrupulo gummi *Acaciae verae*, duabus uncii aquae et semuncia syrapi, cochleatim sumendæ; vel in solutione in diluto Alcoholi.

V. Decoction Guajaci; — — cum Mezereo; Haustus guajacinus; Pilulae Guajaci compositæ; Pulvis Guajaci; — — ammoniatus; — — opius; — — stibiatus; Species Guajaci compositæ; Tinctura Guajaci; — — ammoniata.

HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM.

К а м п е ш ь.

Arbor spinosa, in meridionali America, Jamaica, Hondura, nominatim ad sinum Campeche regni Mexicani copiose, sponteque crescens. Cl. Decandria. O. Monogyn. O. N. Lomentaceæ L. Leguminosæ J. Perennis. Usuale est:

LIGNUM (*Lignum campechense* Ph. Ross. Лазоревое дерево) durum, solidæ texturæ, ponderosum ex flavo-rubrum, longitudinaliter sectum, fissile; transversaliter vero, æquale, nebulosum. Cortice denudatum, sanguineum habet colorem.

Q. Pigmento, a CHEVREULIO haematina vocato, principio scytodepsico intime unito, nititur. Sapor dulcescens, stypticus, in extractis quoque, seu aqua, seu Alcoholi paratis, se prodens; Odor singularis olei volatilis præsentiam indicans.

V. Roborans; adstringens.

U. Alvo, si diu fusa est, atque atonia culpatur, firmandæ, vel decoctura, vel extractum ejus, aptum est, nec minus sub finem dysenteriæ, vis ejusdem medicamentosa prædicatur. Dia-leipyris rarius; sed interdum cum successu obpositum. Usus ejusdem in arte tinctoria celebrior.

D. Semuncia in selibra aquæ, coquitur, atque colatura unciarum quatuor præbetur cochleatim. Aliis extractum coctione parandum magis placet, cuius duas drachmas in quatuor uncias aquæ aromaticæ solutas exhibent.

V. Decoctura Haematoxyli; Extractum —.

HERACLEUM GUMMIFERUM (WILDENOW.)

FERULA AMMON (BROUSSONET ex autopsia.)

Борщевикъ Египетскій; Аммоніакъ.

In Nubia et Abyssinia, interioribusque locis Aegypti et præsertim in regno Barca, (in quo inclutum delubrum Jovi Ammoni sacratum olim exstitit,) gignitur. Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatae L. Umbelliferae J. Perenne. Usualis est:

GUMMIRESINA (vulgo gummi ammoniacum,) tenax, digitis agitata, mollescens. Prostat, vel in granis angulatis variæ magnitudinis, intus albidis, atque inter se plerumque cœn-glutinatis, vel in massis rotundis; tum granula albida, substantiæ molliori fuscæ, immista sunt. E $\frac{2}{3}$ gummi et $\frac{1}{3}$ resinae constat. Probatur sordium expers, splendens, candida, Thuris similitudine, veteribus vulgo Thrausma dicta. Aliis gummiresinis adulteratam dari quidam referunt, quod jam ex sapore per facile cognosci poterit.

Q. Aethereo-oleosa, hydrogenata, oleo volatili cum resina con-juncto, eoque exsuperante, nititur. Odor alliaceus, ingratus; sapor nauseosus amarus, acris, mordens, diutissime inhærens.

V. Incitans, quam in vasis capillaribus tunicarum mucosarum præcipue exserit; in nervos vasorum hæmatophororum agens, hinc excalsaciens; minus tamen, quam alia volatilia olea oxygenes tenentia. Afficit quoque vias uriniferas et mucilagi-

nosa sua indole pulmones, ita abnormitates quoque reproductionis tollit. Antispasmodica quoque vi conspicua.

U. In pulmones irritando agit, quum in vasa capillaria tunicae mucosæ, quæ vias aëriferas obvestit, stimulo suo vim exserens, secretiones promovere possit, quam ob rem, pituita haec viscera gravante, tussim, ravim, angustiorem spiritum, reddente, screatus levat, ac proinde phthisiscentibus, (sputis moram trahentibus vel suppressis,) nisi periergia affectarum partium, aut febrilis tumultus officiat, atque a stimulo metuendum sit, opportunum remedium, præsertim, *Oxymelle scillite*, adjecto *syrupi simplicis tantillo*, adjutum. Ita in asthmate, dyspnæa catarrhali et id genus aliis proficuum. In asthenia vasorum abdominalium et hinc contracto organorum torpore, accumulatione pituitæ, pancreatemphraxi, hepatemphraxi (obstructione jecinoris) et obstructione ramorum venæ portarum conspicuo, in connubio *amarorum spissatorum succorum*, *Suboxydi Stibii hydrosulphurati*, *saponis* etc. efficacia ejus elucet, hinc hypochondriacis, ictericis, hydropicis etc. non alienum. In uterum quoque et vasa hæmorrhoidalia agit, hinc suppressis nevroblacia catameniis et in hæmorrhoidale, vis ejus enitet. In amenorrhœa conjunctim cum *gummiresina Aloës perfoliatae* et *sapone* (WEICKARD,) perutilis. In renes etiam agit, haud secus ac obscœnas partes, unde in dysuria, diabete et id genus aliis, profuit. Nervos arteriarum in extremis irritat, in tumoribus asthenicis, stimulo egentibus, cysticis, fungisque articulorum, hydarthro, lupia, testiculorum induratione, scirrho, (*gummiresina* cum *Aceto scillite* ad consistentiam *pultis* cocta atque duritiei, admota,) in abscessibus maturandis (adposito *emplastro gummeo-resinoso*;) scrofulis, pernionibus etc. Secretioni morbidæ opitulatur, hinc in carie, ulceribus mali moris et chronicis, fœditatibus cutis non spondenda. Ita in tinea capitis *emplastro* e *gummiresina* et *Aceto parabili*, (crusta prius *adipe suilla* emollita ablataque), superdato, profuit.

D. A granis decem ad scrupulum et semidrachmam. Si in pulmones agere lubet, tum minores doses e re sunt; si vero

in abdominalia organa, tum majores effectum exserunt. Forma *pulveris*, qui in aëre mollescit, non est adcommoda, præferenda *pilularis*, in qua excipitur *succis amaris spissatis*, vel *extractis* cum *gummiresina Myrrhae*, *Assae foetidae*, *Aloës perfoliatae*, vel, pro re nata, *Suboxydo Stibii hydrosulphurato*. Sed etiam quapiam *quaqua aromatica* potest solvi, ita fit *emulsio* e duabus *gummiresinae* drachmis, *vitello ovi*, vel *semidrachma* *gummi Acaciae verac* et *quatuor aquae uncisi*, adjecto, si opus, *Oxymelie scillino*, constans, secunda *quaqua hora*, cochleatim, sumenda.

V. *Cataplasma Heraclei salinum*; *Emplastrum gummeo-resinosum*; *Mistura Heraclei gummiferi*; *Syrupus ejusdem*.

H O R D E U M D I S T I C H O N.

Ячмень.

Gramen ignotæ patriæ, a Ruthenis copiose seritur, imo etiam ipsi Laponiæ familiare. Cl. Triandr. O. Digyn. O. N. Gramina L. Gramineæ J. Annum. Usualia sunt:

SEMINA, quæ prout leguntur, integra, *cruda*; *cortice* autem molendo exuta, *mundata*; quæve mola in formam sphæricam redacta sunt, *perlata*; (перловая крупа;) vocitare suerunt Mendentes. **MALTUM HORDEACEUM**, (солодъ,) sistunt *semina cruda*, *aqua frigida*, in tabulatis emollita, atque dein per strata, loco patulo, ac perslatili, distributa, speciem fermentationis subeundo, germina utrinque prudentia, dein, (quod ne ultra justum limitem fiat,) vel illico, aëre libero siccata, vel subito super commodis furnis tosta. **FARINA**.

Q. *Farinaceæ, mucilagineæ*, (*Farina* à *mucilaginis largitur*) *amylaceæ* indolis. Nititur *principio saccharino*.

V. *Farinae*: emolliens; demulcens, et plus, quam *avenaceæ*, nutritoria. *Malti* itidem nutriens, quin excalefaciat, et in primis extrema arteriarum, in reproductione partes suas obeuntium, blande stimulans (*BURDACH*.) majori dosi, musculares canalis intestinalis fibras, relaxando, alvum sat effi-

caciter liquans. Interdum *Acido carbonico* sub fermentatione semet evolente, vim antisepticam exserere videtur.

U. Panis hordeaceus, licet sit gravior *secalino*, a Ruthenis tamen, præsertim vero ruticolis Fenniæ, quum sit grati saporis, murmurantibus præcipue inanitate intestinis, perlubenti corde atque animo estur. Mitissimum nutrimentum in morbis tabificis est **H O R D E U M P R æ P A R A T U M T H I L E N I I**: *Farinae hordeaceae* aliquot libræ, sacculo linteo includuntur, sic, ut inter ejus orificium, et superficiem farinæ, spatium palmæ reddatur vacuum. *Sacculus aquæ adfusæ* et *servefactæ supernatet*. Fervore per nychthemeron sustentato, atque adfusa identidem *aqua*, *farinacea placenta* immititur patellæ. Crusta digitæ crassitie, illam ambiens, cultro rescinditur, nucleusque, postquam siccatus fuit, comminutus, loco sicco servandus. Phthisiscentibus paratur ex eo *pulmentum cum lacte*, mane et vesperi edendum. Fit pro adultis, e *lactis* se decim unciis, et *Amyli* huius *hordeacei*, cochleari, vel duobus, digestione leni, sub agitatione perpetua, et pro re nata, *Saccharo* edulcatur. Duodennibus pueris quantitas dimidia sufficit, (**T H I L E N I U S**.) Addito *baccarum Myrti Pimentae* tantillo, fit hoc pulmentum digestu facilius, (**N I E M A N N**.) *Farina conficiendis cataplasmatibus*, et *fomentis* siccis apta, cui tamen, pro re nata, *secalina* subrogari potest. *Malti infusum* in suppurationibus majoris momenti, ingruente, ob jacturam humorum, macie, celebratur, ita in suppuratione renun, in ulceribus obstinatis syphiliticis, cancerosis, sub interno usu, tulit suppetias. In scrofulosis affectionibus, tinea capitis, herpetibus, rhachitide, tum potui datum, quum extrinsecus forma *balnei*, vel *lotionis*, juvat. Magna ei in dyscrasia humorum, ut scorbuto, tum præcavendo, quum curando, auctoritas, a cel. **M A C B R I D E**, hunc in finem attentioni ex experientiæ Medicorum commendatum, exspectationi examussim satisfecisse, iter navigationis celeberrimi **C O O K I I** circa orbem terraqueum, documentum præbet. Idem confirmaverunt expeditiones plurium circumnavigantium. Ipsemet scorbutum curaturus, *infuso Malti, Vinum et Saccharum* cum successu addidi, sed hoc exemplum tantum

ibi sequi licet, ubi *vitigenus* hic *liquor*, non est caro. In arthrodynia quidam laudant et articulationum debilitate, membrum debile in humefactum calensque *Maltum* indentes. An in febribus biliosis putridis vulgo dictis, ut **COLLIN** adseverat, sit utile, experiri oportet. Si *potio Malti*, non illico, cum recens est, ebibitur, tum incipit evolvi acidum carbonicum, quo, ut **COLLIN** observat, egregium antiemeticon præbet; uti etiam non spernendam potionem adversus typhum, nitentem in putredinem. Scire licet, *Amylum hordeaceum*, quod est plerumque albido cinerascens, *aqua decoctum*, in *gelatinam concorem*, tenacem, transire, et *cataplasma aqua coctum*, ex eo parabile, ad movendam suppurationem, esse peridoneum.

V. *Cataplasma emolliens*; *Decoctiona Hordei*; *Decoctiona Malti composita I*; —— *II*; *Gargarisma commune*.

H U M U L U S L U P U L U S.

Х М І В Л І В.

Planta perennis, caule volubili, *foliis* inferioribus trilobis, in quibusdam insulis fluvii Jenisei spontanea, tam bene viget, ut venditio in vicinas terras incolis Krasnojarscensibus insigne lucrum adferat, alibi vulgaris ad sepes, alibi, adornatis pro usu œconomico lupuletis, colitur. *Cl. Dioec. O. Pentandr. O. N. Scabridæ L. Urticeæ J. Usuales sunt:*

S T R O B I L I, seu amenta subglobosa, laxe imbricata, squamis ovatis, subacutis, membranaceis, stramineo colore præditis, antequam floruerint colligendi, et siccandi sollicite.

Q. *Volatili oleo, scytodepsico, extractivo amaro, principioque narcotico* nititur. *Odor* subnarcoticus, nidorosus; *sapor* amarus.

V. Excitans; narcotica, (*Strobili cervicalibus subditi somnum arcessunt,*) frequentiam pulsuum retardans quidem, sed eosdem reddens firmiores; (*Maton,*) leniter adstringens.

U. Fere ubique, ubi *Opium* dari expedit, utilitatem promittit; laudatur cumprimis in myodynia rheumatica, affectionibus pulmonum, ita in pertussi sub finem. In syphilide. *Decoc-*

tura decrescente luna sumta, vermes efficaciter pellere fertur. (BODIN.) *Unguentum cum pulveratis strobilis factum, intensem carcinomatis dolorem, ultimo ejusdem stadio, quum alia non responderint, lenivisse fertur,* (FRAKE.) *Speciebus resolventibus recte adduntur Strobili.*

D. *Pulveris grana tria; tincturae guttæ quadraginta.* (Scire licet *pulverem strobilorum*, uti etiam *extractum, tincturæ, vi anodyna, præstare.*) Pro succedaneo *Opii* haberí, eique subrogari in variis casibus posse existimatur. (Videsis: *Dissert. inaugura-lem de Humulo Lupulo a cl. de Roches. Edinburgi, 1803 publicæ juris factam.*)

V. *Extractum Humuli L. Pilulae ——; Tinctura ——.*

HYDRA RGYRUM.

MERCURIUS, Ph. Ross.

Ртуть; живое серебро.

Largissimus est *minerae* et *Hydrargyri* proventus in variis Europæ regionibus, et in Americæ metallifodinis. Rarius invenitur *nativum seu Hydrargyrum virgineum L.* (*Mercure natif НАУ, Ртуть самородная*), saepius nuptum *Argento, (Mer- cure argental H.* Сортуть серебряная,) *Acido muriatico (Mercure muriaté H.* Ртуть солекислая,) *seu Sulphuri, Sulphure- tum Hydrargyri rubrum, (Mercure sulphuré H.* Ртуть сърная; Киноварь,) aliis etiam (*Mercure Sulphuré bituminifère H.* Ртуть сърно-смолистая) etc. In sulphureo Dauriæ monte Ildecanensi reperiebatur quidem apud nos *Sulphuretum Hydrargyri ru- brum;* sed tantum in parva quantitate. Quidam etiam *Oxyda Hydrargyri* se invenisse arbitrantur, ut in *Hydria rubrum* et *nigrum.* Postremum videtur fuisse *Sulphuretum Hydrargyri ni- grum, (Aethiops mineralis Ph. Ross.* Ртутьно-сърная черная смесь.) *Emporeticum* haud raro, alienis pretii vilioris, præ- cipue *Plumbo,* interdum quoque *Bismutho* et *Stanno adultera- tum est.* Talis superficies neutiquam nitet, ast fusca, et quasi membranula obducta adparet, tardius et globulis quasi cau-

datis currit, nigra, vel cinerea relinquens vestigia. *Plumbum* perniciosissima omnium labes, detegitur ope *Acidi acieiici*, quo saporem dulcem nanciscitur *Hydrargyrum*; ope vero *Acidi sulphurici* sedimentum deponitur; *aqua autem hydrosulphurata acidula*, nigrum. *Bismuthi* præsentia detegitur *Subnitrate Bismuthi*, qui largiori copia aquæ solutioni metallum adulteratum cum *acido nitrico* junctum tenenti adfusa, ægre solubilis factus, albus *oxydulumque* mentiens, præcipitatur. *Acidum nitricum Hydrargyro* adfusum, *Stannum commistum*, in *oxydum album* corrodit. Præterea fraus detegitur: si drachma, vel plus, in cochleari ferreo carbonibus superimponitur, tum *Hydrargyrum* deflagratione avolat, heterogeneo, quod ei admistum fuit, relictio.

Q. Est *metallum*, vulgari temperie fluidum, album, nitore eoque constanti, **ARGENTUM** referens, ponderosum (gravitas specifica *Hydrargyri* secundum cl. KLAAPROTH: 13,600) in *Acido nitrico et sulphurico* soluble, expanditur calore insigniter, æstu ingenti ad 68° Fahr. volatile; calore autem leñiori fixius, et in vase aperto sese oxydans. Liquidam formam in hybernis etiam rigoribus intemeratam servat, nisi *Hydrargyro* Th. Fahr. 38 et 40 gradibus (HUTCHINS) infra o descendente, aut summo Sieweriae ultimæ (GMELIN, PALLAS, LAXMANN, FRIES) frigori exponatur, aut cum *Acidis*, aliisque *Salibus* solutis, quæ aliis vicinis corporibus caloris materiem avidissime surripere solent, in contactum veniat (BLADGEN,) quo in casu octoëdris solidescit et fit malleabile. In genere linguae immersæ saporem metallicum in primit.

V. *Hydrargyrum depuratum.*

HYOSCYAMUS NIGER,

Блекомпа; Бълена.

Planta, *cor.* ochroleuca, infundibuliformi, obtusa, irregulari; *stam.* inclinatis; *caps.* operculata, biloculari; *seminibus* nigris,

ad pagos, vias et pinguia ruderata, crescens. *Cl.* Pentandr. *O.* Monogyn. *O. N.* Solanaceæ *L.* Solaneæ *J.* Biennis. *Usualia sunt:*

FOLIA, alterna, amplexicaulia, sinuata, hirsuta. Quandoque cum foliis *Hyoscyami albi* permutantur, petiolatis, sinuatis, obtusis.

Q. Venenata, in principio sita narcotico. *Odoris*, intense narcotici, et nauseosi; *saporis* fatui et mucilaginosi.

V. Eadem, quæ *Opii*, et in primis resolvens. Ab hoc, *eo* differt, quod *resina* carens, minus excalfaciat, et ob acre, quod tenet, principium, alvum quoque liquet, vel ad minimum siccum et *succus Conii spissatus*, non comprimat; interdum etiam nauseam, et vomitum movet.

U. Paralysis; varix ani; haemorrhagiæ ab irritatione; cardiotonus. Irritando organon animæ, asthenicæ maniæ, melanæcholiæ hystericæ, (refragrante **G R E E D I N G,**) et hypochondriacæ haemicraniæ, vertigini nervosæ, (**B U R D A C H,**) fit utile remedium. In spasmodicis affectionibus, convulsionibus hysterics, dysodontiasi, aut exanthematibus segnius prorumpentibus, productis, in epilepsia, trismo, laudatur. In algematisbus plerisque omnibus, tantam, quantam *Opium*, promittit utilitatem, persæpe majorem, præsertim, ubi obstipatio usum *Opii* contraindicat. Sane in odontalgia, prosopalgia, myodynia, arthrodynia, magni fit a quibusdam. Nuperrime cl. **T R I B O L E T** *Succum Hyoscyami spissatum* inflammationi pectoris cum successu obponuit, addito solutioni ejusdem *Vino stibiato*, haud secus, ac tracheitidi? Nec minus in adenemphraxibus, et in primis scrofulis, etc. **Externe:** forma *cataplasmatis* (*foliorum*,) vel *emplastri* (*ex oleo seminum, pulvere herbae, cera et balsamo pineo-laricino,*) vel *unguenti* (*ex pulvere et adipe suilla*) scirrum resolvere fertur. Ulceribus quoque rebellibus, pulvis *foliorum* inspersus proficuus. Usu cognitum est, maiores doses effectus esse notabilioris, et quidem sudoris copiosam eruptionem, placidum et profundum somnum, animi serenitatem et corporis vigorem, capitis obnubilationem, gravitatem, et cephalalgiam, vel ver-

tiginem, sensuum internorum torporem, exanthemata, fusca, serpiginosa, pustulosa, in mento et gena oriri; haud secus, ac in quibusdam copiosum lotii profluvium, crebriores alvi dejectiones, alios vomitum experiri, quosdam ventris tormenta, soporeque sub dilatatione pupillæ tentari, experiundo didicimus.

D. Semigranum, grana duo, ad scrupulum, sensim sensimque, idque adscendendo cautissime; adsuetis major quoque dosis impune dabatur.

V. Collyrium *Hyosciami opiatum*; Oleum *hyosciaminum*; Succus *Hyosciami spissatus*; Tinctura ejusdem.

I N U L A H E L E N I U M.

Девясилъ; Оменъ.

Planta in pratis succulentis et humidioribus Russiae australis crescens, foliis amplexicaulibus, ovatis, rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. Cl. Syngenesia. O. Superflua. O. N. Compositæ radiatæ L. Corymbifer. J. Perennis. Usualis est:

RADIX, fusiformis, carnosa, mucilaginea, crassitie pollicis et plus, extus pulla; siccata vero glauca, intus alba. Cum radices hæ cito mucescant, in longitudinem dissecantur, ut melius siccescant. In hortis educata, virtute cedit, sponte crescenti.

Q. Præstans: a volatili repetenda oleo et peculiari principio *inulino*, extractivo-amaro. Sapor ex acri-subamarus, sub-nauseosus; odor sub-aromaticus, *Camphorae Acidoque benzoico*, attestantibus NEUMANN et GEOFFROY, similis.

V. Leniter stimulans, ANGELICAM A. æmulans; expectorans; anthelmintica.

U. In morbis pectoris asthenicis, tussi, asthmate pituitoso laudatur. Contra psoram in unguento celebritatem consecuta est. An pro alexipharmaco, quin pro præservativo contra pestem, ut RAJUS et DIEMERBROECK contendunt, haberi

queat, non scimus pro certo. An tremorem artuum, ab incauto HYDRARGYRI usu ortum, sedet, dubitatur.

D. Vel in *pulvere* ad semidrachmam, vel supra, vel *aqua* decocta, sive infusa, datur. Præcipue *infusum Vino* factum arridet.

V. Oleum *inulinum*; *Unguentum* — .

J U G L A N S R E G I A.

Орѣшина Волоская, или Грецкая.

Arbos in Persia et Syria spontanea, viget cultura in australi Ruthenia, ut in Chersoneso taurica circa Aluschtam, Alupkam, in Iberia, in Astrachanensi provincia et circa mare Hiricanum, Kioviæ etiam, Sanfati (Bohuslaviæ) et alibi in hortis colitur. *Cf.* Monœc. *O.* Polyandr. *O.* N. Amentac. *L.* Terebinthinac. *J.* Arborea. *Usualia sunt:*

C O R T E X V I R I D I S F R U C T U S I M M A T U R I; (*Culiola;*) **P U T A M E N** et **D I S S E P I M E N T U M N U C U M;** **N U C L E U S;** **F O L I A,** glabra, subserrata. Mense Junio colligenda.

Q. *Cortex* nititur *principio scytodepsico*, in *aqua*, tam bullienti, quam frigida, solubili (SCHWILGUÉ); *putamen* pollet *extracto gummoso* et *resinoso*, (SPRENGEL,) suntque austero-amari et balsamici *saporis*; *folia* habent proprium penetrantemque *odorem*, caput gravantem, *saporis amaro-adstringentis*, ingrati; *nucleorum*: gratae dulcis, oleosus.

V. *Corticis et putaminum*: adstringens; tonica; lexipyreta; anthelmintica; antisyphilitica. *Nucleorum*: nutritiva; involvens; largius comestorum laxans et labefaciens ventriculum.

U. *Cortex et putamina* in *aqua* decocta, præbent non ineffectum remedium in syphilide inveterata et fœditatibus cutis, helminthiasi. Scopo purificante a J. HUNTERO commendatur *decoctura* composita, e *fructuum* (cum *cortice viridi*) uncii de- cem, *radicis Caricis arenariae*, *Lapidis Pumicis* et *Sulphureti Stibii* nativi, singulorum uncia, cum *aqua* fontanae libris quatuor decoctis, ad colaturam dimidiæ partis. Hujus *decocturae*

bebbat æger libram mane, alteram vero vesperi, et pro potu ordinario, decocturam *Althaeæ*, vel *Bardanæ*. Debilioribus subjectis propinetur parvis dosibus et saepius, abstinendo a carnibus fumigatis, salitis, acidis, vino etc. Remedium huic simile a POLLINIO et FRIEDREICHIO, celebratum, feliciter curam syphilidis absolutit, ubi multum *Hydrargyri* incassum consumsit æger (JAHN.) Alii lapidem *Pumicem*, ut inefficax renedium, omissunt, et loco radicis *Caricis arenariae*, radicem *Smilacis Sarsaparillæ* sumunt: R. Radicis S. *Sarsaparillæ* semunciam, Ligni *Guajaci* drachmas tres, *Corticum viridium* fr. *Juglandis regiae* drachmam, *Sulphureti Stibii* nativi pulverati scrupulum, coque ex aquæ sesquilibra, colaturæ adde: aquæ *Cinnamomi*, Syrupi *Citri Aurantii*, utriusque semunciam. Per diem consumendum. Extus decoctura concentrata *corticis* et *putaminis* siccata purificat consolidatque ulcera syphilitica, conductit quoque et in aliis laxis, saniosis, scorbuticis crurum et herpeticis ulceribus, si partibus affectis, ope lintei carpti, saepius madefacti, imponitur; vel si ulcera cacoëthea abluantur (HUNCZOWSKY, SPRENGEL, FRANK.) Hoc scopo cl. OSIANDER adhibuit etiam extractum in aqua solutum, et pro gargarismate ad consolidanda ulcera fauicum syphilitica, infusum *Salviae officinalis* cum eodem extracto *corticis viridis*, vel *putaminis*, addito melle, et aliquot granis *Oxymuriatis Hydrargyri*. Extractum hoc sua adstrictoria virtute potest omnino pro succedaneo haberi, iis in morbis, ubi succum *Eucalypti concretum* et radicem *Krameriae triundræ* laudavimus. Alia vis est decocturae ejusdem *corticis*, aqua factæ, authelmintica, quam ad lumbricos pellendos in primis extollit PLATNERUS, eamque experientia confirmatam, persæpe vidi-
mus, (immissi huic vermes intestinales, pauca intra minuta, sub motibus spasticis, pereunt.) SIMEON SETH, dudum jam notavit: *virides nuces Juglandis r.* ad satietatem comestas, lumbricos educere. Hæc itaque ansam dedere ex immaturis fructibus extracto aquoso parando, cuius drachma in uncia aquæ *corticis L.* *Cinnamomi* soluta, remedium euphoniston sistit ad vermes encandos; infantibus biennibus vel triennibus guttae viginti, triginta

ter de die datae, guttæ vero 40 — 50, provectioni æstati, conveniunt. Addito *syrum simplici*, vel *melle*, *solutio gratarum redditur*. Sub usu, decrescente luna, spatio sex, vel octo dierum, continuato, *catharticon mercuriale*, subjungitur (MURRAY.) *E succo nucum viridium expresso*, cum *Saccharo*, aut *Melle*, *Roob* conficitur, quod insigne vim præstat, in angina, tumore tonsillarum, aphthis, aliisque oris ulceribus, addita idonea quantitate *Subboratis Soda*e, vel *Acidi sulphurici diluti*; ope penicilli illinitur, vel *infuso Salviae admistum*, loco *gargarismatis*, adhibetur. *Fructus immaturi*, servato *putamine*, *Saccharo* et *aromatibus* conditi, stomachicum gratum et sub varia miscela *embamma* sapidum ferculis suppeditant; *nuclei*, pari modo confecti, in mensa secunda esitantur. Sapidissimum et palato gratissimum est *embamma*, quod Kioviae et Sanfati (Bohuslawiæ) etc. (Киевское варенье Грецкихъ ореховъ) conficitur. Memoriae **HIPPOCRATES** prodidit: *nuces Juglandis*, *largius comestas*, *lumbros*, tæniasque *latas* pellere. Eundem effectum et **ANDRY** adnotavit, superbibito *Vino Alicantino*, quod pariter infestat vermes et vires ventriculi sustentat. In Gallia, sub dicto connubio, specificum reputatum fuit adversus Tæniam S. *Folia cautim siccata* et in *pulverem trita*, cui pro re nata, etiam *Saccharum additur*, inter anthelmintica vix spernenda, referuntur; *recentia* vero contusa, ambusturis apte admoventur, *succus ex iisdem expressus*, podagrericis prodest, si loco dolenti applicatur (BOERHAAVE.) *Cortex arboris medianus* (et *Amentum*,) tempore, quo illa plurimo scatent succo, collecta et siccata, vomitum excitant; pro scopo vomificio olim, drachma pro dosi, porrigebatur, ut **SENNERTUS** et **SCHROEDERUS** adseverant. *Julorum scrupulos* duos cum binis *Olei succinici* guttis, laborantibus hysteria matronis, fuisse a **CRATONE** commendatos, memoriæ proditum est. *Epidermis nucleum* investiens, flavescentes, subamara, ad drachmam cum *vino*, vel *aqua aromatica*, laudatur a **HOFFMANNO**, qua domesticum remedium, adversus enterodyniam flatulentam. Taceo, quod *folia*, *putamen*, *fructus*,

vel *cortex viridis*, in *aqua* macerata, atque in horto effusa, coacervatim lumbricos terrestres alliciunt, eosque perimunt.

D. *Corticis*, vel *putaminis uncia*, sumitur ad libram *aqua*, decoquendæ ad uncias octo, quæ cochleatim præbetur ter, quaterve de die; *Extracti Juglandis* grana 20—30; in *solutione*: drachma, cum uncia *aqua* *aromaticae*; pro usu externo: semuncia, in selibra *aqua* solvitur; *Roobis Juglandis*, drachmæ duæ ad quatuor, in vehiculo idoneo exhibentur.

V. *Decoctura Juglandis*; *Extractum* —; *Roob*—.

J U N I P E R U S C O M M U N I S.

Можжевельник обыкновенный; Верескъ.

Frutex in acclivibus exsuccis, aridisque Russiæ temperatae germinans, subarborescens, *foliis* ternis, patentibus, mucronatis, *bacca* longioribus. Cl. Dioecia. O. Monadelphia O. N. Coniferæ L. et J. Usualia sunt:

Lignum, tam *radicis*, quam *trunci* et *ramorum* a *cortice* liberatum, compactum, ponderosum, ex albo flavescentes, aut rutilans. БАССЕ, (Яловецъ,) seu *fructus baccati*, integri, maturi, globosi, cœruleo-nigricantes, tota prima æstate virides, nec nisi biennii spatio, maturescentes. *Lignum Fagi sylvaticæ*, *oleo Juniperi communis* illitum, substitui, cl. LIPHART, testatur.

Q. *Baccae*, præter *saccharinam*, *materia quoque resinosa* cum *oleo volatili*, præditæ sunt. *Odor* earundem fragrans; *sapor* subdulcis, subacris et resinosus. *Lignum*, excepta *materia saccharina*, nullo fere *baccarum* principio, destitutum est; *odor* ejusdem et *sapor* idem, sed debilior.

V. Stimulans; sudorifica; diuretica; *baccarum*, potentior.

U. *Baccarum infusum* in hydropisi, pro diverso regimine, aut sudorem, aut lotium movet. Vires diureticæ et simul roborantes, in morbis pituitosis, præsertim œdematosis, et hydropicis, jam HELMONTIUS inter arcana habitas, extollebat impense. *Spiritus* destillatus, *aqua* dilutus, (Джинъ) *Saccharoque* mistus, sub-

inde pro potu, in eodem morbo, præscribitur. Cutis post scarlatinam inflata, et in rhachiticis flaccida, utiliter fricatur panno, qui fumum ex iis *baccis*, prunis inspersis, exceptit. Bilibra *baccarum*, *balneis aromaticis*, non male additur. Laudatur etiam in scorbuto, fœditatibus cutis; *oleum* autem, adversus animalia interaneorum. *Ligni* usus, idem. *Suffitus*, non tam ad corrigendum aëra, quam ad graveolentiam, valetudinariorum; ubi opus fuerit, obtundendam, vulgatissimus.

D. Adhibetur *lignum*, *baccae* et *oleum*. *Lignum rarius* in *infusione*, aut leni *decoctura*, a duabus drachmis ad unciam; *baccarum*, antea contusarum, in *infuso* drachma, semuncia, ad sellibram, vel libram *aquaæ*, vel *vini*. *Olei*: guttæ duæ ad decem. *Extus baccae* non tantum suffiendis valetudinariis aptæ; sed etiam *fomentis*, *cataplasmatisque* uniuntur commode. A quibusdam *lignum radicis*, *trunci ligno*, minus odorario, præfertur, imo pro succedaneo *ligni Sassafras*, habetur.

V. *Infusum Baccarum Juniperi; Oleum Juniperi; Roob —.*

J U N I P E R U S L Y C I A.

Верескъ горный, или каменный.

Arbor foliis ternis, undique imbricatis, ovatis, obtusis, copiosissime in promontoriis rupestribus præruptis, apricis, jugorum Altaici et Sajanensis, continuo tractu, ab Irti ad Jeniseum fluvium, crescens. *Cl. Dioecia. O. Monadelp. O. N. Conifer. L. et J. Usualis est:*

GUMMIRESINA (*Olibanum, Thus, Ладанъ, vulgo dicta*) subdiaphana, pallide lutescens, in lacrymis majoribus ovato-oblongis, utrinque obtusis, magnitudine *seminis Viciae Fabae*, vel *ovi columbini*, solitariis, vel geminis, sæpe pluribus, aggregatis, laevibus, fragilis, fracturis planiusculis. Alii eam **ex JUNIPERO THURIFERA; FÆRSKAL** vero nuperrime **ex AMYRIDE KATAF** desumi adseverat. Variis *resinis*, atque *gummiresinis* alijs, pretijs minoris, malesuado consilio, permiscetur.

Q. *Gummeo-resinosa*, leniter tosta, *odorem* spargit fragrantem, quem in finem, ob gratiam odoris, pro *suffitu* adhibetur. *Saporis* est balsamici.

V. Discutiens, extrinsecus.

U. Nimii in adstruendis ei laudibus auctores fuere, nam in asthmate, hæmoptoë, tussi, cito alvo etc., veterum auctoritate nitentes, commendarunt. Discutiendi in *suffitu* virtuti, traumaticæ in *emplastris* et *balsamis*, MURRAY subscrabit. Intra *albumen ovi*, æque ac *gummiresina L. Myrrhae*, in deliquium abiens, maculis faciei delendis et cicatricibus formandis, haud impar esse censemur. Leucorrhœæ et blennorrhœæ quoque obposita.

D. Interne, (quod vix unquam hodie fit,) a semidrachma ad drachmam.

V. *Pulvis pro Suffitu.*

J U N I P E R U S S A B I N A.

Можжевельникъ Донской; Сабина.

Frutex sempervirens, plerumque hortensis, in locis tamen excelsis Sieveriae spontaneus. *Cl. et O.* præcedentis. Perennis. *Usualia sunt:*

FOLIA, obposita, obtusa, medio glandulosa, quadrifariam imbricata, tenella, acuta. Permiscentur cum foliis *Juniperi Bermudiana* et *Juniperi Virginianæ*, quibus deest *odor* et *sapor Sabinae* specificus.

Q. Eximia, a copioso *volatili oleo* dependens. *Odor hircosus;* *sapor acris, subamarus.*

V. Stimulans; diaphoretica; diuretica; menagogia; anthelminetica; corrodens.

U. Laudatur in asthenia uteri, abnormi secretione, laxa intumescentia, lassitudineque stipata, post frequentia puerperia, abortusque, aut irregularem menstruorum fluxum, superstite, quem in finem injicitur *decocitura* in *vaginam*, aut *abdomen*.

eadem foveatur, ita etiam valet in metrorrhagia cachectica, ubi sub asthenico corporis statu, menstruorum nimius est fluxus, sanguisque male olet. In leucorrhœa, tam interno, quam externo *injectionis* usu, profuit, haud secus ac in incipientibus cancericis ulceribus. In myodynæ rheumatica, astheniae notam eo gradu, ut ad paralysin accedit, ferente, imo etiam, ut quibusdam placet, syphiliticæ indolis, *pulvis foliorum* a granis decem ter de die porrectus, juvit. In arthrodynia, præsertim vero podagra inveterata, tumoribus ossium, contractura, ankylosibus, vel per se sumitur, vel in connubio *Camphoræ, Sulphuris, Suboxydi Stibii hydrosulphurati*, etc. Et præterea partes morbidæ in tepefacta decoctione lavantur, aut tela eodem humectata iisdem superdatur. *Oleum quoque Alchole* solutum, non male iisdem infricatur. Secretioni etiam corrigendæ par est, hinc efficaciam suam exserit in ulceribus malignis, putidis, phagedænicis, scorbuticis, imo in psora, herpetibus etc. Hunc in finem *infusum pro lotione*, vel admovetur *pulvis melli* admistus, vel fit *cataplasma cum Ruta, Alchole camphorato*, etc. *Pulvis* inspersus, cariem ossium et cerebri fungum subagit. In spina ventosa non venerea, cum interno congruorum usu, applicationem *saturatioris decocturae*, conjungere solitus fuit **VERLHOFIUS**; similem efficaciam in exostosi e fortiori infuso, extus adhibito, expertus est **HOFMANNUS**. *Decoctura foliorum*, vel admota *contusa herba*, vermes expulit, adversus quos *succi expressi* cochlear cum *lacte* mixtum et *Saccharo* edulcatum, pariter efficax fuit. *Cathæretica pulveris* admoti vis in verrucis porrissive syphiliticis, aut carne supercrescente, jam antiquitus celebrata, haud secus ac idem in *unguentum* pro fonticulis adhibetur. Remedium est efficax, sed febrili tumultui, variisque aliis neurantistasibus alienum.

D. *Folia* exhibentur in substantia, a decem granis, ad semidrachmam, ter de die, sed non facile pulverata, nam, ut in pulverem redigi queant, siccanda sunt adeo, ut *volatili oleo* priventur. *Conserua* ideo præfertur, e *foliis recentibus*, cum æquali *Sacchari* portione parata, quæ cum s. q. *syrupi corticis fructu*

tus Citri Aurantii, per modum electuarii, aut boli, datur, vel uncia consorum foliorum, in aquae libra, vase clauso, leni igne, ad dimidias partes coquitur, et addita colaturæ, syrapi uncia, secunda quaque hora, cochleatim sumitur. *Olei: 3, 4,* guttæ, cum *Saccharo* dantur.

V. *Ceratum Sabinae; Oleum —; Pulvis —.*

KRAMERIA TRIANDRA. RUIZ et PAVON.

IXINA. WILLDENOW.

Крамерія Американська.

In Huanuco et Tarma *Ratanhia* vocitatur. In Cumana Americæ habitans, in solo sicco, arenoso, calcareo, ardentibus solis radiis exposito, libentius crescens. *Cl. Triandr. O. Trigyn.* (WILLDENOWIUS ad Tetrandr. Monogyn. refert.) Perennis. *Usualis est:*

RADIX, (*Radix Ratanhiae*) horizontalis, longitudine ab uno ad tres pedes, crassitie digiti minimi, ramosissima, **teres**, *corticē* intus rubro, extus nigricante, sulcato, tecta.

Q. Principium *scytodepsicum* efficacissimam ejus partem constituit, *Acido gallico* et *extractivo amaro*, junctum. *Odor* exhalationibus terrestribus analogus, non ingratus; *sapor acris*, *stypticus*, nonnihil amarus.

V. Primarium inter *adstringentia* locum occupare posse existimatur.

U. In hæmorrhœis . cujuscumque generis efficacissimum et quasi specificum est remedium, hinc in metrorrhagia, abortu vel alia causa, concitata, in menorrhagia, uti et lochiis nimiis, epistaxi, hæmoptysi, hæmatemesi, hæmaturia, felicissimo cum effectu, adhibitam fuisse, experimenta, a Clinicis Hispanis, facta, testantur; etiam in externis malis, a vulneratione, laceratione etc. neque minus in aliis excretionibus nimiis, sudoribus excessivis, diarrhoeis, leucorrhœa, blennorrhœa, utilis inventa est; gin-

givarum laxitati scorbuticæ, vel ab abusu *mercurialium*, optime medetur.

D. *Radicis semuncia*, cum *aqua* bilibra, ad *selibram*, decoquitur, et sic exhibetur. Inhibita hæmorrhagia sufficit ad perfectam sanationem, duobus sequentibus diebus dosin dimidiam exhibere. Si autem hæmorrhagia fuit vehementer, et iterata, drachmas duas et semis de die propinare necesse est. Morbis externis forma pulveris applicari potest.

V. *Extractum Krameriae.*

L A U R U S C A M P H O R A.

Л а в ръ К а м ф о р н ы й.

In Indiis orientalibus nominatim Java, in Japonia occidentali et contiguis insulis Saikof, Nipon aliisque, præsertim in insula Satzuma, item in Capite bonæ spei? arbor vulgaris, in lætam vastamque Tiliæ magnitudinem adolescens; in frigidariis vero hortorum Europæorum hinc inde florens. *Cl. Enneandri. O. Monogyn. O. N. Oleraceæ L. Laureæ J. Arborea. Usualis est:*

CAMPHORA, (Камфора,) substantia concreta, ætherea, massulis globulosis, flavis, subluteis cinereisque, dum cruda est, constans, quæ destillatione *ramulorum*, *foliorumque* cum *aqua*, a reliquis *L. Camphorae* partibus constitutivis, separatæ, illico sublimantur, atque in sordidis deformibus glebis per Batavos adferuntur. *Camphora depurata*, cruda nova sublimatione, *Calcariae* ope, per se extinctæ et dilapsæ, parata, in massas magnas orbiculares, subtus concavas, concrescit. Præter *L. CAMPHORAM*, alia etiam vegetabilia *Camphoram* tenent, ita reperitur illa in *radicibus L. Cinnamomi*, *L. Cassiae*, in *Alpinia Galanga*; *Amomo Zedoaria*, in *seminibus A. Cardamomi*, *Piperis Cubebæ*, haud secus, ac in indigenis quibusdam, ut in **THYMO SERPYLLO** et **VULGARI**, **JUNIPERO COMMUNI**, in **ROREMARINO** et **SALVIA OFF. MENTHA PIP.** etc. Ita etiam ex oleis essentialibus: *Rorismarini*, *Lavendulae*, *Majoranae*

et *Salviae off.* etc. separari potest. Aptissima est Medicinæ, *nivea* et *glaciei* instar subdiaphana. Non facile adulteratur.

Q. Egregia, in principio volatili, carbonico, hydrogenio, et pauxillo *oxygenii* residens. Ab oleis essentialibus eo in primis differt, quod plus *Carbonici*, quam ea, contineat. Combustione *Acidum carbonicum* et *camphoricum* dat. Super ignem liquata *olei* instar fluit; accensaque deflagrat omnis. Odorem proprium fragrantem, eumque excitatissimum, fere ad *Rorem marinum* accendentem spargit. *Saporis* est acris, aromatici, amaricantis, simul cum sensu frigoris, *Menthae piperitae*, æmuli fere, linguam et fauces penetrantis.

V. Egregia, excitans, diffusibilis, in momentum irritabile nervorum organicorum agens, cuius actionem incitat, dum irregularē vis sensiferæ distributionem minuit; nervos præsertim cutaneos intensius stimulans, hinc exhalationem cutanēam et remeatum sanguinis in venis promovens, in genere calorem in corpore augens, idque ad sudorem præparans, quin micatus arteriarum reddat auctiores. In principio vires vitae excitans, in statu autem morboso actiones sedans abnormes, nec minus dolores a spasmis, quo antispasmodica ejus vis nititur. Magna dosis pulsum retardat calorēmque animalem diminuit, partibus antea, nimia irritatione, fatigatis.

U. Magna *Camphorae*, prout ad multa, salutifer usus, auctoritas est. Quod de plerisque volatilibus stimulantibus prædicator, id de eadem quoque in universum dici potest, in omnibus nempe formis gradibusque nevrastheniæ, tum chronicæ, tum febrilis, efficacem se præstat, præsertim, si exhalationi etiam cutaneæ calcar subdere e re fore putatur. E nevrastheniarum tribu, typhus est in primis, cui *Camphora* recte obponitur, pulsu parvo, molli, debili, (cuti sudore frigido humente,) delirio, pervigilio, convulsionibus, tendinum subsultibus etc., conspicuus, eaque, vel interne propinatur, vel in *Alcohole diluto* abdomini admovetur extrinsecus. Commode ei hoc in casu adduntur: rad. *Valerianæ off.*, vel pro re nata cortex *Cinchonæ off.* *Aether*, etc. Si vero typhus, synochæ se-

quela est, *praeparata stibiata*, *sales neutri* etc., vel dum pronitatem in putredinem prodit, *acida dulcificata*, *Aristolochia Serpentaria*, etc. In gastrico autem typho, cessante jam paralytico et hyperplerotico canalis intestinalis statu, *neutri sales* et *Cinchona off.*, in pestilentiali, *Cinchona*, *Vinum* etc., adcommoda additamenta. In typho exanthematico, ut variolis, morbillis, purpura, vel scarlatina, ob fatiscentiam virium subito retrocedentibus, atque ad cutim resuscitandis, languenti horum exanthematum eruptioni, utilem stimulum subdit. In scarlatina, (quum *cutis scabrities* et ariditas est, atque exhalatio cutanea non procedit ex sententia, acceditque sub inhorrescentia candicans e rubro exanthema) in variolis, (si est imminuta reagendi vis viiae potentia, sub spastico statu, febriculositate, cuti frigescente, pallescenteque et eruptione segni, decolore, cum indiciis malignitatis,) in morbillis (eruptione cunctante, aut eadem prodeunte decolore, vel ad interiores partes projecta, vel statum cutis ad paralyticum accendentem relinquente,) cumprimis commendatur. An inflammatoriis febribus conveniat, dubitari posset, ni metum minueret explorata *Camphorae* in externis inflammationibus, virtus. Non inepte sane adhibetur in typho, aliquid inflammatorii secum vehente, ubi videlicet febris, vel primitus typhodes fuit, vel synochæ sequela exstitit, sub pulsu spastico, vel molli, debili, et ubi blandos sustinere sudores e re est, ita in typho cum pneumonitide, hepatitide, gastritide, enteritide etc., in connubio *salium neutrorum*, *stibiatorum*, vel *mercurialium*, in exiguis semigrani dosibus, secunda quaque hora, exhibendo, substitit *cl. MERTENS*. Juvat quoque in his *Alcohol camphoratum* dilutum, vel *Camphorae oleo exceptae*, et quo tenacius inhæreat, *unguento Althaeæ off.*, commistæ, inunctio ex. g. in affectionibus pectoris, spiritus difficultati, tussique, succurrens. In morbis spasticis et convulsivis, præsertim, ubi exhalationis cutaneæ, vel alias normalis, vel abnormis secretionis e. gr. *lactis*, aut excretionis cujuspiam ratio habenda, commendatur. Sic in epilepsia (*CULLEN*), scelotyrbe, asthmate convulsivo, pertussi, in enterodynbia, aut spas-

mis ventriculi a hæmorrhoidalì congestione, intoxicatione saturnina, (cum Sulphure,) vel rheumatica, aut arthritica complicatione ortis, imo in dysenteria, meteorismo, si debilitati, spasmis, occurrendum est. Ut heic, ita etiam in herniis incarceratis, frictio quoque, ope ejus, utilis. Dolores omnigeni, præsertim rheumatici, vel adiapneustia orti, ut cephalalgia, odontalgia etc., *Camphoram*, vel intrinsecus adhibitam, vel *Oleo pineo-laricino*, solutam, extus admovendam, expetunt. In morbis viarum uriniferarum et obscoenarum partium, ut in cestromania, dolorifica mentulæ vel cunni tentigine, stipata, in nephritis, ad sistendam *Lyttæ vesicatoriae* vim, vel aliorum acrum diureticorum, ut *Scillæ m.* hinc profectam. Sic quoque narcoticas *Opii* vires, *Daphnes Mezerei* rodentes, sialagogas *Hydrargyri*, & *drasticorum* evacuantes, infringit (QUINCY, BARRY, HUXHAM.) *Unguentorum mercurialium ex Oxydis Hydrargyri* paratorum efficacia, saepius, addita tantum *Camphora*, in inflammationibus chronicis enitescit. In discutiendis inflammationibus externis non frustratur, sic in levi œdematoſo erysipelate, aut sine dolore & febri, aut eadem vix notabili, siccis in culcitellis admovetur, cum interno ejusdem usu. *Cataplasma camphorata* in ophthalmis opportuna, cumprimis autem iis, quæ rheumaticæ vel catarrhalis sunt indolis, *Camphora* cum *mucilagine*, aut *aqua*, conducit. In congestionibus, sugillationibus, luxationibus cum debilitate articulorum *Alcohol dilutum camphoratum* ere est, extrinsecus admotum. In tumoribus œdematosis exhibetur per modum *fomenti*, in maculis corneæ, *linimentum adcommodum*; in pernionibus, vel hoc, vel *Alcohol dilutum camphoratum*. In ulceribus atonicis gangrænescensibus, carie, *Camphora*, vel sola in pulverem tenuata, vel cum *mucilagine* adhibetur, in carie vero humida, *Alcohol dilutum camphoratum*, aptius. In gangraena sumitur interne cum *cortice Cinchonae off.*, vel applicatur extus. A quibusdam etiam in myodynia, arthrodynia, laudatur, parte nempe affecta, panno lano, vel gossypio, *Camphora* resperso, tecta. Utilitatem promittit in variis maniæ formis (PARACELSUS, FRIEWALD,)

et quidem auctiore a drachma ad duas de die dosi, sic etiam in psora, tam curanda profuit, quam retrograda infantum, seu a perfrictione, seu ab inunctione intempestiva, si eclampsiam excitavit, resuscitanda, (ROSENSTEIN.) In helminthiasi etiam commendatur, quem in finem, *clyster e Camphorae* drachma, *Olei olivi* unciis duabus, per triduum, decubitus tempore, injectus, repetendo, dein alternis, si opus, diebus ad quartam vicem (FOWLER) successit. *Camphora Alcohole*, vel *Aetherē* soluta, vel per modum *unguenti* irritantis idoneum remedium, ulcera fungosa corrigit, morsuram insectorum lenit, etc. Medicina adeo valens, aequa facile insidias struere potest, ac prodesse, nisi provida cura evitentur scopuli; hinc cavendum est, ne illuvie in priinis viis latitante detur, aut sub angio-plerotico sanguinis statu, congestionibus, ad superiores partes, factis. **Acutis** morbis tutius, instante crisi, aut præsente, et sub declinatione, convenit.

D. Interne, pro ætatis, sexus, temperamenti, morbi differentia, variat. In universum convenit, initium minoribus præbiis facere, nisi vis mali aliud urgeat; in acutis febribus exigua grani unius dosi ad quatuor, pluries per diem, adquiescimus, in asthenicis ad decem, eaque sola datur, per se pulverata cum *Saccharo*, *Alcohole*, *gummi Acaciae v.* etc., trita; vel cum *Magnesia*, *Nitrate Potassae*, *Opio*, *Moscho*, conjuncta, in infusionibus stimulantibus, decocturis in *Vino*, *Alcohole*, *Aetherē sulphurico*, vel eodem alcoholisato, *Acido acetico diluto impuro*, emulsionibus e mucilagine g. *Acaciae v.*, *Saccharo*, albumine ovi nucleisque *Amygdali com.*, parandis. Per modum pilularum cum extractis amaris, gummiresinis foetidis, etc. Quoniam effectus ejus sunt evanidi, saepius repetenda sunt præbia; in mania maiores exhibentur doses, circumspecte tamen, ne, quod fieri interdum adsolet, syncope, anxietas, nausea, convulsiones, deliria etc., excitentur, qui effectus, vel mitigantur *Opio*, vel tolluntur.

V. *Acetum camphoratum*; *Aether sulphuricus camphoratus*; *Alcohol dilutum camphoratum*; *Cataplasma antisepticum*; *Hæustus cam-*

phoratus; Linimentum Ammoniae camphoratum; Mistura Camphorae; — — acetata.

L A U R U S C A S S I A.

Лавръ лжекоричный; Кассия коричневая.

In Indiis orientalibus, Malabaria, Sumatra, Java et Sinensi imperio crescit. *Cl. et O. præcedentis. Usuales sunt:*

FLORES, seu *gemmae floriferæ*, (vulgo *Clavelli Cinnamomi*) coloris fusco-rubescens, tres vel quatuor lineas longæ, cum capitulo subtereti, magnitudine *baccæ Piperis*. **CORTEX**, seu frustula longitudine pedis *cort.* *L. Cinnamomi* persimilia; crassiora autem et magis fusca, quæ striæ, æque inter se distantes, serpentino modo percurrent. Cum perpessis jam distillationem, indeque cassis virtute, interdum *flores* permiscuntur. *Cortici L. Cinnamomi* subrogatus, interdum gustu minus pungente, dulcique et majori mucilaginis copia, nec non substantia æquali densiore et minus friabili, proditur.

Q. Florum: odor fragrans; sapor acris cinnamomeus; *corticis* odor cinnamomeus fortior, minusque gratus. Qualitas ab *Oleo volatili* repetenda.

V. Stimulans; calefaciens; peptica.

U. In morbis asthenicis, dyspepsia, flatulentia et s. p. Pro succedaneo quoque *corticis L. Cinnamomi*, cui in commercio interdum substituitur, vel fraude interseritur, licet sit debilior, ob leve pretium, quo venit, recte habetur.

D. Scrupulum ad drachmam.

V. Aqua L. Cassiae; Oleum — —; Pulvis aromaticus; Tinctura aromatica; — — acidulata.

L A U R U S C I N N A M O M U M.

Лавръ коричный; Корица Цейлонская.

Arbor in variis Jndiæ orientalis, (præsertim in insula Ceylon,) Americæque regionibus crescens. *Cl. et O. præcedentis. Usualis est:*

CORTEX, (Корица,) *internus ramorum tenuis, crassitie pa-*
pyri, fragilis, convolutus, ex et interne, coloris flavo-ruben-
*tis. Crassus, vel per destillationem *oleo volatili* privatus, fere*
nullam virtutem amplius possidet.

Q. Heroica, ab *oleo volatili*, (de quo continet $\frac{1}{2}$) dependet. *Odorem* gratissimum aromaticum spargit et cum *sapore* suavissimo, acriculum dulcemque, et leviusculum adstrictio-
 nis sensu*m* conjungit.

V. Analeptica; stimulans permanens; roborans; adstringens.

U. Ob gratiam *saporis*, *cortex* pro conditura *eduliorum* ad-
 hibetur; a Medicis vero sæpe medicinis additur, ejusdem vir-
 tutis, ut *cortici Cinchonae*, amarisque; *saporis* quoque corrigendi
 gratia, idque in morbis asthenicis, dyspepsia, debilitate, (post
 evacuationes, puerperium,) nausea et anaphrodisia etc., in *infuso*
aquoso, vel *vinoso frigido*. In haemorrhœis ad cruorem re-
 staurandum facere haud parum, **SCHMIDTMÜLLERUS**, adse-
 verat.

D. Pulveris grana decem ad scrupulum.

V. *Oleum Cinnamomi*.

L A U R U S M Y R R H A.

Лавръ Мирровый.

Arbor Chinæ, Cochinlinæ, littorisque meridionalis et
 orientalis maris Erythræi, Arabiæ felicis. *Cl.* et *O.* præceden-
 tis. *Usualis est:*

GUMMIRESINA, (*gummi Myrrhae*, *Ph. Ross:* Смирна) in
 frustulis, plus vel minus teretibus ad nos veniens, coloris fu-
 sci, sæpius flavo-albescens, pellucidis, ad tactum oleosis,
 friabilibus, interne, albescens, striis, notatis. Optima est quæ
 e Troglodititia, Abyssiniæ provincia, adfertur. Per miscetur
 cum *gummi Pruni Cerasi*, aut *domesticae*, aliis *gummiresinis*, ut
Bællio, *lapidibus*, *tinctura Myrrhae* sæpius madefactis, atque
 pulvere *corticis L. Myrrhae*, respersis.

Q. Non ingrate odorifera, admodum amara, aromatica, sapida.

V. Stimulans, stomacho idonea; menagoga; secretiones quoque leniter movet, praesertim sputum.

U. Interne gummiresina, catarrho chronicō, asthmati et phthisi (secundo et ultimo studio) persæpe convenit, et tum utiliter eidem *Nitras Potassae*, vel *Supertartras ejusdem*, conjungitur, actionis minuendæ causa; a granis decem ad viginati; aptius attamen forma pilularum cum variis congruis exhiberi potest. Phthisi ulcerosæ, ob stimulantem, qua pollet, vim, aliena. Chlorosi, amenorrhœæ, dysmenorrhœæ, cum variis *Ferri præparatis*, obponitur. Commodissimum est, gummiresinam cum extracto *Fumariae off.*, *Marrubii vulgaris* et *Solanii Dulcamarae*, in pilularum massam redigere, et si nevroblacia prævalet, gummiresinæ *Assae foetidae*, *Saponi stibiato*, numero. Laudatur etiam in ulceribus internis, vel pulmones vel intestina, (dysenteria superata,) gravantibus; sed, aut febri, aut inflammatione urgente, aliena. Conjungitur etiam cum *Cetraria islandica*, addita aqua *Calcariae*, recens parata, et radice *Colombæ*, in ulceribus intestinalium. In phthisi pituitosa et hydrope pectoris prædicatur (quæ gummiresinam *Myrrhae* continet,) mistura *Myrrhae ferrata*. Potest etiam cum cortice *Clutiae Elutheriae* jungi, vel *Sulphur præcipitatum* cum extracto *Centaureæ benedictæ* additur ad pilularum massam. Extrinsecus: in carie dentium, laxitate gingivarum, idonea, hinc pulveres dentifriciis et hanc gummiresinam recipere solent. Tinctura quoque *Myrrhae* in dentium affectionibus laudata; multo tamen minus in carie aliorum ossium.

D. Grana decem, scrupulum, semidrachma. *Tincturæ* drachma.

V. *Mistura Myrrhae ferrata*; — — — mitior; *Tinctura Myrrhae*.

L A V A N D U L A S P I C A.

Лаванда колосистая; Увѣчная трава.

Fruticulus Europæ australis, *hortensis*. *Cl. Didyn.* *O. Gymnosp.* *O. N. Verticillatæ* *L. Labiatæ* *J. Usuales sunt:*

FLORES, cal. ovato subdentato, bractea suffulta; cor. resupinata; stamina intra tubum. Vetusti improbantur.

Q. Præstans: ab *oleo volatili* copioso, quod eidem inest, repetenda. *Odor* fragrans, acceptus; *sapor* subamarus, aromaticus, calidus.

V. Stimulans; nervos reficiens. Locale errhinum in *pulvere*.

U. In defectionibus animi, paralysi, tremoribus artuum, vertigine, affinibusque systematis nervosi morbis, præsertim cum aliis aromaticis, ita etiam in aphonia, balbutie, laudes tulit, ast meo arbitratu tutius culcitellis et fomentatione extus, ad varias hunorum stagnationes dissipandas, superdatur. *Oleum* elicetur ex iisdem flavidum, fragrantissimum, cuius *spicae florentes* continent $\frac{1}{200}$, resolutis membris inungendum, balsama etiam externa ingrediens.

V. *Oleum Luvandulae S.*

LEONTODON TARAXACUM.

Одуванчикъ; parvorussice: Кульбаба.*).

Planta in Russia præcipue septentrionali frequentissima, plerumque in pascuis et ad vias obvia. Cl. Syngenes. O. Aequal. O. N. Composit. Semiflosculos. L. Cichoraceæ J. Perennis. Usu-ales sunt:

HERBA; RADIX, eaeque recentes. Herba lacticens, subamará; foliis runcinatis, denticulatis, lævibus. Radix fusiformis, succosa, digitum minorem crassa, extus brunea, intus alba. Primo vere effodienda. Succus recentis expressus, lacteus, amaricans, digitos tractatu, pertinaciter tingens.

Q. *Succo* lactescente, amaro, salso, nititur. Ex uncia *Succi* expressi obtinetur extracti gummosi sapore primum dulciculo, dein subamaro, sicilicus, et extracti resinosi, parum adstringentis, drachma (GLEBITSCH.) Infusum radicis Sulphate Ferri paululum fucatur; herbae vero siccae, nigrescit.

*) Vocabatur etiam caput Monachi, (Попово гумено; Пльшивець;) delapit enim floribus, reliquum, quasi caput, calvum reficit.

V. Leniter stimulans; incidens; resolvens; systematis venae portarum, vasorumque lymphaticorum actionem intendens; diuretica, (ideo *lectimina* etiam dicta,) eaque herbae, radici, et scapis, est communis.

U. Radix commendatur in splanchemphraxi, et inde ortis febribus intermittentibus (de HÄEN.) hypochondriasi, melancholia, hydropisi, renum sabulo, muco, purulentaque materia (Fränk. Samml.), imo hydrops solo *succo* dispulsus fuisse fertur (BONAFAS;) quin etiam cum sero *lactis* mistus, vel decoctus, insignis efficaciam fuit in ictero (v. SWIFTEN.) Non minoris aestimatur in foeditatibus cutis decoctura *herbae* et *radicis* copiosius ingesta, sic in psora, herpetibus etc.; *succus* vero ejusdem et *Fumariae off.*, leprosa exanthemata, aliis incassum tentatis, sustulit (LEIDENFROST.) *Unguentum e radice,* et *adipe suilla depurata* in scrofulis deprædicatur (MALOVIN.) *Folia* ineunte vere pullulantia, in primis intima, Petropoli passim et alibi in Russia, acetarii genus constituant; *radix* vero ustulata in vicem *Coffea*, per modum infusi, ab egenis sumitur. *Herba* recens concisa, et cum furfure, aut farina, mixta, sospitat anserculos (NIEMANN.)

D. *Radix* sescuncia in aquae tribus libris decoquitur et colatura libræ quotidie exhibetur, vel *herbae* et *radicis* recentis uncia cum libra *jusculi* ad uncias octo decoquitur. *Succus* recentis unciae duæ cum *jusculo* exhibentur per plures septimanas, et quidem matutino tempore.

V. Extractum Taraxaci; Mixture — ; — — composita; Species resolventes.

LEPIDIUM RUDERALE.

Жеруха дикая; Клоповникъ; Собачьи пометки.

Planta fere ubique obvia; præsertim vero in ruderatis, et ad vias. Cl. Tetradymania. O. Siliculosæ. O. N. Siliquosæ L. Cruciferæ J. Annua; Usualis est:

Herba: foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis, linea-

ribus, integerrimis, floribus diandris apetalis, (vix conspicuis, flavis.) Mense Junio, aut ineunte Julio colligenda.

Q. Principio volatili, aethereo, acri, extractivo gummeo-resino-so, sulphureoque nititur. Odor herbæ recentis gravis, fœtens, nasturcinus; sapor pungens, acris, amaricans, ingratus.

V. Diapnoica, pectoralis, ut pleræque Cruciferae, diuretica, potissimum in nervos abdominales, reproductionis sphæram, systema vasorum, partiumque irritabilium agit.

U. In dialeipyris, et antiquitus usualis fuisse videtur, et nunc a Ruthenis ruricolis, a quibus etiam nomen herbæ le-xipretæ (лихорадочная трава) sortita est, exhibetur, quæ virtus ejusdem rationalium etiam Medicorum ill. D. RÜHL, RITTMEISTERI, TRINII, experientia, satis superque, prolatis casibus, comprobata est. Laudatur etiam in scorbuto, myodynia rheumatica, catarrho chronicō, tussi, (quin ipsa convulsiva,) hydropisi, anasarca, morbis cutaneis, ut impetigine etc. In ulceribus inveteratis extremitatum inferiorum, haud secus ac scrofulosis, scorbuticis. Masticatio seminis in glossoplegia, (paralysi linguæ,) commendatur.

D. Uncia herbae cum aquaæ unciis sedecim, in vase bene tecto, ad remanentiam unciarum octo decocta, et per linteum colata, cochleari majore, alternis horis, propinatur, vel eadem decoctura extrinsecus ad lavandum frigide, vel tepide, mane vel vesperi, in morbis cutaneis, aut in ulceribus, compressis, tepide madefactis, secunda quaque hora, adhibetur. Pulveris forma inepta, præparatione enim volatiles partes avolant, materiaque fibrosa ventriculo aliena. Herba recens leniter siccata, minutim concisa, si in ampullis vitreis, probe obturatis, teneatur, conservari potest etiam in longum tempus, saccharo conspersa.

V. Infuso-decoctura Lepidii ruderalis.

L I C H E N P A R I E T I N U S.

PARMELIA PARIETINA. (Achar. meth.)

Лишайникъ стѣнныій.

Planta in muris, lateribus bene coctis, saxis, tectis, et

tegulis ædium, quum ligneis, tum lapideis, multisque arboribus,
ubique crescens. Cl. Cryptog. O. Lichenes. O. N. Algæ
L. et J.

Cavendum est, ne cum LICHENE CANDELARI, PARME-
LIA MURORUM et LECIDEA GEOGRAPHICA, commutetur,
quibus pariter color flavus; desunt autem vires medicæ.

Q. Odoris specifice mucidi, haud prorsus ingrati, in corti-
cem Cinchonae off. rubrum incidentis; saporis amaricantis; sub-
adstringentis.

V. Roborans, reproductionis sphæram, et sistema irritabile
stimulans.

U. In dialeipyris præcipue (SANDER, SPRENGEL,) typho-
dibus, hydrope, anasarca, chlorosi, hæmorrhæis, phthisi pi-
tuitosa, blennorrhœa, scrofulis, pertussi, (stadio decrescentia,)
gangræna, (ZADIG) commendatur. Extrinsecus ad corrigenda
ulcera satis efficax fuit hic *Lichen*, vel *aqua coctus*, vel *Alco-
hole diluto*, (*Spiritu Vini*,) extractus, (BURDACH.)

D. Forma pulvris interne ad drachmas aliquot.

L I N U M U S I T A T I S S I M U M.

Ленъ обыкновенный.

Planta, Europæ australis, spontanea, alibi in agris seritur.
Cl. Pentandr. O. Pentagyn. O. N. Gruinales L. Caryophyl-
leæ J. Annua. Usualia sunt:

S E M I N A, ovata, oblonga, compressa, plana, glabra, fu-
sca, nitida, margine acuta. Aquæ supernatantia, vetusta, si-
tum redolentia, improbantur.

Q. *Mucilaginosa*, *oleosa* ($\frac{1}{3}$ *mucilaginis* partem, et $\frac{2}{3}$ *olei*
continent.) Semina, saporis ingrate dulcis, mucilaginosi, unctuo-
si, inodora.

V. Emolliens, demulcens, partes in vivo homine ab irri-
tamento defendens, ideoque medela mechanica. Per se vir-

tutibus medicis nonnisi debilioribus gaudet, et istae fere omnes a dilutione dependent.

U. Decoctruræ, vel infusi (cum *saccharinis* et *acidulis* e. g. *succo Citri* et *Saccharo* ad libitum:) in nephritide, pneumonitide, catarho, tussi, diarrhœa, dysenteria, dysuria, blennorrhagia; externe forma *clysteris*: in tenesmo. *Farina apta*, forma *cataplasmatiſ*, ad maturandos abscessus, furunculos, in cynanche, phlegmone. *Mucilago* quoque cum *aqua fervefacta*, vel *infusione*, conquassatione, vel *coctione* elicetur perfacile, quæ efficacia sua vix cedit, *mucilagini Althææ off.*, *seminum Plantaginis Psyllii*, *Pyri Cydoniacæ*, et *gummi Acaciae v.*, meritoque his in militari præxi, substituitur.

V. Cataplasma emolliens; Infusum Lini; Mucilago —; Oleum —; — sulphuratum.

L Y C O P O D I U M C L A V A T U M.

Плаунъ булавовидной; Волконожіе булавистое;
Колпунникъ.

In sylvis abiegnis, item in turfaceis ericetis, in viis arenosis, pereonans. *Cl. Cryptog. O. Musci L. Stachyopterides W.*, *O. N. Musci L. et J. Usualia sunt:*

SEMINA, seu *pulvis* tenuissimus, æquabilis, subflavus, cibratione facta, vasis probe clausis, servandus. Is continetur in reniformibus capsulis plurium *Lycopodii specierum*, quem omnino vera *semina* constituere, etiamsi *pollini* (antherarum forma similis sit et mixtione,) experimentis **BROTERI** et **WILLDENOWII**, qui e *pulvere* sato plantulas educarunt, probatum est.

Q. Inodora, insipida, misturæ humidi pugnacia, inspersa flammæ, (candelæ, vel alias ardoris corporis,) cum fulguratione et strepitu accenduntur. Constant substantia peculiari, quam **BUCHHOLZIUS** *albumini* finitam, **CADETUS** vero *cerae* congruam pronunciavit; *olei* autem *pinguis*, *materiae saccharinae* et *extracti mucosi* haud parva iisdem inest copia.

V. Exsiccans; absorbens, (extrinsecus admotorum,) imo et liuretica.

U. Interne in ischuria infantum, et lithialgia mitiganda commendatur (HUFELAND.) Externe: in tenellorum infantum interrigine, si inspergantur sicca, efficacissima sunt (ROSENSTEIN,) simplex inspersio per flocculum gossypii sufficit ad excoriacionem arcendam, eamque amplam, profundamque superandam (MURRAY.) In crusta lactea, tinea capitis, (manantibus,) aliisque serpiginosis ulceribus madidis, (HELVICH,) haud secus ac in trichomate, herpete syphilitico unguenta fiunt ex hoc pulvere, oxydo Zinci albo, Hydrargyro; imo etiam in erysipelate profuit. Interne exhibetur pulvis cum syrupo Althaeæ in emulsione, vel forma misturae: ex seminibus Lycopodii, Subcarbonatis Magnesiae, aquæ Menthae, syrapi opiatii, singulorum drachmis duabus, et Acidi acetici diluti, s. q., quæ omni bihorio, cochleatim, propinata, ad ischuriam infantum efficacissima est: LÖFFLER. (Die newest. prant. Erfahr. 1. Bd. 1803. p 76.) Vulgare est pro catapotis conspergendi, ne cohaerent mutuo, et quo sapor ingratus paulisper celetur.

L Y T T A V E S I C A T O R I A. FABR.

MELOË VESICATORIUS L.; CANTHARIS PH. ROSS.

Шпанская муха.

In Rutheniae Australioribus provinciis abundat; generatim vero regionum calidiorum Europæ, ut Hispaniae, Galliae, et Siciliæ incola. Quandoque et incertis fere temporibus, in Russia et tota propemodum Europa æstivis mensibus in primis Fraxino, Platano, Salice, Sambuco, Ligastro vulgari, Populo alba, Syringa vulgari et Lonicera tatarica delectatur, easque gregarie depascit. Cl. Insecta; O. Coleoptera.

Insectum, oblongum, ponderis granorum fere trium, es-

loris ex aureo viridis, lucentis, thorace teretiusculo, antennis filiformibus, articulatis. Insecta hæc mense Junio et Julio, concussis, ante lucis ortum, arboribus, supra extensum linteum, decidunt, atque ope *vaporum* ardantis *Sulphuris* vel *Aceti*, vel per immersionem in hoc, vel *aquam* fervidam, suffocantur, aut in furno necantur et tum leviter siccata, in officinis vulgo sub nomine *Cantharidum* veniunt. Minora longitudinis octo circiter linearum, duo vel tria modo grana, ponderantia, *integra*, *Ptyno Fure*, non corrosa, et recentia, merito præferuntur; diu autem conservata in *pulverem* fatiscunt, minus efficacem. *Caput* eorundem, *pedes* et *alae*, minoris pariter sunt efficiacæ, quam corporis truncus, adeoque separantur.

Q. *Odoris* fœtidi peculiaris, virosi, quasi, vel illi *Conii m.* consimilis; *saporis* picei levis, dein acris et corrosivi. Vis *Lyttarum* medicamentosa *Alcohol*e tota extrahitur, ea enim in resina residet; minime vero *aqua*. Destillatio sicca erogat liquorem *empyreumatico-ammoniacalem*, *oleum empyreumaticum* et *Carbonatem Ammoniae*, relicto *carbone* fatuo. BEAUPOLIUS extraxit ex *Lyttis* materiam nigram, sola *aqua* solubilem, maxime deleteriam, pinguem autem et viridem, solo *Aethere* et *Alcohol*e, evelendam (ALIBERT.)

V. *Lytta vesicatoria* parti corporis molli admota, vasa hujus et nervos irritat, eorumque actionem intendit, inde rubor, dolor, tumor, affluxus seri, quod dein sub epidermide collectum, vesicam ad tollit. Similia (imo enteritis atque gangræna) in tubo intestinali exoriuntur, ubi *Lyttæ vesicatoriae*, majoribus æquo præbiis, porrigitur. Refractiori dosi, in totum systema vasculosum agunt, excitantque motus febiles inflammatorios, pulsu pleno, duro, calore aucto, lingua sicca, siti vehementi, nausea, vomitu, diarrœa, torminibus, dolore artuum, vertigine et asphyxia interdum stipatos; præsertim vero agunt in sistema uropoëticum micturiendique necessitatem, inducunt, sæpe dysuria, stranguriam, hæmaturiam, ischuriam et priapismum, quæ mala haud raro etiam, sub usu externo, urgent, ita, ut verosi-

mile sit, partem earum aliquam resorberi et ad hæcce organa transferri.

U. Interne *Lyta vesicatoria* adhibetur, dum stimulum organismi animali neuroblacia laboranti subdere e re est, sic in paralysi vis ejus enitet et in primis organorum, in quæ vim suam potissimum exserit, ut in renes et urocystidem, sic in ischuria cystica ex paralysi, vel statu detrusoris paretico, in enuresi ex paralysi colli sphincteris, in diabete, imo in haematuria asthenica, et ob consensum organorum dictorum cum obscoenis partibus, in blennorrhœa (*Glect*) et leucorrhœa refractariola, in catameniorum, ex neuroblacia, suppressione, (cum *Tinctura Aloës* (*AD AIR;*) pro aphrodisiaco tamen, tantum abest, ut haberi possit, ut potius, hoc scopo sumta, vix impune feratur. Hydrophobam rabiem eadem coerceri **VERLHOFFIUS**, magnæ olim existimationis vir, adseverat. Formula, quæ ad eum refertur, habet: granum *Lyttæ vesicatoriae*, sesquigranum *Submuriatis Hydrargyri*, et decem *Camphorae* grana, gummi *Astragali Tragacanthæ*, sufficienti quantitate, excepta, et in æquales pilulas divisa. Hoc fine Hungari *Lyttas vesicatorias* in *Aceto*; Poloni vero in *melle* totas conservant, ut demorsis a cane rabido hominibus et pecori propinare illico possint. In pertussi (**SUTTON, CLIFF, BURTON,**) tutissime, nonnisi sub declinationem, idest, ultimo stadio, arbitratu meo, convenit. An expectorationis causa, ut **CHALMERS** (in peripneumonia) suasor est, exhiberi queat, dubito. Fœditatibus cutis a quibusdam cum successu obposita, ut herpetibus, lepræ etc., (**MEAD, BRISBANE.**) *Tincturam Lyttæ* adversus herpetes efficaciorem esse **SIMMONS** testatur. Nec defuerunt, qui in ipsis malignis, vulgo putridis nervosisque febribus, uti etiam in hydropisi, multis eandem encomiis deprædicarent. Frequentior est externus *Lyttæ vesicatoriae* usus, præcipue forma *emplastri s. d. vesicatorii* et *tincturæ*. Rubedo, accumulatio seri sub epidermide, sunt omnino sequela topicæ irritationis; hæc tamen irritatio, mox per totum extenditur organismum et sic constituit efficax remedium ad intendendam: 1°, energiam totius systematis nervosi, e. g.

in typho, fractam, ubi status paralyticus, soporosus, apoplecticus, debilitas magna etc., quo in casu *emplastrum* capiti, vel dorso admovendum est, vel, pro re nata, pectori, lateri interno femoris, et erythematem producto, locus, pro ratione necessitatis, mutatur. *Tinctura* etiam non male spinæ dorsi, vel et aliis partibus, corporis inficatur. 2°, Ad organon, vel viscus quoddam torpens singillatim excitandum: in cerebri commotione (**D E S A U L T,**) sopore, lethargo, apoplexia nervosa etc., capiti vel hunchæ; in amaurosi fronti; in cophosi ex nervorum paresi pone aures; in glossoplegia et extremitatum superiorum paralysi collo; in paralysi urocystidis extremitatumque inferiorum ossi sacro; vel denique lateri interno femorum *emplastrum* superdatur, vel loca hæc aliquoties de die *tinctura* probe perflicantur. In genere notandum, quod his in casibus proprius ad partem laborantem; respiciendo tamen ortum et decursum nervorum, admovendum sit irritans. Ubi exanthema aliquod febrile, v. g. variolæ, morbilli, purpura vel scarlatina, ob fatiscentiam virium, vel non rite formatur et repletur, vel subito retrogreditur, utilem hæcce remedia cuti stimulum subdunt; hoc ipsum valet quoque de chronicis malis, ut de arthrodynia, psora etc., quæ retrograda in pristinam sedem revocari expedit. A neotericis cum optimo successu gangrænæ superimpositum fuit *emplastrum Lyttæ*, cui nempe limites præstituit, emortuque separationi favet. 3°, Stimulum contrarium producendo et serosa evacuatione topice debilitando ataxiis variis, (systematis nervosi abnormibus actionibus,) obponitur. In spasmis et convulsionibus, vel parti affectæ, aut organo laboranti et viciniæ ejus, vel spinæ dorsi *emplastrum Lyttæ* admovetur. Non semel profuit in epilepsia, ubi capiti, vel parti, qua aura epileptica surgit; in tetano, ubi inter humeros; porro in trismo, hysteris affectionibus, globulo hysterico, ubi regioni ventriculi adPLICatur. Non minus in asthmate, dysphagia, vomitu, enterodynæ spastica, imo pertussi et hydrophoba rabie, quæ occasione interni usus jam allegavimus. Dolores fixi a spasmis, vel ab irritabilitate nimia

pendentes, optime *emplastro Lyttæ* tolluntur, in odontalgia ex adaucta morbose sensibilitate juvat interdum ipsis gingivis *tincturam* inficcare, vel tangere illas digito, quo prius *Lyttæ vesicatoria* fuit contrita. 4°, Dum antagonistice agendo, morbosam actionem diminuit, et stimulum quasi derivat, multum præstat in inflammationibus; quia tamen non aliter, quam stimulando agit, non nisi in asthenicis juvat; in sthenicis vero, fracta duntaxat congruis remedii vi inflammationis, convenit, quod nosse non est alienum. His sub conditionibus conductit: in angina catarrhalis, membranacea et maligna, catarrhis, pneumoniis, pleuritide, (præsertim in rheumatica, vel spuria,) enteritide et hepatitide, *emplastrum* nempe, quo fieri potest, propinquius, ad organon adfectum, superdatur. In ophthalmiis chronicis, ubi sensibilitas magna, vel, præmissis præmittendis, etiam in acutis, præcipue catarrhalibus et rheumaticis, ad tempora vel pone aures, vel ad nucham applicatur; hic præstat interdum s. d. *emplastrum Lyttæ perpetuum*. In arthrodynia et myodynæ rheumatica ad loca, ubi nervi adfectæ partis prope subter cutem decurrunt, v. g. in ischialgia, non ad coxas, sed, (secundum COTUNNI,) ad decursum nervi ischiatici in femore; hoc in casu *tinctura* saepe aptior. Solebant etiam quidam laborantibus, variolis, ut tueantur faciem atque oculos, suris et nuchæ, admovere *vesicatorium*. Scopo derivandi ad varia organa sub statu anarrhopiæ non inepta est *Lyttæ vesicatoria*, sic in cæphalea, deliriis, mania etc., ex congestione ad caput, in hæmoptysi ex vasorum pulmonalium impotentia, sanguinis affluxui resistendi ergo, imo interdum secretionem morbosam moderando phthisi molimentum præstat. In dysenteria largum *Lyttæ emplastrum*, abdomini admotum, brevi interdum tempore tormina mitigat, citamque alvum comprimit. Cl. PAULITZKY in dysenteria idem femoribus applicare solebat. 5°, Dum *Lyttæ vesicatoria* vasorum resorbentium actionem intendit, adhibetur quoque in quibusdam hydropiseos refractariolis speciebus, præsertim dum simul interne parvis dosibus porrecta, lotii secretionem promovet. In hydrocephalo in-

santum, tum interno, quum externo, nuchæ, occipiti, imo, in primo, fontanellis admotum *emplastrum*, inter primaria est remedia (ODIER.) Caveatur tamen ab eo in hydrorachitide, ubi per facile gangrænam inducit. Multum sæpe levat in hydrothorace; in anasarca tamen eo in casu modo utilem esse puto, ubi ab exanthemate retropulso illa exorta, eaque recens est, hic nonnisi ad rubedinem agat *emplastrum*, alias sequentur ulcera maligna; ultimo autem stadio, colliquativo vide-licet, tantum abest, ut prosit, ut potius mortem sit acceleratum. Tumores albos, nondum inveteratos, egregie *vesicatoria* profligasse experiundo didicimus. Metastasibus variis hæcce *emplastræ* apta sunt, et resorptionem depositæ materiei acce-lerando, et activitatem in organo, idiopathice laborante, inten-dendo, et sic naturalem secretionem restituendo, sic, v. g. in metastasibus lacteis dolenti parti superdatur. 6°, Externe ad-hibita, *principio acri*, peculiariter agendo, in fœditatibus cutis utilitatem promittit, sic in herpete, lepra etc.; ubi interne quoque laudatur. Cl. BLOCH ex neotericis herpetem, vesicam, (ipso in loco, quem obsedit,) adtollendo, sustulit, et ortum hinc ulcus suppuratione persanavit. Sic cl. EVERS herpetem per to-tum corpus serpentem curavit. Ulcerum inveteratorum suppu-ratio *Lyta vesicatoria* amelioratur; adhibetur quoque interdum, etsi minus apte, ad destruendas varias excrescentias: nævos maternos, verrucas, condylomata, sic et ad extirpandas super-stites membranas post excisionem tumorum cysticorum [etc., ad separandas callositates in fistulis, forma setacei; interdum et pro cauterisatione, fonticulos instituendo, ad insitionem va-riolarum etc.; hic tamen culter præferri meretur.

D. Perraro in *pulvere* datur; si tamen danda est, initium fiat a sexta grani parte ad dimidium, dein ad granum et gradatim ad maximum gradum granorum quinque perveniendum; miscen-da vero cum *Saccharo*, ac præscripta dosis, vicibus repetitis, suscipienda. In *pilularum* forma a gr. $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{2}$ et granum. Fre-quentissime in *tinctura* exhibetur: a quinque ad quindecim guttas, idque cum *emulsione*, vel *aqua*, sensim adscendendo. *Emulsio*,

quæ ad **HEDVIGIUM** refertur, ex *Lyttae v.* drachma dimidia vel integra, nucleorum *Amygdali communis* uncia, *Sacchari* semuncia et aquæ *tepidæ* unciis decem conficitur, atque omni altera vel tertia hora ad cochlear majus porrigitur. Sub administratione ejusdem *decoctiones mucilaginosæ*, *ptisanariæ* etc., non sunt aliena. Etsi ad diminuendam *Lyttae v.* acritatem, additionem *Camphoræ* quidam suadent, ut tutius administretur; nihil tamen secius, magna cura cavendum, ne malos effectus pariat, qui tamen, ubi præpostero consilio evenerint, reparari possunt, (si vomificio non est amplius locus,) *demulcentibus potionibus*, seu illæ *decoctiones* fuerint, seu *emulsiones*, vel *lactis*, vel *olei*, vel, ut quidam volunt, *camphorata emulsione*. Non minus commendata fuerunt varia additamenta ad *emplastrum Lyttae*, eum in finem, ut dicta incommoda præcaveantur, quæ interdum etiam sub *emplastri* usu exoriuntur, sic **HOULSTON Opium**, **SELLA balsamum Myroxili peruiferi** (*B. Peruvianum Ph. Ross.*), **FULLER acidum sulphuricum** vel *nitricum*; alii iterum *Camphoram* proponunt; scire tamen licet, omne id, quod noxios avertet effectus, salubres etiam remedii virtutes constringere. Simplex *emplastrum* exinde adcommodatissimum est; sunt modo, id adhibentibus, eadem regulæ, quæ sub usu interno commendantur, observandæ.

V. *Emplastrum Lyttae; Tinctura — .*

M A N G A N U M.

MAGNESIUM OXYDATUM NATIVUM Ph. Bor.

MAGNESIA NIGRA Ph. Ross.

Марганецъ.

Metallum hoc plerumque invenitur ochraceum cum *Oxygenio* junctum, gryseum, in metallifodinis Nertschinscensibus, Kolivano-Voskresenscensibus, Aecatherinopolitanis, et Olonezensibus; sed neutiquam in tanta copia, ut pro usu, lege artis, depromi queat, adfertur proinde e Thuringia etc.; Rubrum *Carbonio* conjunctum (Орлецъ) reperitur in Uralensibus montibus; terris autem et Ferro, ubique fere.

Q. *Manganum* est metallum album, in gryseum vergens, qua fractum est, splendens, granulosum, textura radiatum, difficulter fundendum, inodorum, insipidum; *aëri* tamen expositum, *odorem* peculiarem *adipi* fœtenti haud absimilem, præ se ferens, *nitoreque* suo orbatum, illico in albido-gryseum transiens *protoxydum*, quod adtracta majori ex atmosphæra *oxygenis* copia, fit fusco-nigrum *oxydum*; maxima vero sistit, atrum. Hac ratione magna cum quantitate *gasis oxygenii* unitum (ex unciis sedecim *Oxydi Mangani nigri*, additis totidem *Acidi sulphurici*, *gasis oxygenii* pollicum cubicorum circiter 3384 elici posse perhibentur;) hinc ad parandum *gas oxygenium* inservire potest. *Oxyda*, quæ cum *acidis* format, plus minusve amara sunt & acerbiuscula.

U. De efficacia ejusdem in variis morbis **KAPPUS**, haud ignobilis auctor, scripsit, probantibus æque et aliis ejus asserta, Medentibus, præsertim Francogallis. Laudatur in fœditatibus cutis: psora, herpetibus, in ulceribus canceraticis. **GRILLIUS** primus observavit opifices in fodinis *Mangani*, ab his immunes fieri, suasorque exstitit, ut *Oxydulum Mangani album*, cum tripla *suillæ adipis* quantitate in *unguenti* formam redactum, adhibetur. Syphilidi obpositum est a **KAPPIO** in variis ejusdem formis, put: bubonibus, ulceribus etc., salutaris hic effectus, (ni me animus fallit,) e perfaciili *oxygenis* evolutione exponendus esse videtur. In affectionibus etiam scorbuticis, ulceribus oris, gingivarum, sanguinem fundentium, viatio, teste laudato viro, profuit, haud secus ac *Oxydum Mangani nigrum*, in eo, (secundum **ODIERUM**,) dyspepsiæ statu, qui cum irritabilitate nimia conjunctus est. **D. BRERA** chlorosi idem cum successu obposuit. Præterea magni fit idem, quod ex eo *gas oxygenium* perfacile elici queat, cuius in asphycticis morbis, usus, ita etiam in paralysi extremarum partium inferiorum, scrofula, difficile respiratione, ex defectu *gasis oxygenii*, ut in valetudinariis, aut confertis militum contuberniis, ubi *aëra* corrumpi notum est, cumprimis emicat. Formæ, quibus exhibetur, sunt: *Acetas Mangani*, (*aqua destillata* dilutus in

scorbuticis ulceribus, oris ambitum infestantibus, si os eo collueretur, valens;) idem et *Oxydum Mangani album e Muriate Mangani*, ope *Potassae*, præcipitata, ad grana pauca, ingesta, in foeditatibus cutis et syphilide laudantur. *Phosphas Mangani e Muriate ejusdem*, ope *Phosphatis Sodaæ* præcipitatus, utilissimus censemur in iisdem morbis, exhibito semiscrupulo. *Oxydum Mangani nigrum*, (in forma *unguenti*: e sex *Oxydi* et sedecim *adipis suillæ* partibus, coacti,) in morbis cutaneis et ulceribus laudatur.

V. *Gas oxygenium; Vapores Acidi oxymuriatici.*

M A R R U B I U M V U L G A R E.

M A R R U B I U M A L B U M.

Шандра бѣлая.

Planta in agris, ruderibus conspersis, frequens, in hortis medicis culta. *Cf. Didynam. O. Gymnosperm. O. N. Verticillatæ L. Labiatæ J. Perennis. Usualis est:*

H E R B A, foliis subrotundo-ovatis, dentatis, rugoso-venosis, hirsutis, ex viridi-albicantibus.

Q. Ab *extractivo amaro, fœculaque* peculiari, repetenda. *Herba* recens *odorem* habet balsamico-acidulum; *saporem* subamarum, subsalsum ingratum.

V. Tonica; pituitam præcipue pulmonum movens.}

U. Antiquissimæ sunt laudes *Marrubii* in tabe pulmonum (**C E L S U S**,) *succo cum melle* in eadem dato, **T R A L L I A N U S** adquiescit, quibus præconiis et cel. **S P R E N G E L I U S** adsentitur, ad propriam provocans experientiam. Pituitam pectus gravantem, et tussim asthmake producentem, sœpe, (haud sine juncto pulmonum infarctu) resolvit, et screatu eliminat (**D I O S C O R I D E S**;) minime proinde mirum, et in asthmate pituitoso suppetias tuisse, selectu præcipue facto *pulveris* tenerimorum *surculorum* apicum, qui potentiores existimantur (**L A N G E**.) Innumeræ **B O R E L L U S** experientias citat, depræ-

dicens *infusum summitatum* ad menstrua provocanda et chlorosin virginum tollendam. Sialorrhœa, quæ ex *Hydrargyro*, ante administrato, ultra annum, in juvene syphilide infecto, perrexerat, *infuso* brevi sublata est (*LINNAEUS*).

D. *Pulveris herbae* a semidrachma ad drachmam. *Infusum* quoque valet. *Succus recens expressus* cochleatim, (vel a semuncia ad sescunciam) datur.

V. Extractum Marrubii v.

M A T R I C A R I A C H A M O M I L L A

C H A M O M I L L A V U L G A R I S. Ph. Ross.

Ромашка обыкновенная.

Planta in arvis, ruderatis, et ad vias frequentissima, receptaculis nudis, conicis, radiis patentibus deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis æqualibus, margine dilatatis. *Cl. Syngenes. O. superflua. O. N. compos. radiatæ L. Corymbiferæ J. Annua. Usuales sunt :*

FLORES, calyce plano, imbricato; squamis margine scariosis, obtusiusculis, receptaculo nudo, cylindraceo, conico; pappo nullo. **ANTHEMIS ARVENTIS**;—**COTULA**; **CHRYSANTHEMUM INODORUM**, et—**LEUCANTHEMUM** facile cum hac permuntantur. Ab *Anthemide arvensi*, cui flores inodori, recept. paleaceum: paleis lanceolatis, acutis, connatis, exsertis; caule foliisque bipinnatifidis, subpilosis, et ab — *Cotula*, floribus majoribus, ingratioris, paleis setaceis, foliis bipinnatifidis glabriusculis, distinguenda. A *Chrysanthemo Leucanthemo*, foliis amplexicaulibus, lanceolatis, basi inciso-dentatis, radicalibus obovatis petiolatis, perfecte differt; nec non a *Chrysanthemo inodoro*, foliis capillaceo multifidis, flor. quam in 1 et 2 majoribus, corona seminum integra.

Q. A pauco volatili oleo, principioque extractivo, amaro, dependens. *Odor florum* fragrans, non admodum gratus; *sapor amarus*.

V. Stimulans; sudorifera; antispasmodica; peptica. *Corticem Cinchonae officinalis*, sua contra putredinem vi, superare, cl. PRINGLE experimentis probare nititur. Blande agunt flores in nervos stomachi et intestinorum, quorum irregularem actionem tollunt, aequabilem distributionem vis sensiferæ restituunt.

U. Febribus intermittentibus, (pulvis datur ad semidrachmam cum melle, aut succo Sambuci melleo, ad dialeipyras curandas, maxime eas, quæ spasmis junctæ sunt, et obstructi-
bus, aut ubi *Cinchonae cortex* neutiquam toleratur) diarrhoe-
is, dysenteriis, (maxime, si radix *Glycyrrhizae*, aut gummi *Aca-
ciae verae* addatur,) dyspepsiæ, enterodynæ flatulentæ, poda-
græ, catarrhis inveteratis, gravibus utero mulieribus, puer-
peris, aut quibus menstrua tarda, dolorifica, vel lochia provo-
canda, multis modis, apta esse, censemur. Extrinsecus quoque,
recte admovetur, forma *balnei*, *clysteris*, *cataplasmati*s, *infusi*,
pulveris.

D. *Florum* a semidrachma ad duas per se in *infuso*, forma
foliorum Theae Boheæ. *Infusum*, plus æquo saturatum, producit
emesin, unde ad promovendum usum *emetorum* recte adhibe-
tur; frigidum, stomachicum est. Magnæ doses *Chamomillæ*
pulveratæ vitandæ sunt, cum facile ventriculum offendant,
vomitum, alvumque citam producant.

V. *Elaeosaccharum M. Chamomillæ*; *Extractum* — —; *Infu-
sum Chamomillæ kalinum*; *Oleum Chamomillæ*; — — *coctum*;
Species Chamomillæ compositæ.

MENTHA CRISP A.

Мята обыкновенная, или кудрявая.

Pl. Siewerica, cor: subæquali quadrifida; lacinia latiore,
emarginata. Stam. erectis, distantibus; colitur etiam in hortis.
Cl. Didynam. O. Gymnosp. O. N. Verticillatæ L. Labiatæ J.
Perennis. Usualia sunt:

FOLIA, cordata, inciso-dentata, undulata, sessilia, stamini-
bus corollam æquantibus. Folia *Menthæ sativæ* quandoque

substituuntur, quæ sunt ovata, acutiuscula, serrata; staminæ corollæ longiora, quo perfacile distinguuntur.

Q. Ab *oleo volatili* pendens, et *pauxillo Camphoræ*. *Odor* fragrans fortis, non admodum gratus; *sapor* aromaticus cum amaritie levi.

V. Stimulans; stomacho apta; resolvens; menagogæ; *lactis* secretionem minuens.

U. Inflationem levat, hinc hypochondriacis, hystericsque, ructus excitando, utilis, nec proinde immerito a *MARTIALI*, *ructatrix*, dicta. Enterodyniam quoque et nauseam ex eadem causa ortam, mitigat. *Extus* admota, dolores artuum a spasio; *Lactis* in mammis coagulum *vino* cocta, ecchymosin, tumoresque frigidos, discutit.

D. *Infusi* uncia ad libram *aquaæ*.

V. *Aqua* *Menthae crispaæ*; *Elaeosaccharum* ——; *Infusum* ——; *Oleum* ——; *Species aromaticæ*.

MENTHA PIPERITA.

Мята перечная, или Английская.

Pl. in locis humidis Angliæ spontanea; apud Ruthenos in hortis colitur. *Cl.* et *O.* præcedentis. *Perennis*. *Usualis* est:

H E R B A, fol. subovatis, glabriusculis, serratis, petiolatis; *spicis* obtusis, inferne interruptis. **S t a m i n .** corolla brevioribus, calyce basi glaberrimo. Ab incautis facile confunditur cum **M E N T H A V I R I D I**, cuius *folia* sunt lanceolata, sessilia, spica longior et exilior, *sapor* debilior. Item cum **M. SYLVESTRIS** — **A Q U A T I C A**, vel — **G E N T I L I**.

Q. Præstantis, a *volatili oleo* et *camphorino* derivanda. *Sapor* rem *piperis* instar, unde nomen sortita, acrem habet, fauces fervore quodam replens, insequente dein haud ingrato frigoris sensu. *Odor* ejus fragrans, subcamphoratus; recentis et *odor* et *sapor* debilior.

V. Stimulans; peptica; antispasmodica.

U. Adhibetur illa in variis nevrastheniæ formis; præsertim

autem officinam digestionis juvat, ideo vis ejus elucet in dyspepsia, inflatione, enterodynbia flatulenta, vomitu, diarrhoea, lienteria, in spasmis nominatim hypochondriacis, hysterics etc. *Herba cum vino, vel aqua decocta, forma sacculi, vel fomenti, ad roborandum ventriculum, in iisdem malis, admovetur.* Nec in myodynbia rheumatica et arthrodynbia, tam interne, quam extus, sua laude orbanda. In suppressis catamenis, chlorosi, leucorrhœa, hæmorrhagiis, recte additur congruis remediorum adminiculis. *Extrinsecus: sugillationibus, frigidis tumoribus, erysipelatosis inflammationibus, mammarum indurationibus apud puerperas, haud inepta.* Inter omnes *Menthae species, piperita, fortissima, ideo ob excalfacientem vim, haud sine circumspectione, adhibenda.*

D. Uncia ad libram aquae in infuso. *Aqua Menthae uncia ad duas. In pulvere grana decem ad duos scrupulos, sed rarius. Olei: gutta, (ad tres, quinque,) datur.*

V. *Aqua Menthae p.; Elaeosaccharum --; Infusum --;*
Oleum --; Species aromaticae.

MENTHA PULEGIUM.

Мята сердечная; Полъй; Блохогонка.

Europæ australis. Cal. Thymi. Fol. punctata. Bract. nullæ. Cl. et O. præcedentis. Perennis. Usualis est:

H E R B A: floribus verticillatis, incisis; cor. obtusis; foliis subovatis, pilosis; Stam. corolla brevioribus. *Permutatur cum MENTHA ARVENSIS, caule adscendente villoso, fol. ovatis, acutis, serratis; verticill. summis, congestis; stam: coroll. æquantiibus, distinguibili.*

Q. A volatili repetenda oleo, eadem ac *Menthae crispæ*; acrior tamen.

V. Eadem ac *Menthae crispæ.*

U. Spasmis durante menstruatione, et pertussi olim ab Anglis obponebatur, quem in finem, succum ejus, ad unum coquere commendavit BOYLE. *Decocitura ejusdem edulcata in rau-*

cedine; *infusum theaeforme* in asthmate laudatur, (СНОМЕЛ;) *infusum vero cum vino albo et limato Ferro factum*, pro certissimo et nunquam fallente emmenagogi habetur, (ХАЛЛЕР.)

V. *Aqua Menthae Pulegii; Elaeosaccharum --; Oleum --.*

M E N Y A N T H E S T R I F O L I A T A.

TRIFOLIUM FIBRINUM Ph. Ross.

Вахта трилистная; Трилистникъ водяной; Бобровникъ.

Pl. cor. hirsuta, stigmate bifido, caps. uniloculari, in paludibus frequenter obvia, Cl. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Rotaceæ L. Lysimachiæ J. Perennis. Usualia sunt:

FOLIA, cuncta radicalia, petiolata, ternata; foliolis ovatis, obtusis, utrinque glabris, venosis, margine repandis, bipinnatis, vel ultra, æqualibus, tenerioribus oblongis.

Q. Vim suam *principio extractivo amaro*, cuius magnam tenet copiam, debet. *Odoris nonnihil fatui; saporis amarulenti, substyptici, maxime post anthesin. Extrahitur principium prævalens, et aqua, et Alchohole; hoc tamen potentius, amaror evolvitur.*

V. Perseveranter stimulans; subadstringens; tonica; anthelmintica; diuretica; majori dosi emetica; alvum ciens.

U. In omnibus morbis, qui ab atonia ventriculi proveniunt, utile remedium, ita quidem, ut et remotiora ex hujus labe pullulantia vitia, medicetur, hinc hypochondriacis et hysterics, dyspepsia, inflatione, cardialgia, et id genus aliis, laborantibus, adcommodum. Cum aliis *amaris*, similis naturæ, remediis, communes exserens vires, dialeipyris etiam obponit; ita et chlorosi, leucophlegmatiæ, hydropisi, scorbuto. In Britannia *succus ejusdem recens expressus*, qui præter *principium extractivum, albumen* etiam continet, domesticum est apud ruricolas, in grassantibus fœdis primo vere exanthematibus scorbuticis. БУЧАНИО teste, utilius is adhibetur ad stases abdominales reserandas, cum *succis* aliarum *herbarum*, qui ad unciam vel duas, cum *vino*, ubi est, vel *elixirio* quopiam

stomachico propinuantur. Ulceribus scorbuticis præcipue purificandis inservit. In morbis quoque cuticularibus curandis, utta scabie etc. invaluit. Verminantibus puellis, opem tulisse certiori fide pronunciatur. Amaritudine sua, tum aquam, quum spirituosa tingit herba, ideoque potissimum, et fere nonnisi sub forma decocturae infusive adhibetur. Britanni dum *Zythum* parant, persæpe amaritiei gratia, loco se libræ *Humuli Lupuli*, unciam foliorum *Menyanthidis trifoliatae* dolio indunt. Extrinsecus per modum *clysteris*, КАМПФИИ suasu, subterdatur.

D. Infusi: uncia ad libram aquæ.

V. Cerevisia amara; Extractum amarum; — *Menyanthidis trifoliatae*.

M O S C H U S M O S C H I F E R U S.

К а б а р'я.

Animal in Tataria, Thibetho, Sinensi Imperio, et in Sieweria, præsertim in montibus habitans Dauricis. Cl. Mammalia. O. Bisulca, s. Ruminantia. (Pecora. L.) Usualis est:

Moschus, (Мекусъ, Кабардинская струя *) substantia peculiaris subunguina, fusco colore, granulata, in folliculo oblongo, magnitudine plerumque ovi columbini, puberis maris, secreta, binis exilibus orificiois prædicto, pone umbilicum ante præputium, sito, et proprie glandulas præputiales constitutente (FISCHER,) collecta, atque cum eodem simul siccata, granula nigricantia, in textu celluloso deposita, referens. *Moschus* e Sinensi Imperio importatus, in vesicis unica sutura, pilis albidis, distinctis et intus teneriori tunicula vestitis, et ferro candente ustus, nullo pæne cinere reliquo, evanidus, habetur optimus; nec *tunquinus*, e regno Thibetano adlatus, vesicam magnitudine ovi columbini, cute pilis radiatis, ex albo subfuscis obsita, instructam, replens, laude sua defraudandus. Corrumperit is, multis modis, et nonnunquam to-

*) Verbum cabardinum, (*Moschus cabardinus*) videtur esse ortum e corrupto vocabulo russico *Cabarga* (Кабарга) loco Moschi calarjini.

tus fere est artificialis, crux siccata coagulata et in frustula subacto, balsamo concreto *Styracis Benzoin*; pulvere *Plumbi*, *Ashphalto* etc., adulteratur, quæ ob odorem penetrantem heterogeneis a *Moscho* admisto communicatum, difficilia sunt detectu. Aromatariorum fibras carneas in *Moscho* demonstrantium experimenta, irrefragabili sunt indicio, *Moschum ex sanguine et carne animalis Moschiferi*, contritis, cum exigua genuini portione, remixtis, haud raro factitium esse. STÄLLER et REINICK *Moschum artificiale* a se paratum, naturali, ut sibi persuasum habent, æquiparabilem, commendant, quorum et nos, parsimoniae studiosi, vestigiis insistentes, artificiali nostro, locum in hac Pharmacopœia dedimus.

Q. Est egregia, quæ ab *oleo volatili* (GROS), partibus *unguinosis* et *resinosis* pendet. (Optimus *Moschus* in centenis partibus, 60 *glutinosae*, 30 *albuminosae Ammonia scatentis*, 9 partes *cereae extractivæ substantiae*, unicam partem *resinae* cum *oleo volatili* continet.) Odor *Moschi* proprius, ambrosiacus, intense fragrans, excitatissimus, caput tentans, in *resinosa matre* residens.

V. Excitans, præcipue systema nervosum, in centralia ejusdem puncta penetraliter agens, ita in encephalon, facultatem cogitandi, sensationem et motus voluntarios intendens, quin vasa hæmatophora nimis stimulet et excalciat; tardescenti etiam cutis functioni calcar subdens; antispasmodica.

U. *Moschus* prima inter medicamina et necessaria jure merito laudandus. In typho et plurimis in morbis cum debilitatis charactere, stimulo suo quasi æthereo penetraliter agit in systema nervosum, præsertim accendentibus tendinum subsultibus, singulu, febrilibus convulsionibus, sub micatibus arteriarum parvis, celeribus, duris, cute arescente, pallenteque, neque tamen vi vitali pessumdata. In pneumonide asthenica, præsertim ubi cetera remedia, ut radix *Polygalæ Senegae*, *Suboxydum Stibii hydro-sulphuratum*, et similia, neutiquam respondent, *Moschus*, in tempore et congrua dosi datus, juvat. In asthmate MILLARI, WICHMANNUS, tan-

quam specificum laudavit, in asthmate spastico arthritico cum gummiresina *Assae foetidae*, *Guajaci off.*, extracto *Valerianae officinalis*, fuit proficuus. In febribus asthenicis, exanthematicis, exanthematis asthenicis retrogradis, ex. gr. variolis (HUXHAM) vel vehementibus spasmis, mania atque horum retrocessione exortis, in convulsionibus variis sine febre (BERGER,) vel organi singularis, vel totius systematis, ut in epilepsia, risu sardonico (ROBAEL,) trismo infantum, tetano, catalepsi, pertussi (BERGER, JACOBI,) asthenicæ indolis. In ataxia hysterica, hydrocephalo, convulsionibus stipato, apoplexia asthenica, rabie hydrophoba, arthrodynia, paralysi rheumatica, etc. commendabatur. In gangræna externo et interno usu invaluit, in primis vero nervea, sic dicta, testante cl. WHYTT, cum Subcarbonate Ammoniae, vel Acido succinico crystallisato, vulgo Succini sale. Grassantibus Upsaliæ variolis admodum funestis, LINNAEUS Moschum collo liberorum suorum appendit, quo impetravit, ut a pestifero hoc malo, quod omnes e vicinia pueros abripuit, intacta permanserit soboles ejus (Amoenit. Acad.) Hanc beneficam ejus vim etiam D. ORITZ et WICHMANN experiundo confirmavere.

D. In febribus nervosis et putridis, sic dictis, in vehementibus spasmis et convulsionibus, in gangræna etc., quavis semihora 6. 8. 10 grana in substantia cum vino, vel in infuso aromatico, cl. HORN, tincturam cort. L. Cinnamomi, ut vehiculum maxime idoneum, commendat. Haec præbia sensim augentur adeo, ut spatio 24 horarum aliquot drachmæ exhiberi queant. Cl. GREGORY in nervosis affectionibus refractariolis ad semidrachmam propinavit. In convulsionibus, a tribus ad decem grana ill. L. B. VAN SWIETEN, propria praxi proficua, exhibuit. Pueris in typho cum variolis, morbillis, scarlatina etc., secunda quaque hora, vel semihora, pro mali ratione, 1. 2. 3 grana. Moschus exhibetur per se cum Saccharo, vel in aliis congruis vehiculis, vel alia coniunguntur cum eo stimulantia, ut Camphora, A. Serpentaria, Opium etc. Cum in pulvere datur, aptum est ejusdem connubium

cum *Valeriana* off., *Saccharo*, in forma pilularum, vel boli cum *Opio*, *gummiresina F.* *Assae foetidae*, per modum misturæ, quæ minus idonea, ope mucilaginis, *Sacchari*, *Aetheris sulphurici alcoholisati* teritur, atque cum *aqua* commiscetur.

V. *Tincura Moschi.*

M U R I A S A M M O N I A E.

Солекислый Амміакъ; Нашамырь.

Sal neutralis, ex *Acido Muriatico*, et *Ammonia constans*, vel *nutivus*, flavi seu albi coloris, ad crateres ignivomorum montium, ut Vesuvii, Solfataræ, prope Puteolos, igne subterraneo in glebas concretus, apud nos vero circa flumen Chatanga, qui mari septentrionali influit, et fl. Schylka in montibus Dauriæ reperitur; imo etiam in liberorum Calmucorum regione (MODEL) griseis efformatus crystallis, crescensque ad rupes, vel arte factus, tum ex Aegypto in placentalis solidis, rotundis, ubi sublimationis ope ex fuligine excrementorum, (LEMERY,) præcipue *Cameli* paratur, olim importatus, quum etiam e quibusdam australis Europæ regionibus, præsertim ex Germania, ubi ex partibus constitutivis, præcipitatione, sublimatione, et crystallisatione, componi solet, forma coni *saccharini* obvenit. Optimus habetur *aegyptiacus*; est etiam bonæ notæ *Amstelaedamensis*, *Brunswicensis* in Germania notissimus; in Russia etiam vix pejoris notæ in variis locis paratur.

Q. Est plerumque crystallis minutis, concretis, saporis salsi, in igne fortiori totus volatilis; in aëre haud deliquescens. Solutio ejus chartam cœruleam vix tingit. Adfusione solutionis *Subcarbonatis Potassae* et *Muriatis Barytae* haud turbatur. *Ferrum*, eidem adhærens, *infuso gallarum quernarum*, nigro; *Cuprum*, *Ammonia*, cœruleo colore, sales sulphurici, *Muriate Barytae*, sedimento, cognoscuntur.

V. *Ammonia liquida*; *Murias Ammoniae depuratus*.

M U R I A S S O D A E.

Солекислая сода; поваренная соль.

*Sal neuter, ex Acido muriatico et Soda constans, reperitur, vel in sicco statu, atque in montium plerumque visceribus latet, in quibus, lapicidinarum modo, cœditur, et tum *cædus sal* (vulgo *Sal Gemmae* Каменная соль, Ледянка) vocatur, qualis reperitur in Regno Galiciæ et Wladimiriae, (olim Russia rubra,) Wilitschkae & Bochniae. Aequo ac heic, uberrimus *cædus* proventus est in Hungaria et nominatim in Marmatia, (Comitatu Maramorossensi;) præcipua ejus fodina est in Rhönaszék. Dantur etiam vestigia ejus inter Carpathicos montes in pago carpato-russice Соль dicto Unghvarinensis Comitatus; apud nos vero similis in Kirgisorum desertis ad fluvium Illecum, item in Sieweria ad fluvios Wiluja, Kepterdei (qui in Wilujam influit.) Alia species e *marinis aquis* sponte provenit, spuma in extremis littoribus ad scopulos reicta, talis est, qui e lacubus Chersonesi tauricæ, Tanais, (præcipue Menits) e *marina aqua*, excoquitur, aut in Archangelopolitano Gubernio; in Kamtschatka etiam. Invenitur quoque sub nomine sedimenti, seu præcipitati salini spontanei (Самосадка) in fundo lacuum Eltonensis, Iderensis et lutulentii (Елтонское, Идерское и грязное озеро) aliorumque, inter Wolgam, Ural, Irtim, Obim, Jeniseumque, jacentium. Nec desideratur in Britannia, Hispania, Germania, (inter fontes hujus salinos eminent Lüneburgenses et Halenses,) Transylvania. *Salem marinum* et præcipue illum, qui prope littora in fossis paludosis evaporatione condensatur, adventitiis partibus, Sulphate Magnesiae, Muriate Calcariae, aliisque fœdari certum est. *Muriatem Calcariae* et *Magnesiae*, nec non Sulphatem ejusdem continentis ex aqua solutio, Subcarbonate Potassae liquido, turbatur, *Murias Sodaæ venalis*, si impurus est, omnino depurari debet pro usu medico, Methodus depurandi eum in secunda parte proponitur.*

V. Murias Sodaæ depuratus.

MYROXYLON PERUIFERUM.

Перуанникъ; Перувіанське бальзамное дерево.

Arbor pulcherrima in America meridionali, regno Peruviano, Brasilia, Terra firma, Mexico, habitans. Cl. Decandr. O. Monogyn. O. N. Lomentaceæ L. Leguminosæ J. Usuale est:

BALSAMUM MYROXYLI, (*vulgo B. peruvianum*, Перувіанской Бальсамъ) consistentiae *syrupi*, fuscum seu subnigrum, guttis diaphanis, *aquaæ* bullienti instillatum, una parte fundum petit, altera supernat. Verum exsiccati nequit, modo aliorum *balsamorum*, sed retinet suam *oleosam* naturam. *Nigrum*, de quo hic agitur, ex *foliis* *ramisque* *arboris* excoquitur; *album* vero, sponte e *cortice* *trunci* ac *ramorum* exsudans, nunquam sincerum ad nos adfertur; alia rara adhuc species, *siccum*, in *cucurbitis* venit, refertque *resinam luteam*, *balsamum concretum* *Styracis Benzoin* paene redolentem. Adulteratur *balsamo pineo-laricino* (quo in casu cum *Acido sulphurico* effervescit et supra *Ferrum* candens odorem *pineo-oleosum* (*terebinthinaceum*) spargit. Cum *oleis* etiam *expressis*, (et tum in *Alcoholæ* non est solubile,) cum *syrupo*, subsidente, et dulci sapore sese manifestante. Paratur quoque artificiale ex *oleis pinguibus*, *balsamo concreto* *Styracis Benzoin*, — *Liquidambar Styraciflue*, *Asphalto* etc.; quod tamen, cum sapore, tum odore, facile distinguitur.

Q. *Odor* est suaveolens, *Vanillæ aromaticæ*, similis, aut gratae benzoinus. *Sapor* calefaciens, acrulus, amaricans, *oleo volatili*, *resina* et *acido benzoico*, consistit.

V. Incitans; exæstuans, externo et interno usu, comprobata.

U. In phthisi pulmonali, ubi multa muci secretio est, diarrœis, dysenteriis, blennorrhœa, (puta, quæ a sola glandularum *LYTTRI* et *COWPERI* laxitate oritur), antiqui laudant; facilime tamen tussim et statum inflammatorium auget; in enterodynia vero plumbea a 20 ad 30 guttas ter de die in *Saccharo SYDENHAMUS* exhibuit; sed extrinsecus majorem promittit utilitatem, læsis tendinibus, vel nervis, dum leniter ca-

lefactum, vulneri instillatur, ulcera sordida depurat. In ulceribus viscerum, quum febris abest, et inflammatio, drachma hujus balsami, cum vitello ovi, additis extracto Cinchonae et melle rosato commendatur.

D. Guttæ sex ad triginta, sæpius de die, cum Vitello ovi, vel Saccharo.

M-Y R T U S P I M E N T A.

Миртъ пряный Индійскій.

Arborea, foliis alternis, Indiae occidentalis. Cl. Icosandr. O. Monogyn. O. N. Hesperideæ L. Myrti J. Usuales sunt:

БАССЖ, di, seu trispermæ, globosæ, magnitudine *Pisi sativi*, fuscae, rugosæ, (vulgo *Piper Iamaicense*, Ямайскій перець.) Permistæ fuerunt cum fructu *Menispermæ Cocculi*, (vulgo seminibus *Cocculi*,) quod nos circumspectos esse oportere docet.

Q. Odor fragrans, gratus; sapor aromaticus, ex oleo essentiali et resina consistit.

V. Stimulans; stomacho apta; excalfaciens.

U. Condimentum blandum ciborum. Aliis aromaticis, carioris pretii, ut nuci *Myristicae moschatae*, cortici *L. Cinnamomi*, gemmis floriferis *Eugeniae Caryophyllatae*, recte subrogatur in praxi militarium valetudinariorum.

D. Grana quinque ad scrupulum.

V. Aqua *Myrti Pimentæ*; Oleum myrtleum.

N I C O T I A N A Т А В А С У М.

Табакъ; Тютюнъ.

In America, perennis; annua vero apud nos, cultuque frequens; in Fennia ad 63° hinc inde seritur. Anno 1650 e Virginia Americæ in Europam adlata. Cl. Pentandria. O. Monogyn. O. N. Solanaceæ L. Solaneæ J. Usualia sunt:

FOLIA, lanceolato-ovata, sessilia, decurrentia, permiscentur cum foliis *Nicotiana macrophylla*, — *fruticosæ*, — *rusticæ*, — *paniculatae*, — *glutinosæ*, et aliis, virtute ei analogis, speciebus.

Q. Venenifica, ab essentiali acri oleo narcotico derivanda.

Odore gravi, peculiari, ingrato; sapore vero acri, nauseoso, conspicua. Optima est *Nicotiana Marylandica*, ad hanc vero bonitate accedunt *Virginica*, et *Kentuckyensis*; in Hungaria vero *Tolinensis*, *Quinqueccllesiensis*, *Muraközensis* et *Debröensis*.

V. Pro ratione dosis: narcotica; stimulans; errhina; sialoga-
ga; emetica; drastico-cathartica; diuretica; zooctona.

U. Forma *infusi*, *vini*, *tincturae*: in adfectionibus spasmodicis, asthenicis, enterodynus, pertussi, hydrope, dysuria (*caute adhibendo*,) auxilio fuisse perhibetur, idque, vel injecto *clyster*, vel *fumo*. In quibusdam asphyxiæ casibus, *clyster ex infuso* injectus profuisse fertur; *fumus* tamen submersis, et suffocatis alienus, (*secundum recentiora observata*,) merito ei *Gas oxygenium* subrogatur, utut idem, quippe qui, particulas plantæ odoras cum *oleo empyreumatico* tenet, stimulum impertitur privum, quo, per machinam in anum inflato, interanea adeo incitantur, ut volvulus ac stricturæ eorundem solvantur, hinc nisi inflammatio instet, in hernia etiam incarcerated adhiberi posse existimatur. Externe in psora, herpete, tinea, cum *aqua saponacea* et *pulverato carboni infusum Nicotianae Tabaci* recte conjungitur. Phthirias in caute adhibita propulsat. Eclampsiam infantum sub dentitione, cæteris in cassum adhibitis, clystere subterdato, curavit. Quam sit commoda strumis *Nicotiana*, EVERARTI, aliorumque experimentis, constat. *Fumus N. Tabaci* in pestilentia quavis suetum remedium. Alvum pertinaciter adstrictam *clyster tabacinus* solvit, nec minus foliorum drachmæ tres, *pulverisque radicis Rhei p.* duæ ex *aqua fontis* q. s. ad colaturam unciarum octo decoctæ, (*decoctura* quavis hora cochleatim propinata,) teste illustri RICHTERO, profuere. *Pulvis ejusdem*, ubi sternuta menta evocari expedit, efficax; insuefactis tamen eidem, irritus. Masticata odontalgiam sedant, *folia*; in ore vero retenta, classiariis adversus stomachacen præsidio sunt.

D. A duabus drachmis ad semunciam pro libra *aqua*, *vini*, vel *tincturae* guttæ triginta et ultra, in hydrope secunda qua-
que hora. *Infusum quoque herbae* ad unciam cum libra *aqua*,

additis *Alcoholis diluti unciis duabus; Fowler* in hydropisi laudat, ut guttæ 40 ad 100, adscendendo, propinarentur. Pro *clystere* drachma pro octo unciis aquae sumitur, major dōsis vix impune fertur teste cl. Richter et Lattao.

V. *Cataplasma tabacinum; Clyster —; Infusum Tabaci; —— vinosum.*

N I T R A S P O T A S S E.

NITRUM NATIVUM, L.

Селипрокислый попашь; селипра самородная.

Sal neuter, ex Acidō nitrico, et Potassa constans, fossilis veniens ex Asia, præcipue vero India orientali; apud nos autem ad Achtabam fuit etc. arteque paratur in nitrariis ubi cunque, præcipue in Russia meridionali in variis Guberniis ut Poltawensi, Czernigowiensi, Kijewensi, Ekaterinoslawiensi, dum substantiæ animalium simul et vegetabilium in putredinem abi-erunt, et nitrogenium evolvendo, quod sese cum oxygenio aëris conjungit, acidum nitricum dat, quod admista Calcaria ligatur, et dein addita Potassa separatur, ortusque hinc Nitras Potassae elixivatur, depuratur, et in crystallos cogitur.

Q. Natus sistit crystallos prismaticas hexangulares, apicibus pyramidalibus itidem hexagonis; sapore acri, subamaro, refrigerante. Inquinatus obvenit: *Muriate Potassae, Muriate Sodaæ et Nitrate Magnesiae.* Inquinatus *Sulphate Sodaæ*, amariorem præ se fert saporem, minusque frigerantem, carbonibus inspersus magis crepitat, quam detonat, aëre sicco fatiscit, et solutus *Muriate Barytae* turbatur. *Muriate Sodaæ, Potassae vel Calcariae*, admistus ex crepitatione super ignem et turbatione ex Solutione Nitratii Argenti cognoscitur. *Terrestria salia* decompositionem Subcarbonate Potassae liquido efficiendo, deteguntur. Ut usui medico, præcipue interno cedat, solvendus est, evaporandus, et iteratis vicibus crystallisandus. *Aqua solutus, a Magnesia et Calcaria modico caloris gradu, addita Potassa, purgatur.*

V. *Nitras Potassae depuratus.*

OLEA EUROPÆA.

Масличина Европейская; оливковое дерево.

*Arbor australis Europæ, (in Chersoneso taurica) Asiæ, inque Africa boreali, racemis axillaribus coarctatis, foliis lanceolatis integerrimis, sempervirens. Cl. Diandria. O. Monog. O. N. Se-
piariæ L. Jasmineæ J. Usualia sunt:*

F R U C T U S; (*Oliva;*) **O L E U M O L I V U M** (*Oleum Olivarum Ph. Ross.*)
 Оливковое масло, Олива) expressum e *drupis recentibus* fere maturis, et sollicite olivitatis tempore decerpatis, paratum, estque blandum, vel subflavum, pellucidum, non nimis unguinosum. Causa ejus oliveta instruuntur. Optimum, quod in oliviferis arvis meridionalis Galliæ et ditione Genevensi colligitur, et ex Italia præ-primis illud, quod a Lucca denominatur, pro usu interno, præferendum. Aestate rancescens, subviride, acre fit, eoque citius, quo calidiore loco et aëri expositum, reponitur. Ut illi aliisque expressis *oleis* albedinem concilient, rancoremque corrigant, olivitores et negociatores, nefario illa ausu in vasis *cupreis plumbeisque* planis per aliquod tempus digerunt, quo soluta parte *Plumbi*, inquinata, usui interno damnosa fiunt. Fraus detegitur eo, quod vitiatum sit magis decolor, dulcius et unguinosius, naturali. Si æqua *Aceti* destillati portio eidem addatur, atque conjunctim agitetur, separato autem *Aceto*, *Aqua hydrosulphurata acidula* adjiciatur, brunum vel nigrum sedimentum præcipitatur. Commiscetur præterea cum aliis *oleis* expressis, ut *oleo papaverœo*, (quod serius congelatur flammaque ardet minus læta) — *Lini* etc., quod, cum sapore, tum eo, quod intensius frigus ad id condensandum requiratur, dignoscitur. Bonum ad 36° therm. F., vel 2 R. congelascit.

Q. Oleosa; *saporis grati*, mollis; *odoris vix ullius*, continet 49 partes *carbonici*, 21 *hydrogenii*, et 29 *oxygenii*, si purum est.

V. Involvens; emolliens; alvum liquans; desoxydans; largiori copia, emetica; anthelmintica.

U. *Fructus salsugine*, seu *muriu conditus persæpe acetiarii forma*, stomacho roborando haud inepti, nec palato ingrati, estur;

hinc *embammata* etiam ingreditur. *Olei olivi* in dysenteria, tenesmo (in connubio *Opii* et *gummi Acaciae verae*) vel kalinorum rarius, in pneumonitide, nephritide, enterodynna saturnina, (reducendo *Plumbi Oxyda,*) enteritide, obstructionibus alvi pertinacibus, et id genus aliis, saepius respondet; **M A L A C A R N I U S** arthritidem vagam, ita curavit; ut alternis diebus aliquot uncias propinaret, quo lotium lateritium secessit, alvus est redditum liquida, et sudores moti; vermibus quoque officit. *Acrium* stomacho, vel interaneis incaute insertorum, vim noxiosam, (involvendo,) frangit. Extrinsicus calidum, corpori frictione admotum, donec sudor motus fuerit, siccitat, duritiae telae cellulose, obponitur. *Hydropisi* profligandæ, herniarum incarceratarum, et articulorum luxatorum repositioni, partui difficulti, sublevando, corporibus heterogeneis in gula hærentibus extrahendis, catheteri applicando, imo operationibus chirurgicis cultri ope peragendis, favet. Pestilentiam et febrem americanam flavam præpeddit, scilicet: inunctiones cum eo sub levi (in tota corporis superficie,) fricatu, institutæ, efficaces inventæ (**B A L D W I N.**) **G A R D A N E U S** quoque haud raro experiundo didicit, insignem talium frumentorum et illitionum efficaciam, quas mane vesperique, per aliquot hebdomades administratas, profecisse adseverat. Morsiunculas apum, vesparum, aliorumque insectorum, imo ictum ipsius viperæ mitigare, enervareque quidam Medici, perhibent. Adustis, vulneribus valde dolentibus, loco aliorum unguentorum, applicatur. *Oleo e seminibus Ricini communis*, dum sincerum, leviorisque pretii est, merito præferatur; *oleum vero Iuglandis r.,* (ex *nucleis expressum,*) *olivo* prorsus, æquiparari posse existimatur.

D. Vel ipsum *Oleum olivum* per se unciatim, et ultra, vel saepè sub forma *emulsionis* ad demuleendum, per unionem cum *aqua*, ope *mucilaginis gummi Acaciae verae*, cui saepè ad conciliandam gratiam, vel *Saccharum*, vel *mel*, vel *syrupus* quipiam additur, atque in dosi duarum drachmarum ad duas uncias adhibetur. *Oleum napinum*, — *Lini usitatissimi*, — *sesaminum* — *sinapinum*, virtutibus consimilibus gaudent,

alterum proinde pro altero, pro circumstantium rerum ratione, adhiberi potest; præferendo tamen id, quod pro fertilitate provinciæ, pretii fuerit levioris; postrema autem duo id pri-vum habent, quod etiam in vicem *olei Ricini communis* ubi-que pene adhiberi queant.

V. *Haustus saponaceus*; *Linimentum simplex*; *Oleum olivum*; *Un-guentum Olivi ceratum*, et varia *cerata*, *linimenta*, *unguentaque* in-greditur.

O R C H I S M O R I O.

O. MASCULA; — MILITARIS; — LATIFOLIA; — BIFOLIA.

Ящрышникъ; кокушкины слёзы.

Plantæ in Ruthenia et in variis Europæ partibus, in sylvis pratisque frequentes, corolla sua peculiari subtus longe calcarata a ceteris distinctæ. Cl. Gynandr. O. Diandr. O. N. Or-chideæ L. et J. Perennes. Usuales sunt:

Radices, (vulgo *radix Salab* vel *Salep*, Салепъ) *bulbi* variæ ma-gnitudinis, (ut plurimum subrotundi seu ovales, rarius palmati,) *seminis Coffeæ arabicae*, vel *nuclei Amygdali communis*. Qui pro bonis habentur, sunt semipellucidi, colore gaudent substramineo, superficie sublacunosa et aspera, figura *seminum Theobrom. Cacao*, in India orientali in solo macriori, postquam caulis marce-scere cœpit collecti et in primis ex Malabarria adlati longa serie filo albo transacti veneunt, majores sunt et usitatores. *Pulli*, cariosi, levesque rejiciendi sunt. *Bunii Bulbocastani radi-ces* interdum illis substituuntur, et pondere leviori et substantia minus compacta, dura, discernendæ.

Q. Mucilaginosa; eximia.

V. Nutriens; involvens; morbosam irritabilitatem deprimens.

U. Phthisis, febres hecticæ (pulvis *Orchidis aqua* vel *lacte* calido subactus, ut *pulmentum*, cochleatim sumitur, vel idem cum *gummi Acaciae v.* et *Saccharo* in *tussi* sicca et phthisica datur,) reproductio lenta, diarrhoea, dysenteria, stranguria, dysuria. Infantibus sine *lacte* nutriendis, *mucilago* quoque ex eadem fit.

D. Exhibetur decoctura radicum, quarum drachma cum bibia aquae ad libram coquitur, atque unciatim propinatur.

V. Decoctura Orchidis.

O R I G A N U M V U L G A R E.

Душица обыкновенная; Машеринка.

In locis montanis, nemorosis, siccis et ad margines dumetorum creberrima. Cl. Didynam. O. Gymnosperm. O. N. Verticillatae L. Labiatæ J. Perennis. Usualis est:

H E R B A , foliis obpositis ovatis, spicis subrotundis, panniculatis, conglomeratis, bracteis cal. brevioribus, ovatis, coloratis.

Q. Ab oleo volatili camphoraceo, (cujus herba continet $\frac{1}{35}$) repetenda. Proprio fragranti odore, simili herbae Origani Majoranae, gratoque nares; sapore vero acriculo, subamaro, aromatico, linguam feriunt, folia.

V. Nervina; stimulans; resolvens.

U. In asthmate, tussique sine febre, virtus ejusdem explorata; in phthisi quoque pituitosa a quibusdam cum successu exhibebatur, nec minorem fœminis etiam, quibus sanguis per menstrua non respondet, præstitisse utilitatem fertur. Frequenter ad epithemata discutientia, et balnea roborantia, recipi solet in œdematibus, aliisque malis similibus et quum evidens aroma habeat, non male exoticis stirpibus cognatis, praefertur. Folia siccata, aqua rite perfusa, succedaneum Theæ Boheæ non ignobile præbent. Cerevisiae addita herba, vel in dolio suspensa, ejus acorem arcit; tempore fermentationis admista temulentiam promovet.

V. Species aromaticæ; Oleum Origani vulgaris;

O R Y Z A S A T I V A .

Сарацинское пшено.

Originatus in Æthiopia, post annum 1696 in Italia, Hispania, Hungaria, Turcomannia, (non supra 47°) sat frequens.

Cl. Hexandr. O. Digyn. O. N. Gramina L. Gramineæ J. Annua.
Usualia sunt:

S E M I N A , oblonga, farinosa, compresso-convexa, utrinque obtusa, alba, semipellucida, subsulcata.

Q. Mucilaginosa, farinacea, insipida, inolens.

V. Nutritoria; involvens; leviter adstringens.

U. Præter cibarium, in diarrhoea, dysenteria et atonia ventriculi, dato pro re nata, vel ptisanario *Oryzae*, vel alia forma, laudatur. Ex eadem quoque et *Alcohol*, (vulgo *Aarak* dictum,) paratur.

O X Y C A R B O N A S P L U M B I.

P L U M B U M O X Y D U L A T U M C A R B O N I C U M , Ph. Bor.;
 C E R U S S A Ph. Ross.

Углекислая свинцовая окись; свинцовыя
 бѣлила.

Est *Oxydum Plumbi* cum *Acido carbonico* conjunctum, quod ex fabricis Batavorum, Britannorum et Germanorum comparatur. Apud nos vero Jaroslaviæ e *Plumbo lamellato*, vaporibus *acidorum vegetabilium* exposito, conficitur. Eligatur niveæ albedinis, ponderosus, sub forma lamellarum friabilium et facile, in pulverem, si teratur, tenuandarum, (*Cerussa in lamellis*, seu *Armentum album*, seu *Schiefera alba*, Бѣлилы,) qui plerumque, dummodo habeat adhuc formam adhibiti *metalli*, sincerior est illo, sub forma conulorum prostante, plerumque Veneto vel Belgico, sœpe *Creta* adulterato, gravitatis minoris, coloris impuri. Usui pharmaceutico aptior et sincerior obtineri potest, dum *Plumbi Oxydum* ex *solutione* in *Acido nitrico* præcipitatur. Carbonate *Calcariae*, *Oxycarbonas Plumbi* in laminis quoque, etsi cum hoc id rarius, quam cum altero fiat, terris variis albis, ex. gr. *Alabastro*, *Alumina*; *Sulphate Barytae* etc, inquinatus esse potest, dum simul cum illis lævigetur, et postea *mucilaginis* ope iterum in lamellas formetur, quod tum levitate minorique albedine ejus, tum et eo detegitur, quod *Cerussa*

alis in *Aceto* non ex toto solvatur et cum oxydabilibus rebus, igni submissa, hasce *terræ*, relinquat. *Creta* admista *Acido nuriatico*, quo facile extrahitur, inveniri potest, vel redacto in metallicam formam *Plumbo*, ex remanente massa irreducibili, *fraus* detegitur.

V. Præcipua siccandi ei vis et inflammationes cohibendi, irritabilitatem et sensibilitatem imminuendi.

U. Non nisi ad usus externos destinatur, præcipue ad siccandas ulceratas, saniosas, excoriatasque, aut *lotio* infantum arrosas partes; ad æstum in ambustis et topicis inflammacionibus, mitigandum; sed monemur a prudentibus viris, *præparaciones Plumbi* extrinsecus quoque admotas, fuisse damnosas, hinc neque pro cosmeticis commendandus, quibus Ruthenæ in primis mulierculæ delectantur, adsciticiam formam, adfectantes. Aptius adhibetur ad *emplastræ* et *unguenta*, in quibus tamen privatur *Acido carbonico*.

V. *Superacetas Plumbi crystallisatus*.

O X Y C A R B O N A S Z I N C I.

OXYDUM ZINCI NATIVUM; LAPIS CALAMINARIS.

Углекислая Цинковая окись; Галмей,
Цинковый камень.

Oxydum cohærens, ponderosum, compactum, potissimum *Oxydo Ferri* inquinatum, cinereum, in luteum, flavum, fuscum, aut rubrum vergens.

V. *Oxycarbonas Zinci praeparatus*.

O X Y D U M A R S E N I C I A L B U M .

ARSENICUM ALBUM Ph. Ross.

Мышьяковая белая окись; Мышьякъ белый.

Obtinetur in metallurgicis officinis sublimatione sub fusione aut ustulatione aliarum minerarum; præsertim vero *Cobalti*.

Q. Refert autem, (dum purum est,) massam scoriformem,

compactam, albam, (*si recens est*,) subpellucidam, procedenti
vero tempore, opacam, (*si diffringatur*,) vitri instar nitentem, sum-
me venenatam, *odoris nullius*, *saporis vero dulciculi*, dein acri-
culi, inflammantis tandem; *ponderis circiter 5.200*, quæ in *aqua bullientis 15*, *frigidæ 80*; *Alcoholis vero*, si cuin eo coquitur,
pariter 80 partibus solvitur. *Solutio hæc tincturam faeculae*
Lichenis Roccellae (Heliotropii) rubro tingit colore; inde *aci-*
dis adnumeratur. *Prunis inspersum ad 383° F.* avolat forma
vaporum canorum, qui *odorem Allii sativi similem*, spargunt.
Metalla polita, his vaporibus obposita, macula alba inquinan-
tur, laminæ cupræ candenti imposta particula *Oxydi Arsenici*
maculam relinquit nigram, vix delebilem. *Centenarius* habet
Oxydi Arsenici partes 75,2 et *Oxygenii* 24,8 (PROUST;) additio-
ne vero 0,20 partium *oxygenij* (ope *Acidi nitrici*) in *Acidum*
arsenicicum convertitur. Cum *Sulphure*, varia in proportione, *Oxy-*
dum Arsenici album jungitur, ac proinde diversas format sub-
stantias. Sublimatione cum parca *Sulphuris* quantitate abit in
Arsenicum citrinum; cum *Sulphuris* 0,10 partibus, *Auripigmentum*
(желтый мышьякъ,) cum ejus 0,16 vero partibus, *Realgar*, *Ri-*
sigallum (сѣрный мышьякъ) constituit. *Arsenicum rubrum*, (крас-
ный мышьякъ,) materia pictoria sat nota, est artefactum, quod
a *Realgare* differt majori *Sulphuris* copia et arctiori cohæsione
(NIEMANN.) Cum substantia aliqua oleosa adiposa, vel pulvere
carbonum, igni expositum fortiori, (in tubo vitro uno extremo
clauso (BOSTOCK) *Oxydum Arsenici album* reducitur ex *oxydo*
in formam metallicam. *Solutio Oxydi Arsenici albi* mixta cum
solutione Subsulphatis Cupri et Ammoniae producit flavescens
e viridi præcipitatum, quod est *Arsenici et Cupri Oxydum*. Ab
aqua Calcariae et Ammonia liquida coloris albi, a *Hydrosulphure-*
to autem *Ammoniae* vel *Potassæ (BERGMANN)* liquido et *Aqua*
hydrosulphurata acidula citrini coloris præcipitato se prodit. *Aqua*
solutum ab instillata Ammonia liquida et Nitrate Argenti liquido
decidit in flavæ massæ forma, (HUME, ROGET, MARCET.)
Interdum *Oxydum Arsenici album*, (præcipue venale,) in primis
ubi in forma *pulveris* venit, *Carbonate Calcariae*, *Sulphate Calcu-*

iae, vel *Barytae* contaminatur, tum prunis inspersum, non avo-
at in totum, uti hoc fit, cum purum est. In residuo hicce
Carbonas Calcariae per effervescentiam adfusione *Acidi sulphuri-*
si productus, detegitur. *Sulphatis Calcariae* vel *Barytae* præ-
sentiam idem *Acidum sulphuricum* ostendit, dum massa albida,
adfuso *Acido*, nullam subit mutationem.

V. Congrua dosi heroica; zooctona, majori corrosiva; escharas
citissime producens, partesque duntaxat, quas tangit, rodens,
cæteris vero contiguis, illæsis. Generatim viam suam præbiis,
in quibus propinatur, debet. Et quidem minima quantitate, v. g.
ab $\frac{1}{16}$ vel $\frac{1}{12}$ grani parte *aqua* dilutum, functiones arteriosi sys-
tematis in extremis vigorat, diaphoresin producit; quin ta-
men notabilem sudorem moveat. Majoribus præbiis, v. g ab $\frac{1}{8}$
ad $\frac{1}{2}$ grani partem, spasmodicam vasorum arteriosorum in ex-
tremis constrictionem atque febriculosum cum horrore motum,
causat, qui, observante HAHNEMANNO, typo adstringitur, eti-
am subsequenti die, licet remedium non fuerit propinatum,
redeunti, utut debiliori. Si idem præbium continuetur, fit vi-
rium fatiscentia, modo in partibus quibusdam, modo in toto
notabilis organismo; ægrotus hebescit et apathia quadam la-
borat; partes extremæ paralysi corripiuntur, musculi flacce-
scunt, proportio plasticæ lymphæ in sanguine ejusque colæ-
sio imminuitur, æger lentis detinetur febriculis, quibus d-in
aquosi pedum tumores, dolores articulares iique gravabiles
accidunt cum eruptione quadam cutanea perdurante. Præbi-
um grani unius, aut plurium, *aqua* solutorum, sequitur labio-
rum, linguæ, palati, faucium, œsophagi, ventriculi et intesti-
norum ardor, dolor acerbissimus, rosio atque inflammatio
ventriculi, in pylori regione et fundo potissimum conspicu-
siccitas oris et linguæ, sitis inextinguibilis, præcordiorum op-
pressiones, nausea, vomitiones frequentissimæ et vehementissimæ
primo pituitæ, tum bilis, modo alvi profluvia violen-
tissima, haud raro crurore tincta, crebri singultus, tendinum
subsultus, cardiopalmus, spirandi difficultas, deliramenta, re-
pentina corporis intumescentia cum circulo circa os et ocu-

los livido, pulsus celer, debilis, contractus, tremulus irregulare, tandem, ni toxicum e penetralibus corporis exterminetur, aut congrua antidoto, omni festinatione conflictanti succurratur, gangræna et sphacelus ventriculi, intestinorumque perforatio, subsequitur, atque horrendum hocce malorum agmen, ineluctabile fatum claudit, mors, quam epidermidis secessus totiusque corporis putredo insequitur subito, naribus molestissima, casso anima corpore, maculis lividis per omnem superficiem, quasi consito, oculis livore circumfusis, unguibus liventibus et capillis, prima jam mortis die haud raro deciduis, imo partibus non nullis, et præsertim obscœnis, viridi, luteo, nigro colore fœdatis. Sectio cadaveris offert excoriationem tunicæ villosæ, præsertim versus pylorum et inflammationem membranæ subjacentis sæpius, (non quidem semper,) crassioris (ALIBERT, RENAULT.) Apparent puncta rubra ab exsudante cruento pronata et veneficio lentius peracto, stases sanguineæ in aliis visceribus, potissimum in hepate occurrere solent (METZGER.) Corpora hominum, nece arsenicali defunctorum, monente WELPERO, diu duritiem mumiarum conservare, veterum observationibus ductus cl. NIEMANN, vix credit. Medentis est cordati, medicamen adeo validum, et haud raro perniciosum, caute et prudenter adhibere, atque in illis duntaxat morbis ad id confugere, qui aliquid istiusmodi ob pervicaciam suam plane requirunt, utcumque decantentur exempla lexipyretam in primis vim ejusdem adtestantia.

U. Internus. *Oxydum Arsenici album*, rite temperatum ac congrua forma porrectum, utile esse censetur in dialeipyris (FOWLER, HUNTER etc.,) præsertim, si febriens cæteroquin non est debilis, (bonæ constitutionis,) neque chronicis affectionibus pectoris obnoxius, aut organico laborat vitio. Ut vero prævertantur mala usu ejusdem subinde oriri solita, puta: labe-factatio organismi, hydrops, tabes, læsio viscerum et id genus alia, adhibenda sunt remedia individuali irritabilitatis statui adæquata conciliandaque toti organismo energia et harmonia activitatis diversorum organorum. *Oxydum Arsenici album*

in curatione dialeipyrarum omnino aliquo intuitu est remedium commodum, quia nullum aliud, adinstar ejus, ita certe saltem typum suppressit, omnia ergo præstat, quod febrifugum præstare debet, sed diarrhœam non sanat. Anne *Cinchona* eam, præcipue cum effectibus febris, sanare valeat? Eadem, quæ huic, olim *Cinchonæ*, objecta sunt, et revera ad Caucasum et in Chersoneso taurica occasio est interdum experiundi et exhibito cortice *Cinchonæ*, febrem hecticam, ascidem et alia gravissima mala suboriri, ast quoniam is eximia facultate roborandi gaudet, hinc in eo typo, qui asthenia solum sustinetur *Oxydo Arsenici albo*, palmam præripit. *Oxydum Arsenici album* in primis locum habere videtur in curatione dialeipyrarum, 1° ubi ob metum status soporosi, aut apoplectici typus breviori tempore suppressendum est, 2° ubi materia febrilis est pertinax, hinc in diathesi præ aliis pituitosa, insignis ejus efficacia. Principalem præterea laudem adquisivit apud nonnullos in dialeipyra quotidiana et tertiana. Verum tamen et *Cinchona* non minus, hoc in casu, præstat; porro tertianæ sunt diversissimæ, prout epidemia est vernalis, autumnalis etc., et prout diathesis earum catarrhalis, biliosa etc., suas quæque methodos exigens. Laudatur etiam in morbis convulsivis, asthmate convulsivo, epilepsia, pertussi. Prodesse dicitur in exanthematibus: elephantiasi, tinea capitis, herpetibus, uti et in cancro (le FEBURE, le COSME, BERNARD.) Morbi syphilitici rebelles, morbi ab *Hydrargyro* producti, paralysis, ulcera desperata, cauto ejus usui, secundum experientias, a cl. SWEDIAUR institutas, cedunt? In Indiis orientalibus adversus hydrophobam rabiem efficaciam exseruisse fertur. In aqua Rosae solutum contra hydrophem adhiberi potest (SWEDIAUR;) sed ei admodum admodum esse videtur, qui abnormi cordis, arteriarumque energiæ natales debet, haud raro etiam sangvinis detractione, non sine successu (STOLL) curato? Externus. Cum Oleo tritum, efficax remedium præstat ad morbos quosdam cutaneos, (Vide: Asiatic researches,) ulcera phagedænica. Contra carcinoma præcipue faciei COSMUS

et BERNARD cum Sulphureto *Hydrargyri rubro* (*Cinnabari*)
cinere solarum detritarum ustaram, *resina Dracucae Draconis* combinant atque portionem, (qua mali ambitus indiget.) pauxillo *aqua*, in *pultem redactam*, ope penicilli, cancri superficie, crassitie unguis, illinunt atque dein *Boletus ignarius*, vel *vesica bovilla*, aut aliud tegumentum, naturae remedii accommodatum, fortiter et permanentur comprimens, imponitur. Diebus aliquot elapsis eschara pronata secedit; et ulcus, quod obtexerat, naturali vigore apparet, remedii *saturninis balsamicisque* ad perfectam consolidationem tractatur, facto (non procul ab ulceri) fonticulo et cibo ordinato leniori (THEDEN, SCHNEIDER.) Probatum pariter medicamen est in ganglii curatione, quem ad *scopum* cl. WOULEM, prius parti affectae *emplastrum Lyttæ*; post vero *Oxydum Arsenici album* applicandum, suadet. *Oxydum Arsenici album* ingreditur etiam arcana quædam, quæ scioli, et multum sibi adrogantes agyrtae, magna cum procacitate, divenditant.

D. Medentes, vario infortunio, prosperrima pericula evertente, ignotaque vera remedii indole, non parum titubarunt in determinanda recta methodo, *Oxydum Arsenici album*, porrigendi, usque dum cl. viri JACOBI, le FEBURE, ALEXANDER, *solutio nem*, in *vehiculo* præprimis *aquoso*, cæteris omnibus formis merito præponendam esse, multiplici experientia, comprobarent. Suas itaque illorum grana duo ejusdem in libra *aqua* solvuntur, primaque septimana unum, (semuncia) secunda duo, tertia vero tria, unaquaque die cochlearia, cum *syrupo opiatum*, sorbentur, subjuncta *diaeta* strictiori et procurata alvi depositione liberiori. Eadem fere docet cl. SWEDIAUR, dum grana duo cum *Sacchari* drachma in *aqua destillata* bilibra solvi, nec non hujus *solutionis* primo cochlear majus (semunciam) omni mane cum *lacte* dari et gradatim, bis terve de die, jubet. Eadem *solutio externe*, (qualis est,) adhibetur. Usus *Arsenici* in *pulveris* forma nunquam periculi expers haberi debet, quippe qui (pulvis) tenacius villis tunice ventriculi adhærescens, deleterium exserit effectum. Ut id impune administrari queat, FOWLER, BRERA aliique

Alcalia adjiciunt, (Vide: *Solutionem Arsenitis Potassae,*) horum *et* *Oxydi Arsenici albi* connubio, neutralisationem, ad instar aliorum acidorum, sperantes; recte tamen observante illustri **KLA-
PROTHIO** connubium *Alcalium* cum *Acido Arsenici, albo* adeo debile est, ut vix aliqua neutralisatio sperari queat, facileque remedium in suas partes discedere (*Oxydo ab Alcali separato,*) possit. Quamobrem doctissimus vir, loco hujus, provide *Arsenici Sulphuretum* (pari portione *Oxydi Arsenici* et *Sulphuris,* constans,) illo mitius, et propulsandis iisdem malis, accomodatus, proposuit. Mirum est, quantam *Oxydi Arsenici albi* copiam equi et pisces, sine noxa, devorare possint, a dosi refractissima ad drachmam usque, ex qua (dosi) equi vermis ventriculi (subinde milles) laborantes, nullo modo laeduntur, e contrario hilares fiunt et curantur (**TOLNAV.**) Confitendum interim, vehementia, qua vitae humanae minitatur, omnibus remediis, quae Res medicina offert, praेire, ejusque usum maxima attentione et circumspectione dignissimum, esse. Quamvis enim nullum detur venenum, quin cauto usu, refracta dosi, contrariis temperatum, in salutem hominum cedere queat, nihil tamen minus *Oxydo Arsenici albo* cautissime est utendum; nam et felici ab initio eventui, sed doloso, tabida mors successit. Pars ejusdem una in ducentis fere et ultra aquae partibus diluta, atque ad guttas tantum triginta de die exhibita, in experimentis **STOERCKIANIS** febrem hecticam causavit, quam nonnisi emollientissima et lacticinia fugare valuerunt. **MONRO** memorat observationem **DUVALI**, Medici Londinensis, qui virum quarta grani parte, quam a circumforaneo agyrta contra dialeipiram accepit, ereptum esse vidit (*Saml. auserles. Abh. f. pr. A. XIII p. 274,*) immo extrinsecus non minus funestos secum dicit effectus, ut in ulceribus (**BRODIE**) (quam intrinsecus) adhibitum. Ipsi vapores arsenicales præcipue venenati deprehensi sunt; pulmones enim laedunt et fossores metallicos frequenter phthisi pulmonali tradunt. Majori, (ut supra allegavimus,) adeoque per quam nociva quantitate, truculentum hocce venenum (præpostero consilio sumptum,)

periculum animali organismo minitatur, et tunc, necesse est, obponantur antidota quædam, quorum sunt celebratissima, quæ ad obtundendam illam vitæ inimicam materiam ejusque ferociam superandam commendantur, nempe: *lac*, aut *meracum* largissimis haustibus epotum, donec nullum amplius vomitum moveat, aut *vitello ovorum*, *butyro insulso*, *oleo amygdalino*, vel alio quodam *pingui* remistum, aut *farina* aliisque *viscidis*, in *pultis lactariae* speciem redactum. Servavit alios *Cremor lactis*, *butyrum insulsum* (FORESTUS,) *amygdalinum* aut aliud dulce recensque *oleum*, alios *mucilagines*, acrimoniam obvolventes, ita cocta cum *seminibus Lini usitatissimi*, *Oryzae sativae*, *Hordei dystichi*, aut *amyllo triticino*, *aqua* cum *Opio*; alios *tepidi*, plenis haustibus ingurgitata, alios *Subcarbonas Potassae liquidus* (HUFELAND,) guttis quinquaginta singula hora exhibitis. *Solutio* (HAHNEMANNI) *saponacea*, quæ partem *saponis oleosi* et quatuor partes *aqua* habet, atque tepefacta tertio, vel quarto quoque minuto, sumitur, est adcommodatissima; *Hydro-sulphuretum* vero (NAVIER) *Potassae* vel *Sodae*, quum tardius agat, minus aptum, attamen commendabile. Ab aliis *Acetum* et *succus pomorum Citri medicae* proponuntur (SAGE,) nisi repugnet *Acidi arsenicosi*, *acidis indoles* adfinis. Videsis præterea: *Carbonem lignarium*. Egri his remediorum adminiculis letho erepti, valetudine sæpius tentantur, eamque nonnunquam febri hectica, paralysi, aliorumque malorum serie, exasperatam trahunt. Permag-ni interest probi Medici, non modo virosam atrocissimi *veneni* potentiam nosse atque prævertere, sed etiam veneficos nefarie eo abutentes, publicæ luci exponere. Si oborta *veneficii* vel dolosi, vel culposi quæstione decidendum est de reatu cuiuspiam, tum *liquori subjiciendo* examini *Hydrosulphuretum Ammoniae* vel *Potassae* (BERGMANN) *liquidum*, aut *aqua hydrosulphurata acidula* instilletur, tum *Oxydum Arsenici album*, si eo *liquor vitiatus* est, cum *Sulphure* conjunctum, citrino colore (*Auripigmentum*) præcipitatur. Nec inepte hoc probatur ope *Oxydi Cupri*, quocum *Oxydum Arseni album* humida via facile conjungitur, instillata nempe *liquori* vitiato *Subsulphatis Cupri* et *Ammoniae* solutione, decidit flavescentia e viridi præ-

cipitatum, quod est *Arsenici* et *Cupri oxydum*. Tumissimum praesentiae ejusdem signum est, reductio (ejus) ex *oxydo* in formam metallicam, quod ignitione cum rebus *oxygenium* adtrahentibus e. gr. *carbonibus* (in tubo vitro uno **extremo** clauso hermetice *Bosrock*) fieri potest. Criterium præterea, quo existentia *Oxydi* minutissimarum *Arsenici albi* particularum detegi potest, quamvis particula (*Arsenici*) in quadringentis millibus, partibus *aquaee*, solvatur, est sequens, (HUME.) Solve grana decem *Nitratis Argenti* in decem *aquaee destillatae* (pondere) partibus, cui adde guttatum *Solutionem Ammoniae*, ut *praecipitatum* formetur, dein opus est, ut id (*praecipitatum*) iterum solvatur et solutio fere transparens reddatur, ita, ut *Ammoniae* excessus non sit, nam solutio *Ammoniae*, utpote levior *aqua*, supernatabit *solutoni* liquidæ, cui eandem applicare oportebit. Si *liquidum* hoc continetur, lagena rite obturaculo vitro munita, non facile corruptur. Adhibetur criterium hoc simplici modo, scilicet: bacillo, vel lamella vitrea, hocce fluido madefacta, in fluidum *Arsenicum* continens, fit immersio, quo facto, illico mutatio (in colorem flavum nitidum) adparet, quo existentia *Arsenici extra omnem dubii aleam ponetur*. Eadem manifestatio fit, *Ammonia liquida* et *solutio Nitratis Argenti*, separatim adhibitis. Quod attinet ad *phosphates*, dum hocce criterium ad *Arsenicum* detegendum usurpatur, modificationes ab ill. MARECETTO propositæ, observatu dignæ sunt.

V. *Solutio Arsenitis Potassae; Solutio Arsenici et Nitratis Potassae; Unguentum Oxydi Arsenici albi; — — — compositum.*

OXYDUM PLUMBI SEMIVITREUM.

LITHARGYRUM Ph. Ross.

Окись свинцовая полуостеклованная; Глемъ.

Est *Plumbum*, tertio *oxydationis* gradu (0,90 *Plumbi* et 0,08 *oxygenii* continens,) quo illud, non modo *oxydatur*; sed et se-



mifusum est, forma squamularum splendidarum, satis ponderosarum, e rubello flavescentium, unctuosarum, quarum decima pars *oxygenii* est; obtinetur in officinis metallurgicis, sub cupellatione **ARGENTI**, atque **AURI**. Inquinatur interdum pulvere laterum, quod facile adfuso *Aceto*, in quo solum *oxydum* solvit, tum et non totali ejus cum *carbonibus* (igne) reductio-
ne, detegi potest. *Cuprum*, saepe venali adhærens, *caeruleo co-lore* apparente, dum *Ammonia liquida* digeritur, se prodit. Re-
jiciatur etiam, quod cum *Ammonia digestum* evadit *subcaeruleum*.

V. exsiccans; subadstringens etc.

U. Per se nunquam adhibetur, sed ad *praeparata et compositiones* varias; præsertim vero, dum prius in *pulverem* subtilissimum redactum, in *oleis expressis* soluitur, conficiendis *emplastris* et *unguentis* inservit.

V. *Emplastrum Oxydi Plumbi*; — — — *saponatum*.

P A P A V E R S O M N I F E R U M , — A L B U M *.

Макъ усыпительный; — Бѣлый.

Planta quinquepedalis, foliis amplexicaulibus, incisis, glau-
cis, *Ægypti* et *Asiæ* meridionalis, *Europæ* hortensis. *Cl.* Po-
lyandr. *O.* Monogyn. *O. N.* Rhœadeæ *L.* Papaveraceæ *J.*
Annua. Usuales sunt:

CAPSULE *seminales*, sub stigmate persistente, poris dehi-
scentes, glabræ. **OPIUM**, seu *succus acteus*, e pericarpiis ma-
turis vulneratis, effluens, ac dein in *massam gummeo-resinosam*,
obscure fuscam, induratus. **A succo e capsulis ope preli ob-**

* Distinguunt Botanici duas species: *P. somniferum* capsulis glabris, forami-
nibus sub stigmate apertis, foliis amplexicaulibus incisis, et *P. album* cap-
sulis glabris, foraminibus sub stigmate clausis, foliis amplexicaulibus incisis; ab
antecedente differt canibus altioribus, foliis amplioribus, petalis latioribus et
longioribus, capsulis multo majoribus, sub stigmate poris non dehiscentibus
seminalibusque albidis, aut e canescente albidis, neque cultura immutatis, qua-
est *P. somnifer. var. Lin. P. officinale verum.*

tento, vel etiam excoto, atque inspissato, distingui debet. Admiscentur ei *extractum Glycyrrhizae glabrae*, vel et *arena*, primum cum *odore*, *sapore*, *colore*, tum et majori mollitie facile detegitur; secundum trituratione *Opii* cum *aqua*, vel *Alcohol*, ubi *arena* subsidet, statim adparet. Adulteratur etiam *succo Lactucæ virosæ*, vel — — *scariolæ*, aut *fimo bubulo*; sed *genuinum*, dum frangitur, splendet adinstar *resinae pineo-sylvestris* et post solutionem puniceam præbet *tincturam*. Ex Indiis orientalibus adlatum coctione, vel tostione mutatuin, postponendum est *thebaico*, vel *turcico*.

Q. Heroica, a *narcotico* cum *gummeo-resinoso volatili juncto*, derivari posse creditur; sed in quo principium *opii* proximum activum residet, apud Medicos non constat, nec analysi chemica hucusque detegi potuit, forsitan vis ejus non ab uno, sed a justo, certo et specifico plurium principiorum proximorum connubio pendet, et pro ratione unionis horum agit. *Oderis* est virosi, tetri; *saporis* amari, acris, nauseabilis. *SERRURIERUS* nupperrime elicuit ex *Opio* atrocissimum *venenum*, *Acidum* nempe *meconites*, organismum animalem, adinstar *aquæ tofanae*, zoothonis viribus infamis, lente, et pedetentim, pessumdans.

V. In centralia præcipue nervi systematis puncta agens; hilaritatis sensu adficiens, gratissimo; actionem vasorum exaltans, hinc siccitatem oris, faucium, obstipationem efficiens; micatus arteriarum pliores reddens; perspirationem cutaneam, uti etiam pulmonalem augens; genituræ secretionem faciens, atque ad sequenda veneris castra stimulans; ast, haec ejusdem virtus interjectis quatuor vel octo horis, serius, cito, pro ratione præbii, defervescit, atque, si id parvum fuit, subsequitur quidam ad obeunda omnia munia vigor; si vero æquo majus, tum excipit languor, tristitia, morositas, ægritudo animi, ægrique somnolenta demerguntur gravedine. Effectus sedans, longe major est, quam irritans, cui ille subsequitur. Largiori et protracto usu facit maciem, vires frangit, stupo-

rem et apathiam inducit, ita, ut liguritores *Opii* vix in publicum prodire audeant, nisi viribus, novo præbio, restauratis.

U. Nevrantistasibus asthenicis in primis adcommodum est *Opium* et nevroblaciis (astheniis) quibusdam, haud tamen absque, scita causarum dijudicatione. Astheniae indirectæ aptius est, quam directæ, ita etiam mediæ ætati conducibilius, quam puerili, vel declivi; sthenico autem statui, (adcumulato sanguine in cerebro,) aut musculari debilitati, jacturæ virium post exinanitionem vasorum insignem prægressam, abundantι organismo *Carbonico*, pronitati ejusdem in putredinem, excretioni cuidam criticae ingruenti etc., omnino alienum. Stimulum in systema nerveum exercendo, sopit nevrantistases quasdam, puta dolores varios, idque, vel energiam adfectorum nervorum augendo, eorumque sensibilitatem minuendo, vel incitationem in centralibus systematis nervosi punctis intendendo. Dum dolores, nevrastheniae solum, ortum debent, vel cum suppressa secretione, ex. gr. adiapneustia conjuncti sunt, tum *Opio* malum radicaliter tollitur; ast ubi sympathica adfectione consistunt, inducias duntaxat pacisci licet, quo doloris causa, congruis remediorum adminiculis, ægro certius suffecturo, tolli queat; sed tum etsi mitigetur quidem sensifica molestia, ast defervescente remedii potentia, itidem recrudescit, sic radicalis est medela ope *Opii* catarrhalium et rheumaticorum algematum, nevrasthenia subsistente, ex. g. odontalgiae, otalgiae etc., vel interne cum *Stibio*, radice *C. Ipecacuanhae*, *Camphora* etc., propinati, vel extus, per modum intrimenti, vel admotu, adpliciti; palliativa vero dolorum a calculo urocytidis, cancro, imo ipsius arthrodyniæ etc. Efferenum ischiatici mali dolorem, et quidem eam ejus speciem, quæ in adfecto ischiatico nervo consistit, pacavit **BOERHAAVIUS**, virtutem *Opii* in se expertus. Nec minus utilis in variis enterodynianæ (præter flatulentam) speciebus, præsertim in connubio aliorum. In *saturnina*, additur *Opio*, *oleum* et *catharticon*; hoc enim, persistente spasmodica interaneorum contractione, ut alvo subducendæ, ita *Plumbob eliminando*, impar erit. In ileo et herniis

incarceratis eadem *eckoproticorum* oclique copula respondisse fertur. Insignis porro *Opii* potentia est in sopiendis convulsivis spasticisque morbis, pure puta asthenicis, nevroblacia cutanea, pallore, difficulti respiratione, doloribus etc., stipatis, verum quoniam turbas saepe insignes excitat, intempestive usurpatum, scire licet, vel minus conducere, vel palliativam tantum curam fieri, dum aliqua adcumulatio, vel sanguinis, vel pituitae, vel seri, vel corrupti humoris, alias per ulcera, vel fonticulos excerni soliti, vel sordes, vel heterogenea in causa horum malorum sunt. His rite discretis, utilitatem promittit, in singultu, tussi, asthmate spasmodico, hyperemesi, cardiopalmo, spasmodico meteorismo, in convolutionibus a nimia systematis nervosi irritabilitate et sensilitate, vel doloris vehementia, ortis. In epilepsia mere nervosa. In spasmo mandibulae inferioris, et opisthotono a longioribus ejus dosibus egregios vidit effectus MACAULAY, HUCH, uti etiam in trismo traumatico BERENDS; in pertussi WEICKARD. Scire licet in universum, *Opium* ad perfectam, durabilemque spasmorum sationem, haud parum conferre, sistendo, et velut abrumpendo pravam consuetudinem, qua iidem inveterascunt sic, ut qui indole, origineque perleves fuere, crebro repetiti, per graves fiant, ac vix non immedicabiles. Praestans porro est palliativum ad sopiendam nimiam nervorum sensilitatem et dependentem hinc ataxiam, hinc hypochondriacis et hystericas solatium est, dum flatus urgent, unde cardiopalmus, anxietas, asthma, suffocationis sensus, dolores et calores vagi oboriuntur. Praecipua porro ejus vis est, in cohibendis variis profluviis, ita subductis prius cruditatibus, in diarrhoea, dysenteria, (non tamen sine restrictione, quippe quod mitigat quidem symptomata, sed absque stabilitate, et catharticorum effectum retardat) vomitu, cholera. In metrorrhagia, doloribus spurii uteri, abdominis, lumborumque stipata, tum ad abortum praecavendum, tum ad haemorrhagiam cohibendam, efficax. Mirum est, dolores spurios *Opio* sedari, veros autem inde augeri adeo, ut saepe puerperio,

ob parvitatem dolorum verorum, retardato, *Opium*, teste PLENCKIO, calcar subdiderit. Valet etiam in lochiis dolorificis, haemorrhagia ab irritatione locali, aut spasmo, menstruatione dolorifica, blennorrhagia. Stimulum in universum systema nervosum exercendo, in asthenia hujus systematis efficax praesertim cum asthenia cerebri, imminuta peripheriae cutis et pulmonum actione, complicata. In nervosa asthenia, ut in paralyssi asthenica (BURDACH,) concitandae reactionis ergo, parvis quidem, sed repetitis dosibus, recte datur, nec minus utile in asthenica pyrexia, auctioris irritabilitatis deprimendae gratia, majoribus sed rarius propinatis dosibus. In typho adhiberi provide et ratio et experientia jubet, nec nisi senioribus ejusdem stadiis, anxietate, pervigilio, doloribus, spasmis, aut alvo cita, stipato, convenit. Febris pure pute nervosa, ob virum dispendium, non facile *Opium* admittit, haud secus, ac in putrida vulgo dicta, ob jacturam *oxygenii*, quam inferret, alienum. In febribus intermittentibus, nervosis symptomatibus, vehementer, concutienteque algore, parvo, tremulo, cito, contractoque pulsu, vomitionibus aut diarrhoea stipatis, recte usurpatur. Secundum experientiam cl. GREGORY, praceptoris aeternum venerandi, ingruente calore sicco, *Opium* propinari bonum est, sed neque ante paroxysmum, vel sub horrorem captum, minus respondisse, idem, magnae auctoritatis vir, adseverat. Cum parva *corticis Cinchonae off.* quantitate adeo proficuum, his esse existimatur, ut nec hydropisin, nec angiophraxin post se trahat. Sthenicis inflammationibus cum Submuriate *Hydrargyri Stibio* et *Camphora* adcommodatissimum, in phrenitide, angina spasmodica, pneumonitide, gastritide, hepatitide, enteritide, ut quidam viri fama et experientia conspicui volunt, in remediis pollet. Mitigat quoque dolorem et febrem symptomaticam, post vulnera, fracturas, adusta. Multum praestat in necrosi digitorum (POTT,) vehementi dolore et inflammatione aut comitata, aut praecedentibus iisdem, orta, admoto extus emollienti cataplasmate, aut unguento (PLENCKII suasu) sambucino. Laudatur etiam in syphilide praesertim, si eam spa-

amus, ut iachuria, tenesmus, aut dolor vehemens, etiam si inflammatorius, comitatur. Multoties expertus est ill. PLENCKIUS, mercurialia cum *Opio* combinata, securius, efficacius, citiusque contagionem hanc profligare, quam *Hydragyrum* solum, *Opio*, neutiquam adjutum. Exhibitetur quoque ægris operationes chirurgicas majoris momenti subituris ad reddendam eorum tranquillam et hilarem mentem. Ad resolvendos quoque, vel maturandos tumores frigidos, syphiliticæ, scrofulosæ, vel rheumaticæ indolis emplastris resolventibus; ab aliis vero, *Nitrati Argenti fuso*, vel *emplastro Lyttæ*, ut minus sensifice agat, admiscetur. *Tinctura Opii* in ophthalmia chronica, vel superstite post hanc sensitatem magna, oculo affecto ad unam, alteramve guttam, instillatur (WARP;) imo etiam cum *aqua*, forma *balnei* oculorum, secundum DEMANJON adhibetur *Opium*. Granum *Opii* dimidium, denti carioso dolenti, cum successu inditur. *Emplastrum opiatum*, partibus spasmo contractis, admovetur. Ulceribus dolentibus, aliisque spongiosis, succurritur *Opio* (GRANT); nec minus tumori epidydimidis, et testiculorum, aliisque (FOTHERGILL.) — Indicia *Opii* clandestine nefario ausu dati, vel dedita opera, cum impatibilis valetudo odium vitæ fecisset, nimia copia, adsumti, non adeo sunt ambigua et per facile temulentia cum delirio, sopore, vel et convulsionibus, pruritu cutis, hidrosi *Opium* spirante, facie tumente rubenteque sub pulsu veloci, et dyspnoea produntur, quo in casu, nisi *toxicum* ejiciatur, aut congrua antidoto, omni festinatione conflictanti succurritur, somno is brevi gravatur, in horrendas convulsiones, letheumque soporem, desituro. Hæc simulac adsunt mali ominis indicia, missa omni cunctatione, tentandum, num vomitiones cieri queant. *Aqua*, hunc in finem tepefacta, in qua *butyrum*, vel *oleum* diffluxit, haud neglecta faucium per digitum, sive plumam, *oleo* madefactam, irritatione, vel *Tartrate Stibii* et *Potassæ*, vel ventriculo irritabilitate jam orbo, *Sulphate Zinci*, vel pharynge et œsophago spastice contractis, ortaque hinc dyscatabrosi, remedio per canalem metallicum in ventriculum dimitendo, propere sub-

veniendum esse censem plerique omnes Medici. Ut sanguinis congestioni ad caput prævertatur, detrahendus is est, aut incisa vena, aut hirudinibus, collo, temporibusque admotis. *Opium* intestinis inhærens, *clystere*, aut *cathartico*, aut *stimulante* injecto, subducatur; plantæ vero pedum, revulsionis causa, vel scopolis fricentur, vel *sinapismo* irritentur. Inter *antidota* celebratur *Acidum aceticum dilutius intrinsecus*; extus vero eodem frons et tempora madefiant identidem. Ab aliis etiam *radix C. Ipecacuanhae*, *infusum Coffeae arabicae* meracum, *cortex Cinchonae off.*, (tremorem atque debilitatem a protracto longioreque usu *Opii* orta, tollens,) et denique *vinum*, (inducias irrequieto furori, concilians) commendantur.

D. Quantitas præbii pro ratione individui, ætatis, sexus, idiosyncrasiae, habitus, variarumque circumstantium rerum differt. Effectus ejus stimulantes magis emicant, propinatis sæpius parvis dosibus; anodynæ vero majoribus. Quod de plerisque omnibus valde *stimulantibus*; præsertim vero sic dictis *narcoticis*, intellectum esse volumus, id etiam de *Opio*, i. e. id ab $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, grani, initio facto, dari debere, atque usque ad granum, quæ quantitas, vix sine noxa, excedit. In chronicis morbis, quibus laborantes, facile adsuefiunt *Opio*, atque in variis sævis, ut tetano, trismo, catalepsi ad scrupulum et ultra propinari potuisse, usu cognitum est. Interdum granum, vel plura, singula semihora, vel hora, repetuntur, atque per vices cum majoribus stimulis, ut *Camphora*, *Moscho*, *aethereis oleis* etc., propinantur; sed hæc augmenta nonnisi per gradus cautissime facienda sunt. Quum datur in pulvere ad faciendum facilius tutiusque æqualem ejus partitionem, cum *Saccharo*, pulvere *Glycyrrhizae gl.*, aut aliis substantiis idem conjungi oportet; cum vero in massa *pilarum* præscribitur, aut in aliquo *electuario*, tum antea solvendum est, aliqua *vini copia*, aut quolibet *syrupo*, vel alio *fluido*, quod præparato congruum est, ut ejus partitio accurata in massis fiat. In spasmodicis morbis, instante plerumque spasio, aut brevissimo ante ejus accessum intervallo (si quando reditus ejusdem prænosci queat)

umendum esse, magni nominis viri suadent. Adstringentibus, alibus metallicis, Carbonatibus alcalinis, ut usu cognitum est, raecepitur Opium, hinc, dum his idem addi expedit, modi, quo administretur, ratio habenda.

V. Clyster opiatus; Gargarisma opiatum; Pulvis Ipecacuanhae opiatus; Tinctura Opii; —— ammoniata; —— campherata; —— rocata; Oleum papavereum; Syrupus opiatus.

PHASIANUS GALLUS.

GALLINA DOMESTICA.

Курица.

Ubivis in Russia. Cl. Aves. O. Gallinæ. Usualia sunt: OVUM, ALBUMEN ejus et VITELLUS, hujusque OLEUM; TESTA.

Q. *Albuminis et vitelli*: oleosa, mucilaginosa, gelatinosa; *Albumen* est liquidum, limpidum, tenax, inodorum, saporis blandi, glutinosum, cum Soda, et hydrogenio sulphurato mixtum, in aquæ frigidae decem partibus solubile, ad 160° F. vero, et ab admisto *Alcoholi*, *Acidis*, et *Alcalibus* ex solutione in massam coagulatur, duriusculam, insolubilem. Cum *Gelatina* satis congruit, atque pariter nutrit. *Vitellus ovi*, *albumine* densior, massam flavam, opacam, sed minus, quam *albumen* tenuem, refert, saporis est blandi, cum aqua tritus dat emulsionem; quæ tamen sponte cito decomponitur. Condensatur coctione, atque ea concretus, *oleum* erogat (*Oleum Ovorum*.) Residuum est *albumen* atque *vitello* plane combusto, paullum *Subphosphatis Calcariae* et *Sodæ* expromitur. *Testae ovorum Carbonatem Calcariae* referunt, cum pauxillo *gelatinæ* remistum; quæ tamen sub earum calcinatione destruitur.

V. *Ovorum nutritoria*, (salubritas eorum a vario coctionis gradu pendet;) *sorbilium* celerrime nutriens; *alvum* laxans; *solida emolliens*; *humores acres demulcens*; *aphrodisiaca*. *Testae*: antacida.

U. *Ova recentia* debilibus et macilentis, nec non atrophia

et phthisi laborantibus, maxime conveniunt; minime vero ubi sordes et pituita primarum viarum premit, vel flatulentia urget, aut sub aestu febrili, quoniam pyrosin, ructus rancidos, nauseam, vomitum moverent, vel febrim augerent. Sorbentur vel cruda per se, vel aqua diluta, vel sorbilia cocta; **GALLENUS** ova tremula febrentibus commendat; sed ea minus idonea sunt; densata autem, seu mediocriter dura, in quibus mollis vitellus duriusculo circumdatur *albumine*, hominibus duntaxat robustis, solidioris alimenti indigis, apta. *Ovum crudum integrum* (*Albumen cum Vitello*) in selibra aquae frigidae dilutum, et aliquoties de die haustum, in ictero laudatur (**WEIKART med. Schrift. 4. B. p. 204.**) *Albumen* in variis catarrhalibus affectionibus, tussi sicca (**LOESEKE**) per se, vel aqua tepida, melle, saccharo remistum, juvat. Nonnullis, qui acido spontaneo laborant, displicet, variaque causat incommoda. In aqua solutum filtratumque pro antidoto *Oxymuriatis Hydrargyri* habetur (**ORFILA**) *Vitellus* plus, quam *albumen*, nutrit, ob oleum tamen, quod illi inest, officinæ digestionis infestus. A quibusdam cum Saccharo, oleo, vel syrupo contritus, simili modo, ut *albumen*, in tussi et raucedine, domestica inter remedia, habetur. Unus aut duo *vitelli*, omni mane deglutiti, icteri medela fure (**WHITE**), scilicet sublato biliferorum ductuum spasio, bilis ad intestinum dodecadactylon promovetur, ubi etiam facta ductuum relaxatione, calculi exiisse perhibentur; nec enterodynæ, (dura alvo) atrophiæ infantum, rhachitidi alienum remedium. In diarrhœis colliquativis vulgo dictis, cum duabus mucilaginosi fluidi unciis, clystere injecto, magnæ utilitatis; jure autem carnis dilutus tornina a purgantibus *drasticis* compescit. Interdum *unguentis* quoque et *linimentis* admiscetur, faciliorem etiam reddit mistionem *aquosam gummire-sinarum*, *oleorum volatilium*, et *Camphorae*. *Oleum ovorum* externe in rhagadibus labororum, et papillarum mammalium, adustis, excoriationibus etc., laudatur. *Testae ovorum* adinstar fabarum torrefactæ, empyreumate, helminthiasi, inimico, vim zootonam exserunt; in connubio igitur aliorum, e. g. ad

nentem BRUGNATELLII, Sulphureti Stanni (fusione unciarum rium Stanni et una Sulphuris sublimati confecti) ad semidrachnam in pulvere porrectæ, tæniæ obponi posse existimantur. Videsis. CARBONATEM CALCARIÆ.

D. Propinatur *ovum*, vel per se, vel forma *linctus*, aut *emulsionis*, aut cum *communi*, vel *aromatica* quapiam *aqua*.

P H E L L A N D R I U M A Q U A T I C U M.

Омежникъ; Укропникъ водяной.

Caulis foliorumque ramificationibus divaricatis, in fossis et ad paludes non infrequens. Cl. Pentandr. O. Digynia. O. N. Umbellatæ L. Umbelliferæ J. Biennis. Usualia sunt:

SEMINA, subaromatica, oblonga, striata, luteo viridia, calyce inæquali stylisque reflexis coronata, a seminibus *Sii latifolii* et *angustifolii*, uti etiam *Cicutæ virosæ*, in iisdem locis nascentium, cum quibus interdum permutantur, indicatis notis, et odore peculiari mucido, constanter differentia, rite distingueda. Semina *Sii latifolii* sunt incurva, sub-ovata, sulcato-striata; *Cicutæ* vero subrotunda, sulcata.

Q. Semina potissimum aromaticæ, oleum destillatione erogantia, stramineum, penetrans, præter id etiam resinam, cuius drachmæ tres et grana quinque, libræ eorundem insunt. Odoris est cum isto seminum *Ligustici Levistici* et *Angelicae Archangelicae* comparandi; saporis leviter aromatici, penetrantis, aliquantum adstrictorio-acris.

V. Nerveum systema irritans, atque ad reactionem sollicitans, in vasa etiam pulmonum cutisque, ita agens, ut secretiones promoveantur, hinc imminutæ, in extremis arteriarum, reproductioni, subveniendo, morbidas secretiones ad normalem statum reducens; leviter narcotica, eaque partibus constitutivis aethereo-oleosis subamaricantibus, involutis pinguedinoso-oleosis et mucilaginosis, nititur; diuretica.

U. In febribus intermittentibus (scrupulum cum cortice Cincho-

nae, vel radice Gei urbani dando), phthisi pneumonica, pituitosa (NIEMANN,) scrofulosa, aut quidem cutaneis eruptionibus retrogradis, ut psora, variolis etc., orta, (addito Sulphure sublimato, Cetraria islandica,) hæmoptoica, rheumatico-catarrhalis, asthmate convulsivo (LANGE) profuisse, auctores fide digni, casibus prolatis, docuere; ast vix existimem inveteratam phthisin curare posse, nisi molestiis a mala digestione obortis, subvenerint. Inefficaciam ejus in phthisi ulcerosa OBERTEFFERUS, aliique haud inopes ab existimatione Medici experiundo comprobaverunt. Neque adversus ulcera varii generis pertinacia, scorbutica, scrofulosa (addita decocturae seminum aqua Calcariæ,) etiam cancrosa, fistulosa (SCHNEIDER,) hydrorachitidem, (Spinam bifidam) illaudata. Herba recens stramine pro lectis mixta efficax, et certissimum fere contra cimices prædicatur. (LANGE.)

D. Seminum semunciam et tantundem, si præsto est, suadente HUFELANDO, Sacchari lactis in pulvere, in æquas duodecim partes divisa, tertia quaque hora dari expedit, vel cum lacte aut aqua communi vel Calcariæ pro decoctura partitum per diem. LANGIUS phthisiscenti pulveris seminum, quantum cuspipe cultri capi posset, mane vesperique obtulit. Aliis ægris per nychthemeron drachmæ duæ vel tres exhibitæ; sed nimia seminum ingesta copia, gravitas capitis insignis, temulentia, vertigo, suboritur; hinc minime mirum pro deleteorio veneno, gignendis convulsionibus pari, habita fuisse.

V. Infusum Phellandrii; Oleum —.

P I M P I N E L L A A N I S U M.

Бедренецъ анисовой; Анисъ; Ганусъ.

Planta pet. inflexis, stigm. subglobosis, fol. rad. trifidis, incisis, fructibus pubesscentibus, Aegypti, Syriæ, aliarumque regionum orientalium; apud nos colitur copiose. Cl. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ L. Umbelliferæ J. Annua. Usualia sunt:

SEMINA, pedunculata, ovato-oblonga, ventricosa, striata ex viridi-flavescentia, suaveolentia. Alonensis, quæ et minora et

gratiiora sunt, præferri merentur. Sæpius cum frustulis terreis, colore et figura, iis similibus, (quod ope aquæ facile detegitur,) commista, inveniuntur, usui medico, inepta.

Q. In multo volatili, (e seminum tribus libris, et quidem e cuticula eorundem unciam ejus, et plus elicuit LEWISIUS) leniter acri oleo sita; saporis semina sunt dulcescentis, aromatici; odoris fragrantis.

V. Leniter nervos stimulans; lactifera; resolvens; expectorans. Columbis præsentaneum venenum (VOGEL.)

U. Pulveratorum seminum: in enterodynbia flatulenta, aut ab Oxydo Plumbi aut Arsenici, præsertim si malum est chronicum, velut effectus horum considerandum, et tum doses propinantr majores, ut sudor moveatur (HECKER.) In diarrhoea infantum, cum Magnesia etc., in ileo addito oleo P. Anisi et Lini (HECKER,) in pulmonum adfectionibus asthenicis, pituitosis; catarrho sine gravi febri. Oleum in myodynbia rheumatica, enterodynbia, spasmis, paralysi extrinsecus adhibitum vallet. Additur etiam evacuantibus drasticis ad avertenda eorum incommoda.

D. Pulveris scrupulum, semidrachma pro infusioni, in conubio aliorum; oleum a guttis decem ad semidrachmam exhibetur cum Saccharo.

V. Aqua P. Anisi; Oleum — —; Elaeosaccharum — —.

P I N U S A B I E S.

Сосна еловая; Ель.

Arbor in borealibus Europæ et Asiæ regionibus usque ad gradum 60° lat. boreal. crescens, foliis solitariis tetragonis, subulatis, mucronatis, laevibus, bifarium versis. Cl. Monœcia. O. Monadelphia. O. N. Coniferæ. Usuales sunt:

TURIONES, (seu cymæ Abietis) cylindrici, squamis rhombeis, complanatis, margine repandis, erosionis. RESINA ABIEGNA, est succus resinosis (vulgo Thus, a Thure veterum, seu Olibano distinguendum,) vel sponte, vel inciso

arboris trans corticem trunko exsudans, tenax, limpidissimus, brevi in lacrymas, supra vulnus fixas, coiens, siccatus, et tum dein colorem aurantiacum, vel rubicundum referens, dgitis contrectatus mollescens, ceterum fragilis. Pix ABIEGNA, (vulgo Burgundica vel alba) est resina abiegna, decoctione leni igne in aqua rite fusa et dein ex densiori linteo per sacculos, cum expressione, ut a sordibus purgetur, colata. COLOPHONIUM, est resina abiegna, per se eousque supra ignem servata, donec omnes ejus aquosae partes et aethereo-oleosae evaporarint, colorem tum diaphana succineo-aurantiacum referens, vel eadem ad siccitatem cocta. Colophonium hoc e balsami quoque, tum pineo-laricini, cum pineo-sylvestris residuo, dum ad obtinendum oleum pineo-balsameum destillationi subjicitur (Terebinthina vulgo cocta) fusione hujus supra ignem paratur, et e contra resina quoque hic descripta e Pinu sylvestri et Larice obtinetur.

Q. Turionum: resinosa, sapor acescens, resinosus, balsamicus; odor fragrans. Resinae abiegnae sapor gratus, amaricans; odor fragrans; odorem ea carbonibus inspersa ingratum reddit, flamma flagrat vivida, fumante, fuliginosa. Colophonium, facile in pulverem flavum conteritur, ad 300° Fahr. liquecit; accensum, per se ardet, Alcohole fere totum ad $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{12}$ residui solvit, minime vero in aqua. Resina et Pix abiegna, haud securus ac colophonium, et balsamum Pini, eo differunt, quod oleo volatili plus, minusve sint orbata.

V. Turionum stimulans; diuretica; diaphoretica; antiscorbutica; Resinae abiegnae, leniter stimulans; zooctona; reproductive favens.

U. Decoctionae abiegnorum Turionum in scorbuto, (BUCHHOLZ) cutisque foeditatibus claret. Resina abiegna cum Sevo fusa, extinsecus: lepræ, ichthyotosi (CULLEN) cum successu obponitur. Resina et Pix abiegna, compositionem unguentorum et emplastrorum subintrant; postremis præsertim, ob facultatem suam adglutinandi, convenit. Pix abiegna in pulmonum adfectionibus recte admovetur scopo derivandi, vel inter humeros,

el pectori, nec minus utilis in tussi catarrhali, inque oculorum, et capitis morbis, derivando, curabilibus. Huc etiam perinet *dropacismus* veterum in tinea capitis. *Fumus fragrantissimae* cum portione *cerae flavae* æquali mistæ, phthisiscentibus quandoque utilis fuisse fertur; quod tamen caute præstandum. *Colophonium*, in *pulverem* tenuatum, stupæ *Lini*, crassitie semipollicari, inspersum atque *Alcoholæ* irroratum, tumibis albis, in genu præcipue, superdatur et simulac siccescit, ex novo, fascia non soluta, malefit *Alcoholæ*. Idem pulveratum hæmorrhagias etiam topicas sistere posse existimatur.

P I N U S L A R I X.

Сосна пріятнопахучая; Лиственница.

Arbor foliis fasciculatis deciduis, strobilis ovato - oblongis, squamarum marginibus reflexis, laceris, bracteolis, panduri-formibus, in montibus vel alpibus Franco - Galliae, Helvetiae Bohemiae, Hungariae (Carpathicis;) apud nos vero in Ripheis, (Uralensibus,) inde a Biela fl. usque in septentrionem, itemque per universam Sieveriam oceanotenus et ad Kamtschatcam usque obvia. *Cf.* et *O.* præcedentis. *Usuale est:*

BALSAMUM PINEO-LARICINUM (*Terebinthina larigna Ph. Ross.*) seu *succus resinoso-oleosus*, vel sponte e *trunko* per *corticem* exsudans, vel copiosius *ex arbore*, binos pedes supra terram, vel altius, a Mayo ad auturanum, perterebrata, per canales ligneos, vulneribus inditos, fluens in suppositos urceos. Spissitudine est *syrupi* tenacioris, *coloris* albidi, vel pallide lutei, ceterum clarus, pellucidus, male *Terebinthina veneta*, Терпентинъ Венеціанской, (cum *Balsamum nostrum* neque *ex Pistacia Terebintho*, apud nos etiam in Tauria meridionali, et Caucaso calidiore, crescente, neque etiam per solos Venetas translatum fuerit,) dictus. Meinisse heic loci juvat *gummi larigni*, quod exustis *Pini Laricis* ad plures a terra pedes, *truncis*, ex inferiori medulla, miro arboris, *extus* maxime resinosæ, paradoxo, *extillat*, *siccescens*, *subrufum*

paulo minus glutinosum, quam gummi *Acaciae verae*, gustu subresinosum, sed totum in aqua solubile, quod cl. RINDERUS, in officinas Ruthenorum medicamentarias olim recipi voluit. *Balsamum pineo-laricinum*, quisquiliis aliisque heterogeneis inquinatum, cribro transmittitur; vetustum vero, nimis spissum, vel avolante plane *oleo volatili*, siccescens, ut usui interno ineptum, improbatur.

Q. *Balsami pineo-laricini*, æthereo-oleosa. *Odor* gravis, ingratus; *sapor* pungens, amaricans. *Alcoholus* est solubile.

V. Ejusdem, quam maxime stimulans; diuretica; urinam violaceo odore imbuens; *gummi* vero *pineo-laricini*, fertur esse nutritoria; antiscorbutica.

U. Organa incitando uropoëtica laudatur in retentione lotii, nevroblacia eorum orta, et vim præcipue in urinæ vias exsecrendo calculosis profuisse fertur. In blennorrhœa (gleet) cautæ vis ejus tentanda, ne sub opportunitate inflammationis, majoribus præbiis, hæc oriatur, unaque epididymidem in consensum trahat. In blennorrhagia (vulgo blennorrhœa acuta) præpostero adstringentium usu, importune inhibita, præsidium est in *cereolis*, (*Unguento e balsamo pineo-laricino Ceraque confecto*) illitis, atque urinæ itineri inditis. In arthr. dynia arthritica in usu fuit, sed heic prout, et in myodynæ rheumatica extrinsecus adhibetur. In hydrope a nonnullis laudatur, *oleum* tamen ex eo destillatum (*Pineo-laricinum oleum*) præfertur. Friatum una cum *Vitello ovi* vel *mucilaginoso* quopiam, aquaque dilutum, et per modum *clysteris* adhibitum a cel. CULLEN laudatur, qua efficax contra obstinatam alvi duritiem, remedium. Friatum simul cum *Superacetate Plumbi liquido*, linimentum præbet, quod non medetur quidem aperto carcinomati, sed impedit ne vehementius serpat, et illæsas vitiatæ addat partes, odoremque tollit cadaverosum (GESNER Samml. von Beobacht.) Opportunum est hoc *balsamum* ob tenacitatem suam ad conterendum subtilissime *Hydrargyrum*. *Gummi larignum* a Vogulis (gente Hunnica; minime vero, ut SCHLÄTZERUS vult, Fennica,) inter cupedias ciborum re-

latum, offa monente, esitatur (**PALLAS.**) vix tamen existum longam ejus nutritu senectam tolerari posse. Præter oligotropham ejus virtutem, dentibus firmandis, aptum esse censetur, vique, ut ferunt, antiscorbutica, prodesse posse existimatur.

D. *Balsamum pineo-larinum* a quinque ad decem guttas datur, sensim adscendendo ad semidrachmam. Contra tæniam spatio böhori ad sex drachmas ante decubitum exhibitum fuit. (**CLOSS.**) Ope *Vitelli ovi, mellis, Sacchari*, facile in emulsionem coquitur; datur quoque in pilulis.

V. *Clyster pineo-balsameus; Haustus —; Oleum pineo-larinum.*

P I N U S S Y L V E S T R I S.

Сосна боровая.

Foliis geminis rigidis primordialibus, solitariis glabris inter arbores Ruthenici Imperii sylvestres vulgatissima utilissimaque. Per omnem latitudinem et longitudinem, excepta articula plaga, et maxime boreali Sieveriae angulo, in *Pini Abietis* sodalitio plerumque, crescens, proceritate, ramorumque densitate venerabilis. *Cl. et O. præcedentis. Usualia sunt:*

TURIONES PINEO-SYLVESTRES, COCOВЫЯ ШИШКИ, (male strobili vel *coni* dicti) ovato-conici, subgemini, basi rotundati. **BALSAMUM PINEO-SYLVESTRE**, (*Terebinthina communis Ph. Ross.*,) succus resinoso-oleosus perforatione aut incisione *arboris* obtentus. Hoc calore ignis siccatum, dat **RESINAM BALSAMI PINEO-SYLVESTRIS**, seu **COLOPHONIUM**. Lente combustis *Pini sylvestris* lignis erogatur *resina empyreumatico oleo* et *acido* prægnans vulgo *Pix* dicta. (Videsis: **OLEUM PINEO-LARICINUM.**) Interdum loco turionum pineo-sylvestrium, vel *Abietis foliosae propagines*, vel ejusdem turiones, inveniuntur; loco autem balsami pineo-sylvestris, balsamum pineo-piceum, (*Terebinthina Argentoratensis*) intensiori colore, et amaritudine, distinguendum, porrigitur.

Q. *Turones pineo-sylvestres*, ejusdem sunt qualitatis, cuius pineo-attegni; balsamum vero ejus cum pineo-larinum converit.

V. *Turionum* eadem itidem, quæ pineo-abiegnorum; *balsami extus* adhibiti: irritans; reproductioni favens; zooctona.

U. *Turiones pineo-sylvestres*, cocti melle, aut sero lactis addito, irritant vasa intestinorum capillaria, in cutim simul et urinam agunt; vasa etiam sanguifera, ad vividiorem actionem, majorē remque calorem producendum stimulant; hinc primaria eorum laus est in scorbuto (*LINNÆUS,*) syphilide (*HIRSCHEL,*) et diuturnis pectoris morbis; sine febri tamen. *FAKE* ex iis, circa *Humuli Lupuli* additionem *Zythum* paravit, velificantibus per æqua Oceani, adversus scorbutum, proficuum. Ita *Sieve-rii* (Sibirici incolæ) tenellas *Pini junioris* summitates et *librum e* summis *ramis*, verno tempore, derasum, in frequenti usu adversus idem malum habent. *Libro* etiam, gustu *citrei corti-cis* subæmulo, commendabili, pro cupediis utuntur. Laudantur *turiones* in psora (*VOGEL;*) ab aliis autem in arthrodynia et myodynia rheumatica (*WALDSMIDT BAGLIV.*) *Succus sub cortice latens* vere novo ad solutionem alvi usque suctus expulit ascarides (*ROSENSTEIN.*) *E cortice* interiori adultiorum *truncorum*, albo, molliori, fibroso, dura, urgente annonæ caritate, necessitas, docuit *panem* conficere Lapones (*LINNÆUS;*) ita etiam ad Kamam, ad Wiatkam habitantes (*PALLAS.*) *Balsamum pineo-sylvestre*, prout est impurum, non convenit *interno* usui; *extrinsecus* vero adhibetur per modum *unguenti* ad pus movendum, vel idem, sub asthenico statu, corrigendum. In ulceribus suppuratione curandis, ubi reproductio, vel morbida est, vel tardius æquo procedit, adcommodum est *remedium*. In vulneribus punctis, laceratis, vel inflammatione erysipela-cea stipatis, ita, in nervorum, tendinum, ligamentorum, læsionibus, quidam eidem adjiciunt *Oleum pineo-laricinum*, præcipue in forma *balsami*, (*balsami pineo-sylvestris libra, cerae et olei pineo-laricini*, utriusque unciæ duæ,) in apertis pernionibus virtute sua balsamica gangrænam avertit. Tineæ capitis, emolliita prius, *oleo pingui*, crusta, admotum, juvat; quatenus eandem detrahit, atque remanentia ulcuscula ad sanationem perducit. Præsente in intestinis puriformi materia, e. g. prægres-

sis diarrhoeis, dysenteriis cum Opio et lacte in clystere datur et pro tali clystere drachma, vel duæ, imo, pro re nata, semuncia ope Vitelli ovi cum lacte miscetur. Videsis: OLEUM PINEO-LARICINUM.

V. Alcohol dilutum antiscorbuticum; Decocitura antiscorbutica; Extractum Pini sylvestris; Pilulae piceae; Sapo piceus; Species Pini compositæ; Unguentum Picis ceratum; —— sulphuratum; — resinoso-ceratum I; —— II; — resinosum.

P I P E R L O N G U M.

П е р е ць д л и н н ы й И н д і й с к і й.

Planta frutescens, sarmentosa, fol. cordatis, petiolatis, sessilibusque, in Amboina, Java, Bengala, aliisque Indiæ orientalis regionibus gignitur. Cl. Diandr. O. Trigyn. O. N. Piperritæ L. Urticæ J. Perennis. Usuales sunt:

FRUCTUS, seu spicæ cum baccis immaturis siccatae, oblongæ, cylindraceæ, amenta repræsentantes. Situ communiter debilitantur, et tum usui medico ineptæ sunt.

Q. Acris, aromaticæ, in principio resinoso et cinchonino, alioque illi analogo (THOMSON,) residens.

V. Incitans; stomachia; excalfaciens; pituitam salivamque movens; phthiroctona.

U. Indiæ incolis, præcipue Gangaridibus, non modo ad instar condimenti ciborum, pharmacorumque usu venit; sed etiam in stomachi mucositate, inertia, indeque orta bradypepsia, (hunc in finem aqua ab iisdem bibitur, cui immissa fuit larga fructus Piperis longi copia,) inflatione, vertigine, et id genus aliis incommodis. Adjicitur quoque ab iisdem unguentis, paralysi superandæ, opportunis (RUMPH,) iisque, quibus adversus arthrodyniam rheumaticam utuntur (PRISO.) Vires fructus Aceto congruisque conditus, fercula eorum acceptiora reddit. A nostratis quibusdam, arthrodyniæ arthriticæ, præcipue vero podagræ retrogradæ paralysique obponitur; extrin-

secus vero relaxationi uvulæ, *sinapismis* etiam quandoque, intendendæ eorum vis ergo, additur.

D. Perraro in pulvere ab octo ad decem grana propinatur. In pituitosa ventriculi atonia in *Vino* diffusum prodest.

V. *Pulvis aromaticus.*

P I P E R N I G R U M.

Перецъ черный зернистый.

Frutex scandens per insulas orientales spontaneus, in *insula Java copiose cultus*. *Cl. et O. præcedentis. Usuales sunt:*

F R U C T U S, (seu *baccæ*) qui *Piperis nigri* nomine veniunt (перецъ черный) immaturi potius, rotundi, extus rugosi, nigrigentes, intus albidi; qui vero penitus maturuerunt, macerati, externo suo tegmine privati, *album* constituunt *Piper. Piper nigrum*, quod vilioris pretii, virtuteque *albo* inferius, rugis et cortice nigro, dignoscendum.

Q. Resinosa parte, quam *cortex* præprimis continet, acrimonia eidem inhærente, nititur. *Odoris* est peculiaris, non adeo aromatici; *saporis* acerrimi, masticatione os et fauces igneo sensu affidentis.

V. Topice, sub sensu caloris, parum diffuso, irritans; stomacho apta.

U. In languore ventriculi, colluviei primarum viarum pituitosæ, originem debenti, et orta hinc bradypepsia, vertigine, vomituritione, hemicrania, habituali constipatione etc; non spernendus, quapropter additur etiam aliis remediis, a quorum protracto usu labefactatio ventriculi metuenda esset. Alii ob æstum, quem ventriculo in primit, usum restringendum esse, ad curandum ventriculi torporem in senibus existimant. Laudatur etiam in podagra, quæ nec febri stipata est, et labefactata digestione supervenit. A ruricolis contra dialeipras adhibetur; sed interdum, haud sine ulla noxa; in furorem enim incidit febriens ingurgitatis duobus cochlearibus *piperis* uno haustu sub vigorem mali in febri quartana (*MURRAY.*) Cachexiis quoque opponebatur, ita scrofulis, ubi sti-

nulus e re fuit. Aptius masticando prodest in glossoplegia et *cataplasmatibus sinapinis*, intendendæ efficaciam causa, additur haud inepte. Condimentum ciborum usitatissimum. Meminisse heic juvat *fructus Piperis Cubebæ*, qui drachma saepius de die propinata, blennorrhœam citissime curare dicitur.

D. Grana quatuor usque ad duodecim sensim addendo, deglutiri possunt mane vesperique, vel in pulverem tenuantur, atque a granis quinque ad decem, sub nimia nevrobacia, exhibentur. Aliæ eum administrandi formæ exoleverunt.

V. Pulvis aromaticus.

P L U M B U M.

S A T U R N U S.

С в и н е цъ.

Nativum nullibi, (nam ex insula Maderæ dubium,) sed semper oxydatum, et mineralisatum invenitur, idque præ ceteris, in montibus metalliferis Britanniæ, Saxonum, Herciniæ, Bohemiæ etc., imo etiam apud Ruthenos in Sieveria, in multis Oalonecensibus, Uralensibus et Dauriæ mineris, præcipue *Plumbum mineralisatum rubrum* (*Plombe Chromaté*), *Plumbum miner. viride* (*Plombe phosphaté*) in mineris aureis Æcatherinopolitanis; Berezowiensibus in *Quartzō* et *Gneisso* sociatum etc.

Q. Metallum e cæsio grysei coloris, ponderosum, (ponderis 11, 352) molle, ductile, maxime malleabile; haud tamen elasticum, neque sonorum. Ad aërem e contactu *Acidi carbonici*, vaporibus contenti, oxydulatur, ut superficies in pulverem cinereum fatiscat. Igne ante candescientiam ad 206, 4° R. deliquescit, et sub refrigeratione in tetraëdras crystallos coit. Digitis tritum odorem peculiarem, saporemque metallicum substypticum prodit. Via sicca facile oxygenium adtrahit, atque pro ratione quantitatis ejus oxyda diversi coloris constituit, ita gryseum, seu *Cinis Saturni*, citrinum seu *Massicot*, fulvum seu *Lythargyrium rubrum* seu *Minium fuscum*, quæ omnia in vitrum pellucidum mellei coloris (*Vitrum Plumbi*) funduntur. *Acida* omnia adficiunt *Plumbum*; sed, si recesseris ab

Acido nitrico diluto, quod *Plumbum* penitus solvit, reliqua in *acidulum* duntaxat, aut *hemioxydum* id mutant.

V. *Plumbum oxydulatum*, aut, quod jam *salis* indolem adeptum est, *calorem* ac *carbonicum* adtrahit, solidas partes, vasa absorbentia, et capillaria, nervos etiam organicos, et fibras musculares constringit.

U. Hinc adhibetur ad impetum humorum, contractis cutaneis vasis, reprimendum, aestum nimiam mitigandum, secretiones morbosas, et inflammationem topicalam cohibendam. Internus *Plumbi* usus est plerumque anceps; persæpe enim in organismum animalem, qualibet receptum via, proprium gignit morbum, sic dictum, enterodyniam plumbeam (colicam saturninam,) quem sequentia concomitantur symptomata: bradypepsia, fastidium ciborum, flatus, ructus acidi dulces, vel et amari, sapor ore peringratus, metallicus, nausea, vomitus, alvi pertinax compressio, vel excrementa dura, quasi combusta, nigra, vel et liquiditas incoercibilis, enterodynbia, et tormina intestinalium cum abdominis intractatione, vel circa umbilicum, qui interiora versus trahitur, dolor; tum accenditur febris, siccitate oris sitique magna, vertigine, tremore artuum, convulsionibus, imo paralysi stipata; cutis fit aspera, luridi vel lividi coloris, æger, (et vasis chyliferis, et glandulis obstructis,) magis magisque macescit, atque demum tabe consumitur. Hinc scire licet, *Plumbum* esse venenum, organismo animali insidias lente struens, ejusque effectus, eo perniciosiores esse, quo agit tectius, esto proinde lex, non nisi cautissime, et extrinsecus modo in usum vocandum; obortis autem præpostero consilio malis, auxillum in pinguibus oleis, *Opio*, cortice *Cinchonae off.*, *Acido sulphurico*, nec non in *Supersulphate Aluminæ* et *Potassæ*, quærendum esse. Sæpe evenit, præsertim in metropolibus, ut negotiatores turpis lucri desiderio stimulati, in œnopolii *Plumbum*, in primis vero *Supercacetum* ejusdem crystallatum acidulis vinis, ut iisdem dulcem impertiant saporem, immisceant, vel etiam, ut *cibi potusve*, præsertim *acidi*, vasis e *Stanno*, *Plumbo* inquinato, confectis, vel eti-

am figulinis, encausto plumbeo, male vitrificato, obductis, per aliquod tempus contenti, partem metalli hujus solvant, eoque in venena commutentur, quod omnino detegi e re est, fitque optime ope Aquae hydrosulphuratae acidulae, quae admistum Plumbum nigro colore præcipitat, vel additione pauxilli Acidii sulphurici, quo facto, Sulphas Plumbi, sub forma albescens pulveris præcipitatur; si vero adhibetur Sulphuretum Potassae vel Calcariae, præcipitatum Plumbi, nigrescit.

V. *Oxycarbonas Plumbi; Oxydum ejusdem semivitreum.*

POLYGALA AMARA.

Истодъ горький; Многомлечникъ.

Planta flor. cristatis, racemosis, caul. erectiusculis, in montosis, nemorosis crescens. Cl. Diadelph. O. Octandr. O. N. Lomentaceæ L. Pediculareæ J. Perennis. Usualis est:

RADIX fibrosa, fibrillis tenuibus subluteis, ineunte vere cum foliis colligenda. FOLIA, obtusa radicalia, obovata majora. Permutatur cum POLYGALA VULGARI, caulibus procumbentibus, foliis linear-lanceolatis acutiusculis, tum et sapore non amaro distinguibili. Adulteratur etiam POLYGONO AVICULARI primo intuitu, jam diverso.

Q. Radicis: subdulcis, subamara. Foliorum sapor amarulentus, in resina, Alcohole extrahenda, residet.

V. Leniter stimulans; expectorans, propter copiam extractivi principii in musculares fibras cum primis agens.

U. In morbis pulmonum asthenicis, (vasis eorum a debilitate mucum secernentibus,) tussi pituitosa, asthmate, catarrho chronicō, phthisi pituitosa, ultima periodo pneumonitidis typhodis, in conñubio in primis Cetrariae islandicae invaluit. A copia lactis, quam animalia habent, dum in pratis hacce planta pascuntur, nomen sortita est (BOËRHAAVE.)

D. Radicis pulveratae a scrupulo ad semidrachmam bisterve; rarius: decocturae radicis uncia ad sesquilibram aquae

de die, per duas uncias ter, quaterve sumendæ. Doses justo majores facile calorem et febriculam excitant.

V. *Decoction Polygalæ amarae.*

P R U N U S D O M E S T I C A.

Слива обыкновенная.

Arbor in hortis culta, præstantior in australibus Rutheniae Europææ et Asiaticæ regionibus. *Cl. Jcosandr. O. Monogyn. O. N. Pomaceæ L. Rosaceæ J. Usualia sunt:*

F R U C T U S, (Черносливъ,) seu drupa oblonga, carnosa, rugosa; ejusque *pulpa*. Fructus immaturi, vel vermibus repleti, uti inepti, rejiciendi; haud secus ac *pulpa Cupro* infecta, quod *ferro* polito detegitur, vel non debitæ consistentiae. **G ум м и,** (Камедь.)

Q. A principio *mucilaginoso* et *saccharino* derivanda; sapor dulcacidulus. *Fructus Brignolensis* eminet principio *saccharino*, atque dulcedine cum grato acore juncta, *vulgari*, antistat.

V. Nutriens; frigerans; alvum subducens.

U. Febres inflammatoriae, (*decoctura e fructu* parata febrietibus adcommoda,) hepatemphraxis, alvus adstricta (*aqua cum fructu, foliisque Cassiae Sennae* infusa dat hunc in finem potionem.) Addito *pulpæ Acido tartarico*, obtinetur massa *pulpæ fructus Amlicae Indicae (Tamarindorum)* analogæ, quæ utpote parabilis commode et ubique, merito præfertur illi, majoris dispendii et adulterationi subjectæ, præsertim ubi præscribi eandem oportuerit militaribus præfectis. Pro succedanea quoque *pulpæ fructuum Cassiae Fistulae* habetur, ut proinde unius indigeni remedii usu, dispendium duorum exoticorum, tuto vitari queat.

D. A tribus unciis ad selibram decocti fructus cum *foliis Cassiae Sennae, Supertartrate Potassæ*, vel *radice Rhei palmati*, addito *aromatæ*, et id genus aliis remediorum adminiculis. *Pulpa* a duabus unciis ad tres commode præscribitur in ele-

uariis, additis præsertim aliis, si vires remedii intendere placet.

V. *Electuarium Sennæ; Mucilago Pruni domesticæ; (Videsis MUCILAGINEM ACACIÆ VERÆ;) Pulpæ prunorum.*

P R U N U S P A D U S.

Ч е р е м и х а.

Arbor europæa, per Rutheniam septentrionalem vulgatissima, locis præcipue depressis, crescens, floribus racemosis, foliis deciduis, basi subtus biglandulosis. *Cf. Icosandr. O. Monogynia O. N. Pomaceæ L. Rosaceæ J. Usualis est:*

C O R T E X R E C E N S. Stratum ejus externum præfertur interno, quoniam istud minus lignosum, et magis resinosum est.

Q. Nititur *acido prussico*, principio *resinoso*, *extractivo amaro* et *scytodepsico*, estque *sapore aromatico amaro*, *nucleos Amygdali amaros*, æmulante, similique *odore insignis*. In sicco similia vestigia remanent.

V. Narcotica; tonica; adstringens; diaphoretica et diuretica. Proxime in nervos abdominales et sistema irritabile agit.

U. Dialeipyris subigendis parem esse, haud ambigua nititur fide, adversus quas, tum in Lotharingia, quum etiam in Suecia efficax fuisse perhibetur (LUNDMARCK.) Fenni *decocitura* ejusdem saturatissima curationem syphilitidis moliebantur, experimenta dein curatius exposita, efficaciam ejus ultra probarunt (BJÖRN LUND). In adfectionibus syphiliticis lenioribus, ut exanthematibus obscænarum partium, oris, blennorrhœa urethræ, *decoctura* videtur sanationem absolvisse; graviores vero mitigasse; subjuncto autem *Hydrargyro* curationis tempus abbreviatum fuisse. Præter vim, qua in ipsum virus pollet, solatur ægros, qui una cum hoc, inquinamento scorbutico, vel labe concoctionis virium laborant. *Balineis* etiam e *decocitura Pruni Padi* contigit, ut pessima syphilitica symptomata tolerentur, donec subsequa *praeparatorum* e *Hydrargyro* administratione, ægri perfecte convalescerent (LUNDMARCK). Nu-

perrime cl. BREHMERUS, aliique, tum Berolinenses, quum Vindobonenses Medici, experimentis curatius factis, evicere, maximo cum fructu exhiberi posse adversus arthrodynamiam, myodyniam rheumaticam et paralyticas, quae has adsequuntur, affectiones. *Aqua e cortice destillata, nucleorum Amygdali amarorum, odore, saporeque pollens, lactea est, et dum fortior paratur, oleo volatili graviori prægnans, quod ubi separatur, sisit præsentaneum venenum, agitque eadem ratione, ac Aqua Pruni Laurocerasi;* præstat autem æquabilitate virtutis, cum cortex ubique obvius sit; *folia autem Pruni Laurocerasi persæpe siccata adhibeantur, multo debiliora, recentibus.* BREHMERUS illam in cardialgia utilissimam invenit; CURTIUS vero SPRENGELIUS auctor est, suasorque, ut drachma ejusdem exhibetur ad sistendos spasmos doloresque e vis sensiferæ irregulare distributione ortos, insignem exsertura vim etiam in curandis atrabiliariis stasibus abdominis, ramos venæ portarum incitando, spasmosque exinde ortos sedando. Scire licet *corticem præparataque ex eo, inflammatorio statui aliena esse.*

D. Adversus dialeipyras datur in pulvere ad *Corticis Cinchonae officinalis modum, et in electuario, interdum cum Muriate Ammoniae depurato.* Pro syphilide paratur decoctura e *corticis sicci vel recentis concisi unciis duabus et aquæ libris quatuor ad dimidium cocta dein colata.* Hujus quotidie libra sex haustibus diversis bibitur. Præbium, pro ratione adfectionis organismi, augeri, vel minui potest. Meminisse juvat: largam dosin cephalalgiam, animi deliquia, vomitum et diarrhoeam cire, imo auctiorem, apoplexiā et subitam mortem illaturam.

V. Infuso-decoctura Padi.

P Y R U S M A L U S.

Яблонъ.

In Russia præsertim meridionali frequentissima arbor, in sylvis et dumetis spontanea. Cl. Icosandr. O. Pentagyn. O. N. Pomaceæ L. Rosaceæ J. Usualis est;

FRUCTUS, seu POMUM.

Q. Sapor dulcis, vel dulcacidus.

V. Eccoprotica; refrigerans.

U. Forma *cataplasmatis*: in ophthalmithide, ulceribus putridis.

Decocturae: in febribus. Succus e pomis commumbus immamnis, Britannis *Crabs* dictis, expressus, in Anglia sub nomine *Verjus* venumdatur.

V. *Alcohol dilutum*; *Extractum Ferri pomatum*; *Pulpa pomorum*; *Vinum lusitanicum artefactum*.

Q U A S S I A E X C E L S A.

Q U A S S I A A M A R A.

Квассия высокая; — горькая.

Arbor procera Indiæ orientalis, Surinami, Jamaicae et insularum Caribbæarum, externa facie ad *Fraxinum excelsorem* accedens. *Cl.* Decandr. *O.* Monogyn. *O.* *N.* Gruinales *L.* Magnoliæ *J.* Perennis. *Usuale est:*

LIGNUM, durum, leve, albo flavescens, interne striis tenuibus notatum, cortice ex albo cinereo, fragili tectum, summe amarum. *Infusum ejus non fucatur Sulphate Ferri.* Frustula crassiora, cortice tecta, sunt tenuioribus præferenda. *Lignum Rhois Metopii* distinguendum, cortice glabro, hinc inde maculis nigris obpresso, hujus *ligni* præterea *infusio Sulphatis Ferri* solutione nigrescit.

Q. Fere inodora; saporis intense et pure amari; *corticis ligni* aurantioris.

V. Tonica, quin irritet, adstringat, nauseam moveat, alvumque ducat, hinc ob certos præstitutos fines, ceteris amaris, subinde præferendum remedium. Præterea stomachica, antihelminthica et antisептика eidem facultas merito adscribitur.

U. Debilitas canalis intestinalis et inde dyspepsia, diarrœa, dysenteria, pressio ventriculi, enterodynbia, nausea, vertigo, debilitas muscularum etc. Hypochondriacis et hystericiis, vel ex abusu spirituorum ægrotantibus, præcipuum adfert levamen. Febres intermittentes et remittentes, arthrodynia, enterodynbia arthritica, sudores pthisi-

corum fetulenti, hyperesthesia, helminthiasis. Idque aut *de cocturae* (melius *infusi*) cum *vino* vel *aqua* triturando, vel *ex tracti* forma adhibetur. Memoratu dignum, muscas *infuso* ejus necari, illudque tutius, quam *Cobalum* in conclavibus ad ea delendas distribui (*NIEMANN*).

D. *Pulveris* grana decem; rarius tamen in hac forma. Drachma ad semunciam in libra vel *aqua*, vel *vini* infusa cochleatim, propinatur. *Extractum* forma *misturae*, *pilularum* a quindecim granis ad scrupulum recte datur.

V. *Decoctura Quassiae excelsae; Extractum* — — .

Q U E R C U S C E R R I S.

Дубъ чернильный.

Frutex orientalis, præsertim in Syria frequens; in Russia vero (observante ill. *HABLITZ*) copiose crescit in montibus Chersonesi tauricæ, inter Bartschisaray et Inkerman, et in maritimis, ita quoque in Caucaso præsertim ad fluvium Ksanii circa Achalgori *). *Cl. Monœc. O. Polyandr. O. N. Amen-*
taceæ L. et J. Usuales sunt:

GALLÆ QUERNÆ (*Gallæ quercinae Ph. Ross.* чернильные опухи,) sunt tumores morbosi foliorum petiolorumque punctura *Cynipis insecti hymenopteri* in **QUERCUM** variis speciebus; præcipue vero in **QUERCU INFECTORIA** (foliis ovato-oblongis, sinuato-dentatis, glaberrimis, deciduis, fructibus longissimis, sessilibus) ut cl. *OLIVIÈR*, itinerator fide dignus, adseverat (videsis: *Voyage dans l'empire Ottoman*,) **QUERCU AEGILOPE** et **ESCULO** excitati; quæ a Mosula ad Tigrim proveniunt, sunt nigricantis coloris, verrucosæ, nucleo fusco referentes et imperforatae, atque pro optimis habentur; viliores vero existimantur Europææ in **QUERCU CERRI** aut **ROBORE** repertitiae, rubicundæ, vel albidæ, foratae, intus spongiosæ. In usum medicum seligendæ sunt exiguae molis, ponderosæ,

**Q. Cerris Pall., Ross. 2. p. 4 et ind. taur. Habl. taur. p. 96 est Q. pubescens Lip.* ed. Wild. 4. p. 450. *Bieberstein fl. taurico-caucas. 2. p. 402,*

ompactæ, aculeatæ; leves vero porosæ, coloris flavescentis, ejiciendæ. Lapidæ figuræ gallarum a turpilucrīcupidis iisdem dediti, gallas reddunt ponderosiores, eoque detegitur fraus.

Q. Eximia, styptica, a copioso scytodepsico principio, et gallico acido, paucoque extractivo (scytodeps. $\frac{1}{15}$ et gallici $\frac{1}{10}$) repetenda. His admista est mucilago et materia evaporatione eddita insolubilis, dein *Calcaria* et materia *salina* (D A V Y.) Decoction gallarum saturata frigescensque deponit præcipitatum e pallido flavens sat copiosum, quod est purius *Scytodepsicum principium*, vix alio processu, puritate ea, parabile. SAPOR valde acerbus, odor nullus; masticatæ friabiles, linguam faucesque vehementius constringentes.

V. Adstringens; roborans; alvum comprimens; antiseptica.

U. In dialeipryris (H O M B E R G, R E N E A L M,) in connubio amarorum, ex. gr. Gentianæ luteæ (C U L L E N,) in diarrhoea inventerata; in hæmorrhoidæ cœca, unguentum e gallis subtiliter in pulverem tenuatis et adipe suilla depurata, aut butyro, pari vel majori vehiculi portione (B E L L, C U L L E N,) illinitur, vel si sedes alta in intestino recto est, infusum gallarum quernarum saturatum immittitur. Externa decocturae, vel infusi, instar epithematis, vel injectionis, admotio, ad relaxatas partes confirmandas, ut in prolapsu uteri, ani, hæmorrhœis, blennorrhœa etc., haud est rara. Gargarisma quoque, pro re nata, non alienum. Conficiendo quoque atramento peridoneæ sunt gallæ quernae.

D. Semuncia gallarum quernarum decoquitur in aquæ libra ad sesquilibram. Pro usu interno a granis decem ad scrupulum in substantia præbetur.

V. Decoatura gallarum quernarum; Clyster adstringens opiatuſ.

Q U E R C U S R O B U R.

Дубъ обыкновенный.

Per omnem Russiam temperatam et australiorem passim nemora efficit et arbustim fere ubique provenit, frequens; in maxime borrealibus vero oris naturaliter deficit, licet sata

usque ultra 60 gradum vivat. *Ct.* Monæc. *O.* Polyandr. *O.* *N*
Amentaceæ *L.* et *J.* *Usualia sunt:*

CORTEX ramorum (корка дубовая) planiusculus, crassiti semipollucari, subligneus, undique cinereus, extus longitudinaliter subfissus, saepe conspurcatus lichenibus. Tenellorum ramorum præfertur. **NUCES, seu GLANDES; FOLIA; CUPOLA GLANDIS,** (дубовые желуди, листы, чашечки желудные.)

Q. Styptica, a Cinchona, minori quantitate resinoso-aromaticarum partium, et majore scytodepsici distans. Acidi gallarum vix adsunt certa vestigia, etsi tinctura Crotonis rubro tingatur colore. Odor ferre nullus; sapor admodum stypticus, acerbitate permistus, cum a junioribus deperpitur ramulis.

V. Adstringens; alvum suppressans; roborans; antiseptica.

U. Lexipyreti nomine a multis celebratus cortex-quernus, sed ob nimiam suam adstrictioriam vim, aut parcus, aut in congruo connubio remediorum roborantium resinoso-aromaticas partes tenentium, adhibendus. In asthenicis morbis, typho, cianche atonica, topica relaxatione, metroptosi, relaxatione oculæ, œdematosis tumoribus, hæmorrhœa, blennorrhœa, gonacrasia, vel pro ratione morbi intrinsecus adhibetur, vel extrinsecus in vino rubro, vel aqua, forma fatus, injectionis, garagismatis. In ulceribus putescentibus, carie, fatus ex eo, additis aromaticis, non est alienus, haud secus ac in gangræna, effectu cacoëheorum ulcerum, decoctura ejusdem concentrata, addito, ni peripheriæ inflammatio obstet, Alcoholis tantillo, extus ope spleniorum admota, magna est efficaciæ. Prodest etiam eadem in luxationibus a ligamentorum laxitate et manticulæ ortis, in exania, in leucorrhœa muliebri diuturna, tumoribusque pituitosis ex hæmorrhoidè cæca. In pulvere sacculis lineis conditus, vino immersus, atque herniosis, præpriminis teneræ ætatulæ, ipsi herniæ superdatus valet, nec minus in abnormi secretione, scrofulis, rachitide, atrophia, vel intrinsecus, vel extus lotione administratur. Glandes testae per modum Cinchonæ præscriptæ adjutabilem præstitisse operam, perhibentur. Nucleus glandium, sapore amaro austero-

que, testus et cum *aqua decoctus* in adenemphraxi et atrophia utilis fuit. Eadem ratio *foliorum* et *cupolae*.

D. In pulverem difficulter tenuatur, ac proinde hæc forma interno usui vix commoda. *Corticis pulverati* uncia in bilibra aquæ ad libram decoquitur, atque cochleatim sumenda datur. Pro usu externo *decoctura* concentratior commendanda est, ut in gangræna selibra *corticis* cum quatuor libris aquæ decoquatur ad colaturam bilibræ. *Glandium* *tostarum* semiunciae adfunditur aquæ *fervidae* selibra, vel unciæ octo, pro die.

V. *Decocitura Quercus*; — *aluminata*; *Clyster adstringens*; — *opiatus*; *Pulvis Quercus compositus*.

RHEUM PALMATUM.

Ревень дланелистный.

Planta *foliis* palmatis, acuminatis, in montibus excelsis Tatariae Mongolicæ et septentrionalibus Sinensis Imperii provinciis, crescens. *Cl. Enneandria*. *O. Trigyn*. *O. N. Oleraceæ* *L. Polygoneæ* *J. Perennis*. *Usualis* est:

RADIX recens, magna, carnosa, solidæ texturæ, cortice dilute fusco obtecta; extus autem, resecto eodem, ex luteo aut croceo rubet, intus iisdem coloribus et interdum etiam albido-variegata. **PALLASIO** teste, e **RHEO** quoque **UNDULATO** et—**COMPACTO**, desumitur. *Radix Rhei rhabontici* eidem interdum supposititia, ramosa est, extus bruna, intus ex albido et subluteo-variegata, non tan ingrati saporis, quam *radix Rhei palmati*, neque amaricantis; sed subdulcis et viscidæ. *Radix Rhei undulati* magis est perpendicularis et indivisa. *Pulveris Rhei* loco, *Curcumæ longæ radicem* fuisse venditam refert **SCHAUBIUS**. *Radices* segmenta, levia, pallidiora, referentes, teredinem cariemve sentientia, improbantur. *Rheum*, quod a Ruthenis (Ревень Сибирский) per Kiachtam emporium venit, merito censemur laudatius et plus *scytodepsici* principii, *Oxalatis Calcariae* et *resinae* tenet, suntque frusta oblonga subteretia, vel subplana, dia-

metri latioris, foramine pertusa, *eique*, quod a Batavis Cantone Chinæ australis adportatur, atque plus principii *extractivi* et acidi gallici habet, omnino præferendum.

Q. Lutea, principio extractivo resinoso multo, volatili pauco, scytodepsico saline peculiari (*Oxalas Calcariae* ad septimam totius partem) et tantillo aluminae et siliceae nititur. Eo autem major *Oxalatis Calcariae* obtinetur copia, quo antiquior est radix.

V. Roborans, præcipue in musculosa debilitate, in secretiones penetraliter agens, resinosis volatilibus suis partibus, nervosum sistema irritans; exsuperante tamen principio extractivo, non ita, ut *resinosa*, excalfaciens. Minoribus dosibus, irritando congrue musculos intestinalium, et robore vi, secretiones canalis intestinalis remorando, peptica, majoribus profusas succorum entericorum secretiones atque muscularum intestinalium hypererethismum excitando, alvum subducens.

U. Canalem intestinalem irritando, in colluvie pituitosa prodest, præcipue cum *Muriate Ammoniae*, *Supertartrate Potassae* atque *aromatico-amaris* remedii, ut radice *Amomi Zingiberis* etc., præsertim, si acor adjunctus est, interveniente flatulenta enterodynia, pulvis ad scrupulum cum *Magnesia*, *Soda*, aut floribus *M. Chamomillae* prodest, hinc etiam hypochondriacis, hystericas ad juvandam digestionem laudatur *radix Rhei* pulverata cum cortice fructus *Citri Auranii*, radice *Amomi Zingiberis*, *Sulphate*, aut *Supertartrate Potassae*. In alvifluxibus pituitosis, et in ipso cœliaco morbo, nimis commendatur *radix Rhei* cum *gummi Acaciae verae*, *succo Hyoscyami spissato*, radice *Colombae* et *Elaeosaccharo Cinnamomi*, ipsis infantibus, non adeo teneris, viridibus alvifluxibus, acore ventriculi et dysodontiasi laborantibus, proficia cum *Magnesia*, vel *Subcarbonatis Potassae* tantillo et *Elaeosaccharo Foeniculi*, quin in ipsa rachitide et atrophia infantum non male incipit medela *radice Rhei*, forma *syrupi*, vel cum *radice Rubiae Tinctorum*, bile taurina, extractis quoque *amaris* etc., in *catapotia* rite redacta. In dysenteria sub finem, subductis videlicet cruditatibus, remittente dolore ex inflammatione, utilitatem promittit; infunditur

sufficienti quantitate aquae ad sesquidrachmam cum semi-drachma *C. Ipecacuanhae*, addito gummi *Acaciae verae* et syrupo *Althaeae*, in dysenteria non adeo febrili, neque enterodynia vehementi, aut tenesimo, stipata. Hæmorrhoidariis etiam, diu conflictatis, pituitæ cursum ex ano habentibus, haud parum levaminis præstat radix parvis præbiis, cum radice *Colombæ* et ligno *Quassiae excelsæ*, conjunctim propinata. Commendatur quoque eadem contra aphthas, uti etiam a RIVERIO adversus lumbricos et vermina. Infunditur etiam, additis aromaticis, radice *Acori Calami*, *Inulae Helenii*, aut *Colombæ*, in malis viscerum abdominalium diuturnis. Qui e febribus convalescunt, infirmitate interdum cum alvi obstructione laborant, et tum idonea est radix cum *Cinchonæ cortice cocta*. Plethoricis, febrienteribus, obstipatione sæpe laborantibus et profluiis sanguinis, congestionibusque obnoxiiis, aliena est. Extus: pulvere radicis *Rhei p.* diuturna putidula ulcera, quæ a debilitate topica trahuntur, non inepte resperguntur, incitandi ergo.

D. Pulveris, a scrupulo ad duos; minori vero in dosi, aliis catharticis recte conjungitur, uti etiam Submuriati *Hydrargyri* etc. Sæpe aroma quoque aliquod utiliter eidem adjicitur.

V. Extractum *Rhei palmati*; Infusum —; Pilulae —; Pulvis *Rhei compositus*; — — et Submuriatis *Hydrargyri*; Tinctura *Rhei amara*.

RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

Пьянишникъ; Роза Сибирская подснежная; коряцкая Шабина; Кашкара; Келарскъ; Черногривъ; ab incolis vero Camtschateæ Камакалечъ vocitatur.

Planta fruticosa, pulchra, corollis rotatis, irregularibus, aureis, in nivalibus alpibus jugi *Sajanensis* ad Jeniseum fluvium, in alpibus elatioribus inter Sieveriam et Dauriam, in alpestribus elatioribus ad lacum Baical, in Camtschata quoque, in insula Beringia, tam in elevatis rupestribus, quam depressis muscosis, ad radices montium et stagna. In alpinis pedali minor, in depressioribus sesquipedalis. Cl. Decandr. O. Monogyn. O. N. Bicornes L. Rhododendra J. Usuales sunt:

S T I P I T E S, seu *ramuli*, squamis stipulæformibus ferrugineis tecti, *foliis* oblongis, scabris, subtus discoloribus, glabris, venoso-reticulatis, umbellarum terminalium, gemma florifera, ferrugineo-tomentosa. Loco ejus **R H O D O D E N D R O N F E R R U G I N E U M**, (quod est *foliis* glabris, subtus leprosis, corollis infundibuliformibus, et maximum *foliis* subcuneato-oblongis, coriaceis, glabris, cal. laciniis ovatis, obtusis, cor. subcampanulata,) substitutum fuisse quidam narrant.

Q. A principio extractivo amaro, et ut verisimile, *scytodepsi-co* narcoticoque derivanda. Odor siccorum, ad odorem *Rhei* paulum inclinans. Sapor austerus cum notabili acritate et amarore, stypticus.

V. Stimulans; narcotica; sudorifica; adstringens, fere instar *Ledi palustris*. *Baicalense* magis narcoticum; quod vero ad *Lenum* crescit, cathartica magis vi pollet; *Beringense* utriusque expers, esse censemur.

U. Apud accolas *Lenæ* fluvii, venatores et glaciei mariæ fossores, adhibentur *folia* in *infuso*, adversus arthriticos adfectus ex frigore ortos, quorum secuti exemplum: **KÖLPINUS**, **GRUNERUS**, **STARKIUS**, **THILENIUS**, **METTERNICHUS**, **PALLASIUS**, opposuerunt eadem optato cum successu myodynæ rheumaticæ, et arthrodynæ, imo et ostealgiæ syphiliticæ, profuisse feruntur; quin tamen in Dauria, in usum tracta, virus sufflaminarint. Ischiadi esse imparem tollendæ ex singulari casu adnotavit **KÖLPINUS**; **PALLASIUS** vero virum diu eadem laborantem, sanatum esse (*Flora Rossica. Petropoli. MDCCCLXXXIV.*) refert. An tussim et screatus, ex malo pectus occupante, ut quidam volunt, levent, experiundo discere expediet. *Sylvicolis Tataris Syanensis jugi accusis*, adinstar *foliorum Theae Boheae* quotidiano usu, ut sibi persuadent, salutari, venit. Innotuit **R H O D O D E N D R O N** jam diu genti regionem Baicalensem inhabitanti, cum somno, ebrietatis sensu, (**G M E L I N Flora sibirica.**) et delirii quadam specie, sudores prolici, et alvum liquari: quo facto, non tantum melius se habere, sed sanitati pristinæ restitui ægri soleant. Utilitatis ex applicatione exter-

a adsunt nonnulla documenta in crurum ulceribus, rigiditate articularum post podagras, in tumoribus scirrhosis et canceratis mammarum (Bützow Catherinæpoli,) contractura, paralysi etc. Pulvis in Sieveria, sternutamentorum evocandorum ergo, quum catarrho, vel cephalalgia laborant, naribus adtrahuntur, a ruricolis. **RHODODENDRON FERRUGINEUM** in paralysi inferiorum extremitatum, forma pulveris ad grana quinque porrectum, ter de die, efficacissimum esse, HERMANNUS refert.

D. KÖLPINUS olim jussit drachmas duas *ramulorum*, et *foliorum*, unciis novem *aquaæ calidae*, per viginti quatuor horas in vase obturato digeri, hujus *infusi* mane uncias duas sumi; sed nuper METTERNICHUS sonica phænomena, usum excipientia, ex hac potissimum forma derivans, substituto *foliorum* pulvere, (cujus) grana quinque, semiscrupulum, denique vero integrum scrupulum administravit. Curæ profecto providæ est, *infusum* pro re nata, vel saturatiæ, vel debilius adornari, aut dosim minuere, aut, si cephalalgia, anxietates, sudores et id genus alia, urgent, intercapedinem suinendi faceare, ad avertendas alias etiam noxas.

V. *Infusum Rhododendri Chrysanthi.*

R H U S C O T I N U S.

Желтникъ; желтое кожевенное деревцо.

Frutex Europæ australis in sylvis atque dumetis, sat communis; in primis vero in Bessarabica provincia Rutheniæ, ubi valachice Дацикъ vocitatur; immo ad Hypanim (Bug) et Hyrgin (Donetz) reperitur; per Tauriam quoque (circa Eski Crym, Bachschisarai, et Mangut) Caucasumque (in deserto inter Cumam et Török fl. in arenosis tractibus Anketeri et Dubigi) frequens. Commercii ibidem materies. Cl. Pentandria. O. Trigynia O. N. Dumosæ L. Terebinthaceæ J. Usualia sunt:

Cortex; Folia (simplicia obovata;) SEMINA.

Q. A principio scytodepsico, specifice balsamico, derivanda. Odor terebinthinaceus; sapor amaro-adstringens.

V. Febrifuga; adstringens; tonica; antiseptica,

U. Ab incolis Moldaviæ, Walachiæ et Banatus Hungariæ, pro specifico *lexipyreto* habebatur, et revera in dialeipyris (Zsoldos) præcipue in (febri) hæmitritæa efficacissimum esse experimenta testantur; præsertim in (febri) chronica cum leucophlegmatia, aut incipiente hydropisi juncta, omnibus medicaminibus prævalet; quia neque obstipationem, neque citam alvum producit. In splanchemphraxi sub diathesi inflammatoria, saburra et acore primarum viarum præsente, in hæmoptysi et plethora, ab usu ejus abstinendum est. Externe ulceribus gangrænosis et cariei ossium in *pulvere* pro inspersione, in *decoctura* pro injectione anginæ ulcerosæ prodest, inflammatoriaæ vero perquam nocet. *Folia*, tum ad paranda turcica *coria*, quum ad imbuenda *fila gossypina*, dein *Rubia* tingenda, sunt usitatissima. Tinctorum etiam illam plantam adhibent ad colorem viridem tingendum, unde dicitur *Sumach tinctorum*?

D. *Corticis* pulverati uncia in octo *pulveres* divisa, per diem apyrexiae cum *Alcoholæ diluto impuro*, *Vino generoso*, aut *aqua* porrigenda est. *Corticis* uncia (ad duas) pro *decoctura* cum libra *aquæ* per $\frac{1}{2}$ horæ decoquenda et per diem porrigena est. *Folia* duplii quantitate exhibenda sunt. *Extractum* cum *aqua* quapiam *aromatica* (ætherea) porrigitur. Ad augendam vim *Rhois Cotini*, et ad tollendam post *eum* nauseam, aliquando *radix Rhei palmati*, *Sulphas Magnesiae*, *aromatica*, subinde *Opium*, *Hyoscyamus niger*, aliquando *Valeriana officinalis*, *Aristolochia Serpentaria*, *Camphora* etc., subjunguntur.

V. *Extractum Rhois Cotini.*

R O S A C E N T I F O L I A, et — G A L L I C A. L.

Роза столиспная бледноцвѣтная и красная.

Frutex in hortis hospitatur, cum suis varietatibus numerosis, caule hispido aculeato, pedunculis inermibus. *Cl. Icosandr. O. Polygyn. O. N. Senticosæ L. Rosaceæ J. Usualia sunt:*

PETALA (*Rosae Damascenae et rubrae flores Ph. Ross.* цветы белой и красной Розы,) pallide rubra. *Recentia siccis fragranti odore antistant.*

Q. Leviter styptica, odor fragrans, ab *oleo volatili*, de quo *florum librae 100*, drachmam continent, pendens.

V. Analeptica, (*hystericis infensa*,) leniter tonica, simulque, adstrictoria.

U. Præcipue cosmeticus; profluvia. Infunduntur quoque cum aliis atque instar *collutorii*, vel *gargarismi* ad vitia oris, fauciumque putredinosa, curanda, nec non ad tonsillitidem, aut anginam dissipandam, usurpantur. Variis etiam *præparatis* conficiendis, uti etiam ad sistendam hæmorrhagiam aptis, inserviunt.

V. *Aqua Rosae centifoliae*; *Oleum* — —; *Mel rosatum*.

ROSMARINUS OFFICINALIS.

Розмаринъ аптечной, или садовой.

Frutex in Russia australi spontaneus, alibi in hortis medicis cultus. *Cl. Diandr. O. Menogyn. O. N. Verticillatæ L. Labiatæ J. Usualis* est:

HERBA, foliis linear-lanceolatis, semperfurentibus, marginibus revolutis, subtus canis, floribus ringentibus, dilute cæruleis.

Q. Ab *oleo volatili camphorino* est trahenda. *Odor* fragrans; *sapor* fervidus, amarus, aromaticus *Camphoram* redolens.

V. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; externe: resolvens.

U. In affectionibus systematis nervosi variis: debilitate ventriculi, vertigine, paralysi, amnesia, amenorrhœa a quibusdam laudes fert. *Vino decocta melleque mixta asthmatis pituitosi exstitit medela* (BORELL.) *Glandularum colli infarctum*, apud infantes dissipat *infusum*, vel *decoctura herbae Saccharo edulcata* (HEISTER.) *Nocturnas pollutiones in theaeformi potu cum Tinctura aromatica acidulata (sulphurica)* ad noctem sumta, cohabet. In chlorosi cum debilitate vasorum abdominali-

lium et nervorum, celebratur, in diarrhoeis chronicis colliquativis *infusum vinosum* valde profuisse ALIBERT testatur. Externe *herba una cum aliis herbis aromaticis forma saccularum, et fomentationum siccarum*, et *Alcohol ejusdem ad varias humorum stagnationes discutiendas, post contusiones, aut luxationes, cum laude adhibetur.* In oedemate chronicā et gangrēna senili quoque laudatur (ALIBERT.) *Oleum volatile (aetherum)* inter manus tritum et ad oculos proprius admotum, refocillare illos visumque acutiorem reddere fertur. *Alcohol (Spiritus Rorismarini)* naribus admotum asphycticos refocillat.

D. *Herbae drachmæ duæ (ad quatuor) cum decem unciiis aquæ, aut Vini per diem sumendæ sunt. Olei gutta ad tres pro una vice cum Saccharo, aut Vino datur.*

V. *Oleum Rorismarini officinalis.*

R U B U S C H A M E M O R U S.

Малинникъ желтый; Морошка.

Non solum per omnem Rutheniam septentrionalem, Sieveriam, ad littora maris glacialis et in contiguis insulis maxime borealis, Nova Terra (Новая земля,) circa oppidum Mezeny Archangelopolitani Gubernii et Kolam in paludosis lichenæ abundantibus et æstate vix perviis locis (Тундра,) spontanea, ac copiosissima planta ab arctois gentibus (Lapponibus et Samojedis,) collecta; sed etiam per Lithuania in locis lacustribus, turfosis, sylvis paludosis, plus, vel minus, frequens; circa Volgæ vero ortum in hortis colitur. Cl. Icosandria. O. Polygynia. O. N. Senticosæ L. Rosaceæ J. Perennis. Usuales sunt:

ВАССА (Морошка) nondum satis maturæ, pallide rubrae et subacidæ, post maturationem vero flavæ, *Cerasi majoris* magnitudine, molles, deciduae, vix acidæ; sed aquosæ, acinis grandioribus, *pisum* fere referentibus. Differunt a RUBO CHAMÆMORO: RUBUS DALIBARDA, — ARCTICUS, — SAXATILIS; primus (*Dalibarda repens* PEARSON Syn. pl.,) stolonibus reptantibus, fol. simplicibus cordatis; alter (Княженица,) foliis ternatis; *Saxatilis* (Костяница,) vero foliis ternatis nudis, flagel-

is reptantibus herbaceis, panicula pauciflora. **HERBA**, foliis implicibus lobatis, caule inermi unifloro.

Q. Inodora, aquosa *baccarum*. *Herbae vires in resina*, principio *cytodepsico* et *extractivo* sitæ. Siccata est fere *odoris* expers, initio *insipida*; dein vero *sapor*, ex acerbo in dulcem abit, intermixta levi amaritie, diu in ore manens. *Virtus baccarum* refrigerans, antiscorbutica; *herbae* diuretica, in urocystidem agens, atoniæ illius occurrens, languentem videlicet muscularem fibram ad contractionem ciens; narcotica.

U. *Baccae* maturæ, tam crudæ, quam conditæ, hominibus *cibum* præbent antiscorbuticum. Hunc in usu, vel *baccae* integræ a Lapponibus et Fennis per hyemem in nive alpium defodiuntur, vel immaturæ in doliis probe clausis superfusa *aqua*, vel perfecte maturæ coctione in formam *roob* redactæ, superadditis reliquis *baccis* integris, submaturis, vel denique acidæ fermentationis ope, variisque aliis modis conduntur et conservantur; tum pro *acetariis*, quum etiam pro *antiscorbutico* classiariorum usu. Lappones et Samojedi contritas *baccas* Rangiferorum (*Cervi Tarandi*) lacie mistas, haud sine delectamento edunt. Varia etiam ex iis *bellaria* consciuntur. In æstu febrili sitique per frequens earum usus, proficue etiam phthisiscentibus, hæmoptoicis (LINNÆUS,) nec minus ad coercendam in scorbutum propensionem valent, quapropter per totam fere Rutheniam in domesticum abiere antiscorbuticon, imo in consummato scorbuto pro *panacea* in septentrione habentur. *Herba* commendatur in ischuria e senili urocystidis atonia, forsitan et in enuresi infantum, absente calculo, et vitio spinæ prodesset. In hydropisi, ruricolarum experientia commendari meretur; sed etiam *radix Rubi* a Boërhævio, hunc in finem impensius laudata erat, eaque cum *melle* cocta, vel cum *Vino rubro*, veteribus pro suinno remedio habebatur in hydrope.

D. Drachmæ duæ *herbae* in decem unciiis fervefactæ *aquæ* per quartam horæ partem infunduntur, ac mane vesperique hæc dosis sumitur. Et *pulvis* et *extractum* tentari

merentur. Scire licet usum *herbae* principiis validioribus, præcipue narcoticis, dotatæ, quasvis, quas validiorum remediorum usus requirit, cautelas etiam exposcere.

SACCHARUM OFFICINARUM.

Сахарникъ; Тростникъ сахарный.

In utraque India et Ægypto in locis uidis sponte gignitur et copiose colitur, cal. lanugine longa involucrato, coroll. bivalvi, flor. paniculatis, fol. planis. *Cf.* Triandr. *O.* Digyn. *O. N.* Gramina *L.* Gramineæ *J. Perenne*. *Usuale* est:

SACCHARUM, seu succus quassatione culmorum graminis expressus, coctione, et despumatione, densatus, flavescens, mucilaginosis particulis, aliisque heterogeneis, scatens, *Mel arundinaceum* **PLINII** et **GALENI**; hodie autem **SACCHARUM COMMUNE** audit, quod repetita denuo in propriis Europæ officinijs coctione in aheno cupreo cum *aqua Calcariae*, vel in connubio cum *sanguine bovillo* (quod reprobatur,) vel *albumine ovorum* sub continua motitatione, despumatione, et filtratione denuo per laneos utres, et post novam coctionem et refrigerationem in modulos argillaceos transmissione, **SACCHARUM ALBUM** sistit; pars vero liquida neutiquam coiens, **SYRUPUS MELASSUS**, vel **MOLASSES**, (gall. *Mélasse*, ruthenice папока) vocatur. *Saccharum album* repetita denuo decoctione, depuratione et evaporatione, in crystallos coactum, **SACCHARUM CANDUM**, constituit, referens, pro varia *ejus* puritate, albas, flavas, aut pullas crystallos. Probæ notæ *Saccharum* est, durum, compactum, albis, pellucidis crystallis, conspicuum, in *aqua* soluble, nec colorem et pelluciditatem solutionis aquosæ *Oxymuriatis Hydrargyri* mutans, nec tritum *Muriate Ammoniae*, odorem volatilem spargens. Summus rerum Arbitr̃ insigni liberalitate, materie *saccharina*, prospexit, elicitor quippe id etiam e succo crudo adscendente **ACERUM** maxime **ACERIS SACCHARINI**,—**PSEUDOPLATANI**—**RUBRI**, e quibusdam **JUGLANDIBUS** et **BETULIS**, hunc in finem servit *succus florum*

Iscrepiadi *syriacae* *Canadensis*; item *Zea Mays*, *e BORAS-
O FLABELLIFORMI* colligunt eum *Jauani*, *e Coco NUCI-
ERA* *Indostani*, imo nec arctoæ gentes destitutæ sunt hoc-
e oblectamento, cuius rei indicio est *HERACLEUM SYPHON-
YLIUM* *Camtschadalensium* *cupedia*, et *FUCUS SACCHA-
RINUS* *Islandorum* delicium. Naturaliter producitur circa no-
dos *BAMBUSÆ ARUNDINACEÆ*, in *HEDYSARO ALHAGI*, in
ASCLEPIADE PROCERA, in cuius foliis cynipes nidulantes eli-
ciunt *oxydatam mucilaginem*, aëre solisque æstu, congelatam. Huc
referuntur radices *Saccharo fœtæ*: *Bætae Cyclæ,—rubrae, Sisari*, etc.,
iterum bene multi fructus: *Ficus Caricae, baccae Vitis viniferae,—
Rhamni Zizyphi, fructus Ceratoniae Siliquæ, Phoenicis dactyliferae,
Pruni domesticae*, nec non *Amylum, manna* etc. Inter substituta
Sacchari illud eminet, quod ex succo *Aceris saccharini* in Amer-
ica septentrionali præcipitatur. Libræ quadraginta hujus succi,
qui arboribus viginti duorum annorum terebra perforatis, edu-
citur, dant libram *Sacchari*, succo, *Calcariae, albuminis et lactis*
ope, clarificato (THOMSON.)

Q. *Saccharum* esse *oxydatam mucilaginem* elucet, quum
e cl. GUYTONII analysi, qui in partibus ejus substantiæ cen-
tenis: *oxygenii* partes 74, *carbonici* 17, et *hydrogenii* 8, dete-
xit, tum e mutatione faciliori cuiusvis vegetabilis *mucilaginis in*
saccharinam substantiam, si augeatur *oxygenis* ratio, tum *e*
Sacchari, si *oxygenio* privetur, facili in *mucum transitu*. *Sapor*
salino-dulcis, acceptus.

V. altrix; demulcens; parum irritans; antiseptica. Extrinse-
cus: leniter stimulans, escharotica.

U. *Vulgare* est *ciborum et potulentorum* bene multorum con-
dimentum, nutrimentum etiam, nec temporis lapsu, nec aëris
temperie, subjectum corruptelæ. Tuetur etiam *vegetabilia* con-
tra putorem, ideoque *condituras*, et *conservas* inservit optime,
haud secus ac suavissimum præbet additamen, tum in com-
ponendis pluribus medicinis, quarum sæpe unionem promo-
vet, in primis vero efficit, ut misceantur *olea, resinæ et acria*
cum aqua, faciliusque in humoribus corporis solvantur, quam-

vis praeparata, ut *Saccharum hordeatum*, *penidium* et similia
haud immerito *cupediis* potius, quam *remediis* adnumerentur.
Ob facultatem nutritoriam et leniter aperientem, laudatur i
cachexiis et macie; ast in hunc finem præfertur *Saccharum*
lactis (сахаръ молочный) quod in Helvetia e *sero lactis* con
ficitur, magna sistens frusta, crystallis opacis, albidis, conflata
quæ septupla *aqua* copia solvuntur, in fermentationem vino
sam neutquam prona. Nec hoc solummodo discrepat a *sac
charo* vegetabili; sed eo etiam, quod *acidum galacticum* (*sac
cholacticum*) et *azoticum* continet: hinc et nutrit, et leniter
aperit, et secretiones promovet. In *lacte asinino* ad uncias
plures per diem in phthisi pulmonali ulcerosa aliisque cache
xiæ speciebus administratur. *Saccharum* solvendi præstantia pi
tuitam, in tussi et asthmate, vias aëreas gravantem, subigit,
ac ad screatus disponit. Mirifice id valet adversus pronata
tem in putredinem, et arcendam, et superandam, quo etiam
scorbuto officere videtur, scite enim notatum est Indos, quibus
copia ejusdem suppetit, a scorbuto immunes esse (PRINGLE.)
Suasum igitur sagaci consilio, ut velificantibus nautis quoti
die aliquid *Sacchari* exhiberetur (MACBRIDE.) Gingivarum
etiam marcescenti vitio medelam adtulit (DE LONNES.) Se
minium verminosum ab intestinis retinet (RUSH;) apte igitur
pro puellis *Saccharum*, vel *mel*, commiscetur cum alio quovis
congruo *anthelmintico*, et palato infantili gratificaturum, et
vermibus exitium, paraturum. Solutio unciæ *Sacchari* in *aqua*
frigidæ libra, mane et vesperi sorbillata, cito sedavit enterodyniam
pituitoso-nervosam (NIEMANN.) Externa *Sacchari* ad
motio variis in morbis eximiæ est efficaciæ. In aphthosis ul
ceribus dulcia quævis penicillo adfricta, vel *linctus*, sive *col
lutionis* instar adhibita, prosunt ad eadem mundanda et con
solidanda. Crystalli *Sacchari* subtile inspersæ corrodunt car
nem ulcerum luxuriantem, et antiseptica vi eadem emendant;
abstergit etiam *aqua saccharata*, syringa auribus injecta, fœti
dum earum profluviū mucosum et subpurulentum. Fissuræ
papillarum in mammis *Saccharo cando*, tantum eis insperso,

haud raro concrescunt, expedit etiam eas *saccharo* humectare, quod *Alcohole diluto* est solutum (**FIELITZ.**) Tentabatur etiam in cicatriculis, vel maculis corneæ delendis cum successu *Saccharum candum* per calatum scriptorium exiguis portiunculis inflatum. Disparuit ejus ope macula post variolas superstes (**HOFFMANN.**) Corrigit odorem aëris corruptum carentibus *carbonibus* inspersum, hinc et *pulveres fumales* ruditer conquassatum, ingredi solet. In organismis inferioris ordinis, ut in ranis aliisque animalibus, haud sine ulla noxa fertur. Nocet etiam hominibus, vel copia, vel mala opportunitate. Fidem rei faciunt, inter alia documenta **STARKII** Anglicani experimenta, in illo ipso facta. Est cumprimis infestum virginibus chloroticis, infantibus rachiticis, hypochondriacis, hysterics, in quibus acor, jam antea productus, *Saccharo* novum adipsicetur pabulum. Cariosi etiam inde fiunt dentes, nigrique præcipue, si tegmen vitreum calidis ingestis, vel *Saccharo* duro inter dentes comminuto, rimas egit. *Saccharum* etiam *Acetati Cupri* obponi posse creditur, neque tantum dolorem sopire; sed etiam cetera incommoda ab eodem orta, levare, alvum efficaciter ducere, atque periculum avertere (**ORFILA.**)

D. Vel simpliciter in *pulverem* tenuatum, vel aliis efficacioribus unitum medicinis datur, nec nisi plerumque, ut constituens, vel corrigens ingreditur formulas. *Mel*, et *syrupus Melassus* (pars succi spissuti *Sacchari officinalis* incrustabilis, сахарная пастка) persæpe, ut succedanea, merito eidem subrogantur, præsertim in praxi militari.

V. *Elaeosacchara*, *syrupos*, etc., ingreditur.

S A L I X A L B A.

S. AMYGDALINA, — FRAGILIS, — LAUREA, — PENTANDRA, — VITELLINA.

Веръба; Вепла; Ива бѣлая, желтая, ломкая и пр.

Rutheniae incola, ubivis crescens. *Cl. Diœcia. O. Diandria. O. N.* Amentaceæ *L.* et *J.* Arborea. *Usualis* est:

Cortex ramulorum (Вербная корка) tenuis, laevis, ni-

sens, externe fuscus, interne pallide-flavens. DECIPiens quoque et BIGEMMIS SALIX (HOFFMANN,) usui medico apta. Detrahitur cortex ramorum triennium cum libro, vel ante anthesin, vel dum florent, et in locis umbrosis, ne odore balsamico privetur, siccandus est. Crassus vero usui ineptus. (FOLIA.)

Q. Analysis chemica docuit unciam *corticis* dare *extracti resinosi* drachmas duas et grana quadraginta, *extracti gummosi* drachmam et grana viginti (GLEDITSCH;) principii vero *scytodespsici* præsentiam probat usus *corticum* ad depsenda conficiendaque pretiosa coria; corium enim bubulum ruthenicum (ιοχηνία) et danicum pro chirothecis, bonæ notæ, *corticibus Salicis albae* et *pentandrae* paratur. Saporem cortex habet valde austерum, amaro-stypticum, admisto balsamici pauxillo, odore perceptibili, quo alias species *cortex Salicis pentandrae* antecellit.

V. Roborans; adstringens; lexipyreta; antiseptica; anthelmintica.

U. Succedaneus functionibus *Cinchonae officinalis*, non est tam adeo, ut illa contra intermittentes febres valens, nec *Cinchoninum* proprium continet; in vulgaribus tamen probatur, ubi cum *Muriate Ammoniae*, *aromaticis*, aut quarta fere *corticis Cinchonae officinalis* parte, addita, enixius agit. *Quassiae* etiam *Simarubae* ab aliquibus subrogatur; majori tamen exhibita dosi. Decocitura *corticis* pronitati in putredinem resistit, *Acido sulphurico* eadem *acidulata*, luem bovillam, teste CAMPERO, propulsavit. Ubi magna adstringentium præbia ere sunt, in curandis ulceribus gangrænosis flaccidis proficit. Extractum, coctione parandum, ad drachmam, aut alteram solutum, in *aqua aromatica* febribus continua obponitur, jactura virium, humorumque corruptela, malignis. *Foliorum succus* recenter expressus, si cum *adipis suillae* sufficienti quantitate leni calore misceatur, fit unguentum *Salicis*, impuris, scorbuticis, et gangrænosis ulceribus, peridoneum (HUFELAND *Armen-Pharmakopœ* 1813.)

D. Ramulorum cortex, externe et interne in pulvere et decoctus exhibetur; utilius tamen, si fuerit viridis. Pulveris scrup-

ulum, drachma, nisi offecerit ventriculo. *Decocturae* semuncia, ncia, in sesquilibra aquae ad libram decoquendo.

V. *Decoctura Cinchonae succedanea*; — *Salicis composita*; *Extractum Salicis*; *Pulvis Salicis compositus*.

S A L V I A O F F I C I N A L I S.

Шалфей обыкновенный, садовый.

Suffrutex, cor. inæquali, filamentis transverse pedicello affixis, in Ruthenia australi spontaneus; in hortis vero, sub dio hospitans commode. Cl. Diandr. C. Monogyn. O. N. Verticillatæ L. Labiatæ J. Perennis. *Usualia sunt:*

FOLIA (lanceolato-ovata, integra, crenulata,) caulis. Ultra centum dantur *Salviae* species, quæ omnes, vel simili gaudent virtute, vel validiori. Ante florescentiam colligendæ.

Q. In volatili *oleo*, et *adstringenti extractivo* residens. *Odoris* fortis, fragrantis; *saporis* subainari, subadstringentis, maxime, dum nondum effloruit.

V. Leniter incitans; *adstringens*; *menagoga*; *extus: resolvens*.

U. In variis ventriculi incommodis, ut inflatione, enterodynæ flatulenta, siti febrili, per modum *Infusi theaeformis* addito succi *Citri medicae*, vel *baccarum Vaccinii Oxycocci* tantillo, ad jucundum acorem. Ill. VAN SWIETEN commendavit illa aduersus nocturnos sudores profusos, qui febres superatas et phthisin comitari solent, in *infuso aqueo*, vel cum *Alcohole*, quem in finem *Aether* quoque *sulphuricus* non inepte adjicitur. *Infusum vinosum* adcommodatius efficaciusque censemur, (*Infuso* contra metrorrhagias frigide propinato, juvat.) quod etiam tumori mammarum ex *lacte* post ablactationem utilè esse SWIETEN testatur. Uti nec leucorrhœæ alienum fertur. *Infusum aquosum*, forma *gargarismi*: in angina serosa, relaxatione gingivarum, laxitate uvulæ, veli palatini, ulceribus oris, aphthis etc., utile se præstitit. *Folia* quoque ad roborandas gingivas adhibentur.

D. Grana quindecim, (ad scrupulos duos) in pulvere dantur.

V. *Infusum Salviae officinalis*.

S A M B U C U S N I G R A.

Бузина черная; Самвикъ.

Frutex in Russia australi spontaneus, et Petropoli subsistens, foliis pinnatis, foliolis sub-ovatis, serratis, caule arboreo.
Cl. Pentandria *O.* Trigynia *O.* *N.* Dumosæ *L.* Caprifolia *J.*
Usuales sunt:

FLORES calyce 5-partito, corolla 5-fida, cymis quinque-partitis; recentes albescentes; siccatae vero flavescentes. **BACCÆ**, recentes ovales, nigræ, umbilico stellato, succosæ, trispérmatæ, succo rubicundo acidulo-dulci. *Flores* in cribris atque super suspensum linteum siccandi sunt, ne, aut nigredine nauseosi fiant, aut mucore corrupti videantur. Substituuntur illis et admiscentur quandoque *flores Sambuci Ebuli*, (Бузникъ, Селеникъ,) quæ est cymis tripartitis, stipulis foliacéis, ovatis, caule herbaceo, et *Sambuci racemosæ*, quæ racemis suis, compositis, ovatis, et caule arboreo, distinguitur. **CORTEX**.

Q. *Odor* fortis, non ingratus; sapor amaricans; *baccæ malicum acidum* habent.

V. *Florum diaphoretica;* extus: resolvens. *Succi baccarum expressi:* purgans.

U. *Flores aqua fervida infusi*, vulgatissimum laudeque dignissimum exhibent remedium, quo diaphoresis blande promovetur, vires æquabiliter dispensantur, noxæ a perfrictione perfacile concipiendæ, avertuntur, morbilli, scarlatina, erysipelas, aliaque exanthemata, in eruptione torpescientia, vel retrograda incitantur, vel reducuntur. Præterea ob resolvendi viñ in repletione pectoris pituitosa, tussi, item sputis peri-pneumoniaeorum hæsitantibus, proficiunt. Externe adhibentur siccatae ad tumores discutiendos atque ad molliendam faucium inflammationem. *Cortex interior* efficax est in hydrope, variis chronicis obstructionibus in pulvere a granis decem ad scrupulum, ex *Vino*, vel decoctus. *Buccæ* ad tingendas lanas et sericum a Törökiensibus adhibentur.

D. Drachinæ duæ, semuncia, ad libram *aquaæ* pro *infuso*.

V. *Infusum Sambuci nigrae.*

S A P O O L E O S U S.

APO ALBUS, HISPANICUS, ALICANTINUS, MASSILIENSIS.

Мыло масляно-содное белое, Гибралтарское и пр.

Est massa *Olei olivi* coctura, deterioris plerumque, utpote spissi et turbidi in fundo vasorum oleariorum remanentis, cum lixivio *Sodae caustico* (quod ex binis *Sodae*, una *Calcariae* parte conficitur,) parata, eaque, si bene confecta, solida est, nec digitorum ad tactui sebosa, albicera, vel aeris accessui exposita pauxillo in subflavidum vergens, superficie, nec deliquescente, neque salinis particulis incrustata, in *Alcohol* et aqua destillata facile atque paulum residui *Culcarei*, si exceperis, ex toto solubilis, nullo solutioni oleo superne innante; aqua et *Alcohol* diluto agitata bene spumet, nec alca-*tinum*, nec rancidulum quiddam sapiat, aut male oleat. Qui maculis variegat rubicundis ac sublividis, quarum originem autores varie trahunt, alii ex *Indigo*, vel *Coccionella*, alii *Auripigmento*, *Oxydo Ferri*, *Mangano*, *Sapo venetus* vulgo audit, cui utpote usibus internis inepto *alicantinus* merito praeferatur.

U. Interne cum *pilulis* datur, fereque semper cum aliis remediis, praecipue *aromaticis*, aut *tonicis*, ut sunt *amara extracta*, *gummiresina Heraclei gummiferi* etc., conjungitur. Coniunctum ejusdem cum *acidis* vetatur. Ad usus externos modo in *aqua simplici* solutus, vel *lacte*, modo in aliis liquoribus et utroque modo, inservit *clysteribus*, *balneis*, *ablutionibus*, *foementis*, etc.

D. Pro adulto est a semiscrupulo ad duos scrupulos, drachmam. Pro infantibus a duobus granis ad quatuor et ultra proportione aetatis, isque, vel in *aqua*, vel in *lacte* solvitur. Dilutum quoque adhiberi expedit, ubi noxii effectus reparandi sunt, quos *acida mineralia*, *Oxymurias Hydrargyri*, aliaque huius indolis *venena*, produixerint.

V. *Alcohol saponatum*; *Pilulae alliatae*; *Sapo stibiatus*.

S A P O S E B A C E U S.

S A P O V O L O G D E N S I S Ph. Ross.

М. сальное обыкновенное, или Вологодское.

Est massa coquendo *Sevum* cum *Lixivio potassino*, cui tum *Mariatis Sodaे* portio adjicitur, (ut consequatur firmorem consistat,) parata. Eligatur albus, firmus, recens, non fœtens, qual apud nos est *Wologdensis*, et qualis in aliis etiam urbibus paratur.

V. *Siccus* si adplicatur, vasa irritat, et cum tempore rebedinem, imo vesiculas producit; forma liquida vero cutis mollem et laxam reddit.

U. Hic *Sapo* nonnisi pro usu externo inservit, (quum a opicificibus non satis purus paretur,) idque per modum *balnei*, *lotionis*, *fotus*, *suppositorii*, etc., adhibetur, cutim relaxando et spasmodicam constrictionem solvendo, forma *balnei* in exanthemibus, ob id suppressis, ita etiam ad auferendas maculas rubras et cicatrices post exanthemata superstites, et non minus in fœditatibus cutis, ut scabie crustosa, herpete, etc. In surditate ex siccitate, vel ceruminis adcumulatione, vel frustulum *saponis* meatui auditorio imponitur, vel *solutio* ejusdem injicitur. In obstipatione habituali forma *clysteris*, vel etiam *suppositorii* commune et aptum est remedium. *Solutus in aqua*, vel potius in *Alcoholе* discutit egregie ecchymoma ex contusione, distorsione etc., (cum partes relaxatas simul corroboret,) sic et tumores frigidos, cysticos et induratos alias, imo albos incipientes; ulcera sordida depurgat; in myodynia rheumatica et arthrodynia multum præstat, præcipue forma *embrocationis* cum *tinctura Lyttæ vesicatoriae*, quæ etiam anchylosi spuriæ, imo et paralysi opitulatur, ut stimulum contrarium efficiens adhibetur quoque in angina et aliis internis inflammationibus; *Sapo* denique cum aliis congruis, ut pus maturans remedium, adhibetur in bubonibus, panaritio etc.

V. *Emplastrum Oxydi Plumbi saponatum*; *Linimentum Saponis ammoniatum*; — — *rubefaciens fortius*; *Sapo pineo-oleosus*; *Solutio Saponis*.

S A P O N A R I A O F F I C I N A L I S.

Мыльнилька; мыльная трава.

Planta per prata et dumeta Europæ mediæ crescens, in Russia etiam perfrequens, cal. monophyllo, nudo; pet. quinque inguiculatis; caps. ablonga, uniloculari, fol. ovato lanceolatis. C. Decandr. O. Monogyn. O. N. Caryophyllaceæ. L. Caryophylleæ. J. Perennis. Usualis est:

RADIX, cylindrica, alte terram subiens, bi vel tripedalis, assitie calami cygnei, saepe digitii minimi, geniculata, superiore ramosa; ramusculis ad genicula brachiatim oppositis, fibris uniformibus prope ramos. Extus rubens; flavescens intrinsecus. radice *Lychnidis dioicae*, ramosa, fibrata, alba, lignosa intus, odorosa, saporis subamari, uti etiam a radicibus *Cucubali Benet*, quæ a rhizotomis *Saponariae officinalis* loco leguntur, atque interdum pro ea venumdantur, characteribus suis probe distinguida.

Q. Tertia fere ponderis parte extracti saponacei, organa guttus lacescentis, tum gummosa et pauxillo peculiaris resinae nititur. Spumescit contrita, atque saponaceam indolem præsert. Infusum videlicet, vel decoctura radicis saturatior ex aqua facta, quassatione crebra, agitata, solutionis saponaceae instar, in spumas abit. Ceterum autem, odoris est expers, sapore aumen protinus subdulci farinaceo, dein amaricante, palatum velicante, radicem *Polygalæ Senegae*, æmulante.

V. Saponacea, blande stimulans plexus nerveos abdominalis, atque hinc organa contigua; in cutaneam quoque perspiracionem et vegetationem nevrasthenia abnormem, agens.

U. In nevroblacia organorum abdominalium laudatur, sic in splanchemphraxi, ut in hepatemphraxi et ictero **БœРННАВИ** olim præconia tulit, haud secus ac incipiente hydropsi, quæ e jecinoris labe nascitur, expedit; nec spernenda ejus vis in pneumonide lenta, pituitosa, adhibito simul *Hydrargyro* et *Opio*, (*SPRENGEL*;) in hypochondriasi et atrophia ob vim blande resolventem, datur cum successu. In pulmo-

nes agendo, efficacem se præstitit, teste cl. Томм adversus pituitosam et catarrhalem tussim. *Radix* tempestive collecta, nec ultra annum, ne vermiculetur, nec aëris injuria lædatur, in apotheca utilis, seu sola, sive in consociatione aliorum, ut *Caricis arenariae* ad præparandam decocturam in syphilide inter usum *Hydrargyri* hauriendam; in morbis articulatis ex eodem inquinamento ortis, laudante impensis BERGIO, innotuit. Proficit quoque in cutaneis, syphiliticis (morbis,) ubi soluta compage cutis, diaphoresin producit. Ventriculum, si diutius in usum trahatur, debilitare HORNIUS adseverat. Pro succedaneo *Smylacis Sarsaparillæ* habetur a priscis.

D. *Radix* recens, a semuncia, ad duas uncias; sicca vero a drachma ad semunciam, addito grati saporis ergo, *Glycyrrhizæ glabrae* tantillo in sufficienti quantitate aquæ decoquitur. Interdum, pro re nata, *radix Arctii Lappae*, aut *Triciti repantis* conjungitur in adfectibus diuturnis; in levibus autem inflammationibus radix *Polygalæ Senegae*. Commode etiam alvus ea eluitur in hypochondriasi, aut infarctibus pituitosis.

S C I L L A M A R I T I M A.

Сквила; морской лукъ.

Planta Rutheniæ australis, ad littora marium arenosa, copiose etiam crescens in insulis Archipelagi. Cl. Hexandr. O. Monogyn. O. N. Coronariæ L. Asphodelæ J. Perennis. *Usualis* est:

Radix, (squamæ bulbi siccatae,) bulbus pyriformis, pungens, basi fibrillis distinctus, epidermide ex fusco rubescente tunicatus, squamis extus tenuioribus aridis, intus carnosus latus, consistens. Interiores calore leni siccatae in officinis asservandæ, speciem cornu aliquantum perlucidi præ se ferunt; oblongæ, longitudine binas uncias æquante, sint tenaces, duræ, ponderosæ, in pulverem difficulter redigendæ. Squamæ leves, exsuccæ, insipidæ, fuscæ, ut corruptæ, rejiciantur.

Q. Eximia: *Scilla siccata* principium tenet *acre*, exsiccatione
aud parum imminutum, paullum albuminis succo mucoso at-
que resinoso juncti; præterea *Subcarbonatam Ammoniae*, *Oxala-*
em Calcariae, *Amylum* et principium amarum, hinc patet,
qualia menstrua sunt, hoc est: *aqua*, *acetum*, *vinum*, *Alcohol*;
aporis amaricantis, *nauseosi*, *acris*; *odoris* est expers.

V. Stimulans, inter persistentes numeranda; in primis vero
systema lymphaticum, interspirationis et organa urinifera ex-
citans. Majori dosi vomitum, minori alvum; minima vero lo-
tum movens. Extrinsecus, *radix* recens, rubefaciens, vesicans.

U. Ut stimulans universale in nevrastheniis, paralysibus,
apoplexia serosa (clystere cum *aceto* injecto,) ut plexus ner-
veos abdominis excitans, ictero, chlorosi etc., obponitur. Tran-
spirationem pulmonum intendendo cum *oxymelle* tussi pituito-
sæ, catarrho asthenico, asthamati spasmodico occurrit. Pulmo-
nibus æquo irritabilioribus, tuberculis pulmonalibus, inflam-
mationi, aut vomicæ aliena est ob stimulum. In renes agendo,
nephritidi sabulosæ opem fert, calculosque urocysticos pro-
licuisse perhibetur. Magni aestimatur in unoquoque hydrope
apyretio; præsertim vero ascite, anasarca, et hydrothorace, (non
vitio tamen glandularum membranulæ cuiusdam, vel auctiōri
arteriarum actione procreato;) sed neuti uam in saccato, quum
colluviem aquosam evacuare inclusam non sit potis. Cum cau-
cas hydropiseos tollere nequeat, jungitur *Scilla* congruis reme-
diorum adminiculis, vel causis simul removendis, paribus, vel,
quæ singularis hydropicorum conditio exigit, si spasmata cul-
panda sunt copula *C. Ipecacuanhae*, et *Valerianae off.*, idonea,
additis *Aethere*, aut ipsa *Opii tinctura*, si a hyperpractica va-
sorum energia impetuque sanguinis metuendum est, additur
ape: *Supertartras Potassae*, *Submurias Hydrargyri* cum *Opio*, ip-
saque interduum *Digitalis purpurea*, si ratio stasim abdo-
minalium infarctuumque haēnda: *sapo stibiatus*, *gummi-*
resina Heraclei, *extractu*: *Triticī repentis*, *Saponariae off.*, *Le-*
ontelontos Taraxaci, *Fumariae off.*, et similium plantarum ju-
vant. Cum vehementer agat, ratio. dosis et incolumentatis vi-

scerum habenda, si enim largius sumitur, ventriculum, alvumque intemperate movet et subinde tormina, inflammations intestinorum, ac cruentum lotium parit.

D. *Radicis* (siccatae) pulveratae grana duo, saepius de die ad quinque ad noctem, addito pro re nata, *elaeosaccharo Foeniculi*, *radice Acori Calami*, *Opio*. Non male *Submurias Hydrargyri Opiumque*, minoribus cum *Scilla* portionibus, nubuntur. *Camphora* nonnullis, ubi diaphoreseos ratio habenda, arridet, sed ne copula hac nimis exæstuet, mitigatur *Nitrate Potassæ*, aut *Supertartrate* ejusdem. In forma *pilularum* aptissime datur in hydrope cum *Submuriate Hydrargyri* et interdum cum pulvere *radicis C. Falappæ* ad noctem. In *infuso* drachmæ duæ ad libram *Vini* exhibentur.

V. *Acetum scillites*; *Mistura scillina*; *Oxymel scillinum*; *Pilulae cathartico-diureticae*; — *Scillæ*; — — *compositæ I*, — — — *II*; *Syrupus Scillæ*; *Tinctura* —; *Vinum scillites*; — — *jupiterinum*.

SECALE CEREALE.

Рожь обыкновенная; Жито.

Gramen annum, glumarum ciliis scabris, in Creta, teste LINNÆO spontaneum, in capite bonæ spei, ad Roggeveld (THUNBERG) ad circulum arcticum, licet saepè sterilitate caritateque annuae colatur, ut in Islandia; at supra; 68° ut in parœcia Sondankyla Lapponiae Kemensis a sato usque 18 semina maturescit; in primis vero in Europa temperata ejusdemque montibus australibus bene colitur. *Cl. Triandr. O. Digyn. O. N. Gramina L. Gramineæ J. Usualia sunt:*

SEMINA subcylindrica, uno extremo obtusa, altero, cui corculum oblique insidet, acuta, sulco uno longitudinali cinerascentia, semipellucida. Rubiginem sentientia, aut *Secali corniculato* intermista, quibus spasmodica epidemici morbi, quin sphacelosa labes artuum a quibusdam adscribitur, dampnatur.

Q. Farinacea, glutinosa tamen, et perfacile acescens, hinc robustioribus tantum *panis secalinus* convenit.

V. Nutriens panis, fermenti leniter irritans; antiseptica.

U. Puls e *farina secalina*, *aqua* et *insulso butyro* cocta, vel sola, vel cum *lacte caprino* comesta mane per plures septimanas, vel menses in phthiseos initio juvit, in inveterata vero malum mitigavit (**LANGE**) non minus *secalinum juscum* profuit, e *farinae Secalis* subtilioris semuncia cum libra *aqua* cocta, omni mane bibitur, subinde conduitur, mane pulte ex *Cetraria islandica* uti vesperique *jusculo secalino* (**BANG**) *Farina* sicca calefacta, inflammations in superficie corporis obvias resolvere, in *cataplasmate* emollire et maturare potest. *Fermentum panis* pro *cataplasmate sinapino* idoneum. *Secale cornutum*, seu *corniculatum*, aut *clavus secalinus* vulgo dictum, est vitium *Secalis cerealis*, quo grana ejusdem ad duplam, vel triplam magnitudinem excrescentia, ungulam avium repräsentant. Ab initio fetente viscidoque obducta sunt mucō, qui dum exsiccatur ab aëris adflatu, in *pulverem* fatiscit inodorum, violaceum, aut nigrescentem. *Saporem* hæc grana, quorum nunquam omnia; sed nonnisi duo, tria, quinque, rarius septem, vel ad summum duodecim, in eadem degenerare observantur, spica, produnt ab initio dulcem, serius vero in acrem urentemque, transeuntem. *Farina* e degeneribus *frumenti* granis parata, cærulescentis, aut subcinerei est coloris, ingratum spargens *foetorem*, et si *aqua* lavetur, intolerabilem. Genesi *Secalis corniculati* favere existimatur æstas humida, eademque frigida in regionibus præcipue frigidioribus; a quibusdam vero Medicis, ut **LENTINO**, **SCHRÖDERO**, **LANGIO** pro producto insectorum habetur. In provincia Italiæ Solognensi creberrime observatur. *Semina* hæc vitiosa testibus le **SAGE**, **NEBEL**, **LANGE**, **TISSOT**, **STEPHANOWITZ** **DONTZOW** (Описаніе о черныхъ рожкахъ, причиняющихъ корчи, и померщвение членовъ С. Петерб. 1797 года,) si sunt recentia, magnaque copia *farri* admista, præsentaneum sistunt venenum, raphaniam (convulsionem cerealem) producens, re-

fragantibus aliis, puta: SCHLEGERO, LEIDENFROSTIO, MODELLO, ESCHENBACHIO, TITIO etc., qui noxiferas eorumdem vires in dubium vocare connisi sunt, imo LONICERUS) (*Vollstaend. Kräuterbuch Frankfurt, 1573 a. th.*) eadem, qua remedium adversus hystericas adfectiones egregium, a vetulis fuisse adhibitum cum successu, refert. Alii efficaciam eorundem pulveratorum experti sunt, in menstruis mulierum largius æquo profluentibus, aut in metrorrhagia puerperali, propinato tertia quaque hora, scrupulo. Medentis est remedium hocce adeo ambiguum, caute et prudenter administrare; tempore graviditatis vix ac ne vix quidem concedendum.

V. *Alcohol dilutum; Cataplasma acetatum; — maturans III; — Secalis muriatum I. — — — II.*

SESAMUM ORIENTALE.

К у н ж у пъ в о с т о ч н ы й.

Planta in Ægypto, Zeylona, Malabaria etc., sponte proveniens. In australibus Rutheniae oris cultura viget. *Cl. Didynam.* *O. Angiosperm.* *O. N. Luridæ* *L. Bignoniae J. Annua.* *Usualia sunt:*

S E M I N A, subovata, flava, dulcia, quæ cœli intemperie carbunculantur, fiuntque cassa et inania, rejiciuntur. **F O L I A.**

Q. Oleoso-mucilaginosa.

V. Nutritoria; resolvens.

U. Antiquitus apud Ægyptios cibi genus fuit (ALPIN;) in Jamaica vero adhucdum *juscula* et *placentas* ingrediuntur (BROWNE.) *Folia* ab ægyptiis resolvendi scopo adhibentur, decocta fotu ophthalmias dissipare feruntur, imo etiam in pectoris morbis, amenorrhœa, pro *clystere emolliente*, atque ad varia cutis vitia detergenda, adhibentur, *emplastrum* etiam paratur, ex *herba, seminibus* et *melle* ad scirrhos resolvendos, et suppurationem accelerandam (ALPIN.)

V. *Oleum sesaminum; Haustus saponatus.*

S I N A P I S N I G R A.

Горчица черная.

In australi Russia sponte crescens, et copiose in hortis colitur, siliquis glabris tetragonis racemo adpressis. *Cl. Tetradyn. O. Siliquosa. O. N. Siliquosæ L. Cruciferæ J. Annua. Usualia sunt:*

S E M I N A, (Горчичное семя) parva, rotunda, subcompresa, striis concentricis notata, fusca, vel nigrescentia, eorumque farina, cum *Sinapi alba*, debiliori, permutantur.

Q. *Principio acri, oleoque volatili (aethereo,) quod in cortice seminum residet, nititur.*

V. Stimulans, salivam proritans, peptica, majori dosi emetica; minori vero diuretica; extrinsecus: rubefaciens, cutim phlogosi perfundens.

U. Suetissimum est eduliorum; in primis vero *carnium pisiumque*, ad intinctus condimentum, e *furina oleo orbata* praeparatum, quod acreidine sua nares, ori inditum, titillat, lacrymasque excit; hoc tamen *embammate* crebro uti alienum est. Nevroblaciis cumprimis idoneum stimulans, sic scorbuto (semina trita et *vino* mista,) hydropisi, asthmati pituitoso, dialeipysis, paralysi profuisse magnæ existimationis Clinici testantur. Apoplecticis, *farinam addito aquae tantillo*, majori in dosi propinatam, vomitiones (*irritis aliis vomificiis*) provocando, auxilio fuisse, certum est. Extrinsecus: myodynia asthenica, variæque aliæ nevroblaciæ, ut paralysis, in primis linguæ etc., præcipue, sub *epispastici cataplasmati*, lotionisque forma, tuto curantur. *Balnea* etiam e seminibus confecta cephalalgiam, odontalgiam, a causa rheumatica arthriticaque ortam, juvant; intus vero ingesta, jejuno stomacho, vertigines removent, senili debilitate, productas. *Pediluvii* stimulum addunt.

D. *Seminum integrorum drachmæ duæ, ad semunciam, subinde in pulvere; saepius in infusione in aqua, vel sero, idque a semuncia ad unciam, præscribuntur.*

V. *Cataplasma sinapinum;* —— *acerrium;* —— *acre;* *Oleum sinapinum;* *Serum lactis* —.

SISYMBRIUM NASTURTIUM.

Гулявникъ; Жеруха водяная; Рыжуха;

Planta ad rivos et scaturigines spontanea, per hyemem totam virens. *Cl.* Tetradyne. *O.* Siliquos. *O. N.* Siliquosæ *L.* Cruciferæ *J.* Perennis. *Usuales sunt:*

H E R B A *recens*, (*Nasturtii aquatichi Ph. Ross.*) siliquis dehiscentibus, valvulis rectiusculis, declinatis, cal. et cor. patentibus, fol. pinnatis, foliol. subcordatis. **S U C C U S E X P R E S S U S**. Permiscetur cum **C A R D A M O N E P R A T E N S I**, cuius siliqua est valvulis revolutis, cal. subhians, glandula utrinque solitaria, inter stamina breviora et calycem, folior. pinnatorum foliol. radicalibus subrotundis, caulinis linear-lanceolatis.

Q. A *principio acri* derivanda. *Saporem* habet acrem, subamarum; *trita* pungentem spargit *odorem*.

V. Leniter stimulans; diuretica; antiscorbutica.

U. *Succus expressus*, qui *Saccharo* in *conservam* apte mutatur, ventriculum visceraque abdominis incitat, *stases* resolvit, qua propter in *splanchemphraxi* et *scorbuto* efficax. *Fœditates* etiam cutis profligat.

D. *Succi unciae* duæ, (diutius in usum trahendo,) dantur.

V. *Succus Cochleariae compositus*.

SOLANUM DULCAMARA.

Пасленъ сладкогорький; Псинки;

Suffrutex scandens, in *sylvaticis paludosis Rutheniae* obvius. Ubi deest, per stolones diffusos, radices, dum solum adtingunt, agentes, nullo negotio, propagatur. *Cl.* Pentandr. *O.* Monogyn. *O. N.* Solanaceæ *L.* Solanæ *J.* Perennis. *Usuales sunt:*

S T I P I T E S, seu stolones repentes, ramuli biennes, vel triennes, cortice tecti ex cinereo subfuscō, primo vere ante productionem foliorum colligendi, siccandi, atque servandi. A *stipitibus* *Solani nigri*, quos loco illorum **S C H A U B** substitutos vidit, probè distinguendi. **F O L I A**.

Q. Principio extractivo, saponaceo, adscribenda. *Odoris*, dum recentes sunt, singularis, nauseosi, tetri, siccatione aufugi; *saponis* ex dulci amari.

V. In nerveos plexus abdominalis canalis agens, et largiori in primis dosi, nauseam, vomitum, tormina, anxietates, vertiginem producens; in cutem agendo, sudorem, pruritum movens; in membra genitalia, lotium ciens, dolores excitans, imo aphrodisiaca esse fertur. Interdum narcosi sua musculorum actionem deprimendo, spasmos, artuum tremorem, et paralyses concitat.

U. In nevroblacia organorum abdominalium, ut in hepatemphraxi, et hinc proveniente ictero, in amenorrhœa et chlorosi, laudatur. In metu phthiseos **WERLHOFIO** haud displicuit, vi screatus movente roboranteque (**HALLER.**) Præsentaneam ei contra hanc vim esse, **SAPARIUS** adseverat. Morbidæ reproductioni efficaciter obstat, hinc in fœditatibus cutis insignis, ut herpetibus, psora, tinea, ulceribus scorbuticis, imo etiam in leucorrhœa, sub herpetica diathesi, profuere. In scrofula, si præsertim tumores glandularum ulcerari cooperunt, valent, in syphilide salubrem *Hydrargyri* actionem, qua dia-phoresis movetur, adjuvant. Myodynæ rheumaticæ et arthrodynæ obponitur, præsertim si malum non est vetus. Vitiis externis cl. **RAZOVX** *folia* adiplicuit.

D. *Stipitum* recentium contusorum semuncia, uncia, ad libras tres *aquæ*, decoctorum ad bilibram, sumatur libra quotidie, cum, vel sine *lacte*, vel uncia eorundem libra *bullientis aquæ* superfundatur, addito, pro re nata, congruo volatili stimulo. Adduntur commode ei *radices Polygalæ Senegae*, vel *Tritici repantis*, vel *Saponariae officinalis*, ne ventriculum offendant, *lignum Quassiae excelsæ*, *cortices Citri Aurantii*, vel *semina Anethi Foeniculi*.

V. Extractum *Solani Dulcamareæ*.

S P O N G I A O F F I C I N A L I S.

— M A R I N A Ph. Ross.

Губка морская, или Гречкая.

Zoophyton maris mediterranei et rubri incola. Cl. Vermes. *O. Zoophytæ.*

Q. Habitaculum *vermium* ex genere *Coralliorum* in frustis varie magnis, difformibus, communiter latere uno convexis, altero planis, flexilibus, tenacibus, tomentosis, bibulis, dense foraminulatis, lapillis nonnullis quandoque intermixtis, *coloris flavidantis*, *odoris saporisque* expertibus. Quo mollior est, quo minoribus poris, quo dilutiori colore gaudet, eo reputatur melior; majoribus foraminibus pertusa, minus sequax improbatetur.

V. Humidum absorbens; puris absorptionem impediens; haemostatica.

U. *Spongia*, si humefit, intumescens, obturando et dilatando agit; quamobrem vulnerum ulcerumque orificiis dilatandis, et *Aceto*, vel *aqua frigida*, rite madefacta, saepiusque applicata, sistendis sanguinis profluviis, apta (*Dioscorides*) ipso plerumque *BOLETO IGNARIO* efficacior; ad prolapsum vero uteri forma *pessarii*. Porro, quaelibet immundities abstergi ea solet, adhibetur vero ad lavanda vulnera post operationes chirurgicas, et ad ulcera impura, pureque abundantia, mundanda, admota quippe sordes eorum adtrahit, atque papillarum carnearum progerminationi favet. Eodem consilio usurpatur ad abscessus, profuse suppurantes, illam superponendo *linteo carpto*. Valet etiam in paralysi urocystidis, vel sphincteris ani, ad lotium excipiendum, vel effluxum fecum impediendum. Adhibetur ad *fomenta calida*, vel *frigida*, aut *collyria oculis* adfectis admovenda. Illam in genere *lintei carpti* loco posse adhiberi cl. *ZELLER* Vindobonensis asserit.

V. *Carbo Spongiae officinalis*; *Spongia cerata*; *Trochisci Spongiae compositi*.

STALAGMITIS CAMBOGIOIDES.

GUTTIFERA VERA (KÖNIGIL.)

Дерево Гуттровое.

Arbor Indiæ incola, in Regno Siamensi prope locum Cambodiae vicinum, item in Zeylona, crescens. Cl. Polygamia. O. Monœc. O. N. Tricoccæ L. Guttiferæ J. Usualis est:

GUMMIRESINA, seu *succus gummeo-resinosus*, ramulorum incisiōne, vel *cortice* trunci vulnerato, exsudans, inspissatus (*Gummi guttae Ph. Ross.* желтая камедь, dictus,) extus opacus, interne pallidulus, in fractura splendens, ad margines diaphanus, friabilis, salivam *colore* flavo tingens. Adfertur e Zeylona, et India transgangetica, ubi etiam e **GARCINIA CAMBOGIA WILD.** effluere fertur. Substituunt quandoque *eidem* frusta impuritatum et sabuli plena, uti etiam *Gummi guttae americanum* vulgo dictum, quod ex **HYPERO BACCIFERO** et **CAYENNENSI** L., tum et diversis **EUPHORBIÆ** speciebus colligi fertur, estque *coloris* multo pallidioris, *saporis* minus acris et siccantis, ceterum, utcunque simile *vero*.

Q. Lutea, in *principio gummeo-resinoso residens*, fere insipida, nec non inodora.

V. Drastico-cathartica; sub-emetica; diuretica.

U. Pro scita dosis administratione et opportunitatis dijunctio-

nem, diversi sunt remedii hujus effectus. Parvis præbiis stimuli vices gerit in neuroblacia abdominali, viscida humorum indole et aquosa colluvie, stipata, quo fine etiam vis ejusdem in asthmate pituitoso, ictero, myodynæ rheumatica chronica, dialeipyris etc., elucet. In asthmate et ictero, ut resolvantur educanturque humores viscidi, expedit exhibere grana tria *gummiresinae* cum *Oxymelle scillino*, aut cum *extracto Gentianæ luteæ*, *Menyanthidis trifoliatae*. Majoribus aliquantum præbiis, ita, ut præter stimulum, alvum etiam liquet, atque diuresin moveat, vel etiam talibus, ut alvum nimis purget, in hydropisi efficacem se præsttit, præcipue

sub torpido viscerum statu, citra virium tamen notabilem faintiscentiam, et abdominales inveteratas stases. Minores tum doses præferuntur; majores vero ad educendum cito serum aptæ, præmissis, certo tempore, *amaris extractis*. In hydrope id perfacile educit, si ad grana quatuor, vel octo, cum *Sub-Muriate Hydrargyri*, aut cum radice *Scillæ maritimæ*, et *Elaeosaccharo* quodam, aut *syrupo*, exhibetur. Cominadant etiam connubium cum *Supertartrate Potassæ*. Magni aestimatur a quibusdam usus ejusdem contra tæniam. **WERLHOFIUS** magnæ, in salutari nobis professione, auctoritatis vir, pauxillo *Sacchari remistam* ad grana usque viginti in *aqua* utrique sexui præcipit, sumique citra ullum incommodum, adseverat. Casu obstinatiore eandem subsequenti die dosin, repeti jussit, imo tertiam aliquando, tertio die, donec exilius tæniæ extremum cum nodulo suo eliminaret. Hac ratione numerosis ægris, tænia lata vel solio L., (vel, ut **PALLASIUS** eandem vocari mavult,) cucurbitina, conflictatis, opem tulit. **HERRENSCHWANDIUS**, ante curationem ipsam quovis vespere, cochlearia aliquot *unguinosi olei*, præcipue *sesamini*, vel *Ricini communis*, administravit; dein vero insecuto mane grana decem *gummiresinae*, si vermis post id præbium non exiit, iterata est portio, tertiaque vice exhibita cum jusculo *carnis*; e *lacte* vero et radice *Allii sativi* *clyster* injectus. Alii præmissis aliquot *Sulphatis Ferri* dosibus, dant semiscrupulum *gummiresinae* cum quindecim granis *Subcarbonatis Potassæ*, aut radicem *Aspidii Filicis maris* ad semidrachmam cum duobus, vel tribus granis *gummiresinae* miscent. Secundum **CLOSSII** et **WAGLERI** methodum: vesperi *Submuriæ Hydrargyri* cum *Magnesia* aut *Conchis* subactus præmittitur; paulo post vero *Oleum amygdalinum*. Sequenti mane semiscrupulus *gummiresinae* cum herba *Centaureæ benedictæ* et radice *Angelicae Archangelicae*; libere autem potui datur infusum *Centaureæ benedictæ*.

D. Si stimulo citra alvi solutionem, opus est, ab $\frac{1}{2}$ gr. ad semigranum datur, et tum conjungitur cum *Potassa*, apte, agitque in uriniferas vias; si vero alviductio necessaria est,

ut in hydrope, tum a duobus ad tria porrigitur grana aliquoties de die scopo drastico, velut in tænia, exhibetur semi-scrupulus, grana quindecim, ad scrupulum. *Saccharum, Elaeosaccharum*, quocum conteritur, addere juvat. *Emulsio* tamen, meo arbitratu, præferri posset, facto cum gummi *Acaciae verae*, *vitello ovi*, *aqua Menthae*, connubio. *Subcarbonas Potassae* pro antidoto ejus habetur (SWEDIAUR.)

V. *Emulsio resinosa composita.*

STRYCHNOS NUX VOMICA.

Чилибуха; Кучеляба.

Arbor in arenosis Indiæ, nominatim Zeylonæ, Malabariæ et Cochinchinæ crescens, foliis ovatis, caule inermi. *Cl. Pentandri. O. Monogyn. O. N. Luridæ L. Apocineæ J. Usualis* est:

Fruitus, nuclei subrotundi, compressi, tenaces, villosus ex cinereo-argenteis splendentibus obsiti; vulgo *nuces vomicae*.

Q. Admodum narcotica. Narcoseos adeo violentæ, ut citra inflammationem perimat (MURRAY.) Largitur *extracti aquosi* dimidiā ponderis partem, spirituosi partes tres. *Sapor* ejus summe amarus, *odor* peculiaris, subbalsamicus, virosus.

V. Lexipyreta, zooctona, præcipue anthelmintica.

U. In dialeipyris valere, multi notant, præferentibus aliis *radicem Gentianæ luteæ* tantillo *nucis* mistam, ipsi *Cinchonae officinalis* cortici. Inclaruit quoque in dysenteria ill. HUFELANDII, aliorumque auctoritate insignium, commendatione. Præmisso vomificio pulvere *radicis C. Ipecacuanhae*, *nux* cum gummi *Acaciae verae* propinata. Alii cum *Cetraria Islandica*, *radice Columbae*, *Orchidis* etc., optato cum successu, dedere; sed aliquando incitatione oborta, desideri cupiditas, tormina ventris, turbidaque lotii indeoles, increvere. De variis curationibus *nuce* et *Sulphate Zincii*, factis, in inveteratis scorbuticis, herpeticis aliisque ulceribus, refert cl. WIEL. Alii contra helminthias in tentarunt. In atrophia mesaraica *Actenriethius extracto* usus est ad sedandos spasmos,

exiguis dosibus cum gummiresina *Assae foetidae* cum fructu datis. Animalia bruta, majori ingesta dosi, anhelose respirant, torpescunt, subsequā insensibilitate, seu stupore, tandem spasmō, vel tetano totius corporis correpta, extinguntur. Magna proinde cura cavendum est, ne armigeris quoque remedio insubide dato, id mali accidat.

D. *Pulveris semigranum*, duo, ad quinque gradatim caute adscendendo; in tænia scrupulum, sed incaute dedere quidam. *Extractum aquæ fervidæ maceratione*, tum vero *coctione et expressione* parandum, itidem ad semigranum, vel integrum datur, auctioni paulatim dosi ad grana quinque.

V. *Extractum Strychni Nucis Vomicae.*

S U B B O R A S S O D A E.

N A T R U M B O R A X A T U M ; B O R A X Ph. Ross.

Бурокислая сода.

Subboras Soda promercalis e sale in India orientali, Perside, Thibetoque nativo, Tincal dicto, elicitur, qui, vel e terris sevosis effossus, vel e lacubus ibidem exemptus præparatusque *extractione et evaporatione*, tandem in Europa, præcipue vero in Anglia et apud Batavos Amstelodami peculiari processu a suis inquinamentis depuratur.

Q. E *Soda et Acido boracico* (secundum KIRWAN: *Soda* 17, *Acidi* 34, *aquæ* 49 partibus,) constans, sistit crystallos hexaëdras, columniformes, tetraëdris pyramidibus terminatas, etc., quæ sunt pellucidæ, decolores, vel albescentes, saporemque præ se ferunt initio dulcescentem, dein ex acri lixiviosum, nauseosum, in *aquæ* copia duodevicies pondus ipsarum superante, solvuntur; in aëre paululum faticunt et discidium patiuntur ex omnium *acidorum*, *aquæ Calcariae*, *Sulphatis Soda*, *Supersulphatis Aluminæ et Potassæ*, *Muriatis Ammoniae* etc., additione, in igne funduntur atque crystallisationis *aqua orbatae*, redduntur friabiles (*Borax usta seu calcinata;*) intensioni vero in pellucidum vitrum liquantur.

V. Ejusdem alcalescens; antacida; sedans; resolvens; reproductioni; favens. Partus dolores stimulare quidam volunt (STARK.) Antiquitas ei menagogam virtutem tribuit.

U. Usu præcipue externo commendabilis ad promovendam variorum ulcerum regenerationem; ita magnam ejus in aphthis, præsertim infantum aliisque oris interni et linguæ ipsis adeo syphiliticis et scorbuticis malis sanandis efficaciam experti sunt Medentes. In ulceribus etiam herpeticis, impuris, cutaneis, valet. Sedecim aquæ Rosæ partibus soluto, cutim lævigari, nævos et maculas deleri; cum unguento autem *Althææ* et *Oxycarbonatis Plumbi*, subactum, refrigerare STARKIUS adserit. Eundem solutionem partibus adfectis illitam et anno simul injectam, hæmorrhoidis cæcæ dolores mirifice lenire; denique Subboratem Soda cum adipis suillæ depuratae pari portione subactum, psoram et lichenes, citra noxam pellere, LÖFFLERUS adseverat. Sensibilitatem nervorum minuendo coitus humorum tollit, quapropter tuberculis hæmorrhoidalibus, varicibus duris, dolorificis tumoribus, obponitur, nec minus collyrium ex eodem adversus varia oculorum valetudinis genera, idoneum esse perhibetur. Maculis corneæ (THEDEN, RICHTER, ARNEMANN,) haud secus ac leviori visus obscurationi et cataractæ recenti, utilis esse existimatur. Ad mitigandam inflammationem et dolorem in primo blennorrhœæ stadio, in leucorrhœa quoque injectiones ex eo in usu erant, soluto in aqua destillata scrupulo ejusdem, quæ forma et pro collyriis oculorum et gargarismatibus, non inepta. Ob actionem in renes anasarcæ medetur et ob *Sodam*, quam tenet, liberam, virulentiam *Oxydi Arsenici albi*, mitigare fertur.

D. Pro usu interno præsertim in acore ventriculi semi-scrupulus (ad duos scrupulos) in aqua solvit, verbi gratia: drachma Subboratis Soda in tribus aquæ uncii addita mellis rosati uncia, ejusque solutionis cochlear ter quaterve de die sumitur. Pro usu externo, e. gr. in aphthis miscetur cum quatuor, vel pluribus aquæ destillatae et totidem mellis rosati partibus, atque eæ penicillo illinuntur, vel drachma ejusdem cum mellis

rosati uncia admovetur. Pro *collyriis* et *gargarismatibus* sumuntur plerumque quindecim grana *Subboratis Sodaæ* et quatuor unciae aquæ destillatae; ast si sialorrhœa a *Hydrargyro*, orta est, aptissimum tunc est *gargarisma* e *Subboratis Sodaæ* solutione saturatissima, quod dolores faucium aliaque incommoda, et cito, et tuto, tollit.

V. *Gargarisma boracicum.*

S U B C A R B O N A S P O T A S S Æ V E N A L I S.

C I N E R E S C L A V E L L A T I Ph. Ross.

Помашь углекислый нечистый.

Est *salina massa* e *cineribus* præsertim duriorum *lignorum*, ustis ac dein elixatis confusa, *Subcarbonate Potassæ* dives, *Muriatæ* etiam *Potassæ*, *Sulphatæ* ejusdem et *Calcariaæ*, nec non *siliceum terram* aliasque impuritates continens, quæ pro usu medico depuranda est; pro depuratione autem eligenda est fragilis, cavernulosa, grysei coloris, atque e gryseo-cærulescentis, perfacile ad aërem liquescens, majorique ex parte aqua solubilis. *Silicea terra*, qua subinde adulteratur, adfuso ad solutionem *acido*, quo copiosum hujus *terrae* præcipitatum, dejicitur, detegi potest. *Subcarbonatis* hujus virtus a *Pharmacopœo* exploretur solutione *Supersulphatis Aluminae* et *Potassæ*, in quam immissum *Subcarbonatis Potassæ venalis lioxivium*, eo uberior dat præcipitatum, quo majori copia *Potassa pura* adfuerit. *Cineres* puriores emptitii, qui ex America sub nomine *Pearl-ashes* adportantur, præ aliis, qui veneunt, sunt commendandi.

V. *Aqua Supercarbonatis Potassæ*; *Haustus carbonicus*; *Hydro-sulphuretum Potassæ*; *Hyperoxymurias* —; *Mistura Acetatis Potassæ juniperina*; — *Citratis Potassæ stibiata*; *Potassa liquida*; *Subcarbonas Potassæ depuratus*; — — *liquidus*; *Sulphas Potassæ*.

SUBCARBONAS SODÆ VENALIS.

NATRUM IMPURUM; SODA IMPURA.

Сода углекислая нечистая.

Subcarbonas Sodaæ venalis, præcipue in Astrachanensis provinciæ desertis et Setensi districtu et prope Ischimum urbem Sieveriæ in variis lacubus æstate exsiccatis, invenitur sat purus, vix ac ne vix quidem exotico postponendus, estque concrementum terreo-salinum, e combustis calcinatisque plantis, ad marina præsertim littora crescentibus, e. g. in Hispania e CHENOPODIO MARITIMO, in Ægypto et Arabia e REAUMURIA VERMICULATA, MESSEMBRYANTHEMO NODIFLORO-COPTICO, in Italia e SALICORNIA EUROPAEA, — HERBACEA-FRUTICOSA, in Anglia et Francogallia e SALSOLA KALI, — SODA, — SATIVA et e FUCO VESICULOSO paratum, atque solutione crystallisationeque depuratum.

Q. Est cinereum, duritie lapideæ, saporis salsi, lixiviosi. *Soda hispanica* merito præfertur; *Smyrnensis* vero, longe majorem Salis alcalini copiam præbet. *Hungarica*, quæ nativa est, in nonnullis lacubus, sponte exsiccatis, copiose efflorescit e qua $\frac{2}{3}$ *Subcarbonatis Sodaæ puri* extrahi solent, *Subcarbonas Sodaæ venalis* pro usu medico depuratur. Videsis SUBCARBONATEM SODÆ DEPURATUM; de SUPERCARBONATE autem SODÆ (*Natro supercarbonico*, logi meretur egregia observatio cl. Prof. REUSS in Comment. Societ. physico-medic. Vol II. p. 1. Mosquae 1817 pag. 75.)

V. *Aqua Supercarbonatis Sodaæ*; *Pilulae* —; *Subcarbonas Sodaæ depuratus*; *Subphosphas* —; *Sulphas* —.

S U C C I N U M,

Я н т а р ь.

Substantia bituminosa, in Russia ad littora maris borealis trans fluvium Meseny prope promontorium Kanin (Канинскій носъ,) haud secus ac infra fluvium Obim et Jeniseum ab arctois sub-

inde gentibus; ad catadupa (cataractas) vero Nenasitensia in Ecatherinoslawensi Gubernio; sed rarius a Borysthenitis legitur; copiosior autem invenitur in Sicilia; ad littora vero maris baltici, praesertim ubi Curoniam, Porussiam, Pomorjaniam alluit, uberrimus ejusdem proventus, atque, vel *Succinum fossile*, (terra excussum,) vel *haustile* (e mari baltico, verriculis lectum,) audit.

Q. Est substantia solida, arida, fragilis in fractura æquabilis, tantæque duritiei, ut tornari, cædi, polirique sese sinat, ut plurimum flavi coloris (*Carabe*, vel *Succinum citrinum*), nunc magis in fuscum, modo magis in rubrum (*Succinum rubrum*) nunc magis in album (*Succinum album*) vergentis, rarius pellucida, plerumque semipellucida, vel subopaca, vel etiam opaca, interdum nubeculosa. Odoraria, et sola jam frictione electrica, gratissimum spirat *odorem*; prunis inspersa fumum ejusdem odoris; ast longe fortioris, eructat, vasisque clavis igne torta, per destillationem largitur *oleum*, *Petroleo simillimum*, (quod *Acido nitrico-nitroso quadrupla portione instillato, in resinam, Moschum redolentem mutatur,*) *Acidum peculiare succinicum et pauxillum acetici*. *Aqua Succinum neutiquam solvitur, Alcohol exiguum duntaxat portionem (1 $\frac{1}{2}$ resinae secundum HEYER) extrahit. In volatilibus et fixis oleis prius (ad 550 F. fusum) facile solvitur (Ver-nix;)* ita etiam in debili *Subcarbonatis Potassae solutione* citra calorem. (THOMSON.)

U. Utut olim delicioribus matronis, hystericis et dysmenorrhœa laborantibus, commendaretur enixius, sed quoni-am cum nullo corporis nostri humore solvitur, neque in ul-lam excretionem manifesto agat, e censu internorum *medica-minum* jure meritoque exulat. Aptius in *suffitus* adsumitur. *Fumus, Succino prunis injecto, adsurgens, princeps suffimigio-rum* materia, quibus, et nares titillantur et gravis corruptæ conclave athmosphæræ odor (minime maligna indoles) cor-rigitur. Idem *fumus*, pannis laneis exceptus, quibus partes ægrotantes leviter fricantur, discutiendo in myodynæ rheumati-

ca, utilis esse putatur, quippe qui *balsamicas*, aut *oleoso-empyreumaticas* ferens particulas, salubrem potest in adfecta suffitaque parte incitationem, efficere. In leucorrhœa muliebri *fumigatio e Succino et resina Fagaræ octandrae (Tacamahaca)* profecisse perhibetur.

V. *Acidum succinicum; Oleum Succini depuratum; Pulvis pro suffitu.*

S U L P H A S B A R Y T A E N A T I V U S.

BARYTA SULPHURICA NATIVA Ph. Bor.; SPATHUM FON-
DEROSUM Ph. Ross.

Сърнокислая пыжелая земля ; Тяжелоземь ; Баритъ.

Est sal medius terrestris, nativus in metallifodinis Hercyniæ, Saxoniæ, aliisque venas implet. In Russia copiosus ejus provenitus est in monte serpentino (Змievская гора) in Kolyvan, *aurum argentumve nativum* haud raro in visceribus suis comprehendens. Purissimus in Germania Freybergæ et Marienbergæ occurrit, isque silit frustula alba, lamellosa, heterogeneis minus inquinata, et est usui pharmaceutico aptissimus.

Q. Ex *acido sulphurico* et *Baryta* (secundum KIRWAN et KLAPROTH continet e centenis *Acidi sulphurici* p. 33, *Barytae* 67, interdum adhuc *Strontianæ* portionem fert LOWITZ) constat, estque insigni pondere specifico, fragilitate, *textura lamellari*, *nitore* quasi *vitreo*, *aqua* insolubilis.

U. Onni, quantum quidem hactenus constat, in corpus animale, efficacia caret.

V. *Murias Barytae; Carbonas ejusdem depuratus.*

S U L P H A S M A G N E S I A E.

MAGNESIA SULPHURICA Ph. Bor.

SAL (CATHARTICUS) AMARUS Ph. Ross.

Сърнокислая Магнезія ; горькая соль.

Vulgo venalis prostans, in genere, vel ex *aquis mineralibus Epsomensisibus* in Britannia (GREW) *Sedlicensibus et Seidschü-*

zensibus in Bohemia, evaporatione et crystallisatione, vel e lixivio matre post obtentum *Muriatum Soda* ex *aqua marina* (HOYLE) obtinetur. Apud nos in confinibus Irkutsk (горькая сибирская соль) et Astrachaniæ in primis repertius, *Sodam* quoque, ut *Sal Sedlicensis*, sibi adnexam habet. *Aqua Seidschützensis* naturaliter abundat *Sulphate Magnesiae* eumque sat purum largitur. Libræ 20 civiles colligunt: *gasis carbonici* cubos pollicares 14 $\frac{1}{11}$, *Magnesiae* gr. 45 $\frac{1}{13}$, *Calcariae* 16 $\frac{4}{10}$, *Sulphatis Calcariae* gr. 89 $\frac{1}{11}$, *Sulphatis Magnesiae* gr. 3120 $\frac{6}{11}$, *Muriatis Magnesiae* gr. 79 $\frac{1}{11}$, (BERGMANN.) Admistus *Murias Magnesiae* (arbitratu MONRO,) auget vim reliquarum partium, hanc aquam constituentium, laxantem. Qui sub nomine *Salis Anglicani* venit, *Sulphas Magnesiae*, omnino depuratione eget, quæ sit eum in aquæ fervidae pari pondere, solvendo, filtrando, et in crystallos redigendo.

Q. Hic *Sal neuter*, dum purus est e *Magnesiae* 19, *Acidi sulphurici* 33, *Aquæ* 48 partibus (secundum BERGMANN) coalescens, sistit crystallos columnares, *saporis acris, amari, aëri expositus deliquium, nisi Murias Magnesiae, acer, avideque aquam atmosphæræ adtrahens, eidem adhæreat, non patitur, in æqua aquæ portione solubilis; secedens autem in partes constituentes, prout cum aliis *salibus Potassam* continentibus, miscetur. Quo siccior, eo melior est.*

V. Cathartica.

U. Ab aliis *catharticis salibus*, qui præsertim e *Potassa*, vel *Soda* coalescunt, differt eo, quod eito exserat efficaciam suam, neque adeo facile, ac illi, vires ventriculi canalisque intestinalis convellat; est vero adcommodus præcipue hypochondriacis, hystericis, irritabiliore aequo fibra præditis. Effectus ejus salutaris exspectandus est, cumprimis (exhibitio prius largiori manu, forma solida, *Submuriate Hydrargyri*,) iniis malis, quæ prompto auxilio egent, hinc apte datur in ileo, herniis incarceratis, præsertim ubi incarceratio fœcalis et in inflammatoria urget ita etiam in obstipatione, enterodynæ plumbea, quibus in casibus non male conjungitur interdum, cum

unguinoso oleo, vel ubi spasmi, ut causa obstipationis argutuntur, cum Opio (PRINGLE.) Quarta parte *Supertartratis Potassae* temperatus et ter per diem ad drachmam exhibitus, ipsam in intestinis nidulantem tamen expulisse perhibetur. In febris hypersthenicis, adeoque in omnibus inflammatoriis, ut laxans, cruditates auferendo, auctam solidorum energiam frangendo, prodest. Abstinendum tamen ab eo in gastrite, enterite, dysenteria etc.; ventriculo etiam admodum irritabili vix convenit (ARNEMANN.) Pro antidoto adversus *Berytae* et *Plumbi praeparata* habetur (ORFILA.)

D. Scopo digestivo exhibetur plerunque in solutione a scrupulo ad drachmam. Scopo cathartico a semuncia ad unciam, rarissime sescunciam, ut plurimum ex aquae, vel communis, vel saporis gratia—*Menthae piperita* partibus tribus, aut alio vehiculo, pro rei indole, congruo, ut liquore *cucumerum sativum* (огуречный рассоль,) solutus nonnunquam manna, quo incommoda et nauseosi ejusdem effectus aliquatenus mitigantur, remistus, aut *oleo unguinoso* temperatus, aut *Ori vitello*, vel *gummi Acaciae verae* subactus,

V. Clyster catharticus.

S U L P H U R.

C ъ p a.

Sulphur nativum occurrit apud nos variis in oris, in primis vero circa Wolgam et Samaram flumina, in monte sulphureo (sic dicto сърная гора,) in *gypso*; ita etiam in Ildecanensi monte sulphureo in Nertzinsk, haud secus ac in fodinis aureis Berezowiensibus prope fluvium (in Sieveria) Olutoram, imo circa Caucasum vestigia ejus adparent; sapientius tamen mineralisatum, variis cum metallis, praeципue *Ferro* (*pyrites*) et quamvis arte in elementa neutiquam diductum sit; natura tamen non solum in penetralibus terrae; sed etiam in ipsis animalibus *) et plantis producitur.

*) Probant id incendia animalium spontanea et analysis partium organicarum chemica.

Q. Est substantia solida, friabilis, coloris pallido - flavi, *odoris saporisque* debilis, præcipue sub frictione perceptibilis, calore manus crepitans, nec *aqua*, nec *Alcohole*, nec *acidis dilutis* solubilis; multis vero aliis cum corporibus (*Oxygene*, *Hydrogene*, *alcalibus*, *metallis*, *oleis unguinosis et volatilibus*) con-nubium iniens, vasis clausis (ad 170° F.) igni submissa sublimatur forma pulveris acicularis (*Sulphur sublimatum*, vulgo *Flores sulphuris*) ad 240° F. liquescit colore rubro, et frigescens acubus crystallisatur; accessu vero aëris (ad 302° F.)flammam concipit, ardetque eadem cœrulea, spargens suffocantes vapores, quo facto *oxygenes* attractum format *acidum sulphurosum*; nuptum vero eidem ad saturitatem, *sulphuricum* sistit.

V. Videsis *Sulphur sublimatum*.

U. Intus nusquam exhibetur, nisi præviam præparationem subierit, qua particulis ipsi interdum immistis, *arsenicalibus*, expurgetur; eas autem *eidem* admistas appareat, si residuo ex detonatione partis *Sulphuris* et quatuor partium *Nitratis Potassae aqua destillata* excepto et filtrato *solutio saturata Nitratis Argenti* admiscetur et *Oxydum Arsenici album* rubicunde in eo fundum pétit. *Sulphur sublimatum* venale semper fere continet portionem *Acidi sulphurici*, pars nempe *Sulphuris* tempore sublimationis oxydatur. Hoc cognoscitur, si *aqua destillata* tali cum *Sulphure* ebulliens chartam cœruleam rubro tingit colore, atque a solutione *Barytae* turbatur. Tam ab *Oxydo Arsenici*, quam *Acido sulphurico* liberatur *Sulphur* lotione iterata cum calente *aqua*. Extrinsecus tum *unguenti*, tum *balnei* sub forma adhibetur, adversus psoram. *Calcariae* æque ac *Sulphuris* libra, in *aquae fluvialis* mensuris septem, vel octo decoc-ta, pro *balneo* adhibetur. *Vapor Sulphuris* sub ipso scabiei principio, cum debita cautela, aliquoties in die adhibitus, ulteriore malo progressum præscindit (FRANK.) Fumigatio corpus circumvolans maximi fit a cl. GALÉS, (*Mémoire et rapports sur les fumigations sulfureuses appliquées au traitement des affections cutanées par J. C. Galés à Paris 1816,*) eaque intro-

ducto etiam in Austria **G A L E S I I** fumigatorio adparatu, maximo cum successu? a D. C A R R O , ut relatum accepimus, administratur. Non sunt heic tacito prætereundi fontes medicati plerumque calidi (*thermae*) Sulphur tenentes, quibus etiam varii *sales Hydrogenes sulphuratum* et *Sulphuretum Calcariae* accedunt. *Fons Aquisgranensis* quinque leucis versus ortum, a Trajecto ad Mosam tanta Sulphuris copia scatet, ut *Argentum* inficiat et colligatur Sulphur sublimatum in ipsiusmet balneariis, *Badensis* uterque, alter in Austria tribus milliaribus Vindobona distans, alter in Badensi provincia, *Landeckensis*, *Warmbrunnensis*, præter Sulphur, *Magnesiam* etiam, *Muriatem Sodaem*, *Sulphatem ejusdem*, *Sulphuretum Calcariae*, nec non *Hydrogenes sulphuratum* continent. Alii fontes, ut *Meinbergensis* et qui ab Alexio duce in Hercynia dicitur, *Ferro* etiam gaudent. In Helvetia *thermae Savarienses*, in Italia antiquo splendore æque ac recenti gloria fulgent fontes *Aponenses*, *Brandolini*, *Pisanis*, aquae etiam *Allobrogicue* in Sabaudia, in Francogallia celebratissimæ aquæ *Sextiae* (quinque leucis in aquilonem a Massiliis distantes,) *Bagnerenses*, *Dacensis* et *Plombierienses*; in Hispania *Archenenses* et *Monbayenses*; in Lusitania, quæ a regina nominantur (*Caldas da Reyna*,) in Anglia et Caledonia fontes *Solis Bathoniensis*, *Harrogatensis*, et *Moffatensis*. In Russia memoratu dignæ aquæ ad Baicalem *Turcenses*, seu *Bargusinenses* et *Baldolinienses*, *Barbenenses* et *Libawienses* in Curonia, *Sergiewienses* in *Buguruslanensi* circulo Orenburgensis provinciæ, *hypocaucaseæ* ad Constantinomontium (Константино-горскъ.) Ceterum vide tabulam sistentem alias etiam *minerales aquas*. Aquæ hæ et aliæ similes, vel potui datae, vel pro balneis adhibitæ, omnia præstant, quæ de solutione Sulphuris ope alcalinorum saliumque exspectari possunt, hinc obponi possunt cum emoluimento neuroblaciæ organicæ, atque exinde originem trahenti, inertiae viscerum abdominalium et vasorum ad venam portæ pertinentium, commendantur igitur in primis in splanchemphraxi abdominali, hypochondriasi, hysteria, haemorrhoidis et menstruorum cursu intercepto, et id

genus aliis. In fœditatibus cutis non minora præstant commoda, perspiratione et ipsis exanthematibus restitutis, vel novis productis. Magna earum est efficacia adversus arthrody-niam, urolithiasin, tamen renalem, quam vesicalem (obponendo enim semet abundantiaæ acidorum, calculorum genesi obicem ponunt.) Sequelas hydrargyroseos et Oxydorum Plumbi tollunt.

V. *Hydrosulphuretum Potassæ; Oleum sulphuratum; Sulphur sublimatum; Unguentum sulphuratum; — compositum.*

SULPHURETUM STIBII NATIVUM.

ANTIMONIUM CRUDUM Ph. Ross.

Сурьма самородная.

Minera est *Stibii*, quæ obtinetur ex Hungaria, Transylvania, Carinthia, Bohemia et Saxonia. Datur etiam circa urbem Nertsinsk in Sieweria. Hungaricum est optimum.

Q. Constat e $\frac{74}{100}$ *Stibii* et $\frac{26}{100}$ *Sulphuris*, estque substantia ponderosa (pond. specif. 4.700—5.000,) solida, splendens radiis, seu striis crystallinis, vel metallice nitentibus, e cœruleo-gryseis; friabilis, odoris saporisque expers, ante candescen-tiam liqueficiens et auctiori igne, odorem *Sulphuris* accensi spargens ac tandem in totum avolans. Pars superior coni, vel placentæ e mineris eliquatae, spongiosa, levis, vel scoriosa, exiguis et irregularibus striis notata et parum metallici habens, rejicienda est. Admista eidem minera *Plumbi* cognoscitur et fractura magis lamellosa, quam aciculari, et insolubilitate in *Acido nitrico-muriatico*. Si *Ferro* inquinatum est post detona-tionem cum $\frac{1}{2}$ partibus *Nitratis Potassæ* massam dat flavam; si vero *Mangano*, viridem. Dum purum, hæc massa alba esse solet. *Arsenicum pyritaceum*, quod HERMSTÆDTIUS et alii adhærens interdum invenere, colore e gryseo-flavescen-te, nitore metallico perfectiori, fractura granulata, et odore, dum fricitur, *Allii sativi*, detegitur.

V. *Sulphuretum Stibii laevigatum; Suboxydum Stibii fuscum.*

SUPER SULPHAS ALUMINÆ et POTASSÆ.

ALUMEN CRUDUM Ph. Bor. et Ross.

Пресыщенная Сърнокислая глина съ Попашемъ; квасцы.

Etsi hicce *sal* etiam nativus inveniatur; multo tamen major *eiusdem* pars obtinetur processu chemico e mineralis *aluminaribus* Goitwigio in Austria, ad Solfataram prope Neapolin, Tolfam (juxta Civitam vecchiam) et in Russia e Gubernio Tambowiensi, in Kirgisorum desertis, cum *argilla* in Carntschatca, et denique in *terra* sic dicta *aluminosa*, in lacu Iunderscanensi, nativus occurrit. *Romanus* idem *sal* est; sed crystalli *eius* habent colorem rubicundum, ab immisto, ni fallor, *Cobalto*, dependentem, qui ex Italia advehitur et prope Tolfam, e *saxo calcinato* certis encheiresibus, extrahitur; datur etiam *Alumen saccharinum*, quod melius ad *praeparata* referendum est.

Q. Est *sal* triplex acidulus ex *Alumina*, *Potassa* et *Acido sulphurico* conflatus, (venalis secundum VAUQUELIN, continet *Supersulphatis Aluminae* 0,49, *Sulphatis Potassae* 0,07, *Aqua* 0,44,) crystallos octaedras albas, subpellucidas, effingit; saporis dulcescentis et adstringentis; in *aqua* difficulter solvitur, quippe qui exigit *eius* 34 partes, si frigida fuerit; suffervfactæ autem duplam portionem; aëri expositus pulvere subtilissimo obducitur, quin tamen fatiscat in totum; supra ignem facile liquecit in *aqua* crystallina, quo simul pelluciditate sua orbatur, spumat atque in massam levem, spongiosam mutatur. Continens *Ferrum*, flavidi est *coloris* et *tincturam galmarum* nigro; *Cupro* autem inquinatus, *Ammoniam* cœruleo tingit *colore*. Is cui *Cobalto* impertitus est color rubicundus, *Romanus* et *Brunswicensi* est similis atque solutio *eiusdem* in *Acido muriatico* ad levem incandescentiam sortitur viridem colorum; vanescentem tamen sub refrigeratione.

V. *Acido-adstringens*; *styptica*; *roborans*; *antiseptica?* *)

*) Ill. Uden Professor Therapiæ et Pathologiæ, usum *Supersulphatis Aluminæ et Potassæ*, in diathesi septica, cum asthenia fibre muscularis, declarata, magna humorum decompositione, alvique excretione colliquativa, urgente, multiplici experientia pernecessarium esse invenit.

Ob prævalens *Acidum sulphuricum* vis ejus huic potius similis est, quam aliis ingredientibus. Copiose ingestus nauseam mouet, aut alvum pertinaciter adstringit.

U. Ob hasce virtutes exhibetur in debilitate tubi intestinalis et hinc pullulantibus quibusdam affectionibus, ita cum amaro-aromaticis valet adversus spasmos ejusdem, diarrhoeas chronicas, dysenteriae ultimum stadium -(ODIER,) præsertim, si ea, vel diuturna fuit, vel e sola intestinorum laxitate, exorta est, cum extracto *Clutiae Elutheriae*, radice *Arnicae montanae*, gummi *Acaciae verae*, aut cum radice *Colombæ* in infuso vinoso. Laudatur etiam in enterodynia pituitosa, flatulenta a cl. PERCIVAL (in connubio *Castorei*, florum *Matricariae Chamomillæ*) plumbea? (GRASHURZ.) Haud desunt exempla curatarum dialeipyrarum (CULLEN) ferente subsidiariam opem cortice *Cinchonæ officinalis*, quin etiam ipsarum putridarum febrium (VOGEL) humorum colliquatione stipatarum; sed nidulantibus biliosis sordibus et alvo adstricta, alienus est ejus usus. Profuit etiam in variolis confluentibus (WENDT,) petechiis, scorbuto. Magni aestimatur in haemorrhœis (profluviis sanguinis passivis,) metrorrhagia, enuresi ex relaxatione colli urocystidis (SELLÉ,) blennorrhœa (gleet,) leucorrhœa et gonorrhœa (stillicidio genituræ,) pollutionibus. Infantibus et tenellis subjectis aptior est ubique, quam *Acidum sulphuricum*. In criticis profluviis et violenter prorumpentibus, est damnifer. Externe forma *injectionis*, *gargarizationis*, *collutorii*, *collyrii* in ophthalmitide membranacea serosa (ubi in *aqua Rosæ* solvit, aut cum *Albumine Ovi*, ita agitatur, ut *collyrium* formet) et in chronicis, nec non in acutis sub stadio relaxationis, cynanche atonica mucosa (in prolapsu intestini recti HELVETIUS suppositoria e *Supersulphate Aluminæ* et *Potassæ* et *mucilagine gummi Astragali Tragacanthæ*, longitudine et crassitie digiti, compingebat, quæ æger duas, aut tres horas retinere cogebatur,) relaxatione uvulæ, anginam serosam comitante, gingivarum laxitate, exania et vaginæ uteri prolapsu, incipiente spina ventosa (HAHNEMANN) et tumore albo post luxationes re-

positas, ad conciliandum ligamentis robur. In carcinomate fungoso LEURSIUS et GESSNERUS commendarunt eum cum Superacetate Plumbi, linteolis imponendum.

D. A grano gradatim ad scrupulum sæpius de die (CULLEN) cum Saccharo et aromaticis; in pilulis cum extractis, vel in Sero lactis etc. HELVETIUS dedit pro dosi semidrachmam, imo unam initio secunda quaque hora, dein omni quadrihorio per quindecim dies.

V. Aluminà; Cataplasma aluminatum; Clyster adstringens opiatum; Collyrium aluminatum; Decoctura Quercus aluminata; Fomentum aluminatum; Gargarisma —; Pulvis adstringens; — Aluminis compositus; Serum lactis aluminatum; Solutio Sulphatis Zinci aluminata; Supersulphas Aluminae fusus.

SUPER TARTRAS POTASSÆ.

TARTARUS DEPURATUS Ph. Bor.

Винокислый Попашъ пресыщенный; Винный камень.

In succo baccarum variarum, præsertim vero *Vitis miniferae* obvius, ex quo instar crustæ crystallinæ parietibus doliorum, in quibus vina austera adservantur, adhæret, nomine *Tartari crudi* veniens, isque albus et ruber. In officinis Montepessulanis, Venetiarum, nec non Heripoli, prægressa solutione in aqua et cum argillis pinguibus coctione, depuratus, sub nomine *Crystallorum Tartari*, vel, si hæ pulveratæ sint, *Cremoris Tartari*, in commercio prostat. *Crystalli Tartari* depurati venales explorandæ sunt, num ab inquinamentis metallicis salibusque heterogeneis, liberæ sint. Quoniam in vasis cupreis parantur, probandum est sane, an non quidpiam hujus metalli contineant, hoc fit, digerendo eum cum *Ammonia liquida*, quo color cœruleus indicabit *Cuprum*, quod etiam metallice adhæredit laminæ ferreæ, bene politæ, solutioni suspecti *salis cum aqua* fervida facta, impositæ, interdum et crystallorum viridescens color suspicionem de *Cupri* præsentia movet. Inquina-

ti Sulphate Potassae et Supersulphate Aluminat et Potassae, solutio ex aqua tepida, adfusa solutione Superacetatis Plumbi, vel Barystae sedimentum deponit, in Acido nitrico non amplius soluble. Et si ab hisce inquinamentis liber invenitur, aqua tamen frigida rite abluendus est, et tum siccatus in mortario ferreo mundo et modice calefacto, in pulverem est tenuandus.

Q. Supertartras Potassae purus sistit crystallos parvas, albas, semipellucidas, fere cubicas, in massas irregulares, vulgo aggregatas. Ad aërem non mutantur, in aqua ad 60° FAHR., tum demum solvitur, cum centies haec pondus ipsius superat; aquae autem bullientis triginta partes unam ejusdem absorbent. Componitur ex Acidi tartarici partibus 3, Potassae una parte et Calcariae tartarosae $\frac{1}{2}$.

V. Frigerans; diuretica; cathartica et, uti quibusdam placet, resolvens; actionem vascularem minuens.

U. Dum activitatem systematis arteriosi inhibet, in synocha, præsertim cum complicatione biliosa et gastrica, in pronitate ejus ad statum putridum, in sanguinis congestionibus sine febre: hæmoptysi, hæmorrhoides (in connubio Sulphuris sublimati et Nitratis Potassae depurati) cum fructu adhibetur. In melæna Supertartras Potassae radice Callicoccae Ipecacuanhae maritus (illius semuncia; hujus vero duodecim granis,) in duodecim æquas partes divisus, atque singula, omni trihorio exhibita, profuit (ODIER.) Jecinoris activitatem cohibendo in diathesi biliosa, polycholia, cholera, diarrhœa biliosa, ictero etc., valet. Tubum intestinalem extimulando, præsentibus sordibus gastricis, in prima periodo febrium gastricarum, in obstipatione habituali, (hic quidam cum Cortice Cinchonae officinalis dant.) Secretionem urinæ augendo, aptum est remedium, ubi illa ex sthenica diathesi est suppressa, et ubi in febre aliqua, per urinam exspectatur crisis; porro in hydropisi (HOME, FERRIAR.) præsertim in anasarca post synocham, vel febrem exanthematicam, e. g. scarlatinam etc., orta, vel methystica (ab ebrietate) cum Digitali purpurea, vel gummiresina Stalagmitidis Camboogicidis (MEDICUS,) vel cum opportunis aliis, ut radice Am-

ini Zingiberis (MONRO,) qui etiam in enterodynìa plumbæ cum fructu dedit. Externe forma *pulveris* pro dentifricio, in primis in connubio *corticis Cinchonae officinalis*, etc., vel in morbis oculorum, aliis congruis junctus et inflatus.

D. Ubi purgatione alvum sollicitare expedit, a duabus drachmis ad sescunciam datur, passim in *aqua simplici*, vel *sero*, (si ad aliud refertur,) præscribi solet a semidrachma ad integrum, secunda, vel tertia quaque hora in convenienti vehiculo, repetendus. Additur interdum apte *catharticis*, *resinosis*, juvat quoque eundem, vel cum *Saccharo*, vel cum *melle* mixtum, præberi, quo præter alia commoda, sumentibus redditur gratior. Tres ejus partes cum duabus *Subcarbonatis Magnesiae*, instæ et ad cochlear minus cum *aqua* sumtæ, ubi *gas carbonicum* in ventriculo evolvere in votis est, convenient. Si *Supertartrati Potassæ* quinta pars *Sulboratis Sodaæ* adjicitur, tum solubilior in *aqua* redditur **TARTARUS BORAXATUS**, Винный камень съ бурою, vel *Cremor Tartari* solubilis crudus; *perfectus* vero obtinetur, dum dicti sales, simul solvuntur et solution ad siccitatem evaporat et a drachma ad tres, cathartico-diuretica virtute, conspicuus, a *Quarino hepatemphracticæ* ascidi oppositus fuit cum successa; in hydropisi autem, a semuncia ad duas uncias, in tredecim aquæ partibus solutus, alterno quoque mane, exhibitus, efficacissimum se præstítit. Si libera *Acidi tartarici* pars *Subcarbonate Potassæ* saturatur, tum **TARTRAS POTASSÆ**, Винокаменно-кислый Поташъ, (*vulgo Tartarus tartarisatus*) cum *Subcarbonate Sodaæ* vero ad saturationem addito: **TARTRAS POTASSÆ** et **SODÆ**, Винокаменно-кислый Поташъ съ Содою, (*Sal polychrestum Seignetti*) et cum *Subcarbonate Ammoniae*, **TARTRAS POTASSÆ** et **AMMONIÆ** Винокаменно-кислый Поташъ съ Амміакомъ, (*Tartarus solubilis*), obtinetur.

P. *Acidum tartaricum*; *Potus acidus vegetabilis*; *Pulvis Convolvuli Jalappæ* et *Supertartratis Potassæ*; — *Supertartratis Potassæ* et *Digitalis*; — *Supertartratis Potassæ compositus*; *Tartras Stibii* et *Potassæ*.

S U S S C R O F A.

PORCUS. Свинья.

Ubivis reperitur. Cl. Mammalia. O. Belluae. Usualis est:

ADEPS (*Axungia porcina*) ex omento cellulari ejus eliquata.

U. Pinguedo hæc consistentiæ *unguenti*, quoniam ubique recens perfacile haberi potest atque peridoneæ est densitatis, pro communissima *unguentorum* et similium, basi, inservit, meritoque omnium ab antiquis propositarum *axungiarum*, rancedine plerumque corruptarum pretiique carioris, vices supplet, imo militari in praxi, commode per se, loco multorum *ceratorum* *unguentorumque* compositorum, adhiberi potest. Ceterum omnia, quæ de *adipe ovillina* agens, dixi, et heic, intellecta velim.

T A N A C E T U M V U L G A R E.

Пижма обыкновенная; Рябинка дикая.

Planta per totam Europam vulgatissima, in Russia etiam in muris, aggeribus, ad fossas crescens. Cl. Syngenesia. O. Superflua. O. N. Compositæ discoideæ L. Corymbiferæ J. Perennis. Usualia sunt:

HERBA, foliis bipinnatis, incisis, serratis, quandoque crispediis. FLORES corymbosi, compositi, flavi. SEMEN.

Q. Præstans: in *volatili oleo* cum principio *amaro*, juncto, residens, ex herba recenti $\frac{1}{200}$ *olei volatilis* educitur, e sicca extracti aquosi $\frac{2}{3}$. Odor fortis, nidorosus; sapor amarus, aromaticus (odori congruens,) adstringens et calefaciens.

V. *Herbae*: incitans vires ventriculi, vasorum sensiferas augens, motum sanguinis, calorem et secretiones promovens, *Seminum*: anthelmintica.

U. In Caledonia adversus arthrodynamiam arthriticam anomalam, præsertim, si malum cum diuturna ventriculi debilitate et pituitosa abdominis colluvie jungitur; celebrata fuit

herba recens, mane ingesta, vel *infusum* tenuē *lacte* et *Saccharo*, mane et vesperi ad selibram potum. *Decoctura* ex *Vino albo*, calida, podagram ad ventriculum conversam, reddidit innoxiam (BRADLEY.) Alii in *infuso* ad prævertendam podagram suadent (DUNCAN.) In dialeipyris etiam, diuturnis atque pervicacibus *succus* recens expressus, efficax fuit. Porro contra interaneorum animalia, efficacia esse in primis *semina*, HOFFMANNI, ROSENSTEINI aliorumque multorum testimonio, constat. *Odore* sane, et *herba* vermbus inimica esse videtur, quapropter minime mirum in enterodynia verminosa profuisse; *infuso* autem *herbæ florū* cum *lacte* facto et anno injecto ascarides expulisse. *Semina* adversus helminthias in crebro sunt adhibita; perperam tamen substituta *seminibus Artemisiae santonae*, quibus longe minus amara sunt.

D. *Herbae* uncia ad libram *aquaæ*, vel *Vini*. *Seminum* pulveratorum grana viginti porriguntur. Pro *infuso* drachmæ duæ ad selibram *aquaæ*, vel *lactis* adhibentur.

V. *Extractum Tanaceti; Oleum —; Pulvis Tanaceti compositus.*

T H Y M U S S E R P Y L L U M.

Өиміанникъ ползучій; Богородская трава; Өиміанъ.

Suffruticulus, in collibus apricis aridis Rutheniae australis creberimus. Cl. Didynamia. O. Gymnospermia. O. N. Verlicillatae L. Labiatæ J. Usualis est:

HERBA caule repente, foliis obovatis, planis, obtusis; basi ciliatis, floribus capitatis, purpurescentibus. Horna tantum hujus *herbæ* collectio ad usum medicum est adhibenda, quod de omnibus classis hujus plantis, quarum partes efficacissimæ, tam celeriter avolant, observandum est, annuatim idcirco rejeccio earum, quæ a priori anno supersunt, sine fraude instituatur. A THYMO VILLOSO discernitur, quod hujus *folia* setacea, pilosa sint, in Thymo autem Serpyllo ad basim solummodo ciliata.

Q. Præter *oleum volatile rubrum fragrans*, (libræ quindecim *herbae* dederunt *olei volatilis acris scrupulos quatuor*,) *resinam acrem* et *Camphoram* tenet; dum enim *herba* destillatur, *Camphora* mox crystallis in excipulo secedit. *Odore* fraganti, grato, *Camphorae* vicino; *sapore* calido, subamaro, aromatico, ad citrinum, inclinante.

V. Stimulans; nervina; stomachica; resolvens.

U. Ope *infusi* ejus, cephalæam a crapula nepotina tolli LINNÆUS contendit; pro specifico autem habetur adversus cœnomaniam (запой) a D. SALVATORI (videsis: *Comment. Societat. physico-med. Mosquensis.*) Extrinsecus: in *fomentis* ad discutendos stagnantes humores, ad excitandam resorptionem, partesque roborandas, vel in *balneis nervinis*, aut ad ciendos menses adhibetur. Etsi nulla se commendet virtute præ ceteris *verticillatis*; ut indigena tamen et obvia, cum semper bona et minoris haberi possit, colligenda usuique servanda est.

D. Infunditur in *liquidi libra* ad semunciam.

V. *Oleum Thymi Serpylli; Species aromaticae.*

T O R M E N T I L L A E R E C T A.

Узикъ; завязникъ стоячій.

Planta in sylvis et pascuis sterilibus, imo etiam in locis arenosis obvia, caule erectiusculo, foliis sessilibus, foliolis ovato-lanceolatis, serratis. Cl. Icosandria. O. Polygynia. O. N. Senticosæ L. Rosaceæ J. Perennis. Usualis est:

RADIX (завязный корень,) conica, superne crassior, nodosa, fibrillis obsessa numerosis, crassitie digitæ 2 vel 3 pollicaris; extus ex rubro fusca, intus dilute rosea, superne squamata.

Q. Eximia, styptica, seytodepsico principio abundare liquet ex *infusi aquosi* rationibus, quo Sulphas Ferri præcipitatur colore purpureo, qui mox in nigrum mutatur. Odoris ea est et recens et siccata, fere expers; saporis styptici, subaroma-

tici. *Aquam et Alcohol*, quibus adstrictorias impertitur partes, colore rubro tingit.

V. Adstringens; tonica. *Radix* adeo adstrictoria est, ut ad dependa densandaque coria, in insulis Feroënsibus et Orcadibus, adhiberetur.

U. In atonia fibrarum muscularium, ita in diarrhoea asthenica, dysenteria (non nisi post sollicitas evacuationes) in haemorrhœis laudatur. Dialeipyras in copula *Gentianæ luteæ* saeppe propulsat (**CULLEN**;) plerumque tamen, præpostero ab agyrtis circumforaneis adhibita, consilio, easdem intempestive suffocat, aut constringendo vasa subito, humores versus nobilia organa pellit; valet haec admonitio de administratione etiam in dysenteria. Extrinsecus in gingivarum cruentatione, dentium vacillatione, uvulæ, ani et vaginæ prolapsu, locum habet; imo etiam in ulceribus atonicis, mucosis a cl. **SALA** laudatur. *Succo Eucalipti concreto*, saeppe succedanea esse potest.

D. A semiscrupulo ad semidrachmam in substantia; uncia vero ejusdem in sesquilibra aquæ decoquitur.

V. Extractum *Tomentillæ*; Infusum ejusdem compositum.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS.

Трилистник донный; донник белой и желтой; Буркунь.

Planta ubique spontanea. Cl. Diadelphia. O. Decandria O. N. Papilionaceæ L. Leguminosæ J. Usuales sunt:

FLORES, penduli, racemosi, flavi, rarius albi, *) vexillo emarginato recedente a carina, alis convolutis, divergentibus, capsulis subdispermis, acutis, rugosis. HERBA. Flores præferuntur vi foliis.

*) Distinguunt Botanici *Trifolium Melilotum officinale* floribus flavis et albis, sequenti modo: *Melilotus officinalis*, leguminibus racemosis nudis 2 spermis, subrugosis, ovatis, subcompressis, acutis, stipulis subulatis; hab. in pratis, ruderatis ad sepes et ripas ubique, annua. *Melilotus vulgaris* leguminibus racemosis nudis 1 spermis, rugosis, obovatis, acutis, stipulis setaceis; hab. cum præcedente, sed minus frequens, perennis. Corollis paulo majoribus, constanter albis.

Q. A volatili oleo pendens. Odor, fragrans; sapor mucilaginosus, subamarus, herbaceus.

V. Emolliens; resolvens.

U. Vix unquam usurpatur hodie interne; intrat tamen *Cassum* helveticum, quem *Schabzieger* vocitare suerunt, eodem fine, quo alias *Trifolium Melilotus coerulea*, eidem additur. Extrinsecus auxilium spondet, per modum siccorum *epithematum*, vel fluidorum. *Cataplasma* etiam intrat. Adhibetur vero in catarrhalibus rheumaticis tumoribus et inflammationibus, vel abscessibus ad maturitatem perducendis. Veteribus planta hæc *Lotus mellitus* fuit dicta, quia apes ex nulla herba plus mellis et suavioris capiunt, quam ex *Meliloti*. (ВОЁРНААВЕ.)

V. *Emplastrum Meliloti*.

TRITICUM AESTIVUM et HYBERNUM.

Пшеница яровая и озимая.

Planta apud Baschkiros in campis colitur una cum *hyberno* ad 62°, communissime in Russia australi. In Calabria uberrima messis. Cl. Triandr. O. Digyn. O. N. Gramina L. Gramineæ J. Annua. Usualia sunt:

SEMINA, inclusa calyce quadrifolio, ventricoso, glabro, imbricato, aristato in *Triticum aestivum*; in *Triticum autem hybernum*, submutico. Rubiginem, cariem, (quæ granis gryseis, pulvere nigro repletis, dignoscitur,) vel ustilaginem (quæ loco granorum glebas fuliginosas, cum paucis glumarum albidis reliquiis in spicis gerit,) sentientia, ut usui inepta merito damnantur. FARINA; AMYLOM; FURFURES; PANIS AZYMUS.

Q. *Seminum farinacea, mucilaginosa, Gluten, Amylum, Albumen dulcemque saccharinam mucilaginem continent, quæ nullo negotio, a se invicem separari queunt. Tritici hyberni aestivo prævalentis, materiae nutritiae libræ decem analysi chemica exploratae continebant glutinis et cuticulae libram et semunciam, Amyli uncias nonaginta, principii saccharini sesquicunciam, gummatis drachmas octodecim.* (HERMESTÆDTS Archiv. der Agriculturchemie.) E farina fit pasta cum aqua

pura, quæ inter manus probe malaxata, atque eousque lota, donec *aqua* decolor fluxerit, tandem *gluten*, quod superest, præbet; si vero id non est; pro certo tamen *fibrinae* animali substantiæ, perquam analogum. Si *aqua*, qua lavabatur *pa-
sta* certo tempore steterit, tum *pulvis* albus, qui *amylum* est, separatur. Cum *albumen* adhuc et *mucilago* dulcis in eadem *aqua* supersint, leni evaporatione *albumen* adinstar flocculorum, separatur; *mucilago* autem dulcis facta, evaporatione ulteriori, eaque exacta, obtinetur.

V. Nutriens; emolliens, *farinae*; *panis azymi*; alvum adstringens.

U. *Farinae* (præter diæticum) siccatae probe pro *cataplas-
matibus* emollientibus, in inflammationibus ad mitigandos do-
lores, adhibendis, vel ad resolvendos, ex. gr. bubones, tuber-
cula hæmorrhoidalia inflammata, vel ad suppurationem cien-
dam, e. gr. in tumoribus glandularum in suppurationem gra-
vatim transeuntibus, quo in casu *mel*, *radix Allii Cepae* etc., recte adduntur; nec minus in abscessibus, furunculis etc., utilitatem promittunt, imo etiam in spasmis abdominis. In diarrhoea et dysenteria, coctura cum *aqua* additis aliis *mucilagi-
nosi*, *decoctura SYDENHAMI* alba, vulgo dicta, suetum reme-
dium. Denique *farina* et *panis triticeus*, ut experientia docet, pro *cataplasmate sinapino* simplici cum *Aceto*, *farina seminum Sinapis nigrae*, vel *aromatico*, vel resolvente frigido cum *aceto* aliisque, apta. Decociti *furfures* tussi ab acri prosunt; extrinsecus vero in *balneis* pedum emollienti scopo adduntur, vel in *aqua* pro *clystere* coquuntur. Calide applicati œdemata pe-
dum dissipant. *Decocitura SYDENHAMI alba* fit, e duabus *mica-
rum panis triticei* uncii, *gummi Acaciae verae* semuncia, in sex libris *aquaæ* decoctis ad libras quatuor, addita *Sacchari* se-
muncia, remanentes.

V. *Amylum triticinum*; *Cataplasma Tritici*; — — *cæpinum*; — — *opiatum*; *Clyster Amyli*; — *nutriens*; *Decocitura Furfuris*.

TUSSILAGO FARFARA.

Бѣлокопытникъ; Подбѣль; Машь и Мачиха.

Planta in solo argilloso ad fossas, et in campis humidis
gignitur. Cl. Syngenesia. O. Superfl. O. N. Compos. radiatae
L. Corymbiferæ J. Perennis. Usuales sunt:

FLORES, calyce simplici, squamis æqualibus, discum æquanti-
tibus, submeinbranaceis; cor. fœmin. ligulatis; receptaculo
nudo, pappo simpl. sessili. FOLIA, (cordata, angulata, denta-
ta, subtus pubescentia.) RADIX.

Q. Totius plantæ recentis: *Sapor* mucilaginosus, subama-
rus, acris et aliquantum aromaticus; *odor* gravis. Verisimile
est extractivo - amaro et scytodepsico paucō, multaque muci-
lagine niti. Infusum Tussilaginis Sulphate Ferri obscure fucatur.

V. Expectorans; demulcens; ab acri defendens, vel idem
involvens.

U. Succi foliorum, vel e tota planta verno tempore expres-
si: in scrofulosis glandularum stasibus (**CULLEN**, **PERCIVAL**,
MEYER,) efficacia celebratur, haud secus ac in ulceribus ejus-
dem indolis. Tussientibus ab omni ævo commendata fuit, po-
tioremque inter pectorales locum tenuit: pro phthisicis, febri
lenta tabescentibus, pneumonicis, raucis a morbillis. Perma-
gni pendenda, arbitratu **FULLERI**, decoctura foliorum ad scro-
fularem phthisin curandam, adeo, ut vel graviori sufficere,
contendat. Fumum foliorum arundine, vel infundibulo excep-
tum tussi et orthopnœæ esse utilem, **DIOSCORIDES**, **GALE-**
NUS, **PLINIUS**, adseverant; per fumisugam fistulam, suctum
odontalgiæ esse adcommodum, alii referunt. Radix siccata
conquassataque, fomitis instar, ad captandas scintillas idonea.
Melle mistam in exulcerationibus pulmonum prodesse, refert
HIPPONCRATES; recentem vero in catarrhalibus affectionibus,
(**DETHARDING**.) Folia siccata instar **THEÆ** hausta, **BOYLE** con-
tra tüssim catarrhalem et asthmaticis suadet. **DIOSCORIDES**
in hisce morbis *vaporem* foliorum in *aqua* coctorum laudat.
Extus *folia* recentia contusa inflammationibus et ulceribus im-

posita conducunt; succus per aliquot dies potatus, quartanam curasse dicitur dialeipyram (BOËRHAAVE.)

U L M U S C A M P E S T R I S.

Илинъ полевый; — длинночеремный; Вязъ.

Arbor procera, tam in australiori, quam frigidiori Europa crescens, Gades et Gestriciam terminos ponente ill. LINNÆO. Cl. Petandria. O. Digyn. O. N. Scabridæ L. Amentaceæ J. Usualis est:

CORTEX ramulorum interior et arboris junioris (fuscus, penitus, tenax.) Majo mense colligendus.

Q. *Mucilagine* abundant tenelli rami; sed coctus et in *extractum* densatus *succus* manifesto adstricterius est et *Sulphatem Ferri* e fusco nigrescenti colore præcipitat. *Sapor* *corticis* subamarus, adstringens, ceterum inodorus.

V. Adstringens; roborans; diuretica.

U. *Decoctione* in fœditatibus cutis, uti psora, tinea, herpetibus, lepra, ubi et intus et externe præscribitur. Scilicet coquitur *cortex* leni igne ad unciam in libra *aquaæ*, data, ut alvus laxa sit, opera, in connubio *radicis Tritici repentis*, *Leontodontos Taraxaci* et *decoctura* hæc perseveranter quotidie prominatur. Cessuri exanthematis indicium est haud æquivocum, eruptionem versus superficiem niti; sed eadem *decoctura* extrinsecus oppugnandum est. Cl. LETTSOM efficaciam *corticis* in illa etiam *lepræ* specie, quæ a SAUVAGESIO ichthyosis dicta est, deprædicat. Laudatur etiam ab aliis in ulceribus, arthrodynia, in primis podagra, diarrhœa, dysenteria, hydrope, dialeipyris; sed non temere ob adstricteriam vim adhibendus.

V. *Decoctione Ulmi.*

VACCINIUM OXYCOCCOS.

OXYCOCCUS EUROPAEUS PERS.

Брусничникъ журавлиной; Клюква; Журавлина.

Suffrutex in locis udosis septentrionalis Russiae crescens; foliis sempervirentibus integerrimis revolutis, ovatis, caulis repentibus, filiformibus nudis. Cl. Octandr. O. Monogyn. O. N. Bicornes L. Ericeae J. Usuales sunt:

BACCÆ RECENTES, (*Клюква*) frigore tactæ rubro-purpureæ, magnitudine *pisi* majoris, globosæ, undique glabrae. **SUCCUS EARUNDEM.**

Q. *Sapor* acido-stypticus; adustarum gelu *baccarum*, acido-gratus; *odor* vix ullus.

V. Refrigerans; analeptica; subadstringens; antiscorbutica; antiseptica.

U. *Roob* earum in febrentium usum, *aqua* dilutum, pro potu exhiberi potest et in primis in biliosis, putridis, sic dictis febribus, in ipso scorbuto, quibus *succus* quoque idoneus est. *Succo Citri medicae* ubique fere succedaneus, ubi *potio ordinaria acidula* opus est. *Baccae Saccharo* conditæ in culinis Ruthenorum et Suecorum notissimæ. *Succus baccarum melle* etiam maritatur. Videsis: **HYDROMEL.**

D. *Succi* unciæ duæ, cum libra *aquaæ*, addito *Sacchari* tantillo, propinantur.

V. *Mel Oxycocci*; *Roob* —; *Succus ejusdem nitratus*.

VALERIANA OFFICINALIS.

Булдырянь аптечный; Маунь; Земляный ладань.

Planta cal. nullo, cor: monopetala, basi hinc gibba supera, semen unum, floribus triandris, foliis omnibus pinnatis, in pratis plerumque depressis et humidis crescens, efficacior in montosis, siccis, fol. angustioribus, fere laciniatis, caule humiliori, odore gravior. Cultura immutata. Cl. Triandr. O. Monogyn. O. N. Aggregatæ L. Dipsaceæ J. *Perennis*. Usualis est:

RADIX fibrillata, fibrillis subfuscis, tenuibus, hirtis tenacibus, rhizomate cilindrico; extus fusca, intus alba, ante anthesin, ineunte vere, evellenda, atque a squalore liberata siccanda probe, clausoque vitro vase, quoniam volatile et fugax, quod efficax est, in loco sicco et frigido servanda. In pulverem ubi usus inciderit, recenter quoad fieri potest tenuanda. Loco ejus *Rusci aculeati radicem* adhiberi monuit **S Y L V I U S**, sciteque innuit maleficium perfacile detegi eo, quod haec dura sit, frangique contumax, atque sine ulla *odoris* gratia. Porro etiam *Eupatorii Cannabini radicem* in vicem ejus submoveri, atque venundari aliorum est monitum. Neque cum radice *Valerianae Phu*, longiori, majori, fibrosiori, ingrati debiliorisque *saporis*, aut *Dioicae*, inerti, fibris tenuioribus præditæ, albiori *odoris*que debilioris, confundenda. *Radix Valerianæ off.* crassior, minus fibrillata, magis lignea, fragilis, et cinereo castanei *coloris*, jure meritoque rejicitur. *Ranunculorum* quædam species, ut *Ranunculus bulbosus*, — *repens*, — *polyanthemos*, *radicibus Valerianæ a Rhizotomis*, mercibus adulterandis, magna copia admiscentur, ægre distinguendæ etiamsi acerrimæ; odorem tamen *Valerianæ*, nequiter simulantes.

Q. Præstans. Nuperrima **T R O M M S D O R F I I** analysis evicit, *oleo volatili*, et haud parca quidem copia niti; nonagesimam enim sextam partem totius ponderis, seu quatuor scrupulos e sexdecim unciis hanc esse particulam *oleoso aetheream* docuit. Præterea octavam ponderis partem elicuit idem vir principium peculiare, quod *Muriatem Ferri* viridi colore tingit, plures etiam solutiones metallicas præcipitat, hinc *acidi ingenium* ostendit. Tandem insunt decima sexta pars ponderis *resinæ odo-ræ*, quæ cum *Potassa liquida* neutiquam jungitur, et vicesima quarta pars *extracti gummosi*. Odor *radicis* recentis graveolens, hircinus, subnauseosus, felibus gratus; *sapor*, ingratus, amaricans, subacris. *Siccatae odor* et *sapor* fere intensiores.

V. Præstans, nerveum sistema excitans, ejusque actionem intendens, estque in usu quotiescumque promta efficaciaque stimulantia et roborantia e re sunt. Nimiam incitationem tol-

lens, insalubriter intensam, extensive auctam, incitabilitatem minuens, eamque vicissim instaurans, si intensive ita tenuis fuerit, ut aucto incitamento resistere non valeat. Pulsus arteriae intendens, calorem augens, omnes excretiones promovens, cutemque in primis adficiens. Antispasmodica, menagogia, anthelmintica. Majoribus dosibus, ægris mobiliori nervorum systemate præditis, anxietatem, vomitus, alvi profluvium, causans.

U. Ex his, quæ de *Valerianæ off.*, virtute obiter dicta sunt, per inductionem facile est collectu, quibusnam in morbis illius commendandus sit usus, quum vero et heic optima sit dux experientia, præcipuas specialium morborum formas, ex veterum recentiorumque testimonio, succincte retulisse dicimus. Præcipui, contra quos celebritatem nacta est, morbi sunt in genere convulsivi et spasmodici, sic epilepsia (HALLER, TISSOT, WHYTT;) psychica, pathetica, (GRUNER;) menisticæ (RIVERIUS;) verminosa (MARCHANT,) (conjunctim cum foliis *Citri Aurantii*, aut *oleo*, si præsto est, *Melaleucae Leucadendri;*) scelotyrbe (BRISBANE;) catalepsis, trismus, entero-dynia spasmodica. Ita sub diathesi hypochondriaca, aut hysterica, paroxysmis algore extremitatum et congestionibus ad caput incipientibus, nec minus in dolorificis asthenicis adfectionibus systematis nervæ utilis, sic in hæmicerana palmarium largiori dosi, et repetita sumtum, habet FORDYCE, qui ipse se ab eadem quadrienni liberavit. Vertigo, quæ ex ærumnis et sollicitudine, post magnam humorum cladem nascitur cum pallore et frigore cutis juncta *radicis Valerianæ* cum herba *Menthae piperitæ* et *Chenopodii Ambrosioidis*, aut radice *Amomi Zingiberis mixtæ*, sæpen numero cedit (SPRENGEL.) In paralyticis malis, unanimi consensu impenseque laudatur, vel sola, vel in connubio fortiorum *stimulantium*, nec minus in apoplexia. In amaurosi cel. RICHTER ejus usum laudat, eaque vel interne, vel extus in pulvere, sternutamenta proritando, vel in infuso cum *Alcohole diluto camphorato*, admoto adhibetur. Cum in morbis exanthematicis, arthrodynia, myodynæ rheumatica etc.; auctorum commendationem habeat, ita tantum-

modo valet, ut hi morbi ab imminuta orti sunt incitatione, tum scilicet pro gradu incitabilitatis adhibita, haud spernendam adfert utilitatem. In omnibus formis asthenicarum febrium, sic in typho, seu is, pure pute, nervosus est, seu in secessum humorum nitatur (additis acidis mineralibus,) aut biliosa, pituitosa complicatione stipetur, aut exanthematibus, variolis, morbilis, petechiis, etc., vel ubi is statum paralyticum, vel spasticum prodit, parvo, spasmodico, inaequali pulsu, parva spiratione, siccitate, algore et pallore cutis, ariditate et tremore linguæ, tacito delirio, comitus, magnæ est efficaciam. In dialepyris sub spastico statu a quibusdam laudatur. Vermantibus cel. STÖRK, omni cum successu porrexit; in chronicis tamen hujus indolis morbis per modum additamenti ad *anthelminthica* aptior, vel etiam ad amara, si asthenia majoris gradus urgeat (GĄJKOWSKY) *Dissert. vermium intestinalium corporis humani historiam sistens. Petropoli 1806.* Radix masticata et extrinsecus applicata, visum confortare dicitur, maculasque oculorum adstergere. BOËRHAAVE.)

D Pulveratae radicis in chronicis morbis est commodissima, et maxime vulgaris forma, quæ tamen haud, citra incommodum sumitur. Interne a granis decem ad scrupulum et drachmam usque propinatur, vel sola, vel cum *aromate* quopiam sub debilitate ventriculi, vel sub diathesi pituitosa cum *Supertartrate Potassae, Muriate Ammoniae*; sub musculari debilitate cum *Cinchona, Ferro* etc; in neurasthenia majori, cum *Moscho, Castoreo* etc.; vel etiam per modum *electuarii* cum *melle*, vel *syrupo*. *Infusum aquosum* non adeo efficax; *vinosum* autem præstans. *Decocitura* vix alicujus efficaciam. Summa cum utilitate in modum *tincturae* exhibetur, præsertim ubi *alcoholisata* non sunt aliena, fractasque vires cito resuscitari expediat, ut in morbis typhodibus.

V. Extractum *Valerianae officinalis*; *Infusum* — — *Oleum* — —; *Species sopientes*; *Tinctura Valerianæ aetherea*; — — *ammoniata*; — — *camphorata*.

VERATRUM ALBUM.

HELEABRUS ALBUM.

Ч е м е р и ц а б ъ л а я .

Planta Græcioe, Italiæ, Austriæ et Rutheniæ australis ac Sieveriae incola sponte crescens, *Cl. Polygamia. O. Monœcia. O. N. Liliaceæ L. Junci J. Perennis. Usualis est:*

RADIX fibrosa, conico-cylindrica, extus fusca, intus *coloris* albidi. *Radix Veratri Lobeliani* non fraud., sed ignorantia sæpe surrogatur eidem.

Q. A *principio acri extractivo-resinoso* petenda. *Odor* præser-tim sub trituratione nauseosus, sternutatorius. *Sapore* est acri, fauces urente, linguam vellicante, intense amaro.

V. Venenata; irritans; sternutatoria; drastico-cathartica: an-thelmintica, phthiroctona.

U. Morbi chronicæ nervosi; mania, epilepsia, rabies hydrophoba, enterodynæ habitualis (Hahnemann,) asthma, hydrops, podagra novissimis experimentis? *Extrinsecus*: Tinea capitis, psora, herpes exulceratus et crustaceus, phthiriasis. Ad pediculos necandos et curandum rebellem herpetem suadetur *unguentum ex uncia radicis, adipis suillæ unciis quatuor et tincturae Citri semidrachma*. Dignum est memoratu aquam Hussonii medicatam, (*Eau médicinale d'Husson*) quæ nuper in podagra celebritatem consecuta est, e *tincturæ vinosa Veratri albi* patribus tribus et *tincturæ Opii crocatae* (*Laudani liquidi*) parte coalescere, (*Moore.*) Loco Veratri, Gratiolam, vel Colchicum autumnale adhibendum esse alii contendunt, (*Jones.*)

D. A granis duobus ad sex cautissime augendo. Scrupulum pro *infuso* cum sex unciis aquæ dimidiaque pars per diem sumenda est. Liberalius ingesta puta ad scrupulum, ardorem faucium, gastritidem, vomitus vehementes cardialgiam, doloresque lacinantes intestinorum, gangrænam, in mortem, nisi antidotus obstiterit, desitram, adfert. Antidotus ejus est *Coffea arabica*, forsitan et *acida lac*. Hippocrates, sub usu Ve-

ratri, ægrotis suadebat hydromel per aliquot dies potandum, hacque ratione medicamentum mitius agere, sibi persuadebat.

VERATRUM SABADILLA. (RETZII.)

Чемеричникъ вшеморный.

Planta Mexicana. *Cl. et O. præcedentis. Usualia sunt:*

S E M I N A, capsulis oblongo-acutis, nigris membranaceis, tecta.

Q. Venenifera. Gustatu *semina* amara, acria, urentia; *odor* vix ullus.

V. Drastico-cathartica; anthelininthica, phthiroctona.

U. Fere in iisdem morbis, ubi *Veratrum album* laudatur, prodest, ita in morbis animi nervosisque: mania, melancholia, epilepsia, catalepsi, scelotyrbe etc. præcipue autem efficax est adversus vermes et insecta. Ascarides *clystere* injecta necant; imo etiam *taeniae solio* obponitur.

D. Infanti bimulo, quadrimo, granum, duo; octenni grana quinque; duodecenni grana decem, cum *syrupi*, vel *mellis* quantitate sufficienti, post quinos dies *catharticon* interpolando. Proiectoris ætatis hominibus a duodecim granis ad scrupulum *extracto* quopiam amaro excepta. Pro *infuso* semiscrupulus in *aqua* sufferverfactæ, aut *lactis* uncia, suadente **HERZIO**, sufficit. Pro *clystere* drachmæ duæ, vel semuncia in *aqua* bullientis, vel *lactis* libra. *Pulverem*, ut phthiroctonum extrinsecus in valetudinariis militaribus adhiberi juvat; cavendum tamen est, ne *pulvis*, aut *Piperis*, aut *Veratri albi*, malesuada fraude, subrogetur eidem.

V. *Clyster Sabadillæ.*

VERONICA BECCABUNGA.

Вероника ручейная.

In fossis et locis humidis copiosa, in locis scaturiginosis, ad fontium latera, in rivulis, qui per hyemem raro congelant. *Cl. Diandr. O. Monogyn. O. N. Personalæ L. Pediculareæ J. Usualis est:*

H E R B A recens, spithamea, vel ultra, glabra, succulenta, caule repente, tereti, simplici, vel subramoso. Foliis ovatis; planis, subcarnosis, obtusis, serratis, dilute virentibus; floribus racemosis lateralibus, racemis oppositis, bracteis lateralibus.

Q. *Odor contusorum foliorum debilis; sapor amaricans, stypticus, acriculus. Masticata folia tenera sapore Sysymbrii Nasturtii, obscure imbuta, adstrictionem stypticam, in ore relinquuntia, satis diu inhærentem. Caules masticati foliis con-*

gruant.

V. Antiscorbutica.

U. *Succum e Veronica Beccabungu expressum, contra scorbutum valere, HOFFMANN adseverat, cujus uncias duas ad quatuor epotari etiam in connubio seri lactis СНОМЕЛ suadet; nec inepte cum succo Cochleariae officinalis, vel alterius antiscorbutici efficacioris commiscetur. Extrinsecus ulceribus scorbuticis cum successu admovebatur PAULI teste. Hæc planta jure meritoque adtentionem vindicat, quippe quæ sapore amaro, et analogia cum virtutibus plantarum proxime adsimilium, præsumendi causam præbet, fore eam, præter antiscorbuticam, tonicam etiam vim exsurgentem, legi etiam illa potest, iis anni tempestatibus, quibus aliæ antiscorbuticae desiderantur, nisi siccæ, aut conditæ.*

V I T I S V I N I F E R A.

В и н о г р а д и на.

Frutex in regionibus australibus omnium mundi plagarum sponte crescens; cultura vero viget in aliis sub mitiori coelo satis; sed non ultra quinquagesimum primum gradum septentrionem versus, et tricesimum versus æquatorem; apud nos vero in provincia Bessarabica ad Istrum, Pruthum et alibi item ad Hypanim, in Chersoneso taurica circa rivum Katsa; in transalpina vero circa Balaclavam, Alupcam, Ursuf, in horis Niceticis (Никитские сады) Aluschtam, et in primis in amœna valle Sudac, passim spontaneus et altissimas arbores

scandens, denuoque ad terram demissus, sic etiam ad Tanaim, et fluvium Cimlam et vallum totius caucasi temperatorium, et ad Elborum, haud secus ac circa mare Hircanum Astrachaniæ, atque in Iberia Persidi cum primis contermina copiose, et altitudine, supra arbores maximas adscendens, emititur. In Europa minime cum successu supra 50° exceptis Dresda, Naumburgo, et Thoruno? colitur. Cl. Pentandr. O. Monogyn. O. N-Hederaceæ L. Vites J. Usualia sunt:

BACCÆ (UVÆ) RECENTES MATURE, — IMMATURE; — SICCATÆ (Passulae, *Uvae passae*); изюмъ; MUSTUM, seu succus ex baccis maturis expressus; САРА, slavoserbice Маджумъ, seu Mustum avolantibus coctione aquosis partibus ad dimidiam partem absumtum spissatumque; DEFrutum, idem ad quartam partem densatum; VINACEA виноградные выжимки seu pars post pressionem uvarum remanens; VINUM (*Temetum*) e Musto ope fermentationis surgens, quod etiam, licet longe debilius, ex aliis fructibus acido-dulcibus, paratur, quale est РОМАСЕУM, liquor pomaceus fermentatus, seu Cidre, slavice яблонникъ, Vides: VINUM LUSITANICUM ARTEFACTUM; ОМРНАЦИУM (*Agresta*), succus immaturarum baccarum.

Q. *Baccarum* species, æque haud ignobiles sunt diversæ, variaque a Ruthenis nomina sortiuntur, puta upyrena (*Kyschmysch*), præcox, hungarica, crassipellis, cylindracea (козьи пипьки), casbinica, pinguis, Constantinopolitana, autumnalis (осенчакъ) et aliæ, præsertim in Tauride varietates, (HABLIZ Descript. Cherson. p. 72;) laciniosa vero et syriaca e Britannia, huc translatae, in tepidariis plerumque Petropoli et Mosquæ maturabantur; quod vero spectat figuram, aliis est oblonga, aliis globosa, aliis, præ brevitate pedunculorum, angulata, nec magnitudo uvis eadem; color autem mox viridis, mox rubellus, cœruleus, brunus, flavidus, pendetque a cuticulis baccarum, nisi arte, ut fieri solet, vel productus, vel auctus fuerit. Epidermis earundem, mox tenuis, mox crassior. Continent baccae plerumque Saccharum, Albumen, gelatinam gluten, mucilaginem, Supertartratem Potassæ, Acidum tartaricum,

citricum, et malicum; et quo propiores sunt maturitati, et minus Acidi malici, et plus materiae saccharinae tenent; siccatis etiam plus inest ejusdem, quam recentibus, hinc minime minimum vinum malacense (Malaga,) Frontinianum (Фронтина) Tokayense dulce (vulgo effluvium vel essentia) hac in primis scatent. Fermentatio vinosa pendet a glutine, quod FABRONIO docente, inest membranis separantibus cellulas baccarum, nec prius, quam peracta succi expressione, cum parte saccharina commiscetur. Vina vel alba vel rubra sunt, quæ coloris varietas, diversis gradibus discrepans, non a succo baccarum, ast epidermidis pigmento pendet. Porro, vel dulcia sunt, vel acida, vel austera, quædam plus Alcoholis tenent, alia magis aquosa. Vetustate insuper crescit eorum virtus. Essentiales omnium vinorum proprietates sunt, quod teneant unum, vel duo Acidæ, præcipue Acidum malicum, quod in debilioribus vinis prædominio petitur; in aliis vero prædominatur Acidum carbonicum, ut in Campanaceo, (Шампанское вино,) Cimlensi (Цимлянское вино,) vinis Acsaicis, et materia extractiva, quæ in vetustis vinis præcipitatur, et deponitur cum tartaro, oleum etiam volatile iis inhaeret, a quo sapor pendet, dein materia colorans, et Alcohol, quo præcipue medica Vini virtus nititur. Vinum rhenanum (Рейнвейнъ, Рейнское виноградное вино), acido malico ætate cum Alcoholis arctius juncto, separata majori Supertartratis Potassae copia, aetheris naturam induit. Inter vina taurica optimum est Sudacense, præsertim illud, quod transplantata Vite Tokayino, conficitur. Tanitarum (Донцовъ или Донскихъ козаковъ) vina sunt: Cimlense a fluvio Cimla dictum, Rasdorense, Melechowiense, et Vedernikowiense. Primum est dulcedine et rubeo colore conspicuum, et albo facilius conservatur. Cimlense album cedit, bonitate ceteris. Hoc et vina, quæ in Acsaicis montibus conficiuntur, æmulantur vinum campanaceum. Sunt autem hæc vina loco calido vix conservabilia; cito enim acescunt; in caveis autem, lagenis siculo immersis, optime conservantur, sed caveæ illæ non de-

bent esse frigidæ hyemali tempore. *Vina hypocaucaeæ*, utpote *Kizluriensia*, *Svanensia*, seu *Törökiensia*, *anticetica*, sub nomine чигиръ nota, sunt debilia, vel vappida; *Iberica* quoque ejusdem indolis. Quam sit *Hungaria vinorum* (variarum specierum) ferax, legi meretur *Novotny Sciographia*, seu *compendiaria Hungariae notitia*, *Vienae MDCCXCVIII* edita, p. 265. Plerisque europæis *vini*, nisi omnibus, palmam præripit *vinum dulce Tokayense*, et in civitatibus maxime submontanis Comitatus Semplmensis: *Eenze*, *Keresztur*, *Liszka*, *Hada*, *Pataç*, *Sátorallya*, *Tolsva*, *Tallya*, *Tartzal*, et *Tokay* provenit. In his tres *Tokayensis vini* ordines a Carpato-Russis, et Hungariae edificantur. 1º *Essentia*, guttatum e *baccis* collecta, est maximi pretii, mensis regalibus et Summatum inservit, 2º E *baccis* siccatis et pressura exactis, vulgo *Ausbruch*, seu *essigum*, 3º Ex affusione alterius *vini*, in reliquias priorum, vulgo *Moscas*. Principe loco promontorium *Tokayense*, proxime *Tallyense*, pro diuturniore conservatione *Tolsvense* commendatur. Inter eugenia etiam Hungariæ *vina* referuntur: in Comitatu Posoniensi *Retsense* et *S. Georgiense*; in Nitriensi *Zomboriense* fortitudine, *Madiense* sapore eminens, *Vaag-Ujhelyene* Burgundico non cedit; in Nagyhontensi *Baka-Banyense* maxime diureticum; in comitatu Castri ferrei *Eisenbergense* *Tokayensi* proxime accedit; in Baranyensi *Vilanense* *Burgundicum* sapore vincit; in Schimeghiensi promontorium *Szelitzense*, et *Keresztriense*, optima *vina* proferunt; in Pestinensi *Kostorense*, *Rhenano* proxime accedit; in Pilisiensi *Budense* rubrum excellit; in Abaujvariensi *Beldagyense*, *Heizense*, mensas magnatum ornant; in Aradiensi *Meneszense* excellit. Melioris nota Germanica *vina* sunt: *Herbitpolitanum*, *Markbrunense*, *Hochheimense*, *Joannisbergense*, *Rüdesheiense* et *Assmanhusense*; *Italicorum vñorum* generosissimum est ad radicem *Vesuvii* crescents, *Lacryma Christi* illictum, cui adjungi potest *Moschatellinum*. Ex gallicis rubris *vina*, quæ *Cahors*, et *Medoc* cognominantur, in primis expeuntur, item *Campinacum*; inter Hispanica eminent, quæ in *Granada*, *Andalusia*, *Valentia*, quorsum *vinum Illicitanum* (*Ali-*

sante;) vinum Tinto dictam; Xeres; in Lusitania Portugallum præsertim a boreis gentibus expetitur. Ad exotica vina pertinent Capense (quod FOURCROY aliis præfert,) vina canarensia, ut Maderaicum. Ex Candia transfertur Malvaticum.

Tabula Cl. Neumann exponens relativas quantitates (portiones) Alcoholis in variis vini generibus e Systemate Chemiæ clarissimi Thomson deponita.

Tres librae circiter (Quart angl.)	c o n t i n e n t												A q u æ.
	Alcohol. puriss. rectificatiss.			Spissioris, oleosæ, unctuosæ, et resinosæ materie.			Gummösæ et tartarosæ materie.						
	uncia.	drachm.	unc.	dr.	gr.	unc.	dr.	gr.	lib.	unc.	dr.	gr.	
Aland	1	6	3	2	0	1	5	0	2	5	3	0	
Ilicitani . . .	3	6	6	0	20	0	1	40	2	2	6	0	
Burgundici . .	2	2	0	4	0	0	1	40	2	9	0	20	
Carcassonensis .	2	6	0	4	10	0	1	20	2	8	4	30	
Campanacei . .	2	5	0	6	40	0	1	0	2	8	3	0	
Califici vulgaris	3	0	0	6	40	0	1	0	2	8	0	20	
Frontiniani . .	3	0	3	4	0	0	5	20	2	4	6	30	
Vini Graviensis	2	0	0	6	0	0	2	0	2	9	0	0	
Eremitani . . .	2	7	1	2	0	0	1	40	2	7	5	20	
Maderaici . . .	2	3	3	2	0	2	0	0	2	4	3	0	
Malvatici . . .	4	0	4	3	0	2	3	0	2	1	2	0	
Vini montis . .													
Pulciani . . .	2	6	0	3	0	0	2	40	2	8	0	20	
Mosellani . . .	2	2	0	4	20	0	1	30	2	9	0	10	
Moschatellini . .	3	0	2	4	0	1	0	0	2	5	4	0	
Novocastrensis .	3	2	4	0	0	1	7	0	2	2	7	0	
(Neufchatel)													
Palmect . . .	2	3	2	4	0	4	4	0	2	2	5	0	
Pontac	2	0	0	5	20	0	2	0	2	9	0	40	
Rhenani vetusti .	2	0	1	0	0	0	2	20	2	8	5	40	
— vilioris . . .	2	2	0	3	20	0	1	34	2	9	1	6	
Salamancensis . .	3	0	3	4	0	2	0	0	2	3	4	0	
Xeres	3	0	6	0	0	2	2	0	2	0	6	0	
Hispanici . . .	1	2	2	4	0	9	4	0	1	10	6	0	
Vino Tinto . . .	3	0	6	4	0	1	6	0	2	0	6	0	
Tokayensis . . .	2	2	4	3	0	5	0	0	2	0	3	0	
Tyroliensis . .													
rubri	1	4	1	2	0	0	4	0	2	8	6	0	
Vini rubri . . .	1	6	0	4	40	0	2	20	2	9	3	20	
— albi	2	0	0	7	0	0	3	0	2	7	0	0	

V. Baccarum nutritius; refrigerans; antiseptica; majoribus in præbiis eccoprotica; diuretica. Uvae siccatae sunt plus catharticae, quam recentes; sed citius inflationem causant. Mustum est eccoproticum; sed ob fermentationem, quam facile in primis viis subit, non facile fertur. Vinum stimulat, ejusque hæc

proprietas est minus diffusibilis et permanentior, quam *Alcoholis*; prudenter vero usurpatum languentem ventriculum roborat, orexin auget, *ciborum* digestione in adjuvat, vires restaurat, diaphoresin cit, et si acidæ naturæ est, sæpe diuresin. *Vinum* majorem exserit actionem in sanis, quam ægrotis. *Recens* citius producit temulentiam et catharsin, quam *vetustum*.

U. Baccæ maturæ crudæ eduntur in morbis febrilibus, biliosis, putridis, affectionibus inflammatoriis. *Dulces* in primis phthisiscentibus eximie conducunt, quin est inter exempla, *hisce* solis quotidie comestis, accedente in vineis cœlo sudo serenoque, auræ liberæ, aut itineris beneficio, plures convalescere, haud secus ac quemdam a dysenteria rheumatico-biliosa mitiori, *succ' baccarum* expresso, educta bile, dysenteriaque in salubrem diarrheam conversa. *Baccae cylindraceæ* (коэзи шипы) tantum plerumque esui offeruntur, aut in vicem *Cucumerum*, *Muriate Sodaæ depurato*, (his deficientibus) a Tanaitis consperguntur. *Succus baccarum* expressus optimum sane nobis præstat remedium in omnibus iis morbis, qui ex imminentia reactione oriuntur, in febribus asthenicis, in morbis spasmoidicis a debilitate, neurosibus chronicis, dyspepsia, arthrodynia atonica, hydropibus etc. In excretionibus chronicis mucosis, hæmorrhœis infantilibus chronicis et denique in stadio reconvalsentiae. *Succus e dulcibus* et maturissimis *baccis* expressus, atque in densitatem *syrupi* spissatus, loco *Sacchari* pro condientis *fructibus* adhiberi potest, exemplo Ruthenorum prope fluvium Soanam (Török) degentium. *Uvae siccatae* majores, vulgo *Damascenæ* dictæ, subfulvi coloris et dulciores, *bellarii* instar, eduntur ferculisque addi solent. Minores, vulgo *corinthiacæ* etiam edulia ingrediuntur, atque hæc et illæ usurpantur in tussi languentibus pleuriticorum sputis, stranguria; *excinatae* vero de cocturis et infusis ingeruntur. Copiosius sumtæ alvum laxant, quod etiam apud infantes præstant, si una, *olco* intincta, in modum suppositorii admoveatur (ROSENSTEIN.) Grata

potio fermentatione *iis, malis Citri medicae et Saccharo* emergit (Warg). Et *Sapa* et *Defrutum*, *cibis* olim condimento servivere; sed nunc *mel* et *Saccharum* *eis* substituitur. *Vinacea*, dum adhuc calorem servat e fermentatione prævia, paralysi, myodynæ rheumaticæ, instar *balnei* parti adfectæ admovetur (LIEUTAUD,) cuius effectum a calore vaporeque penetranti, feriente nares vasaque leniter stimulante derivat TISSOTIUS. Eadem, adfusa *aqua*, præbet *vinum operarium*, vulgo *Löre* hungarice dictum. *Vina* in omnibus morbis, astheniæ notas ferentibus, commendantur, hinc in dialeipyris typhodibus, in exulceratione notabili, gaugræna, optime cum *cortice Cinchonæ officinalis* et *Opio* administrantur, ita etiam in quibusdam convulsionibus, scelotyrbe, tetano symptomatico et in plerisque nervosis morbis, vacuo præcipue ventriculo (WHYTT.) Si cutis non est arida, nec compressa, nec fatiscentibus viribus calet et micatus arteriarum sunt parvi, tremuli, *vinum* omnino indicatur; si vero est celer, fortis pulsus, et cum augmento caloris, sitis urget, et deliramenta etc., *vinum* est alienum. Extrinsecus ante nares retentum, temporibus carpisque adfusum, labefactas vires, integrat, atque, vel debilitate, vel animi deliquio detentos, reficit; fatus sane, vel *balnei* instar infantibus subvenit, e partu difficili enervatis et infesta eclampsia infantes linteo *vino* humectato, obvolvere ROSENSTEINUS suadet. Discutit præterea id resolvitque ecchymomata, tumoresque extus admotum, et rubrum ob adstricteriam vim, qua pollet, roborandis præsertim partibus aptatur. *Acida vina*, ut *rhenanum*, *mosellanum* etc., aliena sunt *iis*, qui acore primarum viarum laborant, ut hypochondriaci, hystericae, etc: nec conveniunt ea febrentibus, aut plethora, aut impetu ruentis sanguinis, aestuantibus. Parcior *vini* usus in senibus esto, nec infantili ætatulæ porrigitor. Ut *vinum* moderate sumtum auget actionem cordis et arteriarum, animales functiones vigorat, exhilarat, viribus intellectualibus energiam impertiendo, ingenium acuit, ita abutentes eo non ferunt id impune, excessus quippe temeti, temulentiam, deliria, soporem, apoplexiæ

gignit. Continuato abusu, tremores artuum, splanchemphraxin, hepatitidem, affectiones cutaneas, tabem, hydropem causat, mala brevi in mortem desitura. Calculi urocystici stamina sugerere vetus querela fuerat. Veneficum *Vini*, quod *Plumbo* fit, adparet ex sedimento nigriusculo, adstillata aqua *hydro-sulphurata acidula* (HAHNEMANN.) *Omphucium*, cibis condimentum dat et *syrupo inservire* potest. Prisci *Roob* et *syrupum* ex eo parata, admiscuerant *gargarismatibus* adversus anginam.

D. Ejus est pro ratione ætatis, morbi indolis, vitæ generis, consuetudinis, et *vini* diversitatis, diversa. In typho præbetur ad pulsus augmentum et delirii cessationem; repetitur autem fatiscentibus arteriarum micatibus.

V. *Acetum Vini*; *Infusum Tabaci vinosum*; *Serum Lactis vi-nosum*; *Vinum scillites*; — *stibiatum*.

Z I N C U M.

Цинкъ; Шпіаумеръ.

Metallum hoc vix alicubi nativum invenitur; sed in statu *oxydato* et *mineralisatum* in *Pseudogalena*, *Oxycarbonate Zinci impuro*. *Indicum* et *Sinense* ob puritatem laudatius eo, quod officinæ metallurgicæ Goslarienses, diversis heterogeneis metallis in primis *Ferro* et *Cupro* inquinatum, dant. In Russia in Neitszynsk *Zincum Acidoo carbonico mineralisatum* in Zmienogorsk in Kolywan in insula ursina (медвѣжій островъ) aliisque in locis occurrit. Est vero cæsio-albidum, vel sublividum, *splendoris* coerulescentis fere argentei, lamellosum, seu tessulare, tenax, inter fragilia ductiliaque *metalla* medium tenens, *Bismutho* ponderosius, *pondus specif.* 6,862, aëris contactu mutatur, ut splendorem amittat; *acidis* vero omnibus adficitur solviturque, igne priusquam candescit, funditur in calore 620° *Fahr.* et si in occlusis vasis ad candescentiam cogatur, præsertim cum *pulvere carbonum*, totum quantum sublimatur; sub aëris vero accessu ignitum, in *oxydum* candidissimum, leve, flocculentum; quod sub nomine *florum Zinci* notum est, mutatur. Ut a suis liberetur inquinamentis, in crucibulo igne

tam moderato, ut maneat fluidum, liquefiat, agitando virgula ferrea *Sulphuris* frustula injiciantur per intervalla. Si injecto *Sulphure* formantur scoriæ, impurum est *Zincum*, quod scorias removendo depuratur denuo *Sulphur* injiciendo, idque eousque, donec tandem *Sulphur* immissum comburatur, nullis omnino scoriis productis; in statu enim metallico cum *Sulphure* neutram coit.


U. Forma metalli non est usitatum Medicis. Fiunt ex illo varia præparata pharmaceutica: MURIAS ZINCI; OXYDUM —; SULPHAS —.

TABULA AQUARUM MINERALIUM, EXHIBENS PARTES CONSTITUTIVAS, IN DATA AQUÆ QUANTITATE.

NOMINA FONTIUM.	Quantitas aquae.	Gasis					Carbonatis				Sulphatis				Muriatis				Ter. silicee.		Aluminae.	Resinæ.	Temperatura.
		Oxygenii	Carbo-nici.	Hydro-sul-phur.	Ni-tro-gen.	Soda.	Cal-cariae	Ma-gnes.	Fer-ri.	Sodae.	Cal-car.	Ma-gnes.	Fer-ri.	Sodae.	Cal-car.	Ma-gnes.	Po-tas-sae.	Grana.	Grana.				
		Grana.	Cub. pollic.	Cubie. pollic.	Cubic. pollic.	Cub. pollic.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.	Grana.
<i>Acidulae.</i>	Selteranae.	8949.	4.35	13.068	5.22	78.3	6.32	13.74	frig.
	Pyrmontanae.	8950.	..	19.6	4.3	98.	0.70	..	8.38	5.44	..	1.7	-
	Spadanae.	8933.	..	9.8	1.85	1.85	4.35	0.70	0.21	-
	Carolinae.	25320.	..	50.	38.5	12.5	..	0.12	66.75	32.5	2.25	165. ^o
	Kilburnens.	188240.	..	84.	36.	2.4	1.25	.31.	18.2	13.0	91.0	..	6.0	0.6	2.8	6.	frig.
<i>Sulphuratae.</i>	Harrowgatens.	103643.	..	8.	19.	7.	..	18.5	5.5	0.5	..	615.5	3.	9.1	frig.
	Moffetta.	103643.	..	1.	10.	4.	3.6	-
	Aquisgranens.	8940	13.06	15.25	5.89	6.21	143. ^o
	Enghienens.	92160	..	18.5	70.	21.4	1.35	33.3	5.8	..	2.4	..	8.0	frig.
	Sedlitzenses.	58309	..	8.	6.7	21.	41.1	14.44	36.5	frig.
<i>Salinæ.</i>	Cheltenhamens.	103643.	..	30.3	3.	12.	12.5	5.	48.0	40.	5.	..	12.5	-
	Plombierens.	4.4	1.	4.7	0.5	2.6	-
	Tunbridgens.	103643.	1.4	10.6	..	4.	1.	..	1.25	0.5	..	2.25	frig.
<i>Ferratae.</i>	Brighton.	58309.	..	18.	31.7	..	11.2	12.2	..	6.	..	1.12	-
	Teplitzens.	22540.	13.5	16.5	..	32.5	61.3	28.5	thernae	
	Bathens.	15360.	..	2.4	1.6	..	.004	3.	12.	6.6	0.4	114. ^o	
<i>Calcareæ.</i>	Buxtonens.	58309.	2.	..	10.5	2.5	1.5	82. ^o
	Bristolens.	58309.	..	30.	13.5	11.2	11.7	4.	..	7.25	74. ^o
	Matlockens.	58309.	66. ^o
	Malvernens.	58309.	frig.

1. BERGMANN. 2. KLAPROTH. 3. BABINGTON. 4. MARCET. 5. FOURCROY. 6. FOTHERGILL. 7. JAHN. 8. PHILLIPS.


9. PEARSON. 10. SCHMESSER. 11. CARRICK. 14. GARNET.



P A R S S E C U N D A

F O R M U L A S P RÆP A R A T O R U M e t C O M P O S I T O R U M

C O M P L E C T E N S.



PRAEPARATA et COMPOSITA.

ACETAS AMMONIAE LIQUIDUS.

LIQUOR AMMONII ACETICI Ph. Bor.; SPIRITUS MIN-
DERERI Ph. Ross.

Уксусокислый Аммиакъ; Росоль уксусонашапырный.

R. Subcarbonatis *Ammoniae triti*, quantum vis,
adfundit:

Acidi acetici diluti, vel deficiente hoc:

----- *impuri*, quantum sufficit.

Acido in vitrea cucurbita, in arenæ balneo, calenti
sensim admisce Subcarbonatem *Ammoniae* ad saturationem
usque. Mista per aliquod tempus seponantur, interdum
agitanda, et dein explorandum est, num *liquor* sit saturatus,
nec ne? sin minus, aliquid, vel *Acidi acetici diluti*, vel *Sub-*
carbonatis Ammoniae admiscendum, vaseque vitro probe clau-
so, servandus *liquor*. Methodus Porussorum conficiendi *Aceta-*
tatem Ammoniae liquidum coalescentem ex *Acidi acetici suffici-*
enti quantitate et *Subcarbonatis Ammoniae* unciis tribus, adfu-
sa *aquae* tanta quantitate, ut totius pondus sit bilibræ, ob vir-
utem remedii semper consonam, præferri meretur. Hic *liquor*,
cum pari portione *aquæ* dilutus, constituit extemporaneum
Acetatem Ammoniae liquidum, vel

R. Subcarbonatis *Potassae* uncias quatuor,
satura:

Acidi acetici diluti impuri, sufficienti quantitate,
Dein solutioni, ubi ad uncias triginta sex evapora-
rit, admisce:

Muriatis Ammoniae uncias duas.

Destillatio fiat e retorta vitrea.

Q. Constat ex *Acetici acidi* partibus 240 et *Ammoniae* partibus 144.

V. Leniter stimulans; exhalantium summæ cutis vasorum constrictionem reserans; halitum expeditiorem reddens. Aegro imprimis calidius cooperto diaphoreticam; dum vero frigori exponitur, diureticam vim exserit, quin tamen circulum sanguinis acceleret, caloremque corporis augeat. Vis ejusdem diaphoretica mire intenditur, *Aethere acetico alcoholisato*, eidem adstillato.

U. In febribus sthenicis, et asthenicis, præsertim a perfriktione; catarrhalibus, vel aliis, ubi sudor quidem movendus; sed stimulus major est alienus, magnæ est efficaciæ. Usurpatur etiam a quibusdam initio typhi, et adversus myodyniam rheumaticam. *Extus, fomenti instar, stagnationes resolvit, testiculis etiam inflammatis, induratis, vaporum forma, haud ineptus.* Laudat eum **ВОЁРНАВІУС** in opacitate cornea, in variis oculorum morbis haud immerito; præterea et *collyria et fortis* ingreditur.

D. a semuncia ad sescunciam per se, aut in connubio *auxiliariorum*, eandem facultatem, habentium.

V. Collyrium Acetatis Ammoniae; Haustus sudorifer.

A C E T A S C U P R I.

**CUPRUM ACETICUM Ph. Bor.; AERUGO CRYSTALLISATA
Ph. Ross.**

Уксусокислая медь; ярь Венецианская.

Venalis prostat; præparatur autem sequenti modo:

R. Cupri limati, quantum vis,

Acidi acetici diluti impuri, quantum satis.

Digerito, donec solutum fuerit *Cuprum*, solutionem evapora denique, ut *crystalli* surgant et seponito. Præparatus in Montepessulanis officinis præstat.

Q. Crystallis laetissime viridibus, tetraëdris, ad aërem ætate opacis, in quintupla aquae ferventis portione solubilibus, coalescit. Alcohol dilutum (*Spiritum Vini*) calefactum recipit 0,075.

V. Emetica; styptica; corrodens; (carnem supercrescentem exedens;) antizymica.

U. *Internus vix ac ne vix quidem commendandus. SCHERF-
FERUS* grana sex ad decem, mensura *lactis* soluta, ad *nar-*
coticum promptissime e ventriculo ejiciendum recentissime
commendavit. Tutior, et efficacior est *externus* usus. Aptissima
est forma, ubi is cum *Acido acetico diluto impuro*, coctus, filtra-
tus, addito *melle*, admovetur, vel solvitur ad grana aliquot in
destillatae aquae uncia, et tum eximia pollet efficacia adversus
ulcera cacoëthea fungosa, verrucas, scorbutica oris, aphthosa, imo
syphilitica, præcipue, si callosis illa marginibus, carneque lu-
xuriante obsidentur. Eadem *aquosa* ejusdem *solutio*, in blen-
norrhœa (gleet) pertinaci, in urinæ iter injecta, est efficacissima. Penicilli ope bis quotidie oculorum pannis *dilutam so-*
lutionem illinendam suadet cel. **BELL.** Haud defuerunt, qui
adversus syphilidem **HYDRARGYRI** usum eludentem, carci-
nomata, rabiem hydrophobam, et epilepsiam proponerent.

V. *Collyrium Cupri compositum; — — opiatum; Linimentum
Acetatis Cupri; Massa Acetatis Cupri composita; Solutio Aceta-
tis Cupri et Muriatis Ammoniae; Solutio Subacetatis Cupri; Un-
guentum Acetatis Cupri; — — — compositum I, — — — II; Vapores
Acidi acetici.*

ACETAS POTASSÆ LIQUIDUS.

**Liquor KALI ACETICI Ph. Bor.; Liquor TERRÆ FOLIATÆ
TARTARI Ph. Ross.**

Уксусокислый посташъ.

R. *Subcarbonatis Potassae depurati, quantum placet.*

*Acidi acetici diluti, quantum sufficit,
ut fiat perfecta saturatio.*

Liquor exinde ortus filtretur per chartam emporeticam, dein
in patina evaporatoria leni calore ad quartam partem evapo-
ret, serveturque in vitro probe clauso.

V. Deobstruens; diuretica; majori dosi alvum liquans.

U. Commendatur in primis in obstructionibus et infarcti-

bus viscerum, tumore glandularum mesaraicarum, scirrh
(BOERHAAVE,) struma, atrophia, rhachitide, affectibus haemorrhoidalibus, leucophlegmaticis, hydropticis; in febribus intermittentibus; alvi et urinæ impedimentis, a pituita tenaciel vel materia sabulosa ortis, imo in ipsa mania et melancholia.

D. Porrigitur a drachma ad quatuor; ut plurimum vero aliis misturis additur, vel in eo extracta varia, in primis resolventia, solvuntur, quæ actuosiora reddit. *Acetas Potassae*, (repetita evaporatione ad siccitatem, perductus,) iisdem virtutibus, quibus, liquidus, gaudens, a scrupulo ad drachmam porrigitur. Mala pertinacia continuatum alterutrius usum per plures menses exigunt.

V. *Mistura Taraxaci composita*,

A C E T U M C A M P H O R A T U M.

Уксусъ камфорный.

R. *Camphorae* drachmam,
tere in mortario lapideo cum
Alcohol. guttis viginti et
Sacchari albi unciis duabus,
probe tritis adfunde:
Acidi acetici diluti, vel
----- ----- *impuri* uncias decem
In vicem unciarum duarum *Sacchari* addere etiam licet;
Gummi Acaciae verae,
Sacchari, utriusque semunciam,

V. Incitans; diaphoretica; antiseptica.

U. In variis morbis, astheniae notas ferentibus; præsertim vero in angore, et spasmis in typho (SWIETEN.)

D. Vel aquæ florum *Sambuci*, vel aliis congruis misturis admiscetur, a semuncia ad unciam integrum propinatur; in typho autem omni hora cochlear sumitur, vitrum fortiter, ante singula præbia, conquassando.

A C E T U M S C I L L I T E S.

Уксусъ морсколуковыи.

R. Radicis *Scillae maritimae* siccatae, et contusae, uncias duas,

Acidi acetici diluti impuri bilibram,

Alcoholis diluti uncias tres.

Macera radicem *Scillae* lenissimo calore in vase vitro cum *Acido acetico* diluto impuro per quatriduum, dein expresso *Acido* adde *Alcohol* (conservationis causa) et quum subse-plerint fæces, liquorem effundito.

V. Stimulans, inprimis pituitam, et lotium; majori vero do-
i, nauseam, et vomitum movens.

U. Morbi pulmonum, astheniae notas ferentes, pituitosi; asth-
na; hydrops. Externe: gargarisationis causa *aqua dilutum* in
onsillitide a perfractione laudatur, imo et in graviori auditu, ex
eadem causa, usurpatur.

D. A drachma, ad semunciam si vomitiones provocare lubet,
cum qualibet aromaticâ aqua. *Oxymel scillinum* ad omnia idem,
quod *Acetum scillites* potest; sed hoc valentius est.

V. Syrupus *Scillae*.

A C I D U M A C E T I C U M.

Уксусная кислома (крайника).

R. Sulphatis Ferri exsiccati libram,

Superacetatis Plumbi crystallisati uncias decem,

Aquae depuratae uncias quinque.

Contrita et indita retortæ, ex arena, igne modico, destilla,
quamdiu *Acidum* prodit, in vase bene clauso, servandum.

V. Admodum stimulans; rubefaciens; antiseptica.

U. Præcipue in syncope; asphyxia; adfectionibus hysteri-
tis; cephalæa, per modum *odoramenti* naribus admovetur; cu-
ti vero adplicatum, rubefacit eam, haud secus ac clavos
emollit, et eradicat. Ceterum videsis: *Acidum aceticum* dilu-
tum impurum.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

ACETUM DESTILLATUM Ph. Bor.; ACETUM VINI DESTILLATUM. Ph. Ross.

Уксусная кислота слабая; винный перегнанный уксусъ.

R. *Acidi acetici diluti impuri*, quantum placet.

Vitreæ retortæ cum parte pulveratorum carbonum circite decima committito, atque arenæ balneo pars sexta calor gradatim auctiori eliciatur, phlegmate aethereo primum prodeunte rejecto, quo seorsim servato, labor protrahatur quousque clarus, nec empyreumaticus liquor prodierit, qui ante empyreumatis notam obtentus, usui servetur.

U. Pro laboribus pharmaceuticis et chemicis. *Phlegma aethereum* superstes parando *Aceto dulcificato Ph. Ross.*, aptum.

V. *Acetus Potassae liquidus; Fomentum acidum; — discutiens Mistura Camphorae acetata.*

ACIDUM CITRICUM CONCRETUM.

Лимонная кислота охрусталованная.

Succus Citri medicae 24 horis, ut separetur mucus, reponitur, dein filtretur et *Carbonate Calcariae* saturetur. *Citras Calcariae*, qui hinc surget, est insolubilis et præcipitatur. *Fluido supernatanti effuso*, præcipitatum eousque lavetur *tepidâ aquâ*, donec nullius aqua saporis fuerit, massaque albescat. Dein haec, dimidio ponderis illius *Acidi sulphurici*, sex partibus aquae diluti, decomponitur, vel potius *Acidi sulphurici* plus adhibetur, ut mucus perfecte destruatur, quem Acidum cum *Calcaria conjunctum*, retinet, atque crystallisationi obicem ponit. *Acidum sulphuricum Calcariae* unitur, et ut *Sulphas Calcariae* præcipitatur; *Acidum vero citricum* liberatum, fluida forma comparet. Tum ad crassitudinem *syrupi* evaporat, et refrigeratum *crystallos* effingit. Ut prorsus depuretur, iterum solvatur, et in *crystallos* cogatur, quae rhomboidalia prismata re-

ferunt, quorum latera fere se in 60 ad 120 gradus inclinant; extremitates vero habent quatuor superficies, angulos laterum, complectentes.

V. Antiseptica eximia; videsis: *succum Citri medicae*. Apud Britannos sub nomine: *Coxwell's concrete salt of Lemons*, venit.

D. Scrupulum (ad duo, et amplius) ex quovis congruo vehiculo datur. *Superoxalas Potassae*, e *succo foliorum Oxalidis Acetosellae*, in magna quantitate extractus, venditur sub nomine: *Essential salt of Lemons*, perperam dicto. Virtutis penes ejusdem, cuius præcedens.

V. *Pulvis Carbonis acidulus*.

A C I D U M M U R I A T I C U M.

Соляная кислота.

R. *Muriatis Sodaæ depurati* bilibram,
Acidi sulphurici uncias sedecim,
Aquaæ fontinalis libram.

Muriatas Sodaæ in olla primum igne rubescat paulum, tum frigefactus retortæ committatur, dein *Acidum* cum *aqua permixta* et refrigeratum *Muriati Sodaæ* adfundatur. Tandem ex arena, leniori calore, quamdui prodit *Acidum* destillet.

V. Eadem fere, quæ *Acidi oxymuriatici* est.

U. Fere omnibus calculis, citra prædominium *Acidi uricæ*, idque a guttis decem sensim sensimque ad drachmam ascendendo, quovis congruo vehiculo dilutum, convenit.

V. *Linimentum acidum*.

A C I D U M N I T R I C O - M U R I A T I C U M.

A Q U A R E G I A.

Кислота соли пресной; Царская вода.

R. *Acidi nitrico-nitrosi* gravitatis specificæ 1, 4.
Acidi muriatici gravitatis specificæ 1, 134.
 pares portiones. Misce.

Solutiones, liquoresque, corrigendo aëri, destinatos, ingreditur.

V. *Vapores oxymuriatici acidi*.

ACIDUM NITRICO-NITROSUM.

ACIDUM NITRICUM Ph. Ross.

Селипряная кислома (крѣпкая.)

R. *Nitratis Potassae depurati et contusi bilibram,
Acidi sulphurici uncias sedecim.*

*Nitrato Potassae immisso vitreæ retortæ acidum affundatur,
fiatque ex arena destillatio, calore gradatim auctiori, quoad-
usque ferreus catinus obscure cœperit rubere. Hujus pondus
specificum est ad destillatae aquæ pondus, ut 1550 ad 1000.*

U. Videsis: *Acidum nitricum dilutum.*

D. Pro ratione dilutionis administrandum.

V. *Acid. nitrico-muriat.; Acidum nitricum dilut.; Aether nitri-
cus; — — alcoholisatus; Unguentum nitricatum fortius; — — mitius.*

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

AQUA FORTIS Ph. Ross.

Селипроватая, или слабая селипряная кислома;
крѣпкая водка.

R. *Acidi nitrico-nitrosi,*

Aquæ destillatae, utriusque pares portiones.

Cauta, gradatimque, *vapores* vitando, commisce.

V. Antiseptica; corrodens.

U. *Potiones Acidò nitrico-acidulatae febribus sthenicis conve-
niunt, vi in primis antiphlogistica, conspicuae, in asthenicis,
ut in typho, (REICH, HOFFMANN, EBERHARD,) non contem-
nendum præbent eaedem antisepticum, uti nec hepatitidi, et in
primis indurationi jecinoris, (SCOTT) alienæ. Psoræ, herpe-
tibus, aliisque cutaneis morbis, et glossocarcinomati diutius
exhibitum, obponitur Acidum; syphilidi vero, (PEARSON,)
ubi Hydrargyrum ob debilitatem ægri alienum est, convenit*

uidem; verum morbo radicitus tollendo impar est. Verrucas, aliasque excrescentias exest. Admoto ejusdem *vapore*, contagiosa putridaque effluvia valetudiniorum etc., (CARMICHEL СМУТН) delentur.

D. A decem ad sexaginta *guttas*, *aqua* congrua quantitate *dilutas*, tubuli vitrei ope, (dentium conservandorum ergo,) sumendas, suadent.

V. *Aqua Acidi nitrici.*

A C I D U M O X Y M U R I A T I C U M.

Кислота соляная пресыщенная, или перекисленная кислотворомъ.

R. *Muriatis Soda*e depurati et pulverati partes tres,
Oxydi Mangani partem,
Acidi sulphurici partes duas,
*Aqua*e simplicis partem.

Retortam vitream tubulatam, tam amplam, ut tota massa dimidiam tantum capacitatis illius partem occuparet, balneo arenæ committito atque cum destillatorio apparatu WOULFIANO, lege artis junge, cuius lagenæ excipientes ad $\frac{3}{4}$ partem *aqua frigida* implendæ sunt. Hoc facto, *Oxydum Mangani* et *Muriatum Soda*e per aperturam tubulatæ retortæ impone, et *Acidum sulphuricum aqua dilutum*, iis adfunde; tandem ex arena, calore gradatim aucto, eosque destillent, donec oriundi *muriatico-oxygenati vapores aquam* in lagenis recipientibus præsentem perfecte saturent.

V. Tonica; refrigerans; antiseptica; miasmata valetudiniorum, aliaque *narcotica venena* enervans, tollens.

U. In febribus asthenicis, malignis, typho, imo, et in scorbuto, atque in plerisque morbis, in quibus *Acidum nitricum*, et *sulphuricum* utilitatem promittit, interne porrigi potest. Psoram, herpetes (ferente unguento *Suboxydi Hydrargyri* per *ficationes* subsidiariam opem) profligat; quo in casu, stomachum roborare fertur, morbificam potentiam ad renes determinare,

effectusque *metalli* in faucibus molestos, continere, aut impedire. Haud desunt, qui idem rabiei hydrophobæ obponant, et interno, et externo usu, efficax. Primis a morsura canis rabi diiebus, atrox malum præcavisse nuperrime BRUGNATELLIUS experiundo didicit. *Forma vaporis* celebratissima antidotus est, qua adversus contagionis pericula corpus redditur tutum, ad corrigendum proinde æra, effluviis coinquatum, in valetudinariis, navibus, aliisque arctis habitaculis, urgente pestilentia, aut febri Americana flava, utilitas ejusdem in primis emicat, item ad *praeparata* quædam *pharmaceutica*, e. g. *Hyperoxymuriatem Potassæ* adhibetur.

V. *Gargarisma acidum.*

A C I D U M P H O S P H O R I C U M.

Фосфорная кислота (кристальная.)

R. *Acidi phosphorici concreti partem,*

Aquaæ fervidae partes tres.

Misce, fiatque *solutio*, si opus, colanda. Si huic parem *aquaæ simplicis* portionem addideris, habebis: ACIDUM PHOSPHORICUM DILUTUM. Кислота фосфорная разведенная.

Q. *Acidum phosphoricum* hac ratione pronatum ex *oxygeniis* partibus sexaginta, *phosphorique* partibus quadraginta constat. Pondus ejus specificum ad pondus *aquaæ* est, ut 15,575,10,000. Pellucidum est, *aqueum*, *inodorum*, et *saporis aciduli grati*, nonnihil *Acidum sulphuricum* æmulantis.

V. *Analeptica; excitans; anodyna.*

U. In typho praesertim nervoso, (minus vero putrido), fractis viribus, sub spastica diathesi, conspicuo, auxilium spondet; si vero notæ secessus humorum, et propensionis in putredinem, præsto sunt, cum *infuso Cinchonæ officinalis* datur. Adcommodum est medicamen delicatulis, sequiori sexui, et infantibus. In chronicis spasticis morbis laudes tulit, haud

secus ac in hypochondriasi et hysteria, præcipue spasmis et congestione sanguinis, cessantibus, annosarum fæminarum menstruis, supervenientibus. In hæmorrhœis etiam valet, irritabilitate auctiori, aut sub spasmodico statu, urgentibus, seu sanguis e naribus, seu ventriculo, seu demum ex uriniferis vijs profluxerit. Interdum pro re nata conjungitur cum illo aut *Cinnamomi*, aut *Valerianae tinctura*. In hæmorrhœa uteri, (*passiva, vulgo dicta,*) commendatur a D. BURDACH, mistura e tincturæ *Cinnamomi* drachmis duabus, *Acidi phosphorici* drachma, cujus omni hora guttæ 25–30 exhibitæ perutiles extiterit, probante dein idem remedium, ex casu inveterato, NIEMANNO. Scorbuticis etiam hæmorrhœis opponitur; imo in dysuria commendatur. In podagra KETTERLINGII commendatione invaluit. In morbis ossium efficacior ejus usus est. LENTINIUS in carie eorundem optato cum successu exhibuit extrinsecus, RUSTUS idem expertus in carie cum putrido ulceræ externo, sanie ex eodem ubertim fluente, in primis si scorbuticæ indolis esset, plaga *Acido* septupla portione aquæ diluto, deligata; interne vero datis quinque *Acidi* guttis, ascendendo gradatim ad quindecim. Alii infusi *M. Chamomillæ* uncias octo, *Acidi phosphorici* unciam in eodem malo, pro usu externo, proponunt, (HUFELAND.) Dentibus cariosis dolorosisque HIRSCHIUS misturam ex semuncia tincturæ *Myrræ* et *Acidi phosphorici* guttis triginta admovit; KLETTENIUS vero in iisdem efficacem censem pulverem dentifricium: ex *Acidi, corticis Cinchonæ officinalis, gummiresinae Myrræ et pulveris lignarii* paribus portionibus, in subtilissimum pulverem redactis, confectum.

D. *Acidi phosphorici* guttæ decem ad sexaginta; *Acidi phosphorici* diluti guttæ viginti ad octaginta-centum cum mucilaginosis. Scilicet incipiendum est a minima dosi, nam et decem interdum guttæ, (mobili nervorum systemate) cardialgiam, gastrodyniam, enterodyniam, atque protracto usu, sialorrhœam produxere.

V. *Subphosphas Soda;* *Unguentum phosphoricatum.*

ACIDUM PHOSPHORICUM CONCRETUM.

Фосфорная кислота сгущенная.

R. *Subphosphatis Calcariae* in subtilissimum pulverem redacti, (*id est ossium animalium mammalium ad albedinem calcinorum,*) partes quatuor,

Acidi sulphurici partes tres.

Acidum sulphuricum, aqua dilutum, et simul cum pulvere Subphosphatis Calcariae in phiala spathula lignea bene mistum, in balneo arenæ per biduum, aut triduum, saepius agitando, tene, postea massæ dimidiam ejus partem aquæ purissimæ tepidae adde, et per manicam Hippocratis tepide madefactam filtra; dumque manica concussa nil amplius fluit; residuum iterum simili modo aqua lavandum et filtrandum est, atque iterum tertia vice iterandum. *Liquorem* sic obtentum evapora, donec gustatu, dentes stupore, afficiat, postea filtrato illo et refrigerato paulatim adde: *Subcarbonatem Ammoniae*, quo usque præcipitatio evenit; finita vero præcipitatione liquorem Phosphatis Ammoniae iterum filtra, tum ad consistentiam syrapi in vase vitreo redactum, in crucibulo semirepleto gradatim, ignem cautissime augendo, ulterius condensa, ut incandescat massa, quam Acidum phosphoricum repræsentantem, igne per aliquot minuta remisso, supra laminam cupream citissime effunde, et Acidum adhuc tepidum indurescit, in vas vitreum operculo vitreo lævigato probe obturatum immittit, et ad usum serva.

V. *Acidum phosphoricum liquidum; Phosphorus; Solutio Phosphori aetherea.*

ACIDUM SUCCINICUM.

Кислота яблочная.

R. *Succini pulverati bilibrام,*

Arenae siccatae, depurataeque tertiam adhibiti Succini partem.

E vitrea retorta, cui capacius collum, admoto ampliori excipu-

lo, commissuris, sic clausis, ut exitus elasticō *fluido* concilie-
tur ex arenæ balneo distilla, leniori ab initio igne; dein ve-
tero gradatim auctiori, quoad fundus retortæ candefactus fue-
rit. Collecto cautim *destillato*, *serventem aquam* addito, ut to-
tum quidquid inest *salsi* solvatur. *Oleum* separa, idque *aqua*
subfervefacta lavato, huncque *liquorem* priori adjicito. *Oleum*
ad rectificationem serva, ast *acidulum humorem* per collum,
qua madefactum, transmissum, calore lenissimo evapora, at-
que ad crystallisandum seponito. Collectas crystallos iterum
solvito *aqua fervente*; ignem instrue, ut per parvum temporis
spatium *liquor* ebulliat, dein cola et evaporatione levi, cry-
stallos refrigerio augendas collige, tandem in charta bibula sic-
cata, vase vitreo, rite obturando, serva.

Q. E carbonio, hydrogene, oxygeneque peculiari coitione com-
ponitur, sistitque aciculares trilaterales, prismaticas, e flavo
albescentes, splendentes crystallos, quæ sapore gaudent *acido*;
odore vero ingrato, empyreumatico (vix succineo) ad *aerem* non
mutantur; *ignis* vero vi avolant.

V. Antispasmodica; diaphoretica.

U. Adhibetur in variis nerveæ debilitatis formis, et qui-
dem in typho, prostratione virium pulsusque parvo et debili
stipato; in variis convulsionibus, et spasmis; hysteria; epilep-
sia, praesertim vero spasmodica stranguria; in paralysi; apo-
plexia serosa; amavrosi etc., in arthrodynia; myodynbia rheuma-
tica; gangraena; sphacelo etc.

D. Guttæ quinque ad viginti exhibentur.

A C I D U M S U L P H U R I C U M,

ACIDUM VITRIOLICUM Ph. Ross.

Кислота сърная (крѣпкая.)

R. *Acidi sulphurici impuri*, (quod in commercio est,) quan-
tum placet.

Retortæ vitræ immittatur, atque igne successive auctiori de-
stilletur eosque, donec non amplius in *vaporum* forma, sed in

striis cohærentibus in recipiens vas defluere cooperit. Tum recipiente mutato, continuetur destillatio, ac denique is gradus ignis; caute tamen augeatur, ut reliquum *acidi* adscendere queat, quod in vitro sicco aëris accessu probe intercluso ope epistomii vitrei, usui reservetur; chemicis *præpuratis* obsummam, qua pollet acrimoniam, idoneum.

V. Corrodens.

Quandoque **PLUMBO**, damnosissimo additamento, infectum est, ut id D. M E Y R et G Ü N T H E R, evicerunt, quod detegitur si conjuncto hoc *acido* partibus aquae, vel æqualibus vel majoribus, album præcipitatum conspiciatur emitti, quo non ad parente, indicium est **PLUMBUM** in *Sulphurico Acido* neutram contineri. Interdum illud præcipitatum esse, etiam *Sulphatis Calcariae* cum portione siliceae terrae aliqua, W I T H E R I N G I U S, testatur. Hujus *acidi* pondus specificum in calore 26 $\frac{1}{2}$ Reaum. esse debet ad pondus aquae destillatae ut 18,50 ad 1,000.

V. Acidum sulphuricum dilutum; *Aether sulphuricus*; — *alcoholisatus*; *Tinctura aromatica acidulata*; *Unguentum Acidi sulphurici*; *Vapores acidi sulphurici*.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

SPIRITUS VITRIOLI Ph. Ross.

Кислота сърия разведенная.

R. *Acidi sulphurici unciam,*

Aquae destillatae uncias septem.

Cautim commisceto *Acido sensim sensimque instillando aquam.*

V. Stimulans; frigerans; adstringens; roborans; potenter anti-septica; antizymica; (fermentationem inhibens.)

U. Synochus; febres petechiales; hæmorrhagiæ; exanthe-mata atonica; scorbutus; psora; herpes aliique cuticulares morbi; imo pestis; scarlatina anginosa, et alii contagiosi morbi; tabes purulenta; ulcera; aphthæ; dyspepsia; pyrosis; gastrody-

nia etc, idque pro ratione morbi, modo *interne* propinatur,
modo *extrinsecus*, per modum *unguenti*, *gargarismatis* etc.

D. Guttæ decem, viginti, triginta in *aqua*, vel quolibet alio
congruo *vehiculo*.

V. *Aqua acidi sulphurici*; *Fomentum acidum*; *Potus acidus
mineralis*.

A C I D U M T A R T A R I C U M.

A C I D U M T A R T A R I C R Y S T A L L I S A T U M Ph. Ross.

Кислома Винокаменная; винокислая
окрустальная соль.

R. *Supertartratis Potassae libras septem*,
Aquaæ fervidae libras viginti quatuor,
solutis adde: *Carbonatis Calcariae pulverati bilibram*.

Filtra liquorem et Tartratem *Calcariae* in vitro remanentem,
aqua frigida ablue, eique adde:

Acidi sulphurici, (*aquaæ libris viginti diluti*,) bilibram.
Digere per viginti quatuor horas sæpius agitando, *Calcaria-*
que Sulphatæ residuum *aqua* ablue, donec insipidus fuerit.
Commistos liquores acidos coquito cum *carbonum pulvere*, dein
filtrato, et evapora ad siccitatem, adsiduo movens, tandem
leni calore in crystallos redigit, siccandas, usuique servandas.

V. *Acida*; antiseptica; diuretica; frigerans.

U. *Febres sthenicæ*; (in quibus gratissimum præbet anti-
phlogisticum, temperans, siti restinguendæ aptissimum;) bilio-
sæ; scorbutas.

D. Semidrachma, drachma ad bilibram *aquaæ*, pro potu
ordinario.

A D E P S S U I L L A D E P U R A T A.

Сало свиное очищеное.

R. *Adipis suillæ*, quantum lubet,
Membranis, venulis, fibrisque demtis, tamdiu calida abluatur
aqua, donec nil amplius cruenti effluxerit, demum concisa in
frusta liquefiat et coletur per linteum.

U. Præcipuuſ: pro parandis variis *unguentis*, *linimentis*, *emplastris* etc. Eodem modo purificantur: *Sevum ovillum*, vel *hujus defectu*, *bovillum*. In curatione militum, utrumque ad omnes pene usus loco *olei expressi Theobrom.* *Cacao concreti*, et similiū utiliter adcommodatur.

V. Cerata; Emplaſtra; *Unguenta Cataplasma emolliens quoque et Linimentum ammoniato-camphoratum*, ingreditur.

ÆTHER NITRICUS.

Эфиръ селипряный.

R. *Alcoholis partes tres*,
Acidi nitrico-nitrosi partem.

Alcohol capaci phialæ in vase, frigida repleto *aqua*, positæ, infundito, atque sensim *acidum* sub jugi motu adde. Phiala levius obturata, in frigidulo, per septimanam, reponatur loco. Denique *liquor*, *aquaæ bullientis calore*, in excipulo, *nive* vel *aqua* refrigerato, quamdiu prodibit *spiritus*, destillet.

V. et U. Sitim sedat; secretiones naturales promovet; inflationem levat; leniter ventriculum roborat; sed in connubio *Subcarbonatis Ammoniae* est lene, ast efficax *diaphoreticon*, haud raro autem *diureticum*, præsertim in quibusdam febrium formis, ubi talis evacuatio e re foret. Si fermentatis *Malti* liquoribus eundem addideris, *Spiritus vini gallici* saporem et gratiam obtinebunt.

D. Semidrachma ad drachmam.

ÆTHER NITRICUS ALCOHOLISATUS.

Эфиръ селипрокислый спиртныи.

R. *Alcoholis partes sex*,
Acidi nitrici diluti partem.

Alcohol capaci vitreæ retortæ ad $\frac{2}{3}$ capacitatis suæ tantum repletæ, infundito, atque *Acidum nitricum* sub jugi motu adde, retortam balneo arenae committe, et cum excipulo am-

lo junge, commissurasque vesica madida obtunde, in qua d emittendas gazoideas substantias orificium acu perfora, et excipulo aqua frigida circumdato destillationem sensim calore uoto circiter quintam aut sextam partem institue. Destillato saucis dosibus saepius lagenam agitando et aperiendo Subcarbonatē Potassae siccum adde, donec seu charta exploratoria cœrulea, faecula Crotonis tinctorii, imbuta, haud amplius ubescit, seu Tinctura Guajaci non coerulescit; tunc aetherem ib aqua, fundum vasis occupante separatum, usque ad octaram partem residui, rectifica, tandem Aetherem nitricum alcoholisatum obtentum, in phialis parvulis bene et stricte operculo vitro obturatis, atque vesica duplicita circumdati, in frigidulo loco ad usum serva.

V. Vinum Lusitanicum artefactum.

A E T H E R S U L P H U R I C U S.

N A R N T A V I T R I O L I Ph. Ross.

Эниръ сърный; Нефть купоросная.

R. Alcoholis bilibram,
adfunde paulatim, et caute in cucurbita:
Acidi sulphurici tantudem.

Alembico cum excipulo satis capaci adaptato, et juncturis bene clausis destillatio ex cinerum balneo remissiori calore instituatur. Simulac liquor stillans Acidum sulphurosum redolet, ab ulteriori destillatione illico desistendum est. Liquori in cucurbita remanentiadfunde Alcoholis libram. Continuetur, ut antea destillatio, cum simili Alcoholis quantitate, pro re nata, bis iteranda. Liquoris aetherei destillationibus his obtenti, partibus duodecim adde:

Aqua communis partes tres,
Potassae liquidae partem.

Aether supernatans a reliquo separetur fluido, lenissimoque

rectificetur calore, quamdiu purissimus et fragrantissimus transit.

V. Excitans diffusilis; anodyna; sudorem, et in primis locum movens; antispasmodica.

U. *Internus*: spasmodicæ adfectiones; asthma spasmodicum; hysteria; convulsiones; epilepsia; hyperæsthesia; cardialgia; myodynia rheumatica; phrenitis hydrocephalica; narcotismus; asthenia; podagra atonica; paralysis; vomitus; singultus; pertussis; typhus; morbi ventriculi et intestinalium ab inflatione, vel spasmodici etc. *Externus*: odontalgia; cephalalgia; et alii dolores rheumatici, ac spasmodici, admoto parti linteo *Aethere* madenti magnitudine palmae manus, quo pars tegitur, illoco fortiter premendo sic, ut evaporatio ejus impediatur, et sic paulisper sustinendo, et tum effectum stimulantem et rubefacientem prodit; ubi vero amota palma, evaporatio subitæ locus fit, frigerantem eximum, duos nempe discrepantes inter se effectus; unde calorico subducto herniae etiam incarceratae proficuus extitit, *externo* usu.

D. Guttæ quinque, decem, viginti ad drachmam cum *Saccharo*, *Vino*, aut *Alcoholè impuro*, aut in haustu *misturae*, aut *Aceti camphorati*.

V. *Aether sulphuricus alcoholisatus*; — — *camphoratus*.

ÆTHER SULPHURICUS ALCOHOLISATUS.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS Ph. Ross.

Эфиръ сърноспиртный.

R. *Acidi sulphurici* partem,

Alcoholis partes quatuor.

Acidum Alcoholi in retorta vitrea sensim admisce, illamque *Alcoholè* madefactam cum excipulo ample junge et ad emitendas gazoideas substantias orificium parvulum faciendum est, atque destillatio sensim sensimque calore cautissime aucto continuanda est, dumque liquor stillans *Acidum sulphurosum* redoleat, ab ulteriori destillatione illoco desistendum est, atque

destillatum, ab excipulo defæcatum in phiala bene obturata ad usum serva.

V. *Potus refocillans.*

ÆTHER SULPHURICUS CAMPHORATUS.

Этеръ сърно-спиртный камфорный.

R. *Aetheris sulphurici alcoholisati unciam,*
Camphoræ drachmam. Misce fiat solutio.

V. Eximia: stimulans; antispasmodica; antiseptica; sudorifera.

U. Febres typhodes; scelotyrbe; hysteria; singultus; cardialgia spasmodica; præcipue ex podagra atonica, et asthma ex eadem causa.

D. Guttæ duodecim (quæ sesquigranum *Camphoræ* continent) ad drachmam (grana septem et semis continentem) ex *Saccharo* vel *Alcoholæ diluto*, aut quovis vehiculo proprio bis terve de die. *Externe* aëre excluso: calefaciens; rubefaciens; admisso autem, abstrahens caloricum; cephalæa, odontalgia; hernia incarcerata. *Alcohol* quoque, *Aetheri sulphurico alcoholisato*, utpote majoris dispendii, rite substituitur.

A L C O H O L.

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS Ph. Ross.

Алкоголь; Винный крѣпчайшій спиртъ; Извинъ. Carpato-russice: паленка.

R. *Alcoholis diluti quantum velis.*

Destillationi iterum subjiciatur, atque tertia exinde pars eliciatur.

V. Excitans; fibras vasorum crispans; sangvinem coagulans; styptica.

U. Pro ratione evaporationis amovetur *caloricum*, ideo sub initium post *Oleum pineo-larinum*, et *Aetherem sulphuricum* adcommodatissimum est adustis. Plumaceolis exceptum hæmorragiis externis admovetur, valet etiam in vulneribus nimis suppurantibus, fistula ani, et ligamentorum atonia. Ali-

num est vulneribus cerebri, inflammationibus, et ambustis in gangrænam, nitentibus.

V. *Aether nitricus*; — — *alcoholisatus*; *Aether sulphuricus*; — — *alcoholisatus*; *Alcohol ammoniatum*; — *purissimum*.

ALCOHOL AMMONIATUM.

Liquor Ammonii Vinosus Ph. Bor.; Spiritus Salis Ammoniaci Volatilis Vinosus, Ph. Ross.

Спиртъ амміаковый услащенный, или щелочнолепучій винный.

R. *Ammoniae liquidae partem,*
Alcoholis partes duas. Misce.

Obturata probe lagena servetur.

V. *Excitans; antispasmodica; sudorifera; interdum pituitam et lotium movens.*

U. *Morbi asthenici: febres; paralysis; lethargus; asthma pituitosum; hysteria, deficiente vis vitæ reactione. Adversus morsuram serpentum majoribus in præbiis externe et interne conductit. Item præparandis *pharmacis* variis aptum.*

D. A decem guttis ad drachmam in quovis vehiculo *aquoso vel vinoso.*

V. *Gargarisma ammoniatum; Tinctura Opii ammoniata.*

ALCOHOL DILUTUM.

Spiritus frumenti depuratus Ph. Ross.

Спиртъ винный разведенныи; Хлѣбное очищенное вино; Пѣнная вода.

*Alcohol dilutius, sub nomine *Spiritus Vini communis vulgo, ut venale prostat; bonæ tamen notæ, fermentatione vinosa subsequenteque destillatione, e vino, faecibus ejusdem, vino pomaceo, aliorumque fructuum, aut e seminibus Tritici, Secalis, Hordei, Avenae sativæ, Oryzae aliisque vegetabilibus, vel e**

juco Sacchari officinalis expresso super carbones recenter ustos obtentum destillando, vel

R. *Alcoholis,*

Aqua destillatae, utriusque pares portiones.

Misce, et in vitro probe clauso serva.

Persæpe loco Alcoholis diluti sumitur idem; sed impurum, Ruthenice горълка, vel hoc deficiente, dilutius adhuc, vulgo си-зуха dictum.

V. *Alcohol dilutum amarum; — — antiscorbuticum; — — camphoratum; Aqua cardiaca; Fomenta varia; Gargarisma antisepiticum.*

ALCOHOL DILUTUM AMARUM.

Спиртъ разведенныи Горькій; горькая водка.

R. *Extracti amari unciam,*

Alcoholis diluti impuri bilibram.

Misce.

V. *Incitans; roborans; imbecillo ventriculo aptum.*

D. *Unciæ duæ, tres bis de die, exhibentur.*

Si cuivis hujus Alcoholis dosi Balsamum pineo-sylvestre additur, et quidem a guttis decem ad triginta et amplius, tum cachecticis, scorbuticis, iisque, quibus post febres intermitentes, præpostero consilio curatas, abdomen tumet, vel hydroperosis, et leucophlegmatia, infausti ominis sequelæ, superveniunt; aptius fit, ut id haud æquivoca docet experientia.

ALCOHOL DILUTUM ANTISCORBUTICUM.

Вино хлѣбное пропивуцинготиное; Горькососновая водка.

R. *Extracti amari,*

— — turionum Pini sylvestris utriusque semunciam,

Alcoholis diluti impuri bilibram.

Misce.

D. *Ut et præcedentis; scorbuticis tamen hoc admodumatius.*

ALCOHOL DILUTUM CAMPHORATUM.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS Ph. Ross.

Спиртъ камфорный.

R. *Camphorae* drachmas duas,*Alcoholis diluti* libram.Misce, ut in vase clauso solvatur *Camphora*. Fit quoque, cum duplici, vel triplici *Camphora*, si necessitas inciderit.

U. Externe (irritando et discutiendo) hæc solutio adversus myodyniam rheumaticam, torporem paralyticum, tumores frigidos, inflammationes asthenicas, ecchymoses, ad gangrænam præcavendam, vel progressum ejus sistendum, præsidio est.

ALCOHOL PURISSIMUM.

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS, Ph. Bor. ALCOHOL VINI ALCOHOLISATUM, Ph. Ross.

Алкоголь чистейший, или винный безводный спиртъ;
Извинь.

R. *Alcoholis Vini*, quantum velis, sub adsidua succussione, tamdiu siccum *Subcarbonatē Potassae* admisce, atque hinc provenientem *aquaē salis solutionem* separatorii ope sæpius aufer, donec ultimæ *Subcarbonatis Potassae* particulæ, nec amplius deliquescent, neque inter se congrumescent. Retorta demum *Subcarbonatē Potassae* probe siccatō superimpletur, per cribrum trajepto, depurato, cui *Alcoholis aqua privati*, supramemorati adfunditur tantum, quam illo resorberi perfecte potest. Retorta arenæ balneo committitur, adaptato cum vesica recipiente, et post viginti quatuor horas lenissimo semper æquali continuato igne destilletur. Simulac guttulæ lentius stillarint, tum destillatum, atque perfecte *aqua privatum Alcohol recipitur*, usui servandum. Loco *Subcarbonatis Potassae*, *Murias Calcariae*, siccatus, ad parandum *Alcohol purissimum*, non male adhibetur. Quod *Alcohol*, hac ratione

elicitum, sit perfectissime aqua privatum, indicat specifica ejus gravitas in temperatura graduum + 15 Ream. non plus quam 791 ad 1000 aquae. Deficiente Aethere sulphurico alcoholisato, sares portiones Acidi sulphurici diluti et Alcoholis simul nuperae, non inepte eidem substituuntur, dupliquantitate pro domini. Ceterum, quid iam de Alchole dictum fuit, hic sane, locum habet.

A L U M I N A.

TERRA BOLARIS, SEU ARGILLACEA PURA. BERGMANN.

Квасцовая чистейшая глина.

R. Supersulphatis Aluminæ et Potassæ, quantum lubet, solve in

Aqua puræ, sufficienti quantitate, huic solutioni instilla gradatim:

Subcarbonatis Potassæ, in *aqua pura*, soluti, quantum sufficit.

Terra præcipitata, probe, *aqua destillata*, lavetur, usuique servetur.

Q. Linguae adhæret, humorem, *aqua madefacta*, vehementer drafrahit. *Odoris est proprie argillacei; saporis terrestris, igne ducescit, atque conjungitur cum acidis.*

V. Leniter adstringens; exsiccans.

U. In excoriatione efficax.

A M M O N I A L I Q U I D A.

LIQUOR AMMONII CAUSTICI Ph. Bor.; SPÍRITUS

SALIS AMMONIACI CAUSTICUS Ph. Ross.

Амміакъ жидкий; спиртъ нашатырный ъдкій.

R. Muriatis Ammoniae uncias sedecim,

Calcariae recens paratæ bilibrام,

Aqua fluviaialis libras sex.

libræ aquæ in figulinum, vel ferreum vas infusæ, *Calcariam* contritam adjice, et vas operito per horas viginti quatuor, dum

Calcaria in pollen dilabitur, quod retortæ immitte. Huic *Muriatæ Ammoniae*, in aquæ libris quinque solutum, addito. Tunc, occluso retortæ ore, agitando permisce, tandem fiat *destillatione*, (calore adeo leni, ut adstantis manus admota retortæ calorem ejus facile ferre queat,) in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciæ viginti. In hac *destillatione* vasa sic conglutinanda sunt, ut *vapores* etiam subtilissimi prorsus cohibeantur.

Q. *Ammonia* componitur e quatuor partibus *azoti* unaque *hydrogenis* (parte) in gas, athmosphaerico, levius, cito ad gr. 130 F., mutabilis. Pond. specif. est 0,9054, constat ex aquæ 74,63 et *Ammoniae* 25,37.

V. Admodum irritans; diaphoretica; antacida; largiori dose ex aqua, emetica. Externe: rubefaciens; caustica; discutiens.

U. Perraro interne exhibebatur, nec nisi, ob acrimoniam, qua pollet, externo usui destinata fuit; a quibusdam tamen commendabatur in typho, ubi opus erat nervos reficere, labefactas vires resuscitare, soporem tollere, diaphoresin mouere, spasmos pectoris et tussim lenire; imo etiam in universalis paralysi et anæsthesia stimulo fuisse corpori perhibetur. Ad guttas decem, quindecim, viginti, multa aqua rite diluta, potentissimum præbere existimatur excitans, et resolvens, quod in morbis, ab adcumulata tenaci pituita natis, e. g. pectoris, asthmate humido, catarrho suffocativo (**FOURCROY**), cephalalgia, apoplexia nervosa, adfectibus soporosis, a stagnanti pituita ortis, aut ad eos excitandos, qui in aqua submersi sunt, eximii est usus. In scrofulis a **SCHRAUDIO** laudatur, in quibus grana duo ad sex infantibus porrecta, eximiam exsérueire efficaciam, haud secus ac in mesenteremphraxi. Crystallos quoque ipsas linguæ, (post leves apoplexiæ insultus,) paralyticæ, admotas, cum successu tentavit ill. **FOURCROY**. Tum vulneribus instillata, quum etiam in spleniis, crebro ea humefactis, admota, tum simul ad duodecim, et quadraginta usque guttas, mane, vel repetitis vicibus per diem, aqua vel potionē calente, inultum temperata, deglutita, homines ab animalibus rabidis, (**TRIGUERRE** apud **SAGE**), aut serpentibus venenatis

L E P R E C H I N ,) *Bero potissimum (EN A U X ,)* morsos, servasse fer-
ur. In carcinomate etiam, syphiliticis ulceribus, aliisque ca-
oëtheis, *externo* simul ac *interno* *usu*, a drachmis duabus ad
inciam usque de die propinata, *aqua* tamen rite diluta, com-
mendatur a *Van Wv.* Quatuor *aqua*e partibus dilutam, in-
hibendis sanguinis profluviis cum successu obposuit *La PIRÀ*;
sed aptior sanguifluxibus minorum vasorum; extrinsecus sane
pro excitandis apoplecticis, epilepticis, soporosis, syncopticis,
et hystericis, uti etiam pro illinendis membris, quæ paralysi-
sonum amisere, adcommodeatior. Proficit etiam adversus tumo-
res cysticos incipientes, frigidos, duros, e lacte coagulato,
vel lympha inspissata, ortos, perniones, dissipandos, uti etiam
forma *linimenti* in myodynia, iino et adustis, efficax. Excitan-
di scopo in plethoricis non, nisi larga sanguinis detractione
præmissa, adplicetur; dum vero intrinsecus datur, evitandus
est sollicite usus omnium, tam *alcalinorum*, tam *saliuum neutro-*
rum, aut *sulphuricum*, aut *vegetabile* quoddam *acidum*, conti-
nentium.

V. *Alcohol ammoniatum*; *Gargarisma* —; *Linimentum Ammo-*
niae; — — *camphoratum*; — *saponis rubefaciens*; — — — *forti-*
us; *Haustus saponatus*.

A Q U A A C I D I C A R B O N I C I .

A Q U A A Æ R I S F I X I . *Ph. Ross.*

Вода углекислая, или напишанная угле-
кислы мъ гасомъ.

Aqua communis, Acido carbonico e Carbonate Calcariae duro,
(vulgo *Marmore*,) ope *Acidi sulphurici* expulso, in vase idoneo
saturetur. *Acidum e Carbonatis Calcariae uncia, pari pondere*
Acidi sulphurici adhibito, et *aqua*e circiter libra diluto, erum-
pens, sufficit ad *aqua*e libras quatuor saturandas.

V. *Lotium* movet, sitim restinguat, quosdam calculos egre-
gie infringit, (in quibus *acidum uricum* desideratur,) calorem

minuit, irritabilitatem stomachi, nauseam, vomitumque, au sedat, aut tollit.

D. Bilibra partitis vicibus quotidie. Eodem modo paratur *Aqua Ferri aërata*, suspendendo semunciam ferrei fili in aqua *Acidi carbonici*, quæ ceteris aquis ferratis substitui potest, virtusque ejus, ut aliarum, est excitans valide nervosum systema, motum systematis arteriosi augens, vires labentes refocillans; deobstruens; in primis astheniæ musculari et nervosæ, splanchemphraxi abdominali, ictero, amenorrhœæ, chlorosi, blennorrhœæ, myodynæ rheumaticæ etc.; admodum data, persæpe in iis quoque casibus commendabilis, dum vulneribus sauciis, post sulphuratas aquas, has etiam propinari, e re est.

V. *Aquæ minerales acidulae artefactæ.*

A Q U A A C I D I N I T R I C I .

Вода селипрокислая.

R. *Acidi nitrici diluti drachmas duas,*
Aquæ communis, vel
Decoctione Hordei, vel
— Furfuris, vel
Infusi Calami, vel
— Chamomillæ bilibram,
Syrupi simplicis, vel
Mellis despumati uncias duas.
 Misce.

V. Stimulans; peptica; antiseptica; oxygenans; interdum diuretica; roborans.

U. Hepatemphraxis, hepatitis chronica, febres typhodes, exanthemata gravatim erumpentia, ulcera syphilitica, (post usum *Hydrargyri*,) herpetica, psora, scrofulæ, aliæve cachexiæ; imo glossocarcinomati, protracto usu, subvenisse fertur.

D. Libra, bilibra, in diem, per vices. Per tubum vitreum potui danda.

A Q U A A C I D I S U L P H U R I C I.

per se, vel in connubio aliorum.

В о д а с ъ р н о к и с л а я .

R. *Acidi sulphurici diluti drachmas sex,*
Aquae communis, vel
Decoctione Hordei, vel
Infusi Calami bilibram,
Syrupi simplicis, vel
Mellis despumati uncias duas.

Quod attinet ad virtutem, et usum, pleraque omnia, quæ de ceteris Acidis mineralibus dicta sunt; præsertim vero de *Acido sulphurico*, eodemque diluto, hic etiam locum habent.

D. Drachmæ duæ ad semunciam in vehiculo idoneo. Si aquæ Acidum sulphuricum in præstituta proportione nuptum administretur, tum per modum lotionis eodem uti licet.

A Q U A A C I D U L A A R T E F A C T A .

Selteranam aemulans.

В о д а у г л е к и с л а я , подобная Зельцерской.

R. *Aquæ depuratae libras quinquaginta,*
Carbonatis Calcariae praeparati drachmas duas,
Subcarbonatis Magnesiae unciam,
----- Sodaæ drachmas sex,
Muriatis Sodaæ depurati sescunciam.

Trajice per solutionem in adparatu proprio gasis acidi carbonici pollices cubicos 909 ad 1000. Lagena hermetice clausa, conservetur.

V. Diuretica; sedans; antacida; antiseptica.

U. Tabidis, splanchemphraxi, urolithiasi, dysuria, aliisque malis, ex metastasi lactea oriundis, laborantibus, prodest.

D. Per cyathos detur.

A Q U A B E T U L I N A V I N O S A.

Вода березовая, кисловато-виная.

R. *Sacchari, aqua soluti, libras sex,*
Vini albi boni, vel
— rubri — mensuras tres,
Succi fructuum Citri medicae, sescunciam,
— betulini mensuras duodecim,
Foecum Cerevisiae albae cochlearia duo.

Commista subjiciantur in cado, (lege artis,) fermentationi. Hæc *betulina aqua*, ibi, ubi *Vinum*, et *fructus Citri medicae*, non sunt caro pretio, præfectis militaribus, præscribi potest.

A Q U A C A L C A R I Æ.

Aqua Calcarie ustæ Ph. Bor.; Aqua Calcis vivæ
Ph. Ross.

Известковая вода.

R. *Calcariae recens paratae libram,*
Aquae bullientis libras quindecim.

Calcariae figulino vasi commissæ, sensim *aquam* adfundito, agitans continuo. Seponito dein per duodecim horas et vas sæpius concutito, postea, ut sedimentum ponatur, quiescant, et *liquor* limpidus supernatans caute effundendus, in lagenis rite repletis, obturandisque servetur.

Q. Solvit aqua $\frac{1}{4}$ *Calcariae* et exinde lixiviosum saporem sortitur, qui sub sensatione caloris excitatur in lingua.

V. Absorbens; leniter adstringens; lithontriptica; siccans.

U. In nevroblacia abdominali, pituitosa colluvie stipata, scopo incitandi, sumitur, ad uncias aliquot per diem, conjunctim cum *amaris aromaticis*, cum *lacte asinino*, aliisque pro re nata, haud secus, ac in malis ab acore primarum viarum, aut actione organorum, succum gastricum fundentium, morbosa

productis, locum habet. In urolithiasi, sub eadem diathesi, profuit, quotidie per aliquot septimanas, cum dimidia *lactis* parte epota. Calculos profecto, secundum experimenta SCHELLI, solvit; in organismo autem animali ad minimum, si largius diutiusque sumatur, lotium notabiliter mutari, *acidum uricum* tolli, dolorem mitescere, augmento calculi obicem ponni, imo variis symptomatibus puta: mictui, et cruento, et mucoso, colluvie pituitosa producto, obviam ire, experiundo didicimus, ac proinde, si malum summovere nequierit; pro certo tamen leniet illud. Communiter cum *jusculo carnis* exhibetur, ubi vero ventriculi, ne debilitetur, ratio habenda, additamentum *aqua Cinnamomi*, vel alius *aromaticae*, non est alienum. Ut autem vis ejus solvens intendatur, *Saponem*, *Subcarbonatem Sodaem* commendant addendum alii, alii *injectiones* in urocystidem cum interno usu conjungendas svadent ex quatuor vel quinque unciis tepefactæ *aqua Calcariae*, addito *Vitello ovi*, vel *amyli triticini*, vel cujuspiam *mucilaginis* pauxillo, idque commode fit mane et vesperi ope catheteris flexibilis, cuius remora ab ægris sat bene fertur. In dysuria calculosa unciis sedecim *aqua Calcariae*, saponis drachmæ tres addi queunt (WHYTT,) atque mitigatur *aqua Calcariae* sapor saponaceus. Gustus minus gratus in lingua, ab adsumta *aqua Calcariae*, perceptus, illico aufertur pauxillo *Aceti* in ore detento, ac dein exputo. In stranguria quoque, et spasmodica ischuria, imo et hæmaturia, emicante præsertim *acido urico*, commendabilis. Sunt etiam exempla curati ope ejus diabetis, tum melliti, quum aquosi; sed in hæmaturia caute administranda. Cum arthrodynia urolithiasi affinis esse censeatur; in hoc etiam malo, si anomalum fuerit, nec activis articulorum tumoribus insigne, utilitatem promittit. In podagra, et chronicis rheumaticis myodynii, ubi acoris quoque metus subest, apte eidem junguntur *amara*, *aqua Cinnamomi* etc. Iuvat etiam in diarrhoea oxode, in dysenteria diuturna, vel ulceræ intestinorum, vel intestinalium glandularum, subsecuta. In hoc malo æque ac in phthisi ulcerosa datur cum *decoctura Cetrariae islandi-*

tae, gummiresina Myrrhae, extractis amaris et lacte asinino. In hyperesthesia nervae systematis, atque subortis hinc spasticis affectionibus laudatur a WEIKARDIO. Ubi cetera pharmaca irrita fuere, vomititionem (post adsumtum cibum) protractorem, saepius aqua Calcariae, largioribus praebiis exhibita, compescuit. Injicitur aqua Calcariae in urinæ iter apud viros, cum blennorrhœa vexantur; in vaginam vero muliebrem, profluvi mucosi purulentique sistendi causa conjunctim cum *extracto Catechu, et gummiresina Myrrhae.* Si clystere injiciatur, valet in alvi diuturnis profluviis in connubio *Opii*, in chronicis vero muci, data, ascarides cum mucoso nido expulisse perhibetur. In ulceribus flaccidis, saniosis et ipso carcinoma-te (RAUMBACH) haud inepte lavantur ulceratae partes quotidie aqua Calcariae, quo saniei fœtor minuitur, et margines ulcerum salubriter incitantur. In ulceribus urocystidis injicitur, in iis vero, quæ interdum obsident intestinum rectum, ope clysteris subterdatur. In excoriationibus chronicisque exanthematis, utpote tinea capitis, psora, herpetibus, crusta lactea infantum (MARX, MEAD, PRINGLE,) per modum lotionis expedit, vel per se, vel cum blando unguinoso oleo, in unguentum coacta, admovetur. In aphthis per modum gargarismatis juvat, in gutta rosacea lotione a BLANE commendatur. Ambusta utiliter delibuntur aqua Calcariae, Olei olivi, vel — *Lini* paribus portionibus et *Tincturae Opii* guttis aliquot, in linimentum coactis. Denique utilis est in tumoribus œdematosis restituendæ absorptionis ergo.

D. Ab initio duæ, quatuor unciae, aliquoties de die, ita, ut selibra, vel libra per diem epotetur. In morbis refractariolis augetur dosis, si non officit ventriculo, conjungiturque communiter cum *lacte frigido*, vel *tepefacto juscule carnium*, aut pauxillo *mucilaginosi*, ubi vero ventriculi ratio habenda, cum aqua *Cinnamomi*, aut aliis *aromaticis*; minime vero, ut quidam falso opinantur, cum *Decocitura Cinchonae*, quippe quæ decomponit aquam Calcariae. Satius est, debilitatis medicamina, (*tonica remedia*,) per vices interponere. In ulceribus, eruptionibus eu-

ineis, carcinomate, juvat addere decocturæ radicis *A. Lippae*, tipitum *S. Dulcamarae*. Si alvus usu ejus comprimitur, aut lyster subterdandus est, aut radix *Rhei palmati* exhibenda athartico scopo; si vero calor et sitis urget, haud raro *Aetheriticus* juvit. *Acida alcoholisata*, in primis talia, quæ, ut *Vismum*, libera acida tenent, esculenta acida vegetabilia etc., utenibus aqua *Calcariae* aliena sunt.

V. Linimentum calcareum.

A Q U A C A R D I A C A.

Питье ободряющее.

R. *Alcoholis diluti*, vel

— — — — — *impuri*, libram,

Aquaæ bullientis libras quatuor,

Sacchari uncias duas (ad quatuor.)

Misce.

Interdum ad gratiam additur succus *V. Oxycocci*, vel *Citri m.* vel alterius convenientis, ratione semper parsimoniae habita,

V. Stimulans; exhilarans; tonica.

D. Pro re nata, a Medente indicanda; meminisse tamen juvat quantitatis.

A Q U A C A R V I.

Ex tempore parabilis.

Вода птминная, (въ скорости приготвляемая.)

R. *Elaeosacchari Cari Carvi* sémunciam,

Aquaæ communis libram.

Misce terendo. Eodem modo parantur:

Aqua Menthae crispæ, В. простой мяты.

— — — — — *piperitæ*, В. перечной — — —.

— — — *Anethi Foeniculi*, В. волоско-укропная.

— — — *Pimpinellæ Anisi*, В. анисовая, aliæque extemporales.

Omnis hæ aquæ aliis pharmatis pro vehiculo inserviunt. (videsis: *Elaeosacchara.*)

A Q U A D E P U R A T A.

Вода очищенная.

Aqua communis filtrata simpliciter, vel prævie cōcta, ac dein per saccum densum cannabinum carbonibus pulveratis repletum, aut per adparatum (filtratorium) trajecta, (Уставы для военныхъ гошпиталей) filtrata, purificata, usui servetur.

U. In plerisque omnibus febribus, exceptis adfectionibus tocis, adfusio frigidæ aquæ ad superficiem corporis totam, urgente in primis calore, primis diebus denis, peraccommoda esse censetur, magnamque promittit utilitatem. *Ægro acidulis potionibus*, mundicie, aëre puro, perflatumque habente, refecto, rarius incidit necessitas *stimulantium volatilium*, quibus fatiscentiæ virium succurri solet. A sexto die adspersio ejusdem aptior, somnum placidum, adinstar *narcoticorum*, accersens. Extrinsecus quoque applicatur aptissime in adustis, contusuris, luxationibus etc., ubique pene, ubi calorici partem demī, e re est, suasu in primis cl. CURRIE.

V. Fomentum discutiens; *Aqua acidi carbonici*; — *acidula*; — *destillata*.

A Q U A D E S T I L L A T A.

Вода перегнанная.

R. *Aquæ fluvialis*, vel *putealis*, vel *fontanae*, quantum lubet. Ex vasis *Stanno*, probe obductis, vel stanneis, vel vitreis, ex amussim mundatis, moderato igne fiat destillatio, quoadusque duæ tertiæ circiter partes destillaverint. *Aqua* tali modo obtenta exponatur per aliquot dies aëri, aut in proprio apparatu, probe cum aëre agitata, servetur usui. Prima portiuncta stillantis aquæ rejiciatur.

U. Pro solvendo *Oxymuriate Hydrargyri*, *Tartrate Stibii* et *Potassae* etc., servit.

AQUA HYDRARGYRI CAUSTICA.

AQUA PHAGEDÆNICA Ph. Ross.

Вода ртутно-известняк.

R. *Oxymuriatis Hydrargyri scrupulum,*

Aquae Calcariae selibram,

Misce, et pro usu externo serva.

U. Rhagades, condylomata, verrucas, ope plumaceolæ adnota, exest; ulcera syphilitica curat.

AQUA HYDROSULPHURATA ACIDULA.

LIQUOR VINI PROBATORIUS HAHNEMANNI.

Вода водопворно-сърная кисловатая; Растворъ пробной Ганеманновъ.

R. *Sulphureti Calcariae drachmas duas,*

Supertartratis Potassæ drachmas septem.

Ingredientia prius in subtilissimum pulverem redige, et vitro ampio immitte, quibus admisce:

Aquæ destillatae uncias sedecim,

vitrum statim obtura, et liquorem quassando agita per $\frac{1}{2}$ horæ, vel donec ex quiescente nullæ amplius propullularint vesiculæ aëreæ. Stet per aliquot horas, ut subsidat, tum liquor decantetur in aliud vitrum, cui *Acidi muriatici* drachmæ duæ, et semis, instillentur. Conquassa iterum, et decanta liquorем limpidum in lagenulas, unciam modo fluidi tenentes, quam statim hermetice obtura, locoque temperato serva. Si limpidus liquor, saporis et odoris peringrati, ova putrida redolentis.

U. Hujus liquoris exiguum portionem, *Vino suspecto*, vel alteri fluido adfunde. Si limpidum restat, nullum (præter fortiorum *Ferrum* innocens) continet metallum, si vero eo turbatur, continet *Plumbum*, vel aliud metallum noxiū. *Plumbum* nigro, *Cuprum* fusco, *Oxydum Arsenici* citrino, *Stibium* aurantiacò præcipitatur colore. *Ferrum* sub ipsa præcipitatione item *acido* superstite solvitur, inde nullam turbationem causat.

AQUA MARINA ARTEFACTA.

Вода морская искусственная.

R. *Aquaæ libras quinquaginta,*
Muriatis Sodaæ depurati uncias decem,
----- Magnesiae drachmas decem,
----- Calcariae uncias duas;
Sulphatis Sodaæ,
----- Magnesiae, utriusque drachmas sex.
 Misce.

U. Pro balneis frigidis, vel calidis. Scrofulæ, rhachitis, aliive morbi systematis lymphatici, debilitas systematis nervosi, muscularum, ligamentorum. Interne libra, pro re nata, propinata, alvum egregie dicit.

AQUA MENTHAE PIPERITÆ.

Вода мяты перечной.

R. *Herbae Menthae piperitae florentis bilibram, vel*
----- siccatae libram,

His adfunditur aquæ tantum, ut distillatione, cum elicite fuerint libræ decem, supersit quantum sufficit ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam, destillentur libræ decem. Hoc modo parantur aquæ stillatitiae:

Ex corticis Citri aurantii bilibra,
----- medicae recentis totidem libris,
----- Lauri Cassiae libra, per diem macerata,
----- Cinnamomi, -----
----- florum Rosæ centifoliae rec. libris sex,
----- fructus Myrti Pimentæ selibra, per diem macerata,
----- herbae Menthae crispaæ florentis bilibra,
----- Pulegii florentis bilibra
----- siccae libra,
----- seminum Anethi Foeniculi libra,
----- Cari Carvi, selibra,
----- Pimpinellæ Anisi, selibra

Singulis harum aquarum libris adde: *Alcoholis diluti* semunciam, conservationis causa.

U. Omnes hæ aquæ ob virtutes parvas stimulantes et carminativas (*plantarum, ex quibus extractæ sunt*) quas habent, per se dantur, vel aliis Pharmacis fortioribus majorisque momenti, sæpius inserviunt.

AQUA SULPHURATA ARTEFACTA.

Вода минерально-сърная искуственная.

R. *Aquaæ puræ* libras quadraginta,
Carbonatis Calcariae drachmas quinque,
Subcarbonatis Sodaæ drachmas decem,
Muriatis ejusdem drachmas septem,
Gasis Acidæ carbonici
 —— *hydrogenii sulphurati*, utriusque pollices cubicos
 900 ad 1000.

Aquaæ in stanneo vase calefactæ, ingredientia addantur, dein refrigerata, *gase acido carbonico*, haud secus ac *gase hydrogenio sulphurato*, apto adparatu, saturetur.

V. Sudorifica; antacida; anthelmintica, ob *hydrogenium*, quod habet, *sulphuratum*.

U. Morbi cutanei, myodynæ rheumatica, paralysis, rigiditas musculorum, tendinum, juncturarum, a vulneribus sclopetariis.

Gaz hydrogenium sulphuratum decompositione *Hydrosulphureti Potassæ* vel *Calcariae* per *Acidum sulphuricum* obtinetur.

AQUA SUPER CARBONATIS POTASSÆ.

AQUÆ CAROLINÆ, BORSETANÆ, ET ALIIS ALCALESCENTIBUS AQUIS æquiparabilis.

Вода попашная углекислая; или щелочная пресыщенная углекислым гасомъ.

R. *Aquaæ depuratae* libras decem
Subcarbonatis Potassæ depurati unciam,

Solve et subjice rivo *gasis acidi carbonici*, qui oriatur ex pulvere *Carbonatis Calcariae*, *Acidi sulphurici*, utriusque unciis tribus, aquae libris totidem gradatim, et caute commixtis. Huic præparationi conveniunt adparatus chemici a D. Ноотк et Woulfe inventi.

V. Antacida; diuretica; solvens; lithontripica in quibusdam casibus.

U. Internus: urolithiasis, arthrodynia, scrofula, icterus, splanchemphraxis, obesitas etc.

D. A selibra ad libram, spatio viginti quatuor horarum.

A Q U A S U P E R C A R B O N A T I S S O D A E.

А Q U A М ЕРНІТІСА АLCALINA.

Вода содная пресыщенная углекислым гасомъ.

R. *Subcarbonatis Sodaे depurati uncias duas,*

Aquaе depuratae libras decem

Solve et misce cum *gase acidi* eodem modo, ut sub *aqua Supercarbonatis Potassae* præceptum est. Lagena hermetice claudenda servetur. Ejus loco statim solvi potest *Subcarbonatis Potassae* drachma (duæ) in *aquaе Selteranae*, *Wildungensis*, *Fachingensis*, vel similis pure *acidulae*, libra.

U. In urolithiasi cum prædominio *acidi urici*. Usum præcedat examen urinæ cum charta *lacca caerulea* tincta, rubescere enim debet, si spe aliqua curam incipere velimus. Præterea adhiberi potest in podagra et morbis e metastasi lactea, aut acore primarum viarum ortis, leucophlegmatia, hydrothorace.

B A R Y T A.

TERRA PONDÉROSA PURA. (BERGMANN.)

Тяжелоземъ, или Баритъ очищенный.

R. *Carbonatis Barytae*, quantum lubet,

In crucibulo ferreo, forti igni exponito, ut per semihoram

ubat; massa dein frigefacta et pulverata, in vase rite clausa
isui servetur. *Vel*

R. *Corbonatis Barytae* partes novem,
Carbonis lignarii partem,

Tere invicem in subtilissimum pulverem, qui crucibulo im-
mittatur operculoque adaptato, summo caloris gradui per ho-
cam subjiciatur. Materia probe trita, decoquatur in vase vi-
treo cum viginti partibus *aqua communis*, solutio adhuc fer-
vida statim filtretur per chartam emporeticam, et vitro bene-
clauso infundatur locoque frigido ad crystallisationem sepo-
natur. Crystalli formatae inter chartam bibulam cito siccentur,
et in vitro idoneo ab aditu aëris serventur.

U. Ad varia *praeparata*.

V. *Carbonas Barytae; Murias* —.

BILIS TAURINA SPISSATA.

Желчь бычачья сгущенная.

R. *Bilis taurinae recentis*, quantum lubet,
evaporet in patina vitrea, in balneo arenae, vel *aqua*, in
solidioris *extracti* consistentiam. Sic confectum, putredini,
in quam pronissima est, longius resistit; nihilo tamen minus,
quum facile in putredinem nitatur, non est diu tenenda; in
cupreis item vasis parata, quo *Cupri* partem continet, despi-
catui ducenda.

V. *Saponacea; resolvens; leniter roborans; prædominantem*
ventriculi acorem infringens.

U. *Encomia* tulit in acholia, (*defectu bilis*,) ejusque inertia,
splanchemphraxy, ictero, infirmitate ventriculi, ructibus aci-
dis, stipata, soda, a perversa liquorum menstruorum secretio-
ne (forma pilularum cum gummiresina *Assae foetidae*,) helmin-
thiasi, ad vermes videlicet exterminandos, quo in casu cuin
C. *Jalappa* conjungitur. *Extrinsecus* addi solet *linimentis an-*
thelminticis, in affectibus verminosis abdomini illinenda, aut
aliis congruis, ad reserandos tumores scrofulosos (HUFELAND.)

Aqua dilutam PLENCKIUS ad maculas corneæ delendas cum successu admovit. Injectio fellea meatum auditorium purgare fertur (LENTIN;) plerumque pilulis amaris admiscetur.

D. Semidrachma aliquoties de die porrigitur. Absente febri adcommoda. Videsis: **Bos Taurus.**

V. *Pilulae amarae ferratae.*

BOLETUS IGNARIUS PRÆPARATUS.

Приготовленная древесная губка.

BOLETUS IGNARIUS e caudicibus *Fagi* et *Tiliae*, collectus, duricorius, a cortice externo, fistulosaque substantia, sollicite, cultri ope, separatus, et discissus, mallei ictibus submittatur, donec adeo mollescat, ut instar pellis *Rupicaprae*, inter digitos diduci et in minores discerpi partes queat.

V. Ischæma; sanguinem mechanice sistens.

U. In hæmorrhagiis externis, violenta vulneratione, vel dissectione arteriarum, nominatim sub amputatione membrorum, enatis, omni festinatione sedandis, jam dudum in existimatione est apud Chiriatros.

D. Adplicatio ea est, quod frustum vulneri paulo amplius imponatur, atque aliud huic majus superdetur; utrumque vero adparatu consueto, arteriam læsam comprimente, in situ contineatur, haud neglecta (sangvine urgentius manante,) sub initium, torcularis, adplicatione. **Lycoperdon Bovista** (*Bovista Chirurgorum*, Дожжевикъ, *fungus*, in pascuis et pratis siccoribus crescens,) eadem promittit utilitatem, plurimumque celebritatis nactus est, vi, qua ad hæmorrhagias sistendas, pollet.

CALCARIA.

CALX VIVA. *Ph. Ross.*

Известь.

Calcaria pura, nulli videlicet *acido* nupta, vix invenitur in rerum natura, utut celeber. **KIRWAN** referat talem nativam flavi coloris in Quernie, et induratam grisei prope Butam se

observasse; ast quoniam constet *Acidum* ab ea *carbonicum* avidissime adtrahi, hinc liquet talem diu puram neutiquam manere posse; præparatur autem sequenti modo:

R. *Carbonatis Calcariae præparati*, quantum lubet, expone in crucibulo fortiori igni per horam, vel donec non effervescat adfusis *acidis*, ut rubescat et confestim in vase serva. Si purissima opus est *Calcaria*, *Carbonatem Calcariae* pulveratum in *aqua destillata* fervefacta lavato, dein solve in *Acido acetico*; solutioni *Subcarbonatis Ammoniae* liquidi quantum satis instillato. Pulverem præcipitatum *aqua destillata* lavato, et igni forti, ut *acidum carbonicum* abigatur, exponito. Massa residua est *Calcaria purissima*.

Q. Est terra *Alcalinis* proxima, secundum experimenta DUVVANA e metallo proprio (*Calcium*) et *Oxygene* constans, alba, levis, dura, in pulverem tamen conteritur facile; odorem vix ullum; saporem vero causticum habet, in *aqua* cum caloris augmento effervescit et dilabitur (*Calx extincta*) et in ejus copia quingenties *Calcariae* volumen superante, penitus solvitur, avidissime adtrahit *carbonicum acidum* et tum quoque in pulverem fatiscit, atque causticitate etiam solubilitateque sua orbatur, quamobrem in vitreis vasis, aditum aëris perfecte negantibus, probe usui servanda. *Calcaria*, quæ multum *Acidi carbonici* adtraxit, utpote usui medicinali inepta, perfacile cognoscitur eo, quod adfusis *acidis*, effervescentia suboriatur.

V. Corrodens; decarbonisans.

U. *Calcariam* cum melle, sapone, *Sulphureto Arsenici* flavo, (*Auripigmento*) commistam, et pro re nata, *Aceto* acerrimo humectatam, inter usitatissima escharotica retulerunt antiquiores. *Misturam* e *Calcaria* et *sapone* in verrucis, tuberculis, exscentiis, sarcomatibus, tumoribus cysticis, scirrhis exedendis, insignem habere vim HEISTERUS auctor est. PLENCKIUS e paribus *Calcariae*, saponisque oleosi portionibus, condensuit pastam maternis nævis haud ineptam, scilicet partibus, quæ nævum ambeunt, vicinis, *emplastro Oxydi Plumbi resinoso* (*adhaesivo*), pro hujus circuitu perforato,

rite munitis, pasta, deformati cuti, admovetur. Interjectis potissimum 12 horis nævus tuberculosus in escharam mutatur, accedente suppuratione, protrudendam. Eandem cum unguentis mistam in coxario malo deprchendit efficacissimam de ИЛЕН. Idem *Calcariam melle* commistam, densi adinstar cataplasmatis in myodynia rheumatica chronica maximis celebrat laudibus. Sic post СЕЛИУМ АURELIANУM, membra resoluta, (præter alia,) *Calcaria* etiam adspersa, fricari jussit ТИСОТИУS.

V. *Aqua Calcariae; Murias —; Sulphuretum —.*

C A R B O L I G N A R I U S.

У г о л ь д р е в е с н ы й.

Carbonis lignarii vulgaris frustula magna, friabilia, compacta, sed lævia, quæ paululum resonant et renitent, de novo, donec nullum amplius ediderint fumum exurantur, et supra laminam ferream ab adhærente iis cinere, scilicet ope, liberantur, pulverataque prius, quam ex toto refrigeruerint, lagenæ, ostio arcto, instructæ, statim immittantur. Orificio probe obturato, ne aëris atmosphærici vel minima pars introire queat, in loco sicco et modice tepido pulvis hic adservandus. Parum refert ex quanam *arboris* specie *carbo* sit paratus; omnis enim æque utilis. Alii ex *Tiliae ligno* obtentum præferunt. Rite paratus pulvis, dum ex novo in crucibulo ignitur, nec flammam capit, nec fumum edit.

V. *Carbo* singularem habet vim *hydrogenes* et *oxygenes* adtrahendi, quapropter, et putredini obstat, et abundantia *oxygenis* in organismo, hinc virtus ejus desoxygenans eluet.

U. Novissimis temporibus medicamentosa sua vi cum primis inclaruit, cœpitque adhiberi in morbis plerumque cum prædominio *oxygenis*, e. g. in phthisi pulmonali (ДРДДОЕС) cum inflammatoria stasi juncta (florida,) dum videlicet in ea, *azotici* penuria, *oxygenes* abundat, ligari hoc ac iners fieri *carbone* ingestu, probabile existimatur. *GARNETUS* cum *Hydro-sulphureto Potassae (Hepate sulphuris)* commistum ad semidrach-

main in phthisi ulcerosa florida exhibuit. Alii in morbis cum fetore, et in putredinem pronitate exhibuerunt, sic **GAVUS** in febribus putridis cum *Campkora* dedit (*Journal de Sedillot.*) In febri bilioso-putrida, et similibus, præcipue colluvie putrida primarum viarum, stipatis, efficax exstitit (*Mench.*) Alii febribus intermittentibus, subducta prius alvo, obposuere. In dysenteria putrida, partitis vicibus, ad drachmas duas propinatus, cum crebras alvi dejectiones, tum fetorem excrementorum, nasum ferientem, cohibuit brevi (*Juch.*) in diarrhoea quoque colliquativa, vomitu, enterodynbia flatulenta expedit. In variis ventriculi, inflatione affecti (*Leonardi*) vitiis, ructu, dyspepsia, imo in ipsa alvi obstipatione (*Mitchell*) profuisse fertur. Infantibus, prævalente ventriculi acore, inquietis, alvo viridi, vomititione laborantibus, recte administratur, enterodyniam, vomitum et diarrhoeam gravidarum submovendo, abortum præcavet, (*Kamenetzky*) Scorbuto etiam oppositus et haemorrhagiis, hoc ex fonte, oriundis (*Odier*) In ptysmate pertinaci juvat. Novissime pro antidoto *Oxymuriatis Hydrargyri*, et *Oxydi Arsenici alti* prædicatur (*Bertrand*) Externus ejusdem usus multo latius patet, et tutior est. In ulceribus gangrenosis et sphacelo, decubitum diuturnum, sequente, juvat carbones pulveratos, adspergere, vel miscere cum *pulte e farina secalina* facto, alii fermentum *panis* præferunt; alii pastam *e farina seminum Lini* cum *aqua* et *carbone* (*Odier*) Ulcera impura fetida e. g. scorbutica usum carbonis, vel in *pulvere*, vel in *unguento* exposcunt. Laxum et spongiosum scorbuticarum gingivarum habitum purgatio *pulvere carbonum* cito profligat, hinc haud immerito *is pulveribus dentifriciis* additur. Carcinomati uteri pasta *e carbone* pulverato et *melle*, (*secondum Odier*) profuit, ut palliativum. In variis fœditatibus cutis, ut psora, herpetibus, achoribus, efficaciter agit, præsertim cum *Sulphure sublimato*. Si partes malo affectre madent, forma sicca præponitur, si vero siccescunt, forma *unguenti* cum *Sebe, butyro* recenti, non *salito*, e. g. in crusta lactea cum *cremore lactis*, in tinea capitidis *cum adipi suilla depurata* adhibetur. An-

te deligationem partes affectae *decoctura Arctii Lappae*, aut *sapone lavandæ* sunt. Cl. THOMANN profligavit brevi tineam per vices adspergendo carbonem pulveratum, et lavando *saponacea aqua*. *Carbo* pulveratus, atque cum æqua portione *furfurum triticeorum* mistus, si tibialibus aut calceis inspergatur, sudorem plantarum pedum acrem, fœtentem, cohibere perhibetur (KAMENETZKY.) *Clysteres* e *decoctura furfurum triticeorum*, vel *infuso seminum Lini* cum pulvere carbonis, in diarrhoeis, dysenteriis, tenesmo, enterodynia flatulenta, haemorrhoidali, verminosa, valent (KAMENETZKY.) Quosdam antiquitus *carbonibus* in vicem *salis* fuisse usos VARRO memoriæ prodidit. Præterea corporibus, quam plurimis fetorem eripit, eaque decolorat (LOWITZ,) hinc in Pharmacia adhibetur ad purificanda et decoloranda varia fluida empyreumatica colorata, utpote: *Alcohol*, *Acetum*, *Acidum tartaricum*, *Carbonatem Ammoniae*, *Supertartratem Potassae*, aliaque *salium lixivias*; etiam aquæ in putredinem nitenti a classiariis obponitur adjecto in primis *Acidi sulphurici* pauxillo. Filtra a SMITHIO et CUCHETO inventa ac depurandæ aquæ dicata (*Fontaines depuratoires*) omnem utilitatem *carboni* debent, qui eorum fundum contegit. *Caro* putescens, hoc respersa, recentis gratiam cito præ se fert, fitque inolens (MÆNCH.) Immittitur quoque sellis familiaricis et latrinis ad fœtidos vapores ex iis erumpentes, retinendos. Adversus sequelas ciborum in cupreis vasis, non rite *Stanno* obductis, præparatorum, valet (ORFILA.)

D. Pro adultis a scrupulo ad drachmam et ad drachmas tres. Propter levitatem forma *electuarii* præponitur. Ad unciam, e. g. carbonum pulveratorum, tres unciae, vel drachmæ duæ *gummi Acaciae verae*, uncia *Sacchari* et duæ vel tres aquæ unciae sumuntur. Ceterum et cum *lacte*, præcipue ab infantibus bene devoratur. Pro *unguento* ad partem carbonum sex partes *olei* alicujus expressi requiruntur, vel et *mel olei* vices gerit. Pro clysteribus ab uncia ad duas adultis, a drachma ad duas infantibus, cum *decoctura Amyli triticini* aut *infuso seminum Lini usitatissimi* etc.

V. *Cataplasma antisepticum*; *Gas hydrogenium carbonatum*; *Pulvis Carbonis acidulus*.

CARBO SPONGIÆ OFFICINALIS.

S P O N G I A M A R I N A U S T A. *Ph. Ross.*

Морская губка обугленная, или жженая.

R. *Spongiae officinalis*, in frustula concisæ, quantum libet. Probe lotam mundatamque in vase sictili clauso, igni expo-
nito, sæpe agitando, donec fumus per commissuras exire ces-
set, massaque fiat perfecte friabilis, in pulverem dein tenuan-
da, usuque, vasis clausis, servanda.

Q. Fugato ita per ignem *oleo animali foetido* et *Carbonate Am-
moniae*, ex *Carbone*, *Muriate Soda*e, et *Subphosphate Calcariae*,
consistit.

V. *Resolvens; exsiccans*.

U. Laudatur in primis in thyremphraxi (tumore glandulæ
thyroideæ,) mesenteremphraxi (glandularum meseraicarum ob-
structione,) scrofula.

D. A scrupulo ad drachmam bis terve de die cum *Saccharo*
aut aliis interne, ut *Muriate Soda*e, et *Submuriate Hydrargyri*,
etc., vel *trochisci* fiunt. A quibusdam etiam *decoctura* exhib-
etur.

V. *Pulvis Spongiae compositus; Trochisci Spongiae compositi*.

C A R B O N A S B A R Y T Æ.

Тяжелоземь углекислый.

R. *Sulphatis Barytae*, subtilissime *pulverisati*, partes octo,
*Muriatis Soda*e *depurati* partes quatuor,
Carbonis lignarii partem.

Bene inter se commisceantur materiaque dein crucibulo immittatur atque operculo adaptato, fortiori igne, per horam urgeatur. Massa probe trita immittatur vasi vitro cum aquæ fer-
ventis viginti et quatuor partibus, bene obturato, agitationeque
permisceatur. Vas in balneo vaporis stet, donec pars non soluta

subsederit, dein liquor per chartam emporeticam filtretur ac sensim sensimque instilletur Subcarbonas Potassae in aqua solutus, donec præcipitatio Carbonatis Barytae prorsus disparuerit. Liquor supranatans decantetur et subsidens pulvis ope aquæ bullientis edulcoretur ac in charta bibula siccetur.

V. *Murias Barytae.*

CARBONAS CALCARIE PRÆPARATUS.

Известь углекислая пріогашенная; мѣль очищенный.

Carbonas Calcariae, seu mollior, *Creta dictus*, seu durior, sub nomine *lapillorum*, et *oculorum Cancerorum* notus, in ferreo mortario pulveratus, atque super porhyritem cum pauxillo aquæ lœvigatus, vasi committatur capaci, tum aqua adfundatur, quæ saepius agitato vase onusta polline elutrietur. *Aqua* quiescente, pulvis subtilis subsidet, illico exsiccandus. Crassus pulvis, cui aqua non est sustinendo, lœvigeletur iterum, eo demque, ut prius modo, tractetur.

V. Absorbens; exsiccans; antacida.

U. *Carbonatis Calcariae praeparati* in cardialgia, pyrosi, ad absorbendum in ventriculo et intestinis prævalens acidum, præsertim impedita ciborum adsimilatione, ac prædominante acore, productum. *Lapides Cancerorum* hoc in casu, ad semiscrupulum vel integrum, cum lenioribus aromaticis ingeruntur. *Creta* vero, licet, ob causas, quarum supra mentio injecta est, et quod heterogeneas sibi admistas partes teneat, proscribi mereatur, atque illis et conchis postponi; nihil tamen minus despiciatui ducenda est *praeparata*, præsertim urgente acrimonia acida, periculoque per moram metuendo. Tunc apertissime cum gummi *Acaciae verae* conjungitur, addito *Succharo* et nuce, si præsto est, *Myristicae moschatae*, facilitoris digestionis causa, et in primis cholerae obviam it. *Mistura Londenium cretacea:* e *Cretae praeparatae* uncia, *Sacchari purificati* drachmis sex, gummi *Acaciae verae* in pulverem tenuati, uncis duabus, aquae destillatae bilibra, coalescens, efficacissi-

mum est adversus sodam remedium. Ope *Cretae*, aquam marinam reddi potabilem refert ALLEMAND (*Comment. Soc. Harlemon. P. I.*) addendo quatuor pintis aquae marinae, unciam *Cretae*. Pro antidoto *Oxydi Arsenici alti*, in ventriculo, hærentis, habetur, vel ad minimum effectus ejus minuit.

D. Grana decein, triginta et amplius, ter aut pluries, de die dantur.

V. *Aqua Acidi carbonici; Mistura Carbonatis Calcariae composita; Murias Calcariae.*

CARBONAS FERRI PRÆCIPITATUS.

Углекислое желъзо осажденное; отсѣдъ углекислого желъза.

R. *Sulphatis Ferri* uncias quatuor,
Subcarbonatis Soda depurati uncias quinque,
Aqua fontis libras decem.

Solve *Sulphatem Ferri* in *aqua*, dein adde *Subcarbonatem Soda*, prius ex *aqua* sufficienti quantitate solutum, et misceto probe. Lavetur *Carbonas Ferri*, qui fundum petit, *aqua tepida*, et postea siccetur.

U. Ut *Ferri limati*; præferri tamen huic meretur, atque a granis tribus, decem ad viginti, et amplius datur.

V. *Mistura Myrrhae ferrata; Tinctura Muriatis Ferri.*

CATAPLASMA ACETATUM.

Катаплазма уксусная.

R. *Farinae* cujuslibet, vel
Micarum panis, quantum vis,
Acidi acetici diluti impuri, quantum satis;
ut fiat Cataplasma, saepius frigide superdandum, et, ubi siccescet calefietque, renovandum.

CATAPLASMA ALUMINATUM.

K. Квасцовая.

R. *Supersulphatis Aluminae et Potassae* drachmam,
Albumina ovorum duorum.

Fortiter simul agitentur, ut in coagulum coëant.

U. In ophthalmite asthenica, pernione, etc. efficax.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

K. Противогнилостная.

R. *Camphorae* (in uncia aut *Alcoholis diluti*, aut *Olei pineo-laricini solutæ*) sesquidrachmam,
Farinae cuiuslibet selibram,
Cerevisiae fervefactæ, quantum satis, ut fiat cataplasma, vel

adde :

Cataplasmati emollienti :

Carbonis lignarii pulverati uncias duas.

U. In ulceribus putidulis, gangræna, sphacelo. Postrema duo mala carbonum pulvere respersa, *Oleo pineo-laricino*, vel *pineo-sylvestri* humefiant, dein interdum *Cataplasma emollientis* superdetur. Id, quod cum *Camphora* conficitur, utpote carioris pretii, utrique oleo, sic, ut supra dictum, adhibito, eadem facultate pollenti, postponi in curatione militum debet.

CATAPLASMA AVENACEUM.

K. Овсяная углекислая.

R. *Farinae avenaceae*, quantum vis,
Fermenti Cerevisiae, quantum satis,
Commisceto, atque leni calori, quoad tumescat, exponito, illico superdandum.

U. Hoc *Cataplasma fermentans* in ulceribus putescentibus, gangræna, sphacelo et similibus, utilitatem promittit.

C A T A P L A S M A C A R O T Æ.

K. Морковная.

R. Radicum Dauci Carotae recentium, rasarum, quantum opus, ut parti corporis admoveantur, vel Earumdem, quantum vis,
coque ex
Aquaæ sufficienti quantitate,
donec mollescant, tunc in pulpam contundito.

U. Parti corporis nudæ admovendo in curatione ulcerum putescentium, cacoëtheorum, canceraticorum, herpetum, perule; psoriasis etiam scroti et genitalium eidem cedit.

C A T A P L A S M A C A R O T Æ C O M P O S I T U M.

K. Морковная сложная.

R. Roob Carotae libram,
Herbae Conii maculati pulveratæ unciam,
Tincturae Opii sesquidrachmam,
Misce, fiat cataplasma.

U. Ad fœtorem doloremque carcinomatis mitigandum efficax.

C A T A P L A S M A C O N I I A M M O N I A T U M.

K. Омего-Аммиаковая.

R. Farinae seminum Lini usitatissimi, vel
— Avenae sativæ selibram,
Foliorum recentium Conii mac., rite contusorum, uncias duas,
Acidi acetici diluti impuri, quantum sufficit,
coque parumper et adde:
Muriatis Ammoniae semunciam:
Misce, ut fiat cataplasma.

U. Tumoribus articulorum scrofulosis, ulceribus cancro-
sis, scirrhomatibus, præternaturali irritabilitate stipatis et gan-
grænæ, adcommodum.

C A T A P L A S M A E M O L L I E N S.

K. Мягчительная.

- R. *Farinae hordeaceae, vel*
— Lini usitatissimi, vel
Micarum panis veteris, quantum vis,
coque ex
Aqua communis, vel
Lactis, sufficienti quantitate ad aptam crassitudinem,
ut fiat cataplasma.

U. Quum admovendum est, vel parti, cui cataplasma superdandum est, vel hujus superficiei *adeps suilla*, vel *oleum prius illinatur*, idque furunculis et aliis tumoribus inflammatoriis, vel vulneribus, ubi suppurationis movendæ necessitas incidit, peridoneum.

C A T A P L A S M A H E R A C L E I S A L I N U M.

K. Аммоніачно-нашатырная, или разводящая.

- R. *Cataplasmatis emollientis libram,*
Gummiresinae Heraclei gummiferi,
*(sufficienti quantitate *Aceti solutæ,)* semunciam,*
Muriatis Ammoniae drachmas duas,
Alcoholis diluti camphorati unciam.
Misce, ut fiat cataplasma.

U. Discutiendo valet in tumoribus articulorum asthenicis, arthropoosi. Si speciebus post Infusum aromaticum residuis, *Unguenti simplicis* uncias duas addideris, habebis *Cataplasma discutiens* anthraci admoderatius.

C A T A P L A S M A M A T U R A N S I.

K. Нагноивающая I.

- R. *Farinae avenaceae,*
Mellis, utriusque pares portiones.
Fiat cataplasma.

CATAPLASMA MATORANS II.

К. Нагноивающая II.

- R. *Cataplasmatis emollientis libram,*
Radicis Allii Cepae tostae, contusae, sescunciam,
Unguenti resinosi unciam.
Misce, ut cataplasmatis crassitudinem adipiscatur.

CATAPLASMA MATORANS III.

К. Нагноивающая ит.

- R. *Farinae secalinae* partes duas,
Saponis picei,
Radicis Alli Cepae coctae, vel
_____ *tostae*,
Mellis, singulorum partem.
Fiat cataplasma.

CATAPLASMA SECALIS MURIATUM I.

К. Ржаной муки соденая 1.

- R. *Farinae secalinae* partes sex,
Fermenti panis veteris partes duas,
Muriatis Sodaem partem,
Aqua communis, quantum satis,
ut fiat cataplasma.

U. In myodynia rheumatica, arthrodynia etc., adhibetur.

CATAPLASMA SECALIS MURIATUM II.

К. Р ж а н о й м у к и с. II.

- R. *Farinae secalinae* libram,
Fermenti Cerevisiae uncias novem,
Muriatis Soda uncias duas.
Misce, fiat cataplasma.

C A T A P L A S M A S I N A P I N U M.

К. Г о р ч и ч н а я.

- ### R. Seminum *Sinapeos nigrae* contusorum,

Farinae avenaceae, vel
— triticeae, vel
Micarum panis, vel
Fermenti ejusdem, utriusque pares portiones,
Acidi acetici diluti impuri, quantum satis,
ut fiat cataplasma.

V. Excitans topicum; derivans; partium organicarum, dum languent, actionem augens.

U. Vitia e nevroblacia, (e reactione vis vitæ deficiente,) ex sudore consveto locali suppresso, aut exanthematibus chronicis, vel acutis retropulsis; paralysis; cephalalgia; stupor; coma (cum vel sine febre,) delirium febrile, interioribus cruribus, femoribus, brachiis nuchæque imponendum.

CATAPLASMA SINAPINUM ACERRIMUM.

К. Горчичная остройшая.

R. *Fermenti panis secalini uncias tres,*
Farinae seminum Sinapeos nigrae uncias duas,
Rasuræ radicis recentis Cochleariae Armoraciae sescunciam,
Radicum Allii Cepae, sub cineribus tostarum et con-
quassatarum unciam,
Muriatis Ammoniae semunciam,
Fructuum Capsici annui pulveratorum drachmam,
Aceti, quantum satis,
ut fiat cataplasma mediæ consistentiæ.

CATAPLASMA SINAPINUM ACRE.

К. Горчичная острая.

R. *Farinae avenaceae, vel*
Micae panis,
Seminum Sinapeos nigrae contusorum, utriusque uncias duas,
Radicum rasarum Cochleariae Armoraciae sescunciam,

*Muriatis Ammoniae pulverati semunciam,
Acidi acetici diluti impuri, quantum satis,
ut fiat cataplasma.*

CATAPLASMA SUPERACETATIS PLUMBI.

К. Уксусо-кислая свинцовая.

R. *Micarum panis, vel
Farinae, quantum vis,
Solutionis Superacetatis Plumbi, quantum satis,
ut in cataplasma madescant.*

U. Ecchymosin, illata extrinsecus vi, productam, discutit.
Excoriationibus, adustis, contusuris, luxationibus, tumoribus
ossium scrofulosis, distorsioni, convenit.

CATAPLASMA TABACINUM.

К. Табачная.

R. *Foliorum Nicotianae Tabaci, grosso modo pulverato-
rum, unciam,
Acidi acetici diluti impuri, vel
Aquae ferventis quantum satis,
simul in cataplasma contundito.*

U. In Herpete. Quum emetica interne neutiquam exhiberi
possunt, tum admotum cordis scrobiculo, vices eorum,
supplet.

CATAPLASMA TRITICI.

К. Пшеничная пропивугнилосная.

R. *Farinae triticeae sescunciam,
Fermenti Cerevisiae unciam,
Mellis semunciam.
Misce, ut fiat cataplasma.*

U. In ulceribus putescentibus, gangraena, sphacelo et simili-
bus, utilitatem promittit, ubi teperfactum est et fermentat su-
perdandum.

CATAPLASMA TRITICI СЕРИНУМ.

К. Пшеничная нагноивающая.

R. *Farinae triticeae uncias quatuor,*
Aquaes simplicis quantum satis.
Sub agitatione ad pultis consistentiam, addito:
Pulpam radicum assatarum duarum Allii Cepae, ut fiat
cataplasma, ad fictile dandum.

CATAPLASMA TRITICI ОПИАТУМ.

К. Пшеничная болеуполищельная.

R. *Farinae triticeae sescunciam,*
Lactis dulcis, quantum satis,
coque ad consistentiam pultis, addendo versus finem:
Opii pulverati grana quinque.
Fiat cataplasma.

CERATUM OXYCARBONATIS ZINCI.

UNGVENTUM ZINCI Ph. Bor.

Мазь цинковая.

R. *Adipis suillae depuratae selibram,*
Cerae flavae,
Oxycarbonatis Zinci praeparati, utriusque unciam,
Olei napini semunciam.
Fiat ceratum.

V. Catulatica.

U. Ulcusculis, et pustulis, cutis excoriationibus superficia-
libus, ad cicatrisationem promovendam, aptum. Scire licet in
parandis componendisque Ceratis, Emplastris, Linimentis, Unguen-
tis, pingvia atque resinosa, leniori igne liquefacienda esse,
aridis, si quæ præsto sunt, sub jugi motu, simul inspersis,
in pertenuem prius redactis pulverem, quoadusque frigescens,
riguerit miscela.

C E R A T U M S A B I N A E.

Мазь сабинная, или Донского можевельника.

- R. *Foliorum Juniperi Sabinae* recentium, cont. libram,
Cerae flavae selibram,
Adipis suillae depuratae bilibram.
Coquito folia *Juniperi Sabinae*, leni igne, cum *adipe suilla*, sub perpetua agitatione, spathula lignea, ad perfectam consumptionem humoris, tunc admisce *ceram flavam* et *cola* per linteum vetustum, seu minus densum. Amoto *Lyttae emplastro* ad fonticulos magnæ efficaciæ est; præsertim autem in morbis articulationum.

C E R A T U M S I M P L E X.

М. Восковая просстая.

- R. *Olei napini*, vel
Alius congrui partes duas,
Cerae albae, vel
 — *flavae* partem et semis.
 Fiat ceratum.

J. Hoc et similia idonea sunt, ubi emollire expedit, vel ab iere organicas partes arcere.

C E R A T U M S U P E R A C E T A T S P L U M B I.

C E R A T U M S A T U R N I Ph. Ross.

М. Свинцовая.

- R. *Olei olivi*, vel
Alius congrui partes tres,
Cerae albae, vel
 — *flavae* partem,
 simul leni igne liquefactis et paululum refrigeratis,
 probe movendo, partitis vicibus,
 adde:

*Superacetatis Plumbi liquidi partem, vel
crystallisati decimam præcedentis partem.*

U. In cnesmo, excoriationibus, adustis valet, imo ad compescendum etiam humorum cursum in ulceribus commendantur.
(Гоосн.)

V. Unguentum *Superacetatis Plumbi.*

C E R E V I S I A A M A R A.

Пиво травяно-горькое.

R. *Herbae Artemisiae Absinthii,*
— *Gentianae Centaurii, vel*
— *Menyanthidis trifoliatae,*
Corticis flavi fructus Citri Aurantii, singulorum semunciam.

Incisis et in sacculo linteo inclusis infundantur *Cerevisiae bona* notæ unciæ triginta duæ, stent per noctem, dein colentur.

D. Cyathus ter de die propinatur.

C E R E V I S I A A N T I S C O R B U T I C A.

II. Противузынготное.

R. *Radicis Cochleariae Armoraciae rasæ,*
Seminum Sinapeos nigrae contusoruim,
Extracti Pini sylvestris, singulorum libram,
Syrupi Melassis libras quatuor,
Cerevisiae tenuis, vel
Infusi Malti, vel
Decoctione ejusdem libras centum et viginti.
Stent leni digestione per quatriduum, ut fiat fermentatio, et cola.

U. Efficacissima est in scorbuto, imo etiam paralysi; addita vero *Subcarbonatis Potassae* libra, facta citra calorem maceratione, haud ineptum fit remedium hydropisi, diuretica vi, enitens.

D. A selibra ad libram per diem, partitis vicibus portionibusque, porrigitur.

C E R O M E L.

M. Воско-медовая.

R. *Cerae albae*, vel
— flavae partem,
Mellis partes quatuor.
 Leni igne liquefacta commisceto.

U. Ut leniter excitans, ad tegenda et consolidanda ulcera,
 astheniae notas ferentia, aliis, tum *Emplastris*, quam *Unguentis*,
 substitui potest.

C L Y S T E R A C E T A T U S.

К л и с т и р ь уксусный.

R. *Clysteris communis* selibram,
Acidi acetici diluti impuri uncias duas — tres.
 Misce.

U. Alvus adstricta, ileus rebellis, narcotismus (apoplexia a
 venenis narcoticis) phrenitis hydrocephalica, et vitia similia.
 Infesta auctiori irritabilitate recte minuitur quantitas *Aceti*.

C L Y S T E R A D S T R I N G E N S O P I A T U S.

К. В я ж у щ і й съ опіемъ.

R. *Decoctionae Gallarum quernarum*, vel
— corticis Quercus Roboris selibram,
Tincturae Opii guttas quinquaginta.
 Misce, et si lubet, pro re nata, etiam *Supersulphatem*
Aluminæ et *Potassæ* addito.

U. In alvifluxu rebelli, (in primis intestini recti,) hæmorrhoides
 mucosa, exania etc.

C L Y S T E R A L L I A T U S.

К. Ч е с н о ч н ы й.

R. *Succi radicis Allii sativi* unciam,
Lactis recentis uncias octo. Videsis: CLYSTEREM ALOES.

C L Y S T E R A L O Ë S.

К. С а б у р н ы й.

- R. Gummiresinæ Aloës perfoliatae,
 (in sufficienti quantitate Vitelli ovi solutæ) drachmam,
Decocturae Hordei, vel
 ——— *Avenæ, vel*
Lactis vaccini libram.
 Fiat clyster, omni, vel altera quaque nocte, injiciendus.
 Interdum additur:
Oxymuriatis Hydrargyri sesquigranum, vel
Succi Allii sativi uncia.

U. Ascarides, intestinum rectum infestantes, subterdato hocce
 clystere enecantur. Eandem utilitatem promittit: C L Y S T E R A L L I-
 AT U S; — M U R I A T I S S O D A E; — P I N E O - B A L S A M E U S; — S A-
 B A D I L L A E.

C L Y S T E R A L O Ë S C O M P O S I T U S.

К. С а б у р н ы й с л о ж н ы й.

- R. Decocturae saturatæ radicis Aspidii Filicis maris seli-
 bram,
Gummiresinæ Aloës perfoliatae,
Balsami pineo-laricini, utriusque drachmam,
Oxymuriatis Hydrargyri sesquigranum,
Olei olivi, vel
 —— *Lini usitatissimi uncias duas. Videsis: D E C O C T U-
 R A M A S P I D I I C O M P O S I T A M.*

C L Y S T E R A M Y L I.

К. К р а х м а л ь н ы й.

- R. Amyli triticini semunciam,
Aquaæ ferventis selibram,
Olei Lini usitatissimi, vel
 —— *olivi, vel*
Adipis suillæ depuratae semunciam.
 Commisce. Interdum, pro re nata, addituri
Tincturae Opii drachma.

U. Tenesmus, enterodynæ, diarrhœa, dysenteria, hæmorrhoidis, stranguria etc. sunt mala, in quibus hic *clyster* tentari meretur.

CLYSTER ASSÆ FŒTIDÆ.

Клистиръ дурнопахучій.

R. *Gummiresinae Assae foetidae* drachmas duas,
Decocuræ Specierum resolventium uncias tres,
Olei olivi unciam. Videsis: MISTURAM ASSÆ FŒ-
 TIDÆ.

CLYSTER ASSÆ FŒTIDÆ OPIATUS.

К. Дурнопахучій съ опіемъ.

R. *Gummiresinae Assae foetidae,*
in Vitello ovi solutæ, drachmas duas,
Aquaæ ferventis uncias decem,
Tincturæ Opii guttas quinquaginta.

U. Spasmi, hysteria, ataxia, convulsiones, singultus, enterodynæ spasmodica, verminosa, flatulenta etc.

CLYSTER CATHARTICUS.

К. Слабищельный.

R. *Infusi foliorum Cassiae Sennæ uncias quatuor,*
Sulphatis Magnesiae unciam,
Aquaæ tepidae uncias septem,
Olei Lini usitatissimi, vel
— olivi unciam.
 Misce.

CLYSTER COMMUNIS.

К. Обыкновенный.

R. *Muriatis Sodaæ, vel*
Sulphatis ejusdem semunciam, vel
Saponis sebacei drachmas duas,

*Decoctione Hordei, vel
— Avenae, vel
— Althaeae, vel
Infusi Lini sine Glycyrrhiza, vel
— Chamomillae, vel
Aquaer tepidae libram,
Olei Lini unciam.
Misce.*

C L Y S T E R M U R I A T I S S O D A E.

К. Солекислой соды, или соляной.

R. *Aquaer (vel Vini rubri) selibram,
Muriatis Soda, quantum solvi potest. Videsis: C L Y-
S T E R E M A L O E S.*

C L Y S T E R N U T R I E N S.

К. Питательный.

R. *Decoctione carnis bubulae fortioris uncias octo,
Amyli triticini semunciam.
Misce.
Tertia vel quarta quaque hora injiciendus.
Huic, si citius rejiciatur, adde:
Tincturae Opii drachmam.*

U. Dysphagia, omnibusque in casibus, ubi ex deglutitione suspensa, nutritio corporis requiritur.

C L Y S T E R O P I A T U S.

К. Оpiатный, или болеуполищийный.

R. *Clysteris Amyli, vel
Infusi semen Lini (sine Glycyrrhiza) uncias quatuor,
Tincturae Opii guttas quinquaginta.
Commisce.*

U. Convulsio, trismus, cholera, diarrhoea, dysenteria, tenesmus, stranguria, enterodynbia spasmodica.

CLYSTER PINEO-BALSAMEUS.

K. Терпентинный.

R. *Balsami pineo-laricini, Vitello evi rite subacti, semun-*
ciam,

Dcocturas Hordei, vel

Infusi Lini, vel

— Chamomillas uncias decem,

Olei Lini unciam.

Interdum *Tincturae Opii* guttae quinquaginta adduntur.

U. Ischuria, dysuria, cystirrhœa, urolithiasis, ascarides.

CLYSTER SABADILLE.

K. Сабадильный, или противуглисный.

R. *Seminum V. Sabadillae pulveratorum semidrachmam,*
Aqua communis uncias decem,

Coque ad colaturam selibræ.

Adde:

Lactis recentis tantumdem. Videsis: CLYSTEREM
ALOËS.

CLYSTER TABACINUS.

K. Табачный.

R. *Foliorum Nicotianae Tabaci sesquidrachmam,*

Infunde:

Aqua ferventis uncias decem,

Per quadrantem horæ colatura injiciatur.

U. Ileus, alvus pertinaciter compressa, hernia incarcerata, ascarides. *Clyster* hic vomitionibus quoque provocandis, urgente in primis dysphagia, aptus; attamen vi narcotica systemati nervoso insidias struit, cordis vero actionem retardat: hinc minime mirum ejusdem usum in asphyxia repudiari a quibusdam.

COLLYRIUM ACETATIS AMMONIÆ.

Примочка уксусо-кислая амміаковая.

R. *Acetatis Ammoniae liquidi,*
Aquaæ Rosæ centifoliae, vel
— communis, utriusque selibram.

Misce.

Interdum additur:

Tincturae Opii drachma, vel
— Humuli Lupuli, vel
— Hyoscyami nigri sesquidrachma.

U. Ophthalmitis obnormi irritabilitate stipata, guttatum instillando, vel per modum balnei oocularis.

COLLYRIUM ALUMINATUM.

II. Квасцовая.

R. *Supersulphatis Aluminæ et Potassæ scrupulum,*
Aquaæ depuratae selibram.
Solve, vel Cataplasmati aluminato
adde:
Aquaæ destillatae libram.

U. Ophthalmitis, nyctalopia, internis roborantibus antiscorbuticis, eodem tempore propinatis, guttatum instillando.

COLLYRIUM CUPRI COMPOSITUM.

II. Уксусо-кислой мѣди сложная.

R. *Massæ Acetatis Cupri compositæ grana decem ad duodecim,*
Aquaæ puræ selibram.

Solve, et adde:

Superacetatis Plumbi liquidi guttas duodecim ad viginti,
Tincturae Opii crocatae guttas viginti ad drachmam, ut fiat Collyrium.

Videsis: COLLYRIUM HYDRARGYRI OPIATUM.

COLLYRIUM CUPRI OPIATUM.

П. Уксусо-кислой мѣди съ опіемъ.

R. *Massae Acetatis Cupri compositae grana octo ad duodecim,*

Aqua destillatae uncias quatuor,

solve et addito:

Tincturae Opii crocatae guttas viginti ad triginta,
ut fiat Collyrium.

Videsis: COLLYRIUM HYDRARGYRI OPIATUM.

COLLYRIUM HYDRARGYRI OPIATUM.

П. Солекислой ртути съ опіемъ.

R. *Oxymuriatis Hydrargyri semigranum ad granum,*

Aqua destillatae, vel

— — *Rosae c. uncias quatuor ad selibram.*

Solve et adde:

Mucilaginis Lini usitatissimi sesquidrachmam ad du-
as drachmas,

Tincturae Opii crocatae semidrachmam ad drachmam,
ut fiat Collyrium.

U. *Collyrium hoc, oculis bis terve guttatim instillatum, ad-*
versus varia eorum vitia asthenica, præsertim, si ex malo
corporis habitu proveniunt, prodest, idque plus vel minus acre
esse debet in ratione asthenie oculorum ipsorum et mem-
branarum insensibilitatis. Id subintellectum velim etiam de
COLLYRIO CUPRI COMPOSITO, — — OPIATO.

COLLYRIUM HYOSCYAMI OPIATUM.

П. Белено-опіяная.

R. *Tincturae Opii crocatae guttas viginti ad drachmam,*

Succi Hyoscyami spissati scrupulum,

Aqua purae, vel

— — *Rosae c. uncias tres. Misce.*

Videsis: COLLYRIUM PLUMBI OPIATUM.

COLLYRIUM LINI OPIATUM.

П. Л ь н я н о - о п і а т н а я .

R. *Tincturas Opii crocatae* guttas viginti,
Mucilaginis Lini usitatissimi sesquidrachmam,
Aquaes destillatae, vel
 —— *Rosae c. uncias tres.*
Fiat Collyrium.

U. Ophthalmitidi, sublato per congrua remedia hypersthetico statu, adcommodatissimum, ita etiam incipienti staphilomati obviam it.

COLLYRIUM PLUMBI OPIATUM.

П. С в и н ц о в а я о п і а т н а я .

R. *Superacetatis Plumbi crystallisati*,
Opii depurati,
Succi Hyoscyami spissati, singulorum grana decem,
Aquaes communis, vel
 —— *Rosae c. uncias novem.*
Cola per chartam, et admisce :
Mucilaginis Lini usitatissimi unciam.

U. Prævalente nimia oculorum sensibilitate adhibendum est; cavendum tamen, ne protractiori ejus admotu iris paralytice, adficiatur. Id etiam dictum velim de COLLYRIO HYOSCYAMI OPIATO. Instillatur autem guttatim oculis.

D E C O C T U R A A L T H A E E .

О т в а р ь п р о с в и р и я к а .

R. *Radicum Althaeæ off. concisarum semunciam*,
Aquaes communis libram,
 coque ad remanentiam unciarum novem.
Cola.

DECOC TURA ALTHÆ COMPOSITA.

O. Просвирняка сложный.

R. Radicis *Althæae* siccatae et incisaæ uncias quatuor,
Baccarum Vitis viniferae siccatarum, vel
Fructuum Ficus Caricae siccatorum (demitis *acinis*)
 uncias duas, vel
Radicis Glycyrrhizæ glabrae unciam,
Aquaæ libras octo.

Decoque aquam cum *Althæa* leni igne ad libras quinque; ubi
 ero *Glycyrrhiza* substituitur, sub fine coctionis addenda est,
 quorem colatum sepone, donec fæces subsederint, et effunde.

D. Bilibra in dies partitis vicibus, et portionibus.

V. *Gargarisma commune.*

DECOC TURA ANTISCOR BUTICA.

O. Противуцинготный.

R. Specierum *Pini* compositarum sescunciam,
Aquaæ puræ sesquilibram,
 decoque ad colaturam libræ,
 cui, si opus est, addito:
Acidi tartarici semidrachmam, vel
 —— *sulphurici diluti* drachmam, vel
Roob Oxycocci, vel
Syrupi Molasses, vel
Oxymellis simplicis, vel
Succi Citri medicae unciam.

D. Libra (et amplius) quotidie exhibetur.

DECOC TURA ASPIDII COMPOSITA.

O. Папоротника сложный.

R. Radicis *Aspidii Filicis maris*,
 —— *Valerianæ officinalis concisaæ*, utriusque semun-
 ciam,

Herbae Gratiolae officinalis,

— — — *Centaureae benedictae concisæ*, utriusque drachmas duas,

coque ex *Aquaæ sesquilibra* ad libram.

Colaturæ expressæ et frigefactæ addito:

Syrupi Scillæ, vel, si præsto est,

— — — *florum Amygdali persicae unciam,*

Aetheris sulphuriei drachmas duas.

V. Incidens pituitam alimentarii tubi, et nidum mucosum faventem vermis destruens, anthelminthica.

U. In helminthiasi eximus. Hoc, (ferentibus aliis subsidiariam opem,) remedio, D. KASCHINSKY aulicus Medicus, optatissimo cum successu tænias latas e penetralibus corporis exterminat.

D. Usus decocturæ sub decrementum lunæ incipiendo a 25 videlicet ad 30 diem. Omni mane et vespere vasculum quatuor unciarum quotidie sumendum est, tum postridie mane *Aspidii Filicis muris pulvere* (drachmis duabus vel tribus), vel eodem composito cum aqua frigida commisto ac deglutito, dein præterlapso bihorio **EMULSIO RESINOSA COMPOSITA** porrigitur. (Videsis: **EMULSIONEM.**) Si provocatus vermis tarde exit, vires infirmi restaurare oportet haustu generosi *Vini et juscule meraco cornium* cum frustulo *panis albi*, et ad noctem **CLYSTER ALOES COMPOSITUS** subterdandus. (Videsis: **CLYSTEREM.**) Interdum sub usu horum remediiorum nausea movetur, imo et vomitiones provocantur, quod tantum abest, ut noceat, ut potius haud raro contribuat ad scopum consequendum; ast prima dosis et secunda *Emulsionis resinosaæ*, vomitu rejecta, tæniam non pellit.

D E C O C T U R A A V E N Æ.

O. Овсяныхъ крупы.

R. *Seminum Avenae sativæ* decorticatum unciam,

Aquaæ sesquilibram.

Coque ad colaturæ libram.

D E C O C T U R A C E T R A R I A E.

O. Исландского мха.

R. *Cetrariae Islandicae* semunciam,
Aquae communis sesquilibram,
coque ad libram, et sub finem coctionis addito:
Radicis Glycyrrhizae rasa drachmam, vel
Mellis puri semunciam.
Cola.

U. Cum (vel sine) lacte: morbi pulmonum asthenici; per-tussis; phthisis pituitosa; tabes; leucorrhœa etc.

D. Unciae quatuor, ter quaterve, in diem.

D E C O C T U R A C I N C H O N A E.

O. Хинны.

R. *Corticis Cinchonae contusi*, (vel in pulverem triti,) unciam,
Aquae ferventis bilibram.

Decoque in vase leniter clauso ad remanentem libram et,
liquorem adhuc calentem per vetustum linteum et rarum ex-
primendo, cola.

D. Unciae binæ, bis, ter, quater, vel sæpius de die.

Interdum sub finem coctionis adduntur:
Corticis Lauri Cassiae drachmæ duæ, vel
Extracti Glycyrrhizae glabrae semuncia, vel
Radicis Angelicae Arhangelicue drachmæ duæ, vel
---- *Aristolochiae Serpentariae* tantumdem,
---- *Valerianae officinalis* tantumdem.

Pro ratione scopi, qui intenditur, id est, si actio in nerveum,
musculare, seu vasorum systema dirigenda est, aut ratio sto-
machi, aut alvi citæ, vel coactæ, habenda, aut exhalationis
cutaneæ, singulis aut nonnullis decocturæ dosibus, vel ante
vel post ejusdem exhibitionem statim in vehiculo idoneo pro-
pinari licet:

Aetheris sulphurici alcoholisati guttas viginti, vel
---- *camphorati* guttas decem, vel

Alcoholis diluti drachmam ad duas, vel
— — — *camphorati guttas decem, vel*
Tincturae Opii guttas quinque, vel
— — — *aromaticas acidulatae guttas quindecim ad*
 triginta, vel
— — — *Valerianae aethereae semidrachmam, vel*
Subcarbonatis Ammoniae liquidi, vel
Tincturae Serpentariae drachmas duas, vel
Pulveris radicis Valerianae officinalis scrupulum, vel
— — — *Serpentariae V. grana decem, vel*
— — — *Rhei p. grana quatuor, vel*
Sulphatis Potassae scrupulum, vel
Pulveris aromatici tantumdem, vel
— — *radicis Colombae grana decem, vel*
Tincturae Guajaci guttas quadraginta, vel
— — *Cinchonae drachmas duas ad semunciam, vel*
Acetatis Ammoniae liquidi semunciam.

DECOCTURA CINCHONÆ

(per praecipitationem) CLARIFICATA.

О. Хины очищенный.

R. Corticis Cinchonae officinalis optimi, in pulverem triti,
uncias tres.

Aquae fontanae bilibram,

decoque ad remanentem libram, et liquorem vel calentem, vel refrigeratum per linteam exprimendo cola. Tunc adde *Calcariae* semunciam, ut *rubrum Cinchoninum* omne e liquore secernatur. Cola trans chartam, et in liquorem limpidum *aureum acidum carbonicum*, tam diu immitte, donec *Calcaria* omnis e decoctura fuerit præcipitata. Iterum trans chartamcola et propter saporis gratiam admisce:

Tincturae aromaticae,

Syrupi simplicis, utriusque sescunciam.

V. *Corticis Cinchonae* roborans; *lexipyreta* citra ventriculi molestias. Eximie conductit his, qui *reliqua Cinchonae* praepa-

ata respuunt, vel propter fabricam digestionis labefactam, vel propter idiosyncrasiam, vel propter fastidium e longiori Cinchonae usu exortum. Color clarus Vini vetusti et sapor gratus delicatulis placet.

D. Unciae duæ, tres, et ultra, bis, ter vel saepius de die. Hæc decoctura, (quum sit carioris pretii,) tantum militaribus præfectis præscribenda.

DECOCTURA CINCHONÆ SUCCEDANEA.

О. Хину замѣняющій.

R. Pulveris grossi corticis *Salicis albae*, vel
 ————— amygdalinae, vel
 ————— pentandrae,
 ————— *Aesculi Hippocastani*, utriusque unciam,
 ————— radicis *Acori Calami*,
 ————— *Gei urbani*, utriusque semunciam.

Coque ex aquae fontis unciis triginta duabus ad dimidias; colatura libræ exhibeatur.

DECOCTURA COLOCYNTHIDIS.

О. Колоцинтовый, или горькой тыквы.

R. Pomorum *Cucumeris Colocynthidis* exemptis seminibus incisorum drachmam, ebulliat cum aquae fontis sufficienti quantitate per sex minuta, dein colaturæ selibræ admisceto: *Aetheris sulphurici alcoholisati* drachmam, *Syrupi corticis fructus Citri Aurantii* unciam.

U. In hydrothorace (Висчнавъ) exhibito ter de die cochlari.

D E C O C T U R A F U R F U R I S.

O. О сп р у б е й п ш е н и ч н ы х .

R. *Furfuris triticei* uncias quatuor.

Aquaes communis libras duodecim,
coque ad libras novem.

Cum subsederit *furfur*, elutriandus est.

Interdum singulis ejusdem libris additur:

Mellis, vel

Syrupi simplicis uncia,

Succi Vaccinii Oxycocci, quantum satis ad gratiam.

U. Vices *Decocturae Hordei* supplet.

V. *Potus acidus mineralis*; — — *vegetabilis*.

D E C O C T U R A G A L L A R U M Q U E R N A R U M .

O. О р ъ х о в ъ ч е р н и л ь н ы х .

R. *Gallarum Quercus Cerris contusarum*, vel
— — — — *infectoriae* — — — unciam,

Aquaes purae sesquilibram,
coque ad colaturaē libram.

Sic etiam paratur: D E C O C T U R A Q U E R C U S R O B O R I S .

D E C O C T U R A G U A J A C I .

D E C O C T U M S P E C I E R U M P R O D E C O C T O C U M L I G N O

G U A J A C I . Ph. Ross.

O. Б а к а у ш о в ы й с л о ж н ы й .

R. *Specierum Guajaci compositarum* uncias tres,

Aquaes ferventis libras tres,

decoque ad remanenterē bilibram;

sub finem coctionis adde:

Radicis Glycyrrhizae drachmas duas. *Cola*.

Subinde loco *Glycyrrhizae* liquori colato additur:

Mellis despumati semuncia.

U. Myodynæ rheumaticæ; morbis cutaneis, symptomatibus philidis ægre cedentibus, apta.

V. Decoctura Guajaci cum Mezereo.

DECOCTURA GUAJACI cum MEZEREO.

O. Бакаут. съ Волчникомъ.

Fit eodem modo, ut DECOCTURA GUAJACI, addita singulis decocturæ libris corticis radicis *Daphnes Mezerei* drachma, vel

R. Decocturae Guajaci,

----- *Mezerei*, utriusque pares portiones.

Misce.

U. In iisdem, ut præcedens, morbis valet; sed efficacior in ligamentorum duritie, ossium et periostei adfectionibus, itque in ulceribus inveteratis.

D. Libra, vel sesquilibra de die datur.

DECOCTURA HÆMATOXYLI.

O. Кампешево й.

R. *Ligni Haematoxyli Campechiani rasi sescunciam,*

Corticis Lauri Cassiae drachmam,

Aquæ communis bilibram.

Lignum ex aqua decoque ad libram, sub finem coccionis addens corticem et cola.

U. *Alyus* cito protractior.

D. *Uncia* (ad duas) ter vel saepius de die datur.

DECOCTURA HORDEI.

O. Ячнóй крúпы.

R. *Seminum decorticatum Hordei uncias duas,*

Aquæ communis libras quinque.

Decoque ad dimidium et colaturæ, si lubet, adde:

Mellis despumati, vel

Oxymellis simplicis uncias duas.

U. Pro potu ordinario. Si vero huic addas *Nitratis Potassae depurati* drachmas duas, habebis: **D E C O C T U R A M H O R D E I NITRATAM**, cuius dosis erit unciæ tres, quatuor, sæpius de die.

V. Gargarisma commune.

D E C O C T U R A J U G L A N D I S.

O. Волоско-брѣховой шелухи.

R. *Corticis viridis Juglandis regiae* unciam,
adfundito:

Aquaæ ferventis libram.

Per sex horas stet in digestione, dein coquito per
quadrantem horæ et cola.

D. Sumatur partitum per diem.

U. In syphilide, nimia corporis sensibilitate continuata,
usu *Hydrargyri* immorigera.

D E C O C T U R A L A P P A E.

O. Лапушиковой.

R. *Radicis Arctii Lappae concisæ* uncias duas,
Aquaæ communis libras tres,
coque ad colaturæ bilibram.

In colata decoctura interdum solvitur *Sulphatis Potassæ* drachma, quo cuticularibus vitiis aptior fit.

U. Cutis fœditatibus obponitur.

D. Bilibra partitis vicibus in dies exhibetur.

D E C O C T U R A M A L T I.

O. Солодовой.

R. *Malti* selibram,

Aquaæ communis libras sex,

decoque ad colaturam librarum quatuor et,

si opus, pro re nata, adde:
Acidi sulphurici diluti semunciam, vel
— tartarici drachmas duas, vel
Roob baccarum Vaccinit Oxycocci, vel
Syrupi Molassis; vel
Oxymellis simplicis, vel
Succi Citri medicae uncias tres.

U. Hoc *Apozema Malti* in scorbuto, ad libitum; pro potu ordinario, propinatur; in connubio autem aliorum libra ad libram, partitis vicibus, quotidie in eundem finem exhibetur, indeque antiscorbutica paratur *Cerevisia*. Persæpe loco *decoctus infusum ejusdem propinatur.*

V. Cerevisia antiscorbutica.

DECOC TURA M ALTI COM POSITA I.

O. Солодовый сложный 1.

R. *Malti* uncias quatuor,
Specierum Pini compositarum uncias duas;
decoque ex
Aquaæ communis libris quatuor ad tres colaturæ.

DECOC TURA M ALTI COM POSITA II.

O. Солодовый сложный 2.

R. *Decocturae Malti,*
— antiscorbuticae (acidulae) pares portiones.

D. *Unciae quatuor ter quaterve de die.*

DECOC TURA M EZER E I.

O. Волчниковой.

R. *Corticis radicis Daphnes Mezerei concisi drachmas duas,*
Radicis Glycyrrhizæ glabrae contusaæ semunciam,
Aquaæ communis libras tres.
Decoque leni igne (sub finem addendo radicem Gly-
cyrrhizæ) ad bilibram et cola.

U. In fœditatibus cutis, scrofula; minime tamen syphiliti
cæ indolis.

D. Libra in dies, partitis vicibus, exhibetur.

DECOC TURA MUCILAGINEA I.

О. Слизистой 1.

R. *Gummi Acaciae verae unciam,*

Decoctione Hordei libram,

solve et adde:

Oxymellis simplicis semunciam.

DECOC TURA MUCILAGINEA II.

О. Слизистой 2.

R. *Aquæ puræ libram,*

Cornu Cervi rasi,

Gummi Acacie verae, utriusque unciam,

coque, ut solvantur et colaturæ, si lubet, addet;

Sacchari puri semunciam.

U. Diarrhœa, dysenteria, cystitis, nephritis, dysuria.

DECOC TURA ORCHIDIS.

О. Ятрышниковой.

R. *Pulveris radicis Orchidis Morionis drachmam,*

Aquæ communis sesquilibram,

decoque ad libram, addens, si lubet, sub finem cocc-
tionis:

Corticis Lauri Cassiae contusi drachmam, vel
liquori colato, si lubet, admisce:

Tincturae aromaticæ semunciam,

Sacchari albi tantumdem,

ut fiat DECOC TURA ORCHIDIS AROMATICA.

U. Diarrhœa, dysenteria etc.

DECOCTURA POLYGALÆ AMARÆ.

О. Истодовой.

- R. *Radicis Polygalæ amarae* semunciam,
Aquaæ purae sesquilibram,
coque ad libram et colaturæ interdum, si placet,
adde:
Radicis Scillæ siccatae et *pulveratæ* scrupulum,
Mellis despumati semunciam.

D. Unciæ binæ, ter quaterve de die, offeruntur.

DECOC T U R A Q U A S S I A E.

О. Квассии.

- R. *Ligni Quassiae excelsæ rasi* drachmas duas,
Aquaæ fontanae bullientis libram,
coque ad colaturam unciarum octo.

D. Uncia, (duæ,) vacuo stomacho, exhibetur.

DECOC T U R A QUERCUS ALUMINATA.

О. Дубовой корки квасцовской.

- R. *Corticum Quercus Roboris contusorum* semunciam,
Aquaæ communis libram,
coque ad uncias octo et adde:
Supersulphutis Aluminae et *Potassæ* drachmam,
Syrupi simplicis semunciam.

U. In sanguinis profluviis et symptomatibus colliquativis
morborum asthenicorum, præsertim typhi.

D. Uncia, ter quaterve de die, plus vel minus, rarius vel sæpius, ne alvus plus æquo comprimatur. Omissò *syrupo*, persæpe extrinsecus pro *lotione fomentoque* adhibetur et **GARGARI-SMA ANTISEPTICUM** ingreditur.

DECOC T U R A SALICIS COMPOSITA.

О. Вербной корки сложный.

- R. *Corticis Salicis concisi* drachmas novem,
Radicis Gentianæ luteæ contusæ drachmam,

Aquaes sesquibram,
decoque ad libram.

Interdum *corticis Quercus Roboris* drachmæ duæ
addi possunt.

Succedanea DECOCTURÆ CINCHONÆ.

Eadem citra additamentum *Quercus* facta, cum aliis, quorum
penes DECOCTURAM CINCHONÆ mentio injecta est, adposi-
te consociari potest.

D E C O C T U R A U L M I .

O. Илимовой корки.

R. *Corticis interioris Ulmi campestris incisi unciam,*
decoque ex
Aqua fontis libra ad selibram.

D. Selibra bis terve per diem in foeditatibus cutis.

E L Ä O S A C C H A R U M C A R V I .

Элеесахаръ шминной.

R. *Sacchari puri pulverati semunciam,*
Olei Cari Carvi guttas duodecim,
misce.

Eodem modo parantur:

Elaeosaccharum Pimpinellae Anisi, Эл. аниской,
— *Anethi Foeniculi, — Волоскоукропной,*
— *Menthae crispaе, — Кудрявомяпной,*
— *Menthae piper. etc. — Перечномяпной.*

U. Pulveribus variis junguntur Elaeosacchara in genere ad
parandas ejusdem nominis aquas extemporales. Quantitas Elaeo-
sacchari cuiuslibet, supra posita, sufficit ad parandam aquas ejus-
dem qualitatis libram, cui semuncia *Alcoholis diluti* (conser-

vationis causa,) additur. Videsis: AQUAM CARVI, ex tempore parabilem.

E L E A O S A C C H A R U M C H A M O M I L L A E.

Э л е е с а х а р ь р о м а ш к о в о й .

R. *Sacchari albi unciam,*
Olei M. Chamomillae guttas viginti.
Misce, fiat pulvis.

D. Drachma vel sicilicus (drachmæ duæ) pro dosi.

U. In enterodynæ spasmodica, flatulenta.

E L E C T U A R I U M S E N N A E.

К а ш к а С е н н ы с л а б и ш е л ь н а я .

R. *Pulpa fructus Pruni domesticae sescunciam,*
Pulveris foliorum Cassiae Sennae sesquidrachmam,
Supertartratis Potassæ pulverati semidrachmam,
Mellis despumati drachmas sex.
Misce fiat electuarium.

E M P L A S T R U M A D S T R U M A M.

П л а с т ы р ь о т ь з о б ა , и л и с к у л ь н ы й .

R. *Emplasti Oxydi Plumbi saponati semunciam,*
Submuriatis Hydrargyri subtilissime pulverati drach-
mam,
Tartratis Stibii et Potassæ pulverati grana decem.
Malaxetur exacte.

U. Super alutam extensum strumæ admovetur, haud secus
 ac cynanche parotideæ, *Mumps* a Caledoniis dictæ. Videsis:
PULVEREM SPONGIA COMPOSITUM, TROCHISCOS EJUSDEM
COMPOSITOS et LINIMENTUM BILIS SALINUM, subsidia-
 riæ in curatione strumaticorum opem latura.

EMPLASTRUM CONII.

П. Омеговый.

R. *Cerae flavae libram,*
Olei olivi selibram,
Balsami pineo-laricini uncias quatuor,
leni igne colliquefactis, colatis ac paulo refrigeratis,
adde:
Succi Conii spissati uncias tres,
Herbae ejusdem pulveratae uncias quatuor.
Malaxentur et fiat emplastrum.

V. *Emplastrum Conii compositum.*

EMPLASTRUM CONII COMPOSITUM.

П. Омеговый сложный.

R. *Emplastri Conii,*
gummiresinosi,
Suboxydi Hydrargyri nigri, singulorum se-
munciam,
Camphorae drachmam,
Tartratis Stibii et Potassae pulverati semidrachmam.
Malaxentur, fiat emplastrum.

U. In arthrodynia, arthritide, in primis podagra, in myodynia rheumatica, parti affectae admovetur; in pertussi inter scapulas, in agalactia maimmis, dein etiam ad provocanda retrograda exanthemata valet, multiplici experientia probatum. Sine Camphora et Tartrate Stibii et Potassae fiet quidem simplicius *emplastrum*, sed tumoribus asthenicis et induratis accommodatus.

EMPLASTRUM GALBANI STIBIATUM.

П. Галбано-сурьяный.

R. *Gummiresinae Bubonis Galbani,*
Heraclei gummiferi,

Balsami pineo-sylvestris,
Cerae flavae, singulorum unciam,
Tartratis Stibii et Potassae pulverati semidrachmam,
commisce, ut fiat emplastrum.

Huic, pro re nata, *Camphora, succus Hyoscyami spisatus, pulvis Lyttae* etc. addi possunt.

U. In myodinia rheumatica, paralysin minante, arthrodynia variisque frigidis, vulgo dictis tumoribus, etc. *Emplastrum* hoc, super alutam extendendum, parti corporis denti admovetur et, dum, vel prolico sudore, vel ob alienam causam, decidit, renovandum est.

EMPLASTRUM GUMMIRESINOSUM.

EMPLASTRUM GUMMOSUM. *Ph. Ross.*

П. Камедо-смолистой.

R. *Emplastri Oxydi Plumbi* partes duodecim,
Gummiresinae Heraclei gummiferi,
Bubonis Galbani,
Balsami pineo-laricini, vel
pineo-sylvestris, singulorum partem.

Prius gummiresinas in balsamo pineo-laricino liquefactas, per linteum cola, dein in *emplastrum*, probe movendo, commisce.

U. Tumores glandularum atonicos (*ægre abscedentes*,) fūnculos, abscessulos, abscessus, verrucas, clavos et similia posenter resolvit aut maturat.

EMPLASTRUM LYTTÆ.

П. Шпанскихъ мухъ.

R. *Emplastri simplicis* partes quatuor,
fuso sub jugi motu inspergito:
Lyttae vesicatoriae pulveratae partem.
Refrigera.

Hujus *emplastri* vices supplet *emplastrum T. Meliloti* super alutam, vel *pulmentum panis secalini* super linteum extensum *pulvereque Lyttae vesicatoriae* respersum, et haud raro citius eundem exserit effectum. Pars tamen, cui admovendum est *emplastrum*, *pulvere Lyttae* respurgendum, primo *Aceto* perficitur, quo facilius actionem suam producat, dein per decen circiter horas admotum relinquatur.

E M P L A S T R U M M E L I L O T I .

П. Д о н и н и к о в о й .

R. *Resinae balsami pineo-sylvestris* bilibram,
Adipis suillae depuratae,
Cerae flavae,
Pulveris herbae cum floribus T. Meliloti, singulorum
libram.

Cölliquescentibus cæteris in finem pulvis addatur;

U. Remoto *Lyttae* *emplastro* hoc imponitur.

E M P L A S T R U M O X Y D I P L U M B I .

E M P L A S T R U M L Y T H A R C Y R I I Ph. Ross:

П. Г л е ш н ы й .

R. *Oxydi Plumbi semivitrei* pulverati partem;
Olei olivi, vel
Adipis suillae; vel
Alterius congrui partes duas.

Coque leni igne, addens sub initium et identidem *aquaep tepidae* pauxillum (præcavendæ combustionis ergo,) et assidue agita, donec oleum *oxydumque* in emplastrum coiverint. Dum liquescunt, enitendum est, ne mistura, plus æquo, calefiat. Si ad quinque partes *emplastri* hujus, *Resinae balsami pineo-sylvestris* additur pars; **E M P L A S T R U M O X Y D I P L U M B I R E S I N O S U M** (*Emplastrum udhuesivum*) habebis.

U. Ad cavendas partes vulneratas, ulceratas et excoriatas ab aëris noxio contactu, ad siccanda ulcera saniosa et flaccida, ad

restum nimium et inflammationem in ambustis et erisypelate mitigandum, maxime idoneum est.

V. *Emplastrum gummiresinosum*, et sequens.

EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI SAPONATUM.

II. Г л е ш н о - м ы л ь н о й .

R. *Emplastri Oxydi Plumbi* partes quatuor,

Saponis sebaci partes duas,

Muriatis Ammoniae pulverati partem.

Sapone et *emplastro* simul liquefactis et semirefrigeratis *Murias Ammoniae* subtilissime tritus addatur.

Hoc emplastrum illico, simulac factum est, parti adfectæ superdetur.

U. Fungus articulorum aliive tumores asthenici, vulgo frigidí sic dicti, ejus admotu curationem recipiunt.

V. *Emplastrum ad strumam*.

EMPLASTRUM SIMPLEX.

II. п р о с т о й .

R. *Ceras flavae* partes tres,

Adipis suillae depuratae partes duas,

Resinae balsami pineo-sylvestris partem,

colliquefacta misce.

V. *Emplastrum Lyttæ*.

EMPLASTRUM SUBOXYDI HYDRARGYRI.

EMPLASTRUM MERCURIALE Ph. Ross.

II. Р т у ш н ы й .

R. *Hydrargyri depurati* libram,

Balsami pineo-laricini, vel

— *pineo-sylvestris* uncias duas,

tere simul, donec globuli *Hydrargyri* prorsus

disparuerint, deinde addito:

Emplastri Oxydi Plumbi, lento igne liquati, libras
duodecim,

Misce.

V. Lymphatica vasa stimulans, actionem eorum promovens, cum *Tartrate Stibii* et *Potassae* est irritans, calefaciens, solvens, plerumque pustulas movens, derivans.

U. Variis indurationibus asthenicis idoneum, ita etiam myodyniae rheumaticæ, strumæ, hydrarthro et similibus Si singulis hujusce *emplastri* unciis semidrachma *Tartratis Stibii* et *Potassae* additur, vis ejusdem intenditur, fitque quibusdam morbis aptius et tunc habebis: **EMPLASTRUM SUBOXYDI HYDRARGYRI STIBIATUM.**

EMULSIO PHOSPHORATA.

Эмульсия фосфорная.

R. *Phosphori* sesquigranum,

Olei amygdalini, vel

— *olivi* semunciam.

Commista in aqua fervida saepius agitando, donec omnes *Phosphori* globuli disparuerint, digere et solutioni adde, sensim terendo:

Mucilaginis gummi Acaciae verae sescunciam,

Aquae aromaticae cuiuslibet uncias duas,

ut fiat lege artis, emulsio, cum *Syrupi simplicis* semuncia, rite edulcoranda.

D. Omni quadrante horæ, vel semihora exhibeatur semuncia ad unciam; caute tamen. (Semuncia sextam grani partem *Phosphori* continet.)

EMULSIO RESINOSA COMPOSITA.

Э. Смолистая сложная.

R. *Resinae Convolvuli Jalappae*,

Gummiresinae Stalagmitidis Cambogiooidis,

Submuriatis Hydrargyri, singulorum grana decem.

Conritis exactissime cum *Sacchari* drachmis duabus
et cum *Vitello* recentis ovi subactis, addito successivo:
Olei pineo-laricini semunciam,
Aquae Menthae piperitaæ unciam.

Sumto PULVERE ASPIDII COMPOSITO, et præterlapsis ho-
ris duabus, dosis hujus emulsionis bipartita secunda quaque
hora exhibeat, ac post singulas alvi ductiones sorbeatur va-
sculis infusum florum *Tiliae europaeaæ*, vel foliorum viridium
Theæ Boheæ. Armigeris, haustus aquæ frigidae magis ad-
huc expedit, quum citius tæniam pellat, et obortam nau-
seam compescat. Videsis: DECOCTURAM ASPIDII COMPO-
SITAM.

E X T R A C T A P L A N T A R U M.

Экстракты производственные.

Partes plantarum, ut: *Cortices*, *flores*, *folia*, *herbae*, *ligna*, *ra-
dices*, *stipites*, aut *decoctione*, aut *infusione* prægressa, evaporatio-
ni exponuntur, atque in massam debitæ crassitudinis den-
santur.

Q. Præparatio extractorum, pro natura, et *Vegetabilis* diver-
sitate, variat. *Mucilago*, principium *scytodepsicum*, *saccharinum*,
extractivum, et partes *salinae*, adhibita per se aqua extrahun-
tur, avolante *volatili*; resina vero *Alcohol*.

V. Eadem ac simplicium, unde sumuntur; vix tamen omnibus
Vegetabilis qualitatibus et virtutibus, gaudent; fit enim elemento-
rum, sub præparatione reactio, cui auctior temperatura, humi-
ditas, aër athmosphæricus, ejus oxygenii absorptio, (aut alieni
cujuslibet,) succurunt.

I. EXTRACTA DECOCTIONE SPISSATA.

І. ЭКСТРАКТЫ ВАРЕНИЕМ СГУЩАЕМЫЕ.

Plantarum, fixo amaro, vel adstringente principio prædicta-
rum partes, contunduntur, aut inciduntur, et ex octuplo aquæ

per semihoram, et ultra, coquuntur leni igne; aquam novam quantitate, repetitis vicibus addendo, et coquendo, donec inodora, et insipida fuerit. Liquor tandem per laneum pannum filtratus, in adparatu idoneo (Cacabo stanneo capaciori minime profundo, in balneo aquae,) evaporationi ad lenem ignem exponitur, in debitam, sub continuo motu, crassitudinem, melis densandus. — Ita parantur sequentia:

EXTRACTUM CORTICIS CINCHONÆ OFFICINALIS.

(C a l i d e p a r a t u m.)

2. Х и и ы.

U. Quoniam *aromaticæ* partes, in extracto inspissando, avolant, hinc adcommodum est hoc *extractum*, et haud raro acceptum, repugnanter *corticem* in alia forma sumentibus, vel ubi leniter tantum roborare expedit, ut, e. g. in diarrhœis, ventriculi infirmitate sub usu *soteriarum aquarum*. Datur etiam in aliis morbis, infantibus, raro aliam admittentibus formam. Magna illud pollet efficacia, quod methodo GARAYANA per triturationem cum *aqua* elicetur, hujus drachmam esse efficaciorum, quam consueti, binas tresve, QUARINUS adfirmat.

D. Nostrum extractum a semiscrupulo usque ad semidrachmam porrigitur, solviturque, vel *liquore* quodam *salino*, vel *aqua destillata*, vel *Vino*, vel in forma *pilarum* porrigitur.

EXTRACTUM CORTICIS CLUTIÆ ELUTHERIÆ.

2. К л у ц і и; — К а с к а р и л ь н и й.

U. Extractum hoc, in Norico tractu, encomio APINI Altornini, celebritatem consecutum, diarrhœæ, lienteriæ, leucorrhœæ, blennorrhœæ etc., in primis obponitur. Est cari pretii, ac proinde in praxi militari rarius adhibendum.

D. Porrigitur a scrupulo usque ad semidrachmam, vel in *aqua* solutum, vel *pilarum* forma.

EXTRACTUM CORTICIS SALICIS ALBÆ.

Э. В е п л о в о й к о р к и.

U. In praxi militari pro succedaneo haberri potest *extracti* *inchonae officinalis*, atque in variis morbis, ubi adstringere, et robore opus est, adhiberi, præterea pro ulceribus pulmonum (WELSCH) laudatum.

D. Grana decem (ad quadraginta) exhiberi possunt.

EXTRACTUM FOLIORUM JUGLANDIS REGIÆ.

Э. В о л о с к о - о р ё х о в ы х л и с т о в ь.

U. Extractum hoc, præter roborantem, vim anthelminthicam exserit. Drachmæ ejusdem duæ, in uncia aquæ *Cinnamomi* solvuntur, atque ab initio biennibus, vel triennibus puellis ochlear parvum; senioribus vero, a dimidio usque ad integrum cochlear majus porrigitur, et si, post triduum nulli preceunt lunbrici, *catharticon congruum*, subjungitur. Consulte tiam additur *gargarismatibus* ad roborandas palati debilitatas partes, imo etiam *codem diluto* non male deligantur phageænica ulcera.

V. *Mistura Juglandis.*

EXTRACTUM FOLIORUM MENYANTHIDIS TRIFOLIATÆ.

Э. В а х ш ы т р и л и с т н о й.

U. Eandem, quam ipsa *herba*, in forma pressiori, habet efficaciam, ejusque multo vulgarior est usus.

D. A decem, ad triginta grana, exhibentur.

EXTRACTUM HERBÆ ACHILLEÆ MILLEFOLII.

Э. Тысячелистника.

U. In hypochondriasi bonum præstat auxilium, et inflationem levando, et spasmos leniendo, præsertim extracto *M.*

Chamomillae junctum. Conducit etiam iis, qui nocturnis pollutionibus vexantur et tum consulte ei additur: **TINCTURA AROMATICA ACIDULATA** (seu *sulphurica*.) Cetera vide de **ACHILLEA MILLEFOLIO**.

D. Datur a granis quindecim usque ad semidrachmam.

EXTRACTUM HERBÆ ARTEMISIÆ ABSINTHII.

Э. П о лынной травы.

U. Fragrantia, quam *planta* possidet, privato, sola amari-ties superest, haud multum ab *extracto Gentianæ Centaurii* discrepans. E diurno ejusdem usu, *lac puerarum* instar *bilis amarum*, et infanti exstissee noxium, **BORRICHUS** ob-servavit; **LINNÆUS** vero confirmavit. *Splanchemphraxy*, hypo-chondriasi, hydropisi, cachexiæ, helminthiasi, acholiæ etc., convenit.

D. Exhibitetur a scrupulo dimidio ad integrum, vel in for-ma *pilularum*, vel cum *liquido* quodam, e. g. *Acetate Potassæ liquido*, vel etiam *aqua* quapiam *aromatica* solutum. Extus ad-motum mitigat graviora helminthiaseos symptomata, vermesque necat.

EXTRACTUM HERBÆ CENTAUREÆ BENEDICTÆ.

Э. В олчца кудряваго.

U. Videsis: **CENTAUREAM BENEDICTAM**.

D. ——————

EXTRACTUM HERBÆ FUMARIÆ OFFICINALIS.

Э. Травы дымянки.

U. Hoc leniter amarum extractum, præter amaritudinem, indole saponacea, conspicuum, in iisdem morbis, quibus plan-ta obponitur, claret; præcipue vero in psora efficax.

D. Scrupulum.

EXTRACTUM HERBÆ GRATIOLÆ OFFICINALIS.

Э. Дикаго Аврана.

U. Videsis: GRATIOLAM OFFICINALEM.

D. ——————

EXTRACTUM HERBÆ MARRUBII VULGARIS.

Э. Бэлой Шандры.

U. Præcipue ad pituitosos pectoris adfectus conductit. In ipsis pulmonum abscessibus, inter alios quidem cl. НАЕНІУС illud laudavit. Nec in splanchemphraxy abdominali, ictero pertinaci, hydropisi incipiente, aliisque stasium abdominalium sequelis, vana est in illo spes collocata, quod tum aliis extractis, tum Acetati Potassae liquido etc., jungitur.

D. A graniis quindecim ad drachmam.

EXTRACTUM LIGNI HEMATOXYLI CAMPECHIANI.

Э. Лазореваго дерева; — Кампехай.

U. In diarrhoea refractariola et dysenteria Britannorum encomiis ornatum; sed nonnisi declinante (dysenteria) admittendum, ubi debilitati intestinalium succurrendum est. Videsis: НЕМАТОХИЛОН КАМПЕЧИАНУМ.

D. Drachmas ejus tres in aquæ Cinnamomi uncia sesquialtera et aquæ fontis septem unciis, addito Tincturae Catechu sicilico solverat cl. PRINGLE, cuius misturae quarta quaque hora duo cochlearia capta, juncto subinde vesperi Opio.

D. DUNCAN in dysenteria protracta, scrupulum ejus, terde die, in congrua potionē exhibuit subjuncto clystere opiatō. Extractum hoc aqua, e. g. Menthae crispae, ea proportione, ut ejus drachma, hujus unciam intret, solutum, omnino prodest, si solutionis hujus cochlearia tria quotidie

propinentur (BALDINGER.) Si per se dandum est, scrupulum (ad duo) sufficit.

EXTRACTUM LIGNI QUASSIÆ EXCELSÆ.

AMARÆ.

Э. Квассии.

Eadem vi pollet, qua *lignum*. Præfectis solum militaribus si opus fuerit, præscribendum, est enim cari pretii.

D. A granis quinque ad semidrachmam, in *pilularum* ve
elixirii forma, vel etiam cum *Vino* solutum, datur.

EXTRACTUM NUCIS STRYCHNI VOMICÆ.

Э. Чилибухи.

U. Formula, quæ ad ill. HUFELANDUM refertur, habet: *Extracti Strychni nucis vomicæ* grana decem, *Mucilaginis gumm Acaciae verae* unciam, *Aquaæ fontis* selibram, eaque soluti secunda quoque hora, duobus cochlearibus, sumitur, in dy senteria ab eodem laudata. Videsis: STRYCHNUM NUCEM VOMICAM.

D. Granum ejusdem exhibere sufficit.

EXTRACTUM RADICIS CICHORII INTYBI

Э. цыхорного корня.

U. Idem ac CICHORII INTYBI.

EXTRACTUM RADICIS GENTIANÆ LUTEÆ.

Э. желтой Горечавки.

U. Extractum hoc est peramarum, admodum calidum, obponitur ventriculi vitiis, a debilitate, et prædominante acore ortis. Convenit cum eo *extractum Menyanthidis trifoliatae*, nisi quod non tam calidum sit; loco autem *extracti Quassiae cariores*, merito in usum trahi potest.

D. A granis quindecim usque ad semidrachmam porrigitur.

EXTRACTUM RADICIS GLYCYRRHIZÆ GLABRÆ.

EXTRACTUM LIQUIRITIAE Ph. Ross.

2. Солодковато корня.

Q. Forma venit subcylindrica, longitudine sex pollicum, crassitie unius, vel majori, foliis laurinis obvolutum, in fractura splendens. Rejiciatur *empyreuma* sapiens, vel olens, et quod *Cupro* inquinatum est.

V. Videsis: GLYCYRRHIZAM GLABRAM.

U. ——————

EXTRACTUM RADICIS KRAMERIAE.

3. Крамерии.

Methodo DON HYPOLITI RUIZ, (primarii quondam in expeditione Peruviana scientifica, Regis Hispaniae Botanici, cui cognitionem virtutum KRAMERIAE debemus) paratur ita: Radices collectæ, elotæ, et concisæ macerantur in aquæ partibus sex pondere, coquunturque igne libero, donec aquæ valde coloretur. Liquido decantato, iterum eadem aquæ quantitas, adfunditur, et recoquitur eosque, dum omnes partes extractivas, solutas esse, adparuerit. Liquores seu tincturæ collentur per materiam laneam, et ad consistentiam mellis liquidæ evaporentur. Extractum ab igne remotum vasis idoneis calori solis exponatur, quoad durum et friabile gummiresinae *Aloes* adinstar evadet, purum, pellucidum, coloris intense rubri extracto *Pterocarpi Draconis L.* (*Sangvini Draconis Ph. Regn. Pol.*,) valde simile; a quo tamen majori friabilitate, qualitate styptica, et amaritudine internoscitur, sub masticatione dentibus non adhæret, igne adspersum sine fusione consumitur nullumque odorem oleosum neque resinosum sensibilem edit. E radicibus recentibus paratum præferendum, est illi e siccis, uti et aquosum, alcoholeo.

D. Scrupuli duo in aquæ unciis tenuiter soluti, aliquot

guttis *Acidi acetici*, vel *Citri medicae* admistis, post sex hora repetendi, bis in diem propinuantur.

EXTRACTUM RAD. LEONTOD. TARAXACI.

Д. Одуванчика.

Iisdem virtutibus, quibus ipsa planta gaudet. In reserandi obstructionibus præstans, ita est exemplum hepatemphraxeos eo et superbibita *mulsa sublatæ*; tuberculis etiam pulmonum cum successu obponebatur. Nec extractum liquidum laude sua orbandum, fitque sequenti ratione:

R. Radicis L. Taraxaci recentis libras duodecim,
conclide et contunde in mortario ferreo,
dein adde:

Aquaæ communis libras sex.

Exprime succum, post unicam ebullitionem in vase stanneo colandum, lenique calore, ad spissioris *syrupi* crassitudinem redigendum.

D. Cochlear (vel duo) saepius de die porrigitur.

EXTRACTUM RAD. RHEI PALMATI.

Д. Ревенного корня.

U. Cathartica vi cedit pulveri. In diarrhœa, duo vel tria ejusdem grana, pilularum forma cum cochleari *Aquaæ Cinnamomi* exhibentur; in leucorrhœa vero exiguae tantum doses conferunt. Si suspicio syphilidis subfuerit, exigua *Submuriatis Hydrargyri* quantitas non male subjungitur.

EXTRACTUM RADICIS TORMENTILLAE ERECTÆ.

Д. Завязного корня.

U. Ubique adhiberi potest, ubi *Succus EUCALYPTI SPISATUS* indicatur.

D. A quinque ad decem grana exhibentur.

EXTRACTUM STIPITUM SOLANI DULCAMARÆ.

Э. сладкогорькаго Паслёна.

D. A quinque ad decem grana dantur.

II. EXTRACTA INFUSIONE SPISSATA.

ЭКСТРАКТЫ НАЛИВАНИЕМЪ СГУЩАЕМЫЕ.

Plantarum, adstringente, vel amaro, mixto cum volatili, vel volatili aromatico, acri aut narcoticō principio, præditarum partes, inciduntur, vel in pulverem rediguntur, atque ferventis aquæ vel frigidæ circiter octuplo, probe triturantur, aquam, partitis vicibus, addendo, et effundendo, donec inodora et insipida fuerit. Dein liquor in vase prædicto duplici fundo, atque ejus intermedio spatio solutione Muriatis Sodaæ aquosa repleto, evaporationi super ignem et sub continuo ejus, ope lignæ, vel vitreæ spathulæ motu, in debitam crassitudinem densatur. Ita parantur sequentia:

EXTRACTUM CORTICIS CINCHONÆ OFFICINALIS.

(*Frigide paratum.*)

Э. Х и н ы.

EXTRACTUM CONORUM HUMULI LUPULI.

Э. Х м ъ л я.

D. Grana quinque, quindecim, in forma pilularum, vel in quolibet vehiculo aquoso.

EXTRACTUM FLORUM ANTHEMIDIS NOBILIS.

Э. Римской Ромашки.

U. Videsis: ANTHEMIDEM NOBILEM.

EXTRACTUM FLORUM MATRICARIAE CHAMOMILLÆ.

Э. простой Ромашки.

U. Extractum hoc, *floribus* ipsis, **I. P.** descriptis, præsertim ratione virtutis anodynæ, et antispasmodicæ, postponi posse existimatur; robورans tamen, et antisepticon præbet egregium, febribus in primis bilioso-putridis, variis diarrhoeis, et stomacho adcommodum; nec male in splanchemphraxi abdominali exhibetur, additurque summa cum euphoria aliis resolventibus.

III. EXTRACTA ALCOHOLISATA S. GUMMEO-RESINOSA.

ЭКСТР. СПИРТНЫЕ, ИЛИ КАМЕДО-СМОЛИСТЫЕ.

EXTRACTUM CORTICIS CINCHONÆ OFFICINALIS.

EXTRACTUM CHINÆ SPIRITUOSUM, S. GUMMEO-RESINOSUM.

R. *Corticum Cinchonae officinalis*, grosso modo pulvulatorum, libram,

Alcoholis diluti bilibram,

Aquæ communis libras quatuor.

Digere in phiala vitrea leniter clausa et in balneo arenæ posita, per triduum; massam exprime, et e liquore colato *Alcohol* destillatione elice. Residuum in patina evaporatoria, vel cacabo aheneo *Stanno* obducto, leni calore sub perpetua agitatione evapora ad extracti spissitudinem. Eodem modo parantur sequentia:

EXTRACTUM CORTICIS CITRI AURANTII.

Э. Померанцовой корки.

U. Eadem virtute pollet, qua *cortex Citri Aurantii*. Agit debilius, quam *cortex*, idque una tertia parte. *Eo* in militari praxi possumus carere.

EXTRACTUM CORTICIS RHOIS COTINI.

Э. корки желтниковой.

D. ab $\frac{1}{4}$ grani parte ad granum gradatim adscendendo datur.

EXTRACTUM HERBÆ TANACETI VULGARIS.

Э. травы дикой Рябины.

D. a decem granis ad scrupulum.

EXTRACTUM PULPÆ CUCUMERIS COLOCYNTHIDIS.

Э. мякоти Колоцинтовой.

U. In paralysi et alvi obstipatione commendatur.

D. Granum (ad tria) porrigitur.

Sic parantur etiam: **EXTRACTUM RADICIS ACORI CALAMITI.** Э. корня Касапика. **EXTRACTUM RADICIS COLOMBÆ.** Э. к. Колюмбы. **EXTRACTUM RADICIS GEI URBANI.** Э. к. Гребника. **EXTRACTUM RADICIS INULÆ HELENII.** Э. к. Девесила. (*Decocitura radicis inferius.*) **EXTRACTUM RADICIS VALERIANÆ OFFICINALIS.** Э. к. Мяуна. (Patum virtutis e *radice* continet.)

EXTRACTUM TURIONUM PINI SYLVESTRIS.

Э. Сосновых шишечек.

D. Grana decem, ad semidrachmam.

IV. EXTRACTA PECULIARITER PARATA.

ЭСТРАКТЫ ОСОБЕННО ПРИГОТОВЛЯЕМЫЕ.

EXTRACTUM AMARUM.

Э. Горький.

R. Herbae *Artemisiae Absinthii*,—— *Menyanthidis trifoliatae*,Radicis *Gentianae luteae*, singulorum quantum lubet.

Concisa coquæ ad perfectam extractionem in aquæ communis sufficienti quantitate post colaturam expressionemque residui, decoctura exponatur evaporationi, ut fiat leni igne debitæ consistentiæ extractum.

D. A granis decem ad triginta per se, aut aliis congruis additum, exhibetur.

V. Alcohol dilutum amarum; — — — antiscorbuticum.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

Э. Колоцинтовой сложный.

R. Pulpæ fructus *C. Colocynthidis* comminutæ drachmas sex, Gummiresinae *Aloës perfoliatae* contritæ sescunciam, — — — *Convolvuli Scammoniae* contritæ semunciam, Seminum *Amomi Cardamomi* contritorum drachmam, Alcoholis diluti libram.

Macera leni calore pulpam per quatriduum in Alcoholè et colato liquori adde Gummiresinas; dein vero consumatur Alcohol, quoad aptam habuerit spissitudinem, tandem semina admisceto.

V. Pilulae *Colocynthidis ferratae*; — — stibiatae.

EXTRACTUM FERRI POMATUM.

Э. Железояблочный.

R. Ferri limati partem,

Succi pomorum acidulorum partes quatuor.

Stent in digestione, in loco tepido per aliquot dies in vase

ferreo; post sufficientem oxydationem *Ferri*, coquantur perpetuo motu cum spathula ferrea, leni igne ad dimidiæ partis consumtionem. Liquor per linteum colatus, ad extracti molles consistentiam spissatus reponatur.

U. In amenorrhœa, chlorosi, nevroblacia, languido humorum motu, febris intermitentibus quartanis, helminthiasi etc. *Aquaes Cinnamomi vinosaæ* partes sex cum parte ejusdem **TINCTURAM FERRI POMATAM** constituant.

D. A granis decem ad scrupulum in forma pilularum.

F E R R U M L I M A T U M.

Ж е л ѣ з н ы е опилки.

R. *Ferri purissimi* ab omni heterogeneo liberi, quantum lubet,

Limae ope ex ferro in pulverem subtilissimum redigatur.

Q. Hic pulvis, ut medico usui sit idoneus, debet esse subtilissimus, metallice nitens, atque in *acidis* multum *gaz hydrogenii* evolvendo, solubilis, vasisque vitreis probe obturandis servetur; ferruginem enim percessus damnatur haud immerito. Continere *Cuprum*, colore cœruleo cognoscitur, quem *Ammonia* cum eodem digesta, consequitur.

V. Interne sumtum, vim tonicam adstrictoriam in fibram muscularem exserit, receptum in sanguinem incitantem ejus vim auget, ruborem eidem majoremque consistentiam conciliat, calorem vernaculum, sub nascente purpureo, eoque amæno oculis, genis, labiis, gingivis colore, auget, totum, increscente muscularum energia, roborat organismum, festinatis dein arteriarum micatibus, et accelerato sanguinis motu, caliturnum.

U. *Ferrum* generatim utilitatem promittit in diuturnis apyretisque vitiis, vi adsimilativa labefactata, sine ullo vis sensiferæ augmento, pronatis. Torpor digestionis, cum cruditate, et ad acorem continua propensione; habitus frigidus, spongiosus, tumidus, pallidus, pulsuum languor et tarditas, aquoso-

rum humorum, vel congestorum in cellulari tela, vel excretorum copia, et id genus alia, usum ejus præprimis exigunt. Vires solidorum per morbos, ærumnas, improbos labores, multifariam intemperantiam, præsertim venereum, aut cynædorum, labefactatas fractasque, imo ipsas genitales, restaurat. Cum primis utile est superata febri inflammatoria, nervosa, aut putrida, cum *cortice Cinchonae officinalis* in *vinoso infuso*, aut intermittentē dein protracta (*BORSIERI*) aut myodynæ rheumatica, vel arthrodynia (toilendæ superstitis ligamentorum, et muscularum debilitatis causa,) aut dysenteria, vel hæmorrhagia quavis etc. In dialeipyra, si e torpore digestionis, et laxitate vasorum originem trahit, quadantenus vim lexipyretam sortitur. Laudatur etiam in asthenicis sanguinis profluviis; in hæmatemesi tamen ab initio alienum est, nec nisi remittente ejusdem vehementia, cum debilitas superest, atque spasmodicus ventriculi, et abdominis status persistit, et tum conjungitur cum *anodynīs*, et *aromaticis remediis*, ut *cortice L. Cinnamomi*, *fructu A. Cardamomi*, *ligno Quassiae excelsae*, *radice Colombæ*, *cortice Cinchonae off.* etc. in hæmorrhœa uteri, puerperarum vel abortientium, menorrhœa, hæmorrhoidæ, blennorrhœa (gleet,) leucorrhœa muliebri, diuturna gonorrhœa (stillicidio geniturae,) atrophia infantili, rachitide, colluvie pituitosa, qua lumbrici generantur, ictero, phthisi, scrofula, struma a pluribus laudatur. In scorbuto etiam expedit, præsertim, si ulcera cutanea produxit. Roborando vasa hæmatophora circulationem sanguinis excitat, quo multis malis, ex hoc fonte promanantibus, occurrit, ita leucophlegmatiæ, chlorosi (*SYDENHAM*, *VAN SWieten*,) hydropisi a torpore vasorum absorbentium, vel jactura sanguinis, aliorumque humorum, ortæ, aut qua interdum chloroticae laborant, tympanitide. Non male datur in convulsionibus, sic in epilepsia vincenda *Valerianæ* potentiam auget (*LETTSOM*,) in scelotyrbe asthenica aut verminosa (*WENDTII* suasu) itidem cum *Valerianæ off.* radice conjungitur. Adversus vermes intestina occupantes, ipsam adeo

nterum tæniam, et enterodynamiam helminthicam adhibitum DARLUE.) Philadelphiæ Medicus RUSH limatum *Ferrum* cum nelle propinavit; si vero, quod interum evenit, alvus comprimitur, pulverem *radicis Convolv.* *Jalappæ* subjunxit. In helminthiasi tanto certius vim suam exserit, si laxior simul ventriculi compages, et acida primarum viarum saburra obtinet. Tolluntur *Ferro noxiæ Hydrargyri* sequelæ. Nec assimilis est forma *Ferri* in *aqua*, qua ferrarii fabri *candens ferrum* extinguunt. Hæc, et *ferro oxydulato*, et *aëre hydrogenio* abundans, pro *balineis* adhibita, permeat corpus, idque confirmat, hinc in nutritionis labe, in arthrodynia anomala, et colluvie pituitosa salutarem præstat effectum. Bonum est indicium, si sumto *ferro*, nec comprimitur alvus pertinaciter, nec resolvitur (JAHN,) sed persistit modus ejusdem naturæ consentaneus, reddunturque excrementa nigro colore imbuta. Alienus est *Ferri usus* urgente febri, vi arteriarum musculorumque concitata, hinc etiam vetat eum plethora, quævis inflammatio, sanguifluxus sthenici, suppuratio, et ulceratio, nimia vasorum energia, vigens. Abstinendum etiam a *Ferri* usu, ubi tensa nimis fibra est, vis sensifera auctior, subortis etiam spastibus, hinc hypochondriacis, et hysterics prudenter dandum. Neque etiam alvo adstricta, et quum stomachus, et intestina sordibus scatent, aut status paralyticus, vel splanchemphraxis male habent, concedendum.

D. *Ferrum limatum ex aqua humoribusque gastricis, et intestinalibus oxygenes* adtrahit, avolante in speciem aëriformem *hydrogene*, hinc ructus flatusque nidorosos haud raro usum excipiunt, quapropter non male eidem flores *Matricariae Chamomillæ*, *cortex Citri Aurantii*, et *herbarum extracta amaro-aromatica* adduntur. Granis duobus tribusve subsistere oportet bis de die, largius enim, aut protracto usu sumto, ingratae sensationes puta: anxietas, æstus, insomnia, cephalæa, opresiones ventriculi et interum hæmorrhagiæ exoriuntur. Convalescentibus, labante digestione, pulveris forma cum *radice Colombæ, Gentianæ luteæ, et cortice L. Cinnamomi* datur.

In dialeipyra diurna, pituitosa colluvia stipata, cum cortice *Cinchonae* off. *Floribus M. Chamomillae*, *Muriate Ammoniae*, in menostasia cum diurna blennorrhœa, cum *Muriate Ammoniae*, *Sapone stibiato*, radice *Rhei palmati*, gummiresina *Myrræ*, in hæmorrhoida mucosa cum bile *taurina*, *Sulphure sublimato*, radice *Scillæ maritimæ*, *Succo Conii spissato*. Pilulæ etiam cum extractis *amaris* effinguntur, additis, si cardialgia subboritur, *aromatibus*, vel alvo cita, *Opio*, vel eadem compressa, rudice *Rhei*. In forma electuarii etiam cum melle aut syrupo datur; sed id admittendum tunc tantum, dum repugnantia est ægroti ad pulveres vel pilulas. Datur etiam in *infuso vinoso* vel *tinctura*. Additamenta ad *pulverem* in aëre liquefientium aut *acidum gallicum* tenentium sunt aliena. Cavendum quoque ne mox ante, vel post pastum deglutiatur.

V. Extractum Ferri pomatum; Gas hydrogenium; — — sulphuratum; Suboxydum Ferri praeparatum; Sulphas Ferri; Sulphuretum ejusdem; Tinctura Muriatis Ferri; — — — alcoholisata.

F O M E N T U M A C I D U M.

A Q U A V U L N E R A I A.

П р. к и с л а я.

R. *Acidi acetici diluti*, partes sex,
Alcoholis diluti partes tres,
Acidi sulphurici diluti partem,
Mellis despumati partes duas.
 Misce et, si opus, cola.

U. Vulneribus recentibus ulceribusque asthenicis, multum puris fundentibus, aptum.

F O M E N T U M A L U M I N A T U M.

П р. к в а с ц о в а я.

R. *Supersulphatis Aluminæ et Potassæ semunciam*,
 solve in
Acidi acetici diluti impuri selibra;
 dein adde:
Alcoholis diluti tantumdem.

U. Pernio, genu aliarumque articulationum dolores et tumores, linteum, hoc *liquore* constanter madefactum, adplicando, medelam recipiunt.

FOMENTUM AROMATICUM.

Пр. ароматическая.

Frigide aut tepide superdandum *infusum Specierum aromaticarum*, vel, ubi calore solum modo opus est, *vesica bavilla* vel *suilla* repleatur ad dimidium *aqua tepida* et parti adfectae admovetur, vel pannus laneus porosus, *aqua servidae* immersus, dein expressus adplicetur, renovando simulac frigescet.

U. Vitia reactione vis vitæ, æquo auctiori, stipata.

FOMENTUM COMMUNE.

Пр. обыкновенная.

R. *Alcoholis diluti* vel

— — — *impuri* selibram,

Acidi Acetici diluti impuri libram.

Mox ante usum parandum, frigide superdandum, saepiusque renovandum.

FOMENTUM DISCUSSIONIS.

Пр. разводящая.

R. *Aquae bilibram*,

Acidi acetici diluti, vel

— — — *impuri*

Alcoholis diluti impuri, utriusque libram,

Muriatis Ammoniae depurati semunciam.

tepide vel frigide admovendum.

U. In Ecchymosi, contusione, linteis humefactis, superdandum.

FOMENTUM PINEO-OLEOSUM COM-
POSITUM.

Пр. скипидарная сложная.

R. *Olei pineo-laricini unciam,*
Vitelli ovorum duorum,
Simul tritis admisce:
Decoctionae herbae A. Absinthii, vel
————— florum M. Chamomillae, vel
————— Radicis Acori Calami libram,
adde:
Alcoholis, vel
Alcoholis camphorati uncias duas ad tres.

U. In ulceribus gangrænosi ad separationem partis emor-
tuæ a viva efficacissimum. 1812 anno, quum bellipotens
Ruthenorum exercitus in Russia, 1813 autem in Germania et
1814 in Franco - Gallia commoraretur, æstivis caloribus ex-
positus, nil ita profuit ad arcendas infestas muscas, ac hoc
fomentum, quod etiam generationi vermium in vulneribus (de-
ligatione hoc fomento madefacta) obicem posuit; quapropter
magnæ utilitatis esse potest, præsertim, quum milites vulne-
ribus saucii, sub æstivis caloribus, ad valetudinaria transferuntur.

GARGARISMA ACIDUM.

Полосканье кислое.

R. *Acidi oxymuriatici guttas decem,*
Aquaæ Rosæ selibram,
Mellis — unciam.

U. In adfectionibus gingivarum scorbuticis merito præfer-
tur reliquis externis remediiis.

GARGARISMA ALUMINATUM.

II. ИЗЪ КВАСЦОВЪ.

R. *Supersulphatis Aluminae et Potassae* drachmam ad sequentem drachmam,

Decoctione Hordei, vel

Infusum flororum Sambuci, vel

— *foliorum Salviae* bilibram,

Acidi sulphurici diluti guttas triginta,

Mellis flavi unciam, vel

Sacchari puri semunciam.

U. Ulcera atonica faucium et gurgulionis, angina ulcerosa aut gangrænosa, maligna dicta, præcipue cum scarlatina juncta; item in gingivarum et uvulæ laxitate, anginas serosas, comitantia etc.

GARGARISMA AMMONIATUM.

II. АММИАКОВОЕ.

R. *Decoctione Hordei*, vel

— *Radicis Althææ libram*,

Subcarbonatis Ammoniae, vel

Ammoniae liquidae drachmam ad duas, vel

Alcoholis ammoniati semunciam.

U. Tonsillitis (initio morbi,) odontalgia, otalgia rheumatica, paralysis linguæ. Si major stimulus requiretur, loco *decoctione Hordei*, *aqua aromatica*, vel *infusum Sinapeos nigrae*, vel *Capsici minui* adhibetur.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

II. Противугнилостное.

ALCOHOL DILUTUM hacce intentione utiliter adhibetur, vel

R. *Decoctione Quercus aluminatae libram*,

Acidi acetici diluti impuri,
Tincturae Myrrae, utriusque unciam;
Misce.

Interdum loco *Acidi acetici diluti impuri* addantur guttae qui decim *Acidi sulphurici*, vel — *muriatici* triginta.

U. *Cynanche maligna*.

G A R G A R I S M A B O R A C I C U M.

П. Б у р о в о е.

R. *Subboratis Soda* semunciam,
 solve in
Aqua communis libra,
 adde:
Mellis flavi semunciam.

Interdum huic gargarismati additur *Alcoholis diluti impuri* und vel sescuncia; addita vero *tincturae Myrrae* semuncia vel unctiet adcommodum ulceribus oris fauciumque a nimio *Hydrogyri* usu obortis.

U. *Aphthae*, *Sialorrhœa*.

G A R G A R I S M A C O M M U N E.

П. О б ъ и к н о в е н н о е.

R. *Decoctione Hordei*, vel
 — *Althaeæ*, vel
Aqua communis libram,
Acidi acetici diluti impuri uncias duas
Mellis flavi unciam.

Cui interdum additur *seminum Sinapeos nigrae* pulveratoru semuncia, vel, pro re nata, *Nitratis Potassae* drachma.

U. In anginis, præsertim inflammatoria cum *Nitrate Potassae*.

GARGARISMA MURIATIS AMMONIÆ.

II. Н а ш а т ы р и о е.

R. *Muriatis Ammoniae depurati* drachmam ad duas,
Infusi Specierum aromaticarum, vel
 — *florum Arnicae*, vel
 — — *Chamomillae*, vel
Decocturae Hordei libram
Oxymellis simplicis unciam.
 Misce.

U. Salivam movendo, brevi tonsillitidem propulsat.

G A R G A R I S M A O P I A T U M.

II. О п і я т и о е.

R. *Extracti Opii* drachmam,
Aquaे ferventis libram,
 Misce terendo et adde:
Alcoholis diluti, unciam,

U. In ulceribus linguæ vel faucium irritabilibus, rebellius; odontalgia, aut otalgia rheumatica; cephalalgia nervosa hicax,

GARGARISMA OXYMURIATIS HYDRARGYRI.

II. С о л е п е р е к и с л о й р т у ш и.

R. *Oxymuriatis Hydrargyri* grana quatuor,
Muriatis Ammoniae drachmam,
Decocturae Hordei, vel
 — *radicis Althaeæ* libram,
Mellis flavi unciam
 Misce.

U. Ulcera faucium internarum syphilitica, phagedænica, phtæ malignæ, in scarlatina anginosa, haud neglecto, pro reata, interno usu corticis *Cinchonæ officinalis* cum Subborate *Sore* et aquæ *Calcariae* modico.

G A S A

FLUIDA ELASTICA AÉREA.

Г а с ы у п р у г и е в о з д у х о о б р а з н ы е .

GAS ASOTICUM OXYDULATUM.

Г а з ь с е л и м т р о к и с л о в а ш ы й .

Igni in retorta vitrea Nitratis Ammoniae partem et arenae partes tres sub + 150° R. th. exponendo adparatu hydrargyro-pneumatico obtinetur.

V. Exhilarans; actionem systematis muscularis incitans.

U. Inspirando in nevroblacia, asthenia musculari, paralysi.

G A S C A R B O N I C U M .

ACIDUM CARBONICUM CALORI JUNCTUM.

Г. У г л е к и с л ы й .

Elicitur ope *Acidi sulphurici* e pulverato *Calcariae Carbonate*.

Q. Constat partibus 27,38 *Carbonii* et 72,62 *oxygenis*
(**GAY-LUYSSAK.**)

V. Antiseptica; antispasmodica; sangvinem movens.

U. In ventriculi sensibilitate nimia et vomitu hinc obortu multiplici Medentium experientia comprobatum. Item inservit ad *aquas minerales*, *acidulas*, *acidulo alcalinas* et *acidulo-ferratas* parandas, item ad *Alcalia* hoc *acido* saturanda.

V. *Aqua Acidi carbonici*; *Aqua acidula artefacta*.

G A S H Y D R O G E N I U M .

HYDROGENIUM PRINCIPIO CALORICO JUNCTUM.

Г. В о д о т в о р н ы й .

R. *Ferri limati* partem,*Acidi sulphurici* partes duas,*Aqua communis* partes octo,

Limatum Ferrum, retortæ tubulatæ cum collo curvato immittatur, dein Acidum sulphuricum aqua dilutum, infundatur, et bene agitetur. Sub effervescentia massæ gas hydrogenium evolvitur, quod adparatu hydropneumatico in vasa vitrea, aquæ plena, colligatur. Obtinetur etiam solutione Zinci in Acido muriatico aut sulphurico, quinque vel septem aquæ partibus, dilutis.

V. Apertis naribus vicies fere citra periculum inspirari posse; dein vero facies colore tingitur cœruleo; pulsus vero fit debilis et celer, vertigo oritur, ægrique obcœcantur.

U. Obposuere quidam phthisi pulmonali inhalationem ejus; sed efficaciam uberius experiri oportebit.

GAS HYDROGENIUM CARBONATUM.

GAS HYDROGENIUM PORTIONEM CARBONICI CONTINENS:

Г а с ь у г л е в о д о п в о р н ы й о б ъ у г л е н ы й.

Instillando aquam in ardentes carbones, vase clauso, in idoneo adparatu (WATTI) fit.

U. Inspiratione cautus in phthisi pulmonali (BEDDOES et WATT,) catarrho, tussi, hæmoptysi laudatur; ast diutius et incaute inspiratum, apoplexiam, in mortem desitaram, producit.

GAS HYDROGENIUM SULPHURATUM.

Г а з ь с ъ р н о в о д о п в о р н ы й.

R. Ferri limati partes duas,

Sulphuris sublimati partem,

immitte crucibulo amplio operculo adaptato, et subjice per $\frac{1}{4}$ horæ summo caloris gradui. Massa post refrigerationem dat Sulphuretum Ferri (flavo-brunei coloris) conficiendo Gasi hydrogenio sulphurato, peridoneum; dein in hunc finem:

R. *Sulphureti Ferri* partem,

immisso retortæ tubulatæ, curvato collo, instructæ
dein adfunde:

Acidi sulphurici, prius quatuor partibus aquæ com-
munis, diluti, tantumdem.

Misturam coquito leni calore sub continua agitatione. Gas hydrogenium sulphuratū, tempore operationis hujus, evolvendum, adparatu hydropneumatico in vasa vitrea, aqua fer-venti repleta, colligit, usuique serva. Educitur etiam ex aliis Sulphuretis, vel acidis, vel aqua effervescente, cuius oxy-genes Sulphureta decomponit ope *Acidi sulphurici*, quod Sul-phuri inhæret. Aquis Soteris etiam inest.

V. Minuens irritabilitatem præcipue in pulmonibus.

U. Utilitatem promittit inspiratum in pertinaci tussi, post pnevmonitides cum sputo superstite.

V. *Aqua sulphurata artefacta.*

G A S O X Y G E N I U M.

OXYGENIUM PRINCIPIO CALORICO NUPTUM;

Г. кислоторный.

R. *Oxydi Mangani nigri* pulverati partem,

Acidi sulphurici partem dimidiam.

Oxydo Mangani, vitreæ retortæ immisso, acidum adfundatur, dein collum retortæ cum adparatu hydropneumatico, tuto jun-ge, atque calorem \pm 80 R. th. gradatim ange, quamdiu gas oxygenium purum evolvitur. Residuum in retorta remanens ope solutionis in aqua atque evaporationis, ad siccitatem, dat Sulphatem Mangani, remedium a neotericis adversus varios morbos, laudatum. Atmosphæra e hujus gasis 27 et azotici 73 (LAVOISIER) partibus constat; curatiori tamen indagine eam e 21 primi et 79 postremi partibus coalescere, extra om-nem dubii aleam positum est.

Q. Est odoris saporisque expers.

V. Inspirati, micatus arteriarum incitans et calorem animalem augens. Combustionem corporum accelerans.

U. Pulmonibus inflati: in asphyxia potissimum submersorum, vel suspendio, aut vapore carbonum, aut alio elastico noxifero fluido, vita ad parenter privatorum, valet. In asthmatice etiam, atonia pulmonum, et morbis astheniae notas ferentibus, praeconia tulit. Nocet in pneumonitiide (SCHERER.) Ulcera saniosa ejus usu curationem recipiunt.

G E L A T I N A A N I M A L I S.

Спудень животныхъ.

R. *Glutinis animalis* indurati (venalis) selibram,

Aquaæ libras tres,

coque, ut fiat solutio,

cui adjice:

Albuminis ovi, quantum satis,

dein massæ probe despumatæ et clarificatæ addito:

Sacchari albi selibram.

Coque leni igne ad sesquidrachmam. *Gelatina*, ut concrescat, effundatur.

U. In febribus intermittentibus (ARMAND SEGUIN.) Vide-sis: *Bos Taurus. Vel*

R. *Extremitatum Bovis Tauri* (*ungulis pilisque demtis*)
in frustula dissectarum partem,

Aquaæ fluviatilis partes octo.

Coque leni igne in olla figulina usque dum e parva decocti portione refrigerata, consistentia gelatinæ adpareat surrexisse, tum liquor coletur et spuma pinguedineque ablatis, usui servetur.

GELATINA CETRARIÆ.

Студневой кисель Исландского моха.

R. *Cetrariae Islandicae* concisæ uncias duas,
coque ex
Aquaæ fontis unciiis triginta,
ad remanentiam circiter partis quartæ. Colaturæ addito et
solve:
Sacchari albi unciam, vel
Syrupi Zingiberis sescunciam,
ut fiat post refrigerationem gelatina.

GELATINA CORNU CERVI.

Студень оленяго Рога.

R. *Cornu Cervi rasi* uncias tres,
Aquaæ libras totidem.
Coque ad colaturam sesquilibræ, et adde:
Vini albi veteris uncias duas,
Succi fructus Citri medicae semunciam,
Syrupi — — — unciam,

Effunde, ut frigore in tremulam massam coëat. Eodem modo
cum pari portione aquae parari potest: GELATINA AMYLI;
Исчтию осолле. Vel

R. *Cornu Cervi rasi* selibram,
Aquaæ fontis libras sex.
Coque leni igne in vase fictili ad remanentiam libræ. Liquori
cum expressione colato et adhuc calenti admisce;
Sacchari albi,
Vini rhenani, utriusque uncias duas.
Repone in frigido loco, ut in gelatinam coëant.

H A U S T U S C A M P H O R A T U S.

С м ъ с ь к а м ф о р н а я .

R. *Camphorae* (ope aliquot guttarum *Alcoholis pulveratae*)
grana quinque,

Gummi Acaciae verae scrupulum,
Sacchari puri drachmam;
simul bene tritis, sensim adde:
Aquae fontis drachmas decem.

Interdum adduntur:

Subcarbonatis Ammoniae grana quinque vel plus, *Gummiresinae F. Assae* fetidae grana decem, vel utriusque simul, vel alterutrius.

V. Stimulans; narcotica; antispasmodica. Si *haustui camphorato Subcarbonatis Ammoniae* grana quinque, et *pulveris aromatici* scrupulum addideris, lexipyretam sub accessum febris, habebit vim, in tracheitide etiam efficacem.

H A U S T U S C A R B O N I C U S.

VULGO AËROPHORUS.

С у г л е к и с л а я .

R. *Subcarbonatis Potassae depurati* scrupulos duos, vel
— *Ammoniae* scrupulum,
Aquae fontanae uncias duas.

Misce.

R. *Succi Citri medicae* recentis unciam, vel
Acidi acetici diluti impuri tantumdem,
Syrupi simplicis,
Aquae fontanae utriusque semunciam.

Solutio[n]e *Subcarbonatis Potassae*, vel *Ammoniae* prius sumta, mistura e succo *Citri medicae*, vel *Acidi acetici* diluti impuri illico, dum effervescit, porrigenda est.

V. Nauseam, vomitumque rebellem, a præternaturali ventricali irritabilitate, ortum, compescit; leniter etiam sudorem et urinam sollicitat. Ceterum omnia, quæ de **MISTURA CITRATIS POTASSÆ STIBIATA** dicta sunt, hic etiam quadrant.

H A U S T U S C I N C H O N A E.

C. Х и н на я.

R. *Aquaee Menthae piperitae* drachmas sex,
Corticis Cinchonae pulverati scrupulum,
Syrupi simplicis drachmas duas.

U. Videsis: M I S T U R A M A S S E F O E T I D E.

H A U S T U S G U A J A C I N U S.

C. Б а к а у ш о в а я.

R. *Gummiresinae Guajaci officinalis* grana quindecim,
• *Gummi Acaciae verae* drachmam,
Sacchari puri scrupulum,
tere simul, et paulatim adfunde:
Aquaee Menthae piperitae sescunciam.
Interdum adduntur:

Subcarbonatis Ammoniae grana quinque, vel *Camphorae* grana
quinque, vel *Tincturae Opii* guttae viginti separatim, vel con-
jurictim.

U. Myodynia rheumatica, arthrodynia.

H A U S T U S O P I A T U S.

C. о п і а ш на я.

R. *Aquaee fontis* unciam,
Tincturae Opii guttas viginti,
Syrupi simplicis drachmas duas. Misce.

V. Narcotica; exhilarans; soporifera, vel

R. *Aquaee fontis* semunciam,
— *cujuslibet aromaticae*,
Syrupi opiatii utriusque drachmas duas,
Tincturae Opii guttas decem. Misce.

Huic, si guttas viginti *Vini stibiati* addideris, H A U S T U M DIA-
P H O R E T I C U M habebis; si vero *Vini Ipecacuanhae* et *Aetheris*

sulphurici, utriusque guttas quadraginta ad drachmam, tum accessui febrilis paroxysmi, efficaciter obstabit.

H A U S T U S P I N E O - B A L S A M E U S.

С. Терпентинная.

R. *Balsami pineo-laricini* cum *Vitello ovi* subacti scrupulum, ad semidrachmam,

Aqua Menthae piperitae, vel

Mucilaginis Acaciae verae unciam,

Tincturae aromaticae,

Syrupi simplicis, utriusque sesquidrachmam. Misce.

U. Blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; hydropisias.

H A U S T U S S A P O N A T U S.

С. Масляно-амміаковая.

R. *Olei sesamini*, vel

— *olivi* sescunciam,

Aqua Menthae piperitae unciam,

Tincturae aromaticae drachmam,

Ammoniae liquidae guttas viginti.

U. In catarrho; alvo adstricta; urolithiasi; helminthiasi; trismus neonatorum.

H A U S T U S S U D O R I F E R.

С. Помогонная.

R. *Acetatis Ammoniae liquidi* unciam,

Tincturae Opii,

Vini stibiati, utriusque guttas viginti,

Syrupi simplicis drachmas duas. Misce.

H Y D R A R G Y R U M D E P U R A T U M.

Ртуть очищенная.

HYDRARGYRUM, ut ab incongruorum additamentorum, (quisbus interdum a turpilucridis negotiatoribus adulteratur,) labe liberetur, destillatio opus est, quæ sic instituitur:

R. *Hydrargyri quantum velis.*

E ferrea retorta ad medietatem hocce *metallo* repleta, tubaque ferreo verticaliter erecto, dein recurvato prædita atque cum vitreo recipiente capaciori ad dimidium *frigida aqua* repleto, sic junctum, ut orificium colli superficie *aqua* immersum sit, fiat destillatio ex arenæ balneo.

Q. Globulis exacte sphæricis, levissime iterum coëuntibus, currens in charta, in cursu nil impuri relinquens, *Acetum* minime dulcificans, vel *plumbeas* particulas per reagentia detegendas, nequaquam prodens, per corium expressum fere nil immundi, vel pulverulenti relinquens.

U. *Hydrargyrum metallicum* interne sumtum, vix est medicamentosum; immutatum enim percurrit intestinalem tubum, imo notabilem ejus quantitatem per longum tempus (per annum unciam quotidie) sumtum fuisse citra ullum incommodum FORDYCE refert; nihilo tamen minus id, si in interaneis moretur ex parte enterico oxydari *succo*, eoque efficax redi, ut proinde medicamentosam exserat vim, porrigendum *hemiboxydata* aut *acidula forma*, qua permeat non solum primas vias, sed totum systema vasorum omnesque corporis, vel subtilissimos meatus penetrat, quin tamen energia adsimilativarum virium universi adparatus organici adsimilari queat, quod sane extra omnem dubii aleam ponit sapor in ore metallicus, morbosus glandularum salivalium status, ulcera mercurialia, exhalatio cutanea, per quam aurei annuli aliaque ornamenta, ex hoc *metallo* fabrefacta, si cutem arcte ambeunt, post *hydrargyrosin* albescere visa sunt (quod nonnisi ex amalgamatione *Hydrargyri* cum *auro* exponi potest.) Sudor interdum *Hydrargyri* globulis scatens (HORN,) imo si ZELLERI experimentis fides habenda, *metallum* in ipso animalium sanguine (quibus unguenta ex eo parata fuere admota) inventum, denique globuli *Hydrargyri* in cadaveribus eorum, qui *hydrargyrosin* passi sunt, repertitii (BONNET, SCHENK, FERNELIUS.) Pro ratione oxydationis allarumque concurrentium rerum agit tum multifariam in omnia Systemata, potissimum glanduloso inci-

tando secretiones, atque excretiones permutat, uti etiam insigniter in glandulas salivales & cutim, ex quo patet usum ejusdem in morbis latius patere, atque pro ratione connubii, habitus corporis, opportunitatis, temperaturæ, præparationis etc. multivariorum exserere effectum; agit quippe, ut errhinum *Subsulphas Hydrargyri* ut sialagogum *idem* in qualibet forma; ut catharticon *Submurias Hydrargyri*; ut diureticum *Submurias et Oxymurias Hydrargyri*, in connubio præsertim aliorum diuretorum; ut diaphoreticum *Submurias Hydrargyri* et in connubio remediorum cutaneam exhalationem promoventium.

U. *Hydrargyrum metallicum* solo pondere acturum ad pertinaces alvi obstructions, intestinorum intussusceptiones, ileum, quotidiano usu aliquot unciarum pondere in *Oleo olivo*, vel *papavereo*, aut in pingui *curnis jure* (HOFFMANN, PLATTNER, WEICKARD) dabatur, quæ experimenta in canibus etiam capta respondisse feruntur; nihil tamen secius, magna cura cavidum, ne noxæ, quod fieri adsolet, inferantur, laceratis, constrictis, aut inflammatis intestinis, ipso malo periculosiores (HODGES in *Mem. of Med. soc. of Lond.* T. 6. p. 6.) *Unguentum mercuriale* vulneri a rabido animali illato adfrictum cum interno usu *Sulphatis Hydrargyri lutei* (*Turpethi mineralis*) multos a rabi hydrophoba servavit (DARLUE *recueil periodique*, tom. III.) Sed a similibus *unguentis*, id est sine additamento acidorum factis, duntaxat eatenus exspectanda utilitas, quatenus oxydabilitas *Hydrargyri* tritu possibilis est. *Aqua fervida Hydrargyrum* nequaquam solvit, utut *decoctura* talis a quibusdam ad enecanda interaneorum animalia commendetur ob vermiculugam virtutem (*decocta scilicet aquae libra cum metalli uncis duabus sub agitatione cum bacillo ligneo*.) equidem aliis potius additamentis, vermibus inimicis, salutarem ejus vim adscribendam duco. Epilepsiam helminthicam curatam fuisse *Hydrargyro* auctoritate HEISTERI constat, nec minus utilitatis adversus infantilem syphilidem præstisset a GARDANNEO relatum accepimus, utut nulla observata post coctionem *Hydrargyri* ponderis ejusdem jactura. In omni hydrargyrosi circum-

spiciendum est, ne vires labent, neve aut sudores profusi aut alvifluxus exoriantur, sola quippe per cutem exhalatio juvat. Quapropter, vel præmittere tepefacta *bulnea*, vel cum ejusdem usu conjungere expedit. Præferenda vero mitiora e *metallo* præparata, iisque non male *Camphora*, vel *Opium* additur; si vero pervicacia mali potentiora exigit, corpus valentibus nutrimentis firmandum est. Scire licet in genere præparata cum *acidis* facta, meritis *oxydulis* pro usu interno præferenda esse, parvas etiam doses in curatione syphilidis securiores esse magnis fortibusque, ut organismus inita velut familiaritate cum stimulo remedii, nullatenus mitis, adsuescat eidem. *Hydrargyrum* largiter aut inconsidérata ingestum, excitat motus febribus (febrim mercuriale,) cutis videlicet arescit; pulsus arteriarum festinantur; incitatione vero in organa, quæ secernendæ salivæ dicata sunt, propagata, glandulæ salivales tumefiunt, saliva ubertim prolicitur (*sialorrhœa*), gingivæ flaccescunt, tumescunt atque a dentium latice gryseo obductorum, hebescent um et vacillantium radicibus secedentes, sanguinem fundunt; lingua ipsa muco tenaci obducitur, per oris ambitum erythema observatur, aut in eodem ulcuscula prorum-punt, haud raro linguam internamque buccarum faciem perrepentia, et cacoëthea; *sapor* vero metallicus infestus; glandulæ colli turgent; protracto autem usu exoriuntur horrores, nausea, vomititio, lancinantes capitis dolores, occiput et nasi radicem occupantes, tremores artuum, interdum biliosa dyscrasia (**TOURTELLE**), subinde paralysis, quandoque exanthema peculiare subnascitur eczema mercuriale **PEARSONIO**, *hydrargyria ALFYO* dictum, crebrescens, gliscens cum rubore cutis, ardore et tumore in scroto et cruribus, vesiculis manifestum plurimis, pellucidis, mole acuum capitula æquantibus, opaco lac-teoque latice farctis. Nonnunquam febris hectica accedit, cutis escharis liventibus deturpata, pilis defluentibus, unguibusque secedentibus, novis interea crassioribus curvisque subnascentibus æque ac in trichomate a: lepra evenire solet, in mortem nisi propere subveniatur, desitura. Ad coercendam *sialorrhœam*, si

præter opinionem, aut *Hydrargyro* largius ingestæ, suborta est, porriguntur *Cathartica*, *Opium* et *aqua frigida* fauibus adsi-
duo admovetur. Alii aquam hydrothionicam commendant. Memo-
ria etiam tenendum est, acida, adiposa, dyspepta utentibus per
frictionem *Hydrargyro* alienissima esse.

D. In volvulo ab uncia ad aliquot, si alia remedia irrita
fuere.

V. Emplastrum *Suboxydi Hydrargyri*; *Nitras Hydrargyri* di-
latus; — — liquidus; *Oxymurius Hydrargyri*; *Oxydum Hydrar-
gyri rubrum*; *Pilulæ Suboxydi Hydrargyri*; *Submuriæ Hydrargy-
ri*; *Suboxydum Hydrargyri nigrum*; *Unguentum Nitratis Hydrar-
gyri fortius*; — — — mitius; — — *Suboxydi Hydrargyri*.

H Y D R O M E L.

Медъ разведенныи водою; сыта.

R. *Mellis despumati* uncias duas,
Aquæ fontis bilibram.

Coquito, et despuma, donec supersit sesquilibra. Cola. E *meli-*
crudi partibus duabus, et *succi petalorum Rosæ expressi* par-
te, commistis, **MEL ROSATUM** fit; e *succo autem baccarum Vac-*
cinii Oxycocci, et *melle* (pari pondere,) leni calore, commistis,
jucundum et efficax, **MEL OXYCOSSI**, coalescit.

V. *Hydromellis*: solvens; diuretica.

U. Cum *aqua* commisti: in febribus inflammatoriis biliosis
pro potu ordinario. *Mel rosatum* *gargarismata* adversus angio-
nam ingreditur; *Acido autem sulphurico* commistum, aphthas
purgat, uti etiam collutoriis haud male additur. *Mel Oxycocci* va-
riis decocturis misturis et potionibus additum, gratum saporem
conciliat, aestum sitimque sedat, et pari passu cum *Oxymelle*
simplici procedit.

HYDROSULPHURETUM POTASSÆ.

KALI SULPHURATUM Ph. Bor. HEPAR SULPHURIS Ph. Ross.

Сърнопомашная печень; сърнощелочная водо-
творная смесь.

R. Subcarbonatis Potassæ depurati,

Sulphuris sublimati utriusque pares portiones.

Contrita simul amplio loricato crucibulo immittantur, atque adaptato operculo, et prunis cautim subditis, denique liquefiant. Crucibulo simulac retrixerit, fracto, *Hydrosulphuretum* ablatum, in phiala probe obturanda, reponito.

Q. In aqua solubile, humoresque, dum aëri exponitur, adtrahit, in soluta vero forma etiam *Oxygenes*. Igne leni liquatur; intensiori vero decomponitur. Si humefit, extricato *hydrothionico acido*, redolet putrida ova; *saporis* est alcalini, acriculi, amari.

V. Antacida; diaphoretica; resolvens.

U. Ejusdem in fœditatibus cutis cum multo fortius ipso Sulphure cieat capillaria vasa omnino commendandus. Ita etiam in pectoris, aut rheumaticis, podagricis affectionibus; sed ob ingratum saporem plerumque ægre et repugnanter sumitur. Ad externum usum efficax est aqua lotioni inserviens e *Hydrosulphureti Potassæ* parte ad octo aquæ. BARLONUS laudat in tinea capitum misturam: e *Hydrosulphureti Soda*e drachmis tribus, *Saponis* sesquidrachma, *Aquaæ Calcariae* unciis septem et semis, *Alcoholis* diluti drachmis duabus, qua bis de die maculæ impetiginosæ irrorantur. A GARNETTO in phthisi pulmonum florida cum æqua carbonis lignarii pulverati portione, ad drachmam quinques de die propinatum cum successu. Quidam post CHAUSSERIUM in tracheitide (croup) et pertussi deprædicant; in primis vero SENFIUS propinatis duobus, quatuor granis, in aqua, melie vel syrupo secunda quaque hora pro infantibus. Eximio est auxilio ad tollendas hydrargyroseos, *Oxydorum Plumbi*, et ipsius *Oxydi Arsenici* funestas sequelas. Drachma ejusdem in selibra

aquæ soluta, solutione, quovis quadrante horæ, cochleatim sumta, præsentanea esse fertur. NAVIERUS auctor est, ut eidem æqua portio Ferri limati adjiciatur, quo elicita majori hydrogenis sulphurati copia in hydrargyrosi perperam continuata, sequelis Arsenici, scrofulosis adfectibus, juvare enixius dicitur. Utiliter adhibetur ad aquas minerales sulphureas, arte parandas.

D. Si in cutim tantum et pulmones agere lubet, datur a granis quinque ad decem ter de die. Idem præbium et infantibus angina polyposa correptis adcommodum. In beneficio, si venenum in primis adhuc viis hæret, brevibus intervallis repetendum est, et quidem, quo plus veneni ab ægro sumtum. Adversus Oxydum Arsenici album, et Oxymuriatum Hydrargyri propinatur drachma ejusdem in libra aquæ ad semel. Cogitur in pilulas, bolos, vel per modum pulveris, vel electuariorum administratur. Interdum sub usu ejus nausea aut vomitatio movetur et tunc, aut dosis minuenda, aut ab usu ejus supersedendum.

V. Aqua sulphurata artefacta; Gas hydrogenium sulphuratum.

H Y P E R O X Y M U R I A S P O T A S S E.

С о л е к и с л а й п р е с ы щ е н н ы й п о п ыш ь .

R. Subcarbonatis Potassae depurati, quantum lubet,

Aquæ communis, quantum satis.

Solve, et trajice per hanc solutionem in vitro pharm. Gas acidum oxymuriaticum ad perfectam saturationem, liquor lenissimo calore evaporet ad punctum crystallisationis, et in loco frigido, ut in crystallos coëat, seponatur, quæ in parva aquæ ferventis quantitate, solutæ, iterum in loco seponantur frigido, ut denuo crystalli exsurgent.

Q. Hyperoxymurias Potassae purus ex Acidi oxymuriatici p. 58,3 Potassae 39,2 et aquæ 2,5 coalescit, crystallique ejus sistunt alba, et nitida prismata 5 lateralia, aut tabulas rhomboidales, vel aculeos. In 10 partibus aquæ frigidæ sol-

vitur, *aëre* immutabilis; *igne* vero fusus *gas oxygenium purissimum* largitur, cum corporibus oxydabilibus, nimirum *carbonis*, *Phosphoro*, *Sulphure*, contritus, detonat.

V. Oxygenans; sistema arteriosum incitans.

U. Morbi asthenici; malus corporis habitus; scorbutus; fœditates cutis; psora; herpes; syphilis; hepatemphraxis etc.

D. A granis quindecim ad scrupulum de die.

V. *Solutio Hyperoxymuriatis Potassae.*

INFUSO - DECOCTURA LEPIDI RUDERALIS.

Наливка отварная дикой жерухи.

R. *Herbae Lepidii ruderale* minutim concisæ unciam, adfundito:

Alcoholis uncias duas,

Aquaes simplicis selibram.

Digerantur leni calore in clauso vase per bihorium saepius agitando. Post refrigerationem coletur, et residuum, antea fortiter expressum, coquatur cum aquae unciis sedecim in vase tecto ad remanentiam unciarum quatuor, dein residuum coletur, et exprimatur fortiter, decocturaque colata cum infuso misceatur.*

D. Secunda quaque hora cochlear tempore apyrexias dialeipyræ danda.

INFUSO - DECOCTURA PADI.

Наливка отварная черемховой корки.

R. *Corticis Pruni Padi* unciam,

Alcoholis diluti uncias duas,

Aquaes communis uncias quinque,

digere leniter in vase clauso, post refrigerationem exprime; *Corticem* remanentem coquito:

in *Aquaes communis* unciis octo,

ad remanentiam unciarum quatuor.

Decocaturam colatam cum *infuso* commisce.

V. *Infusum hoc alcoholicatum, cum decoctura junctum, virtutem roborantem, et incitantem cum sedante, et antispasmodica unit.*

U. In arthrodynia, et myodynia rheumatica diurna, haud secus ac in affectionibus paralyticis, quæ hæc mala consequi solent, laudatur. Phthiseos symptomata mitigat.

D. Secunda quaque hora cochlear (vel semuncia) datur.

INFUSUM ARNICÆ (FLORUM.)

Наливка цвѣтковъ Бараника.

R. *Florum Arnicae montanae sesquidrachmam,*
Aqua ferventis libram,
infundito per sesquihoram, et cola.

U. In typho absque erethismo sanguineo efficax.

D. Unciæ duæ, aut quatuor, ter in die dantur.

INFUSUM ARNICÆ (RADICIS.)

Наливка корня Бараника.

R. *Radicis Arnicae montanae semunciam,*
infunde:

Aqua ferventis selibram,

digere in stanneo vase, operculo probe clauso, per semihora-
ram, in colatura dein solve:

Gummi Acaciae verae drachmam.

Non male, pro re nata, additur *Aether*, aut

Tinctura Opii crocata.

U. In neuroblacia interaneorum, borborygmis, et meteorismo symptomatico, astheniæ natales debente; florenti tamen vigori vitali, ad hyperstheniam opportuno, alienum.

D. Secunda quaque hora cochlear exhibetur.

INFUSUM AROMATICUM.

Наливка ароматная, или пахучихъ травъ.

R. *Specierum aromaticarum* uncias quatuor,
Aquaे ferventis libras quatuor.

Macera per horam, dein vase clauso per aliquot minuta
 coque, et cola. Interdum recte addes singulis aquae libris:
Muriatis Ammoniae depurati drachmam, *Acidi acetici diluti* im-
 puri uncias duas, vel *Alcoholis diluti* selibram.

V. *Fomentum aromaticum.*

INFUSUM CANNABIS.

Наливка конопляныхъ съмянъ.

R. *Seminum Cannabis sativae* integrorum semunciam,
Aquaе bullientis bilibrام,
 digerito calide per sesquihoram; dein per quinque minuta
 coquito et colaturæ addito:
Syrupi simplicis, vel
Sacchari, quantum lubet.

U. Pro potionе ordinaria.

INFUSUM CATECHU.

Наливка Кашеху.

R. *Extracti Catechu*, drachmas duas et semis,
Pulveris corticis Lauri Cassiae semidrachmam,
Aquaе bullientis uncias septem.

Infundantur extractum, et cortex cum aqua in vase clauso, per
 bihorium, et liquori colato, adde:

Syrupi simplicis unciam.

D. Uncia, tertia quaque hora, in alvisfluxibus refractario-
 lis, post singulas sedes liquidas.

INFUSUM CATECHU OPIATUM.

Наливка кашеху опиашная:

R. *Infusi Catechu uncias octo,*
Tincturae Opii drachmas duas;
Misce. Cui interdum additur:
Tincturae aromaticae uncia, vel
Mucilaginis Acaciae verae unciae duæ.

V. *Adstringens; sedans.*

U. *Diarrhoea, lienteria, dysenteria, sanguifluxus intestinorum.*

D. *Semuncia, tertia quaque hora. Illico, ut factum est, ne
 præcipitetur Opium, præbeatur, vel ante singula præbia con-
 quassetur phiala.*

INFUSUM CHAMOMILLÆ KALINUM.

Наливка ромашковыхъ цветовъ попашная:

R. *Infusi florum Chamomillæ sesquilibram,*
Subcarbonatis Potassae depurati drachmam;
Misce.

V. *Peptica; antacida; leniter diuretica.*

D. *Selibra ad libram.*

INFUSUM DIGITALIS.

Наливка листовъ Наперстянки.

R. *Foliorum Digitalis purpureae (tempore florescentis plan-
 tæ collectorum, et in umbra siccatorum) semunciam;*
Aquaæ fervidae uncias viginti.

Infunde vase clauso, refrigeratum cola, cui non alienum erit
 adjicere:

Tincturae aromaticae unciam:

V. *Colaturæ cochlear majus, æqualem vim pulveris folio-
 rum grano, prodit, bis vel ter per diem adultis dando.*

R. *Foliorum Digitalis purpureae siccatorum drachmam,*
Aquaे ferventis uncias octo.

Macera in vase leniter clauso per quadrihorium et dein co-laturæ admfisceto:

Tincturae aromaticæ unciam.

Hæc formula est accommodatissima, qua in primis virtus *Digitalis* esseritur, quæve exhibetur per diem bis unciatim donec lotium ciet, addito, et gustus gratia, et ad præcavendam nauseam et actionem *Digitalis* sedativam minuendam *aromate*; si vero loco *aromatici* tantumdem *Aetheris nitrici alcoholisati* addideris, vis remedii diuretica intenditur. Si alvum moverit, singularæ dosi *Tincturae Opii guttae* octo, instillantur. In debellando hydropæ plus centuplici, et læto effectu, sese probavit.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

Наливка корня Горечавки сложная.

R. *Radicis Gentianæ luteæ semunciam,*
Fructus Citri Aurantii immaturi,
Radicis A. Zingiberis utriusque drachmam,
Alcoholis diluti uncias quatuor,
Aquaе libram.

Adfunde primum *Alcohol*, dein post tres horas *aquam*, tum digere leni calore per horas duodecim, et cola.

D. Unciæ duæ, bis terve de die.

INFUSUM LINI.

Наливка льняныхъ съмянъ.

R. *Seminum Lini uncias duas,*
Radicis Glycyrrhizæ glabrae semunciam,
Aquaе ferventis libras quatuor.

Infunde ad focum per horas tres, et cola.

Cui interdum additur:

Succus Citri medicae, vel *Roob Oxycocci*, vel *Oxymel simplex*, vel *Saccharum purum*, ad gratam aciditatem dulcedinemque.

U. Dysuria, Catarrhus, pneumonitis, blennorrhœa, ischuria incipiens. Nephritidi, splenitidi, hysteritidi, auxilio est; ceteris vero phlegmasiis, ut cystitidi, liquida talis modi, tantum abest, ut mollimentum præstent, ut potius onere suo et malum irritent, et conflictantem in discrimen vitæ conjiciant.

INFUSUM RHEI.

Наливка ревенная.

R. Radicis *Rhei palmati* pulveratæ sescunciam,
Subcarbonatis Potassæ depurati sesquidrachmam,
Aquaæ communis fervidæ libram.

Maceratis in vase clauso per duodecim horas admisceto colaturæ unciarum decem expressæ:

Alcoholis diluti unciam.

Serva usui.

D. A drachma ad semunciam et ultra bis de die.

V. *Mistura Taraxaci composita.*

INFUSUM RHODO DENDRI.

Наливка кашкарная.

R. *Foliorum Rhododendri Chrysanthi* siccatorum drachmas duas,

Infunde:

Aquaæ fervidae libram,

Committe vasi fictili luto oblito. Digere leni calore per horas duodecim, liquoremque cola.

D. Unciæ duæ alterna quaque hora, ad quartam vicem, nisi vertigo, nausea, vomitus, vel alia mali ominis indicia ulteriore administrationem veterant.

INFUSUM SENNAE.

Наливка Сенны слабительная.

R. *Foliorum Cassiae Sennae* sescunciam,
Seminum Anethi Foeniculi, vel
Pimpinellæ Anisi contusorum, semunciam,

Supertartratis Potassae drachmas duas,
Aquaes fontalis libram,
Supertartratem Potassae in aqua coquendo, liquorem adhuc
ferventem Sennae et seminibus affunde.

D. Unciae duæ, tres, pro prima dosi; dein vero quavis hora
 unciatim, donec alvo semel, bis, terve ducta, gastricæ sor-
 des importunæ fuerint exterminatæ.

INFUSUM SENNAE SALINUM.

Н а л и в к а С е н н ы г о р ь к о - с о л е н а я .

R. Foliorum Cassiae Sennae drachmas duas,
 adfundito:
Aquaes communis fervidae uncias quatuor,
 macera per semihoram, et in expressa colatura solvito:
Sulphatis Magnesiae, vel
— Sodaæ drachmas sex,
Mellis despumati semunciam.

Detur pro dosi, eidem, cui prius, scopo inserviens.

INFUSUM SERPENTARIAE.

Н а л и в к а к и р к а з о н н а я .

R. Radicis Aristolochiae Serpentariae semunciam,
 adfunde:
Aquaes bullientis libram,
 stent per semihoram in vase clauso, et cola.
 D. Semuncia, uncia, secunda vel tertia quavis hora, secun-
 dum res circumstantes.

INFUSUM TABACI.

Н а л и в к а л и с т о в ь т а б а ч н ы х .

R. Foliorum Nicotianaæ Tabaci drachmas duas,
Aquaes ferventis uncias quatuor,
 infunde in vase clauso in balneo aquoso per horas sex, infu-
 so expresso adde :

Alcoholis unciam.

D. *Guttæ viginti ad drachmam dosin sensim sensimque augendo. Vel*

R. *Foliorum Nicotianae Tabaci drachmas duas,
Vini albi Hispanici libram.*

Macera per septimanam, et per chartam cola.

D. *Semidrachma ad sesquidrachmam ex quovis potu conveniente. Nicotiana Tabacum protracto usu, ventriculo insidias truit, succum gastricum vitiat, orexin minuit.*

INFUSUM TORMENTILLÆ COMPOSITUM.*Наливка узиковая сложная.*

R. *Extracti Tormentillæ erectæ drachmas duas,
Corticis Lauri Cassiae scrupulos duos,
Aquæ ferventis uncias septem,
Syrupi simplicis unciam, vel
Mellis despumati semunciam.*

Macera extractum, et corticem per bihorium, dein colaturæ Syrupum vel mel addito.

U. *Ejus in chronicis diarrhœis unciatim tertia, vel hora quavis quarta propinati. Additis aliquot Tincturæ Opii guttis, efficiacus est. Hoc iisdem pollere virtutibus, quibus extractus Catechu, et succus Eucalypti concretus claret, experiundo didicimus.*

INFUSUM VALERIANÆ.*Наливка маунтая.*

R. *Radicis Valerianæ officinalis incisæ unciam, adfunde:*

Aquæ bullientis libram,

stent per horam in vase clauso et cola; interdum adduntur:

Aetheris sulphurici alcoholisati drachmæ duæ, vel

Tincturæ aromaticae, vel

Calami semuncia.

D. Unciae duæ, plus vel minus, pro re nata, exhibentur.

Eodem modo parantur:

INFUSUM ABSINTHII Н. Полынная.

— BACCARUM JUNIPERI. Н. Можжевельная.

— COCHLEARIE ARMORACIÆ. Н. Хрѣновая.

(Si libræ infusi Cochleariae Armoraciae tantumdem seminum Sennapeos nigrae et unciam Alcoholis Cochleariae Armoraciae ad-dideris egregium remedium in myodynia rheumatica (chronica,) paralysi, in quibusdam hydropiseos formis et scorbuto obtinebis.) —

INFUSUM CHAMOMILLÆ. Н. Ромашковая.

— SAMBUCI. Н. Бузинная.

— SALVIAE. Н. Шалфейная.

— MENTHA CRISPÆ. Н. Мята.

— MENTHA PULEGII. Н. Полейная.

— ANGELICÆ. Н. Дягильная.

— CALAMI. Н. Аирная.

— CHENOPODII. Н. Мари душистой.

— PHELLANDRII. Н. Укропника водяного.

LINIMENTUM ACETATIS CUPRI.

OXYMEL ÆRUGINIS .Ph. Ross.

Мазь уксусокислой мѣди.

R. Acetatis Cupri unciam,

Acidi acetici diluti impuri,

Mellis despumati, utriusque libram.

Primum Acetas Cupri solvatur in Acido acetico diluto, et postea admisceatur Mel despumatum et in sartagine cuprea coquatur ad consistentiam syrapi.

U. Vel adhibetur per se, aut dilutum aqua, vel etiam, si ita visum fuerit, excipitur Unguento resinoso, et tum ulceribus scrofulosis, aliisve refractariolis admovetur, magna cura cavendo, ne devoretur. Videsis: ACETATEM CUPRI.

LINIMENTUM ACIDUM.

М. Солекислая.

- R. *Mellis despumati unciam,*
Acidi muriatici guttulas viginti.
- Misce. Idem cum *Acido nitrico* parari potest.

U. Ulceribus faucium putescentibus, scarlatinæ anginosæ, vel atonicæ, penicillo admotum, et id genus aliis prodest.

LINIMENTUM ACIDUM PINEO-OLEOSUM.

М. Сърнокислая скрипидарная.

- R. *Olei pineo-laricini uncias duas,*
 — *olivi uncias quinque,*
Acidi sulphurici sesquidrachmam.
- Commisceantur.

U. Adusta; contusura; distorsio; erythema e morsiunculis insectorum; ecchymoma; præcipue perniones. Rejecto *Acido sulphurico* ad ventrem fricandum bis de die in hydrope, et ischuria valet.

LINIMENTUM AMMONIAE.

LINIMENTUM VOLATILE. Ph. Ross.

М. Щелочнолетучая, аммиаковая.

- R. *Olei olivi vel,*
 — *sesamini partes tres*
Ammoniae liquidae partem.
- Misce.

U. Myodynæ rheumaticæ, doloribus spasticis, vel aliis (ab inflammatione internarum partium) stipatæ, anginæ etc., conducit.

LINIMENTUM AMMONIAE CAMPHORATUM.

М. Аммиаковая камфорная.

- R. *Camphorae partem,*
Olei olivi, vel
 — *sesamini partes octo*

Ammoniae liquidae partes tres.

Fiat linimentum.

U. In nevroblacia, ut in paralysi, impotentia virili, ulceribus atonicis, scorbuticis, phagedænicis, pernione et id genus alius, debilitatem indicantibus, in eo auxilium est.

L I N I M E N T U M B I L I S S A L I N U M I.

M. Желчно-соленая 1.

R. *Bilis taurinae recentis unciam,*
Muriatis Soda depurati semunciam;
Aquaæ tepidae unciam,
Solve et adde:
Olei olivi semunciam, vel
quantum satis, ut fiat linimentum.

U. Struma hoc linimento adsidue perfricanda est, dein vero
E M P L A S T R U M A D S T R U M A M illico superdandum, subjunctis,
ut præscriptum est, **P U L V E R E S P O N G I E C O M P O S I T O** et
T R O C H I S C I S E J U S D E M .

L I N I M E N T U M B I L I S S A L I N U M II.

M. Желчно-соленая 2.

R. *Bilis taurinae recentis, quantum vis*
Muriatis Soda depurati,
Olei nucum Juglandis utriusque, quantum satis ad con-
sistentiam. Misce.

U. Ad tumores scrofulosos, aliasque astheniæ notas ferentes,
discutiendos (HUFELAND,) peridoneum.

L I N I M E N T U M C A L C A R E U M .

M. Водо-известковая.

R. *Olei Lini usitatissimi recentis,*
Aquaæ Calcariae, utriusque pares portiones.
Misce conquassando

U. Excoriationibus, adustis etc., conducibile.

LINIMENTUM OXYDI HYDRARGYRI RUBRI.

М. ртутнокрасной окиси.

R. *Oxydi Hydrargyri rubri* subtilissime pulverati granum,
Olei nucum Juglandis regiae drachmam ad sicicum.
 Misce.

U. *Oleum Juglandis* recenter expressum, jam solum ad annos oculorum tollendos commendatur, si malum non est adhuc inveteratum, atque in subjectis minus sensibilibus, illico post chemosin profligatam panno, ope penicilli, vel pennæ columbinæ, illinitur. In minus sensibilibus *oleum vestum*, atque ad ranciditatem fere inclinans, plus efficit. Si autem morbus est inveteratus, additio *Oxydi Hydrargyri rubri* re est, quod a grano ad tria usque augeri potest, successive amen, exigente in primis id mali pertinacia. Interdum leuconata et staphylomata spuria, proptoses corneæ, (rarius iridis simul) obfuscatae deformiter propendentis, at integræ, nec iuptæ, nec exesæ a morbose collecto humore distentæ hoc inimento debellata fuisse perhibentur. Infantibus neonatis, qui us subinde a mitiori ophthalmitidis gradu, pannis teguntur oculi, ita admovetur hoc linimentum, ut resupinatis cantho anteriori (ob clausas firmiter palpebras) instilletur. Penetrat ensim rimas palpebrarum, ut clausas, et ad locum pervenit affectum; copiosius autem apertis postea oculis.

LINIMENTUM OXYMURIATIS HYDRARGYRI.

М. Солепресыщенной ртупи.

R. *Oxymuriatis Hydrargyri* grana octodecim,
Muriatis Ammoniae depurati drachmam;
Aquaæ destillatae libram,
solve, misce et adde:
Cerati simplicis, vel
Unguenti Superacetatis Plumbi libram;
 Tiat linimentum.

LINIMENTUM PHOSPHORI AMMONIATUM.

M. Фосфорно-амміаковая.

R. *Phosphori semiscrupulum,*

solve in

Olei pineo-laricini uncia,— *camphorati semuncia,*

adde:

Ammoniae liquidae uncias duas.

Misce, fiat linimentum.

V. Excitans; resolvens.

LINIMENTUM RESINOSUM.

M. Смолистая.

R. *Unguenti resinosi,**Olei pineo-laricini, utriusque pares portiones,**Oleum paulatim misce cum unguento liquefacto.*

U. Ulceribus putescentibus, gangrænosis et quæ cacoëthe vocant, auxiliatur.

LINIMENTUM SAPONIS AMMONIATUM.

M. Мыльно-амміаковая.

R. *Solutionis Saponis,**Acetatis Ammoniae liquidi, utriusque unciam,**Ammoniae liquidae semunciam.*

V. Stimulans; solvens; rigiditati partium mollium post contusuras convenit; vel

R. *Acetatis Ammoniae uncias quatuor,**Solutionis Saponis uncias duas. Misce.*

V. et U. ut et præcedentis. Hoc tamen illo debilius est.

LINIMENTUM SAPONIS RUBEFACIENS.

M. Мыльная раздражающая.

R. *Olei olivi partes quatuor,*— *pineo-laricini,*

Aqua fontis,

Ammoniae liquidae singulorum partem.

Misce.

V. Egregie stimulans.

U. Paralysi, rheumaticæ myodynæ, arthrodynæ, doloribus spasmodicis, idoneum. Interdum additur præcedenti miscelæ: *Solutionis Saponis æqua portio, et Tincturae Lyttæ partes duæ.*

LINIMENTUM SAPONIS RUBEFACIENS FORTIUS.

М. Мыльная сильнѣе раздражающая.

R. *Saponis pineo-oleosi uncias duas,*

Oli pineo-laricini unciam,

solve in

Alcoholis diluti camphorati unciis octo,

adde:

Ammoniae liquidae sescunciam,

Tincturae Lyttæ semunciam

ut fiat linimentum solvendo leni calore *saponem in oleo*, et addendo cetera.

V. Præstans stimulans; solvens etc.

U. Myodynæ rheumatica, arthrodynia, paralysis. Idem *linimentum, linimenti Saponis ammoniaci, vicem persæpe obit, et etiam pro embrocatione adhiberi potest.*

L I N I M E N T U M S I M P L E X.

М. Просстая, масляно-восковая.

R. *Olei olivi, vel*

Alterius congrui partes quatuor,

Cerae flavae partem.

Colliquefiant in linimentum.

L I N I M E N T U M S T I B I A T U M.

Мазь мыльно-сурьяная.

R. *Tartratis Stibii et Potassæ drachmam,*

Solutionis Saponis semunciam,

Aquaæ puræ uncias quatuor.

Misce fiat linimentum.

LINIMENTUM SUBOXIDI HYDRARGYRI.

M. Р т у ш н а я.

R. *Unuenti Suboxydi Hydrargyri,*

Adipis suillæ depuratae, utriusque uncias quatuor,

Camphoræ unciam,

Alcoholis guttas quindecim,

Ammoniae liquidæ uncias quatuor.

Camphora cum Alcoholi, dein vero cum adipi et unguento contracta, tandem paulatim Ammonium liquidam instilla, cunctaque commisceto.

V. Stimulando vasculare (præprimis vero lymphaticum) et musculare systema, reactionem vis vitæ expeditiorem reddit, quapropter in variis morborum formis infricando sit appropriate idoneum remedium.

M A G N E S I A.

MAGNESIA USTA Ph. Bor.; MAGNESIA PURA Ph. Ross.

Магнезія пересженая.

R. *Subcarbonatis Magnesiae quantum lubet,*

In crucibulo probe tegendo, per sesquihoram igne fortiori rubescat ac dein frigefacta, in lagenam obturamento vitro muniendo, immissa, usui servetur. Si tamen cum acidis, quod interdum evenit, effervescentiam excitari, calcinationem protrahendam esse, etiam me tacente, liquet.

Q. *insipida* est, et *inodora*, alba, neque *aqua* solubilis; *Actio* autem *carbonico* imprægnata solvitur. Grana ejusdem 45 æqualia censemur granis 100 *Subcarbonatis Magnesiae*. *Permista* cum *Calcaria* improbatur.

V. Absorbens, quin ructus, ut *Subcarbonas* ejusdem, excitet; laxans vero, acore in primis viis adtracto.

U. Ad subigendum succi gastrici acorem, atque in affec-

tionibus hinc pullulantibus, puta soda etc., commendatur, et quoniam Subcarbonas ejusdem tertiam fere *Acidi carbonici* partem tenet, quod aeriformiter extricatum, ructus flatusque pro-
ducit molestos, haud immerito præfertur huic in morbis præ-
sertim infantum, et hypochondriacorum ex acore primarum
viarum originem trahentibus, et tunc pro re nata cum *Elaeo-*
saccharo A. Foeniculi, Menthae piperitae, aut urgentibus spasmis
cum succo *Hyoscyumi spissato*, nuptum, aut *Oxydo Zinci* imperatur.
Valet etiam ad acria ventriculoque noxifera, involvenda.
Fluida forma sumi potest tantum cum *gummi Acaciae verae, Saccharo*, sorbitonemque hac ratione puellis cita alvo aut acri-
monia bilis acida laborantibus non inutilem præbet. Adhibetur etiam *Magnesia*, urgente dysodontiasi, ad curanda aphthosa infantum ulcera. Efficacissima est sane, ut quidam neoterici; in primis vero *WOLLASTON, MARCET, et BRANDE*, analysi calcu-
lorum probarunt, adversus urolithiasin; neque enim nobis latet,
nucleos calculorum in renibus productos *acidum lithicum (uri-*
tum,) pro basi tenere, (sedimento in matula rubro se prodens,) quod *Magnesia* in primis, et alia ejusdem indolis, puta: *sales kalini fixi, Subcarbonates Soda et Potassae, Aqua Calcariae Sapo,* si non coercent prorsus, (calculos solvendo,) ad minimum secre-
tioni ejusdem, genesi calculorum faventi, officiunt. Si sedi-
mentum lotii albescit, vel in cinereum vergit colorem, calcu-
los esse solubiliores, et *Phosphatem Calcariae, — Ammoniac-*
Magnesiae, Oxalatem Calcariae, Oxydum cysticum, — xanthi-
cum, tenere in propatulo est, et tunc *acida varia, puta:* *citricum, carbonicum, vel muriaticum, pro virtute, qua pol-*
lent, lithontriptica, ad accommodationa esse credendum est. *Conjunctio Magnesiae (pro interno usu,)* cum *Acido tartario* sat vulgaris, qua *sal neuter Magnesiam* facultate anta-
cida fraudans, pronascitur, damnanda est. Decomponuntur
Magnesia Supersulphas Aluminiae et Potassae, Murias Ferri, Su-
pertartras Potassae, Oxymurias, et Submurias Hydrargyri, Carbonas
Ammoniae. Efficacia *Cinchonae* intentiorem reddere fertur.

D. A granis decem ad scrupulum datur.

MASSA ACETATIS CUPRI COMPOSITA.
vulgo Lapis Divinus.

Составъ уксусокислой мѣди сложный; вра-
 чебный камень.

R. *Acetatis Cupri*,
Supersulphatis Aluminæ et Potassæ,
Nitratis Potassæ singulorum unciam.

Misce et liquefac in balneo arenæ, solerter vitata *Nitratis Po-*
tassæ detonatione; sub finem adde:

Camphoræ tritæ drachmam ad drachmas duas.
 Misce.

V. *Collyrium Cupri compositum*; — — *opiatum.*

МЕЛ ДЕСПУМАТУМ.

Медь выпѣненный, очищенный.

R. *Mellis crudi*, quantum lubet,
Aquaæ communis, quantum satis.

Coquatur despumando, donec *Syrupi* crassitudinem fecerit
Misturis, decocturis, infusionibus additur variis.

V. *Hydromel*; *Linimentum Acetatis Cupri*; — *acidum*; *Me-*
Oxycocci. Videsis: HYDROMЕL.

MISTURA ACETATIS POTASSÆ JUNIPERINA.

Смѣшеніе уксусокислого попаша можжевельное

R. *Subcarbonatis Potassæ depurati* semunciam,
Acidi acetici diluti, quantum satis ad saturationem,
 dein adde:
Decoctionæ Juniperi communis (ex unciis duabus bac-
 carum ejusdem præparatæ,) libram,
Olei pineo-laricini, in *Vitello evi* soluti, drachmam,
Mellis communis unciam. Misce.

D. Secunda quaque hora vasculum dimidium in hydrope.

MISTURA ASSÆ FŒTIDÆ.

См. Дурно-пахучее.

R. *Gummiresinae Assæ fœtidæ* drachmam,

*Acetatis Ammoniae liquidi semunciam,
Aquæ aromaticæ sescunciam,
solve.*

U. In asthmate spasmatico acuto (MILLAR.) subjuncto
LYSTERRA ASSÆ FŒTIDÆ, vel eodem OPIATO; remittente
utem malo, HAUSTU CINCHONÆ, propinato, tertia quaque
ora repetendo.

D. Secunda quaque hora cochlear dandum.

MISTURA ASSÆ FŒTIDÆ COMPOSITA.

См. дурнопахучее сложное.

R. *Solutionis Assæ foetidae uncias octo,*
Acetatis Ammoniae liquidi uncias quatuor,
Tincturae aromaticæ,
— *Digitalis, utriusque semunciam.*

U. Asthmati, hydropisi, phthisi pituitosæ, hæmoptysi ad-
bommodata mistura (ROGERS.) Eadem, ut præcedens, dosi
origenda.

MISTURA CAMPHORÆ.

См. Камфорное.

Fit eodem modo, quo *Acetum* ejusdem, hac tamen sub di-
inctione, quod loco *Acidi acetici diluti impuri* adhibeatur
qua quælibet *aromatica*, vel *mucilago gummi Acaciae veræ*; non
st tamen ita conservabilis *Mistura*, ut *Acetum camphoratum*.

MISTURA CAMPHORE ACETATA.

См. Камфорно-уксусное.

R. *Camphoræ drachmam,*
Alcoholis scrupulum,
tritis sensim admisce:
Gummi Acaciae veræ pulverati,
Sacchari albi utriusque unciam,

Acidi acetici diluti sesquilibram:
Servetur usui in vitro bene obturando.

V. Leviter stimulans sub initio, dein narcotica, secretiones
præsertim per exhalationem cutaneam sollicitans.

U. Variis asthenicis morbis, typho, cynanche malignæ, po-
dagræ retrocedenti, variolis retrogradis, facultate stimulante,
opitulatur. Pneumonitidi vero, myositidi rheumaticæ, mania
et ceteris astheniaæ notas ferentibus, vi, qua pollet, narcotica
antispasmodica, admodum.

D. A semuncia ad duas uncias et amplius, sæpius de die,
vitrum fortiter ante singula præbia, conquassando, exhibetur.

MISTURA CARBONATIS CALCARIÆ COMPOSITA.

С м. М ъ л о в о е с л о ж н о е:

R. *Carbonatis Calcariæ* praeparati,
Gummi Acaciae verae pulverati;
Sacchari puri singulorum drachmas duas;
Tere simul, dein sensim adde:
Vini Ipecacuanhae sesquidrachmam,
Tincturae Opii drachmam,
— *aromaticæ* sescunciam,
Aquaæ fontanae, vel
— *Menthae piperitæ*, vel
— *crispæ* uncias octo;
Misce.

V. Antacida; peptica; adstringens.

U. Cardialgia, diarrhœa, dysenteria sub finem.

D. Uncia ad duas, ter, pro re nata, de die.

MISTURA CERÆ ADSTRINGENS.

С м. В о с к а в я ж у щ е е:

R. *Cerae flavae* drachmas duas,
Mucilaginis gummi Acaciae verae semunciam;

Liquefactis igne, trituratione continua, adfundito;
Infusi Angelicae, vel
 —— *Valerianaæ off.* uncias septem,
 dein solve:
Extracti Catechu drachmas tres, vel
 —— *Tormentillæ* tantumdem,
Mellis communis unciam.
 Commiscé.

U. In dysenteria, diarrhoea diurna, abnormi irritabilitate,
 doloribus abdominis, stipata, in primis subductis cruditatibus,
 aut iisdem per superiora *pulvere C. Ipecacuanhae* eliminatis,
 magnæ est efficaciæ.

D. Omni hora semuncia (conquassando) præbetur.

MISTURA CHELIDONII MAJORIS.

См. Экстрактно-чистяковое.

R. *Succi Chelidonii spissati* drachmam,
 solve in
Aquaæ destillatae unciis quatuor,
 adde:
Oxymellis scillini,
Syrupi Heraclei utriusque unciam.

D. Quarta quaque hora cochlearia duo exhibentur.

MISTURA CINCHONÆ.

См. Хинное.

R. *Corticis Cinchonae off.* pulverati unciam,
Extracti Glycyrrhizæ drachmam, vel
Mucilaginis Acaciae veræ uncias duas,
Aquaæ fontis libram,
Tincturae aromaticæ semunciam, vel
 —— *Cinchonæ* unciam.

Quibus, si opus addito: *Acidi sulphurici diluti* drachmas duas.
 Ante singula præbia conquassetur phiala.

MISTURA CITRATIS POTASSÆ STIBIATA.

См. Лимонокислого помаша суръмяное.

R. *Subcarbonatis Potassae depurati drachmas duas,*
Succi fructus Citri medicae uncias tres, vel
quantum sufficit ad saturandum, peracta effervescentia addito:
Aquaæ Menthae p. uncias tres vel quatuor,
Tartratis Stibii et Potassæ grana duo, vel
Vini stibiati unciam,
Syrupi simplicis tantumdem,
ut mensura totius misturæ sit unciæ octo.

Scire licet, *Misturam Riveri*, nil aliud esse, quam *Citratæ Potassæ liquidum*, unciatim per se, vel idoneo vehiculo exhibendum. Additis singulæ *ejusdem* unciæ, sex guttis *Tincturæ Opii* sudorem cit, et cito, et efficaciter.

V. Excretiones promovens et præcipue exhalationem dermaticam, **HAUSTUI SUDORIFERO**, æquiparabilis.

U. In perfrictione et morbis hinc oriundis, inflammationibus sthenicis, astheinicis.

D. Uncia, subsequentibus vero bihoriis **seinuncia**, vel prout necessitas exegerit; ad vomitionem vero cohibendam sine *stibiatis* recte adhibetur. Si loco *Succi Citri*, *Acidum aceticum impurum dilutum* adhibueris, *Acetatem Potassæ liquidum* obtinebis, et tunc *mistura*, vi urinam ciente et cathartica, hydropisi conveniet (Vides: **MISTURAM ACETATIS POTASSÆ JUNIPERINAM**.

MISTURA HERACLEI GUMMIFERI.

См. аммоніачное.

R. *Gummiresinae Heraclei gummiferi drachmas duas,*
solve in
Aquaæ Menthae crispaæ, vel
— Anethi Foeniculi vel
— fontanaæ unciis septem,

et adde:

Tincturæ aromaticæ drachmas duas,
Oxymellis scillini unciam.

V. Stimulans; attenuans pituitam, lotium et sudorem movens.

U. Dyspnea, pneumonitis asthenica, hydrops, morbi pulmonum pituitosi, splanchemphraxis.

D. Uncia, vel sescuncia, tertia, vel quarta quaque hora. Singulis dosibus interdum adduntur:

Subcarbonatis Ammoniae, vel
— Potassae depurati grana duodecim, vel
Tincturæ Opii camphoratae semidrachma ad duas
drachmas.

Si gummiresinae *Heraclei gummiferi* drachmæ duæ in *Aquaæ fontis*, vel *Aquaæ Menthae crispæ*, vel *Aquaæ Foeniculi unciis septem* sunt solutæ, lac ejusdem, sic dictum, habebis.

M I S T U R A J U G L A N D I S.

См. Волоскооръховаго экстракта.

R. *Extracti nucum Juglandis immaturarum semunciam,*
Aquaæ Lauri Cinnamomi unciam,
Syrupi simplicis, vel
Mellis sesquidrachmam. Misce conquassando.

U. Helminthiasis; præsertim vero ascarides lumbricoides.

D. Ter de die triginta guttæ bimulis, trimulisque pueris exhibendæ, adultis guttæ centum in die.

M I S T U R A M A G N E S I A E.

См. Углекислой магнезии.

R. *Subcarbonatis Magnesiae drachmam,*
Aquaæ fontanae, vel
— Menthae crispæ, vel
— — — piperitæ selibram,
Tincturæ aromaticæ drachmas duas,
Ammoniae liquidæ drachmam.
Misce.

D. Uncia ad duas, pro re nata, vel sumto cibo, si cardialgia urget.

M I S T U R A M I L L E F O L I I.

См. Экстракта Тысячелистного.

R. *Extracti Millefolii semunciam,*
Aquae Menthae piperitae uncias duas,
Elaeosacchari Menthae semunciam.

U. In hypochondriasi, propinato, ter in die, cochleari.

M I S T U R A M U R I A T I S A M M O N I A E S T I B I A T A.

См. Солекислаго аммиака сурьмяное.

R. *Muriatis Ammoniae depurati,*
Extracti Glycyrrhizae,
— Absinthii singulorum drachmam,
solve in
Aquae Menthae piperitae unciis quatuor,
adde:
Vini stibiati drachmam.

U. Dialeipyris convenit, exhibito secunda quaque hora
 cochleari (vel duobus,) tempore apyrexias.

M I S T U R A M Y R R H E F E R R A T A.

См. Смирны желъзистое.

R. *Pulveris gummiresinae Myrrhae drachmam,*
Carbonatis Ferrri præcipitati semidrachmam,
Syrupi Zingiberis semunciam,
simul tere et adde:
Aquae Menthae piperitae selibram,
Tincturae Cinchonae compositæ semunciam.
Misce.

V. Stimulans; tonica; peptica.

U. Cachexia, phthisis, cacochymia, exhibita, bis terve de
 die, sescuncia.

Quandoque vices superioris supplet sequens:

R. *Tincturæ Muriatis Ferri* uncias duas,
— *aromaticæ semunciam.*

Misce.

D. Drachma ter de die ex vasculo **INFUSIM. CHAMOMILLÆ.**

MISTURA MYRRHÆ FERRATA MITIOR.

См. Смирны желѣзистое слабѣйшее.

R. *Gummiresinae Lauri Myrrhae drachmam,*
Subcarbonatis Potussae depurati grana viginti quinque,
Aquæ Menthae Pulegii selibram,
Sulphatis Ferri triti scrupulum,
Tincturæ aromaticæ semunciam,
Syrupi Heraclei sescunciam.

Gummiresinae, Subcarbonati Potussæ, Syrupoque simul contritis,
Aquam et Tincturam adjicito; dein vero Sulphatem Ferri et
misturam in vase vitro, rite obturato, nec non ad obturacu-
lum usque repleto, ne major Ferri oxydatio fiat, serva.

V. et U. ut et præcedentis. Mistura hæcce minus irritans,
quam præcedens, vel cetera *Ferri præparata*, continet *Ferrum*
in minimo oxydationis gradu, plus attamen *Acidi carbonici*,
quam *Suboxydum Ferri* (*Ferri rubigo*), ubi metallum maximo-
oxydationis in gradu est. Persæpe in hecticis febribus, qui-
busdamque phthiseos formis, catarrho chronicæ, chlorosi et
ceteris morbis, ubi virtus ejus tonica valet, adhibetur, id
que unciatim bis de die.

MISTURA NITRATIS POTASSÆ.

См. Селипранное.

R. *Nitratis Potassæ depurati drachmam,*
Aquæ Menthae piperitæ vel
— *fontinalis uncias tres.*
Solve et adde:
Acidi acetici diluti impuri sescunciam.

D. Uncia, tertia vel quarta quaque hora. Interdum singulis dosibus adduntur: *Tincturae Opii* guttæ quinque, ad quintam vel sextam vicem, intercapidine nychthemeris.

M I S T U R A S C I L L I N A.

См. Морсколуковое.

R. *Aquaæ Menthae piperitæ* uncias quatuor,
Syrupi Scillæ, vel
Oxymellis ejusdem uncias duas.
 Misce.

Cui interdum additur: *Tincturae Opii camphoratae* uncia.

U. Sputum et lotium movendo, in tussi pituitosa, pneumonitide asthenica et similibus prodest, semuncia ad unciam, quater de die, exhibita.

M I S T U R A T A R A X A C I.

См. Экстракта одуванчикового.

R. *Extracti Taraxaci liquidi* uncias duas,
Aquaæ Menthae piperitæ selibram,
Mellis despumati unciam.

U. In infarctibus viscerum, ictero etc., subjuncto *clystere* e Speciebus *resolventibus*, vel, pro re nata, e *Sopientibus*.

M I S T U R A T A R A X A C I C O M P O S I T A.

См. Экстр. одув. сложное.

R. *Acetatis Potassæ liquidi*,
Extracti Taraxaci,
Infusi Rhei,
Mellis despumati, singulorum pares portiones.

U. In iisdem morbis propinato cochleari tertia quaque hora. Tantumdem *Tincturae Gentianæ* addi potest.

MOSCHUS ARTIFICIALIS.

М скусъ и скусственный.

R. *Olei Succini depurati* drachmam,
huic sensim, sensimque, et cautim
instilla:

Acidi nitrico-nitrosi semunciam,
ut coëant in massam flavidam, *aqua* dein ferventi eluendam,
usuique servandam.

Q. Hæc resinosa massa est fragrantissima *odore Moschum*;
(ast, si crematur, spirat parum ammoniacalem;) *colore autem*
corticem Citri Aurantii æmulans, in *Alcohole* perfecte solubilis.

V. Iisdem fere pollet viribus, quibus *Moschus naturalis*.

U. A SWIETENO, STÖLLERO, pro succedaneo *Moschi naturalis*, commendatus, atque præsertim adversus epilepsiam
adhibitus est, haud secus ac scelotyrbe, pertussi, asthmati,
aliisque, his similibus, morbis, obpositus.

D. Exhibitetur in *pulvere* a granis decem ad scrupulum, vel
in *tinctura*.

MUCILAGO ACACIAE VERÆ.

Слизь камеди Аравийской.

R. *Gummi Acaciae verae* pulverati partem,
Aquaæ bullientis partes duas.

Solvito *gummi* triturando cum *aqua*, per vices adfusa, ut re-
digatur in mucilaginem.

V. Involvens; leniens; nutriendis.

U Internus, et externus. Ad effingenda *catapotia*, perido-
nea. In variis corporibus solvendis, et *aquaæ* adpropriandis, uti
Camphora, *Oleo*, et *resinis* optimum præbet ministerium. Ut
subigatur sicilicus *olei unguinosi*, cum *aquaæ* uncia, requiritur
drachma *mucilaginis* hujus. Ita paratur: MUCILAGO GUMMI
PRUNI DOMESTICÆ.

MUCILAGO SEMINUM LINI.

Сл. Льняныхъ съмянъ.

R. *Seminum Lini usitatissimi integrorum unciam;*

Aqua communis uncias decem,

Coque leni calore, sub perpetua agitatione, ad remanentiam selibræ. Cola et exprime per linteum vetustum.

MURIAS AMMONIÆ DEPURATUS.

AMMONIUM MURIATICUM *Ph. Bor.*; SAL AMMONIACUM

DEPURATUM *Ph. Ross.*

Солекислый амміакъ очищенный; чистый
наша пыть.

R. *Muriatis Ammoniae venalis, quantum lubet;*

Aqua fervidae triplam quantitatem,

Solve, dein filtra, et leni igne evapora ad pelliculam, postea in loco frigido sepone, ut crystalli formentur in charta bibula sic scandæ. Hac solutione fuligo, et quisquiliæ præcipitantur; salia autem immista, ut *Sulphas Sodaæ*, sublimatione sunt separanda.

Q. Hac ratione ex *Ammoniae* p. 40, *Acidi muriatici* p. 52, et aquæ p. 8, coalescens, efformat crystallos aciculares, octogonas, vel bipinnatas, albi coloris, transparentes; saporis pungentis, suburinosi, refrigerantis, perquam ingrati, quæ in aquæ temperatæ tripla, fervidæ autem æquali copia solvuntur. *Alcohol* plus, quam dimidiam partem absorbet. Discidium particularum patitur hic sal additis *alcalinis* fixis, *Acidis* (*sulphurico*, et *nitrico*), aqua etiam *Calcariae*.

V. Extero atque interno usu leniter stimulans, resolvens, quin irritet, adapplicationis modo, quantitate, et diverso regmine sudorem, lotium, pituitam movens, imo, et alvum subducens.

U. Experientia compertum est adversus hypersthenicas febres valentissimum esse remedium, nulla cæteroquin ratione

habita formæ morbi (HORN), præsertim alienis malo *acidis*, loco *Nitratis Potassae* (ARNEMANN.) Neque repugnat eum ab ipso morbi initio præberi, præcipue, si circumstantes ægroti res (ut ventriculus, interanea,) ita comparatae sunt, ut *Nitras Potassae* neutiquam dari queat, vel morbi genius, ejusque complicatio officit (JAHN.) In pleuritide cum jecinoris inflammatione complicata, sananda, cum gummi *Heraclei gummiferi*, et extracto *Leontodontis Taraxaci aqua solutum*, fecisse multum, testis est HIRSCHEL. Gastritidi, enteritidi ob sensibilitatem adfectarum partium alienus. Insignis ejus vis est stimulans atque in incidenda pituita, ut in vitiis digestionis, morbis pulmonum, et uteri asthenicis, in febribus catarrhalibus, mucosis, in amenorrhœa, splanchemphraxi, diuturnisque illis malis, quæ comitantur, aut excipiunt illam, ut ex. gr. in hydrope, chlorosi, hypochondriasi, in catarrhis cum multa bronchiorum pituita, imo etiam in pneumonitide leviori, eadem stipata, cum tanillo *Tartratis Stibii* et *Potassae*. In febribus nervosis et putridis (mitiori in typho,) epidemicis, ab initio cephalalgia vehementi stipatis, quam pede pressim languor, imbecillitas, cibi fastidium, diarrhœa fœtens sequuntur, sub pulsu debili, celesti, duriusculo, genis rubentibus, lingua arida, cœruleamente, tremula, oculis rubris, micantibus, anima fœtente etc., insignem hujus remedii virtutem expertus est JAHN. In typho putrido, præsertim instantे gangräena, variolis collabentibus, cum *Camphora*, multum præstat. In dialeipyris efficacem esse MUYS, multis observationibus ad liquidum deducere conatus est, quas suis quoque WOLF, LÆSEKE, et JACOB confirmarunt, sed in his etiam *cortex Cinchonae off.*, aliaque succedanea, non male adduntur. Non desunt, qui eundem adversus scorbutum, phthisin etc., commendarint, non ubique tamen subscribente experientia. Extus late ejusdem usus patet: Pronitati in putredinem efficaciter adversari ill. PRINGLI pericula, extra corpus vivum capta, evincunt, hinc plurimum pollet in partibus corporis mollibus, gangräena, et sphacelo correptis (JUSTAMOND,) a sanis separandis, nec minus in necroscia ossium inspersus, (modo partes

vicinæ molliores contra ejus acrimoniam rite munitantur (**T H E D E N**,) ita etiam in herniis incarceratis, ubi, aut gangrænæ, aut sphaceli metus subest, si aut *cataplasmatibus* addatur, aut *temento* cum *plantis aromaticis* (**S C H M U C K E R**,) aut *aqua* cum *cortice Cinchonæ off.* decocta, solutus, per fatus modum, ut plurimum frigidi, admoveatur, in furunculis etiam gangrænosis, si cum *cortice Cinchonæ*, et *unguento resinoso* subactus adhibetur (**I D E M**.) Specifica virtute ad curandam psoram gaudere cl. **P L E N C K** experiendo didicit. Magna quoque *Muriatis Ammoniae depurati*, quam extus stimulando exserit, vis est discutiens cœterisque *Salibus neutrīs* hoc titulo præfertur merito. **S M I T H I I** experimentis constat, *salibus neutrīs*, irritabilitatem infringi, si *Muriatē Sodaē* exceperis. In tumoribus glandularum frigidis, artuum, hydarthro, fungo articulari (**K I R K L A N D**,) cysticis, in varicibus gravidarum, ecchysibus, et similibus. Cl. **K E A T E** auctor est, ut *Muriatis Ammoniae* in *Aceto* et *Alcoholē diluto* (*Muriatis Ammoniae uncia, Aceti, Alcoholis utriusque unciis quatuor soluta*) solutus hydrocele superdetur, quo malum duodecimta dierum spatio plerumque curavit (*Cases of the Hydrocele*,) si præterea punctio scroti accesserit, malum, modo testiculus ipse sit sanus, neque, aut pure, aut crurore scateat, vel hydrocystidibus foedetur, citra recidivam, et tuto, et cito curatur. Nec minus utilem se præstítit in stagnationibus lactis, tumoribusque coagulo ejusdem ortis (**J U S T A M O N D**,) aut in pernionibus inflammationibusque præcipue oculorum, testiculorum (**W I L M E R**.) Ita nunc mera *aqua*, medo per modum *Oxycrati* (*aquæ, et aceti*) (**B E L L**,) modo *aquæ* partibus viginti, *liquoris vitigeni* partibus quinque, et *Aceti* partibus duabus cum dimidia (**V A N S W I E T E N**,) nunc una cum æquo *Nitratis Potassæ* pondere, octaginta *aquæ* et viginti quatuor *Aceti* partibus solutus, vel cum aliis conjunctus, et per fatus modum applicatus in sugillationibus, contusiones (**R I C H T E R**,) vulnera sclopetis inficta (**I D E M**,) ossium fracturas, luxationes, toties insequentibus, et comitantibus, magni æstimatur; *solutio* ejus, si, dum calet, superdetur, valentior est (**H O R N**,)

ni si frigoris admovendi, ut in SCHMUCKERIANIS fomentis incidat necessitas. Gargurismatibus et Collutoriis saepe additur, ut in ingina asthenica (pituitosa,) inflammatoria, tumore glandularum salivalium, glossoplegia. Irritandi scopo clysteribus adjiciuntur, quibus asphyctici, aqua submersi, suffocati, apoplectici suscitantur. Dentibus adfricatus mucum adhaerentem abstergit, quo in consortio Cinchonae corticis dentifricium praebet non spernendum. Drachmam Muriatis Ammoniae in siclico Succi Citri medicae solutam ad odontalgiam, (gossypio hac solutione imbuto, dentibus indito,) arcanum fuisse, GODFREY memoriae prodidit. Leni denique, qua pollet, acrimonia, haud est impar verrucis, quibus antea humefactis, bis vel ter quotidie adfricatur, citra dolorem exedendis (BELL.)

D. Praebium, quod porrigitur, pro alio atque alio medentis sine, ægrotantis sexu, ætate, conditione, morbi indole, aliud atque aliud est, ut a granis denis (secunda) ad drachinam (quaque sexta hora) deglutiendam ascendat. Vix ultra siclicum tuto datur. Major quartinas ventrem extimulat. Medo in pulvere, modo solutio præscribitur, aut plerumque in consortio aliorum. Juvat eundem saporis ergo cum Sacchare, vel mell, vel extracto aut infuso Glycyrrhizae glabrae, vel syrupo quodam mitceri. Nec additamenta neutrorum Salium quorundam, ut Nitrois Potassae, pro re nata, aliena sunt. HORNIUS adjectionem Camphorae, Cinchonae officinalis, Vini, extractorum amarorum, aliorumque stimulantium vix impune ferri existimat. Murias Ammoniae decomponitur Acido nitrico, sulphurico, tartarico, Aqua Calcariae Potassa, Soda, Acetate Potassae, Superacetate Plumbi, Sulphato Zinci, Supersulphate Aluminæ et Potassæ.

V. Fomentum discutens; Gargarisma Muriatis Ammoniae; Mixture Muriatis Ammoniae stibiata; Murias Ammoniae ferratur; Pulvis Muriatis Ammoniae stibiatus; Subcarboneas Ammoniae.

MURIAS AMMONIÆ FERRATUS.

AMMONIUM MURIATICUM MARTIATUM Ph. Bor.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES — Ross.

Солекислый Аммиакъ желѣзистый.

R. *Muriatis Ammoniae depurati*, subtilissime pulverati,
partes duas,

Tincturae Muriatis Ferri alcoholisatae partem.

Terantur in mortario vitro, donec massa prorsus exsicetur et
colorem e flavo aurantiacum obtineat, quæ dein in pulverem
tenuissimum redacta, in lagena probe claudenda, servetur.

Q. Hac ratione coalescens, æri expositus, deliquescit, in
tripla vero aquæ quantitate solvitur. Salsus est, unaque pun-
gens et stypticus. Colore sit aurantiaco vivide tinctus; mini-
me vero fusco, aut subflavo.

V. Stimulans vasa torpida; roborans; deobstruens; diuretica.

U. In plerisque morbis, *martialia exigentibus*, atque potis-
simum colluvie pituitosa primaruim, et muco secundarum vi-
arum stipatis, remedio est, hinc commendatur in splanchem-
phraxi, hydrope, hypochondriasi, chlorosi, ictero, atrophia, ra-
chitide, scrofula, struma, asthmate, imo et in dialeipyris. In
fœditatibus quoque cutis efficacem se præsttit, puta: in psora,
herpetibus, ulceribus cacoëtheis, canceraticis etc., haud secus
ac in blennorrhœa.

D. Ad grana duo, quatuor, ad decem, in solutione; in pulve-
re enim et pilulis humorem adtrahit. Interdum eidem nubun-
tur, pro ingenio morbi, *extracta amara*, *bilis taurina*, *Scilla ma-
ritima*. Aliis *electuarii* forma præplacet.

MURIAS BARYTAE.

BARYTA MURIATICA Ph. Bor.; TERRA PONDEROSA

SALITA Ph. Ross.

Солекислая тяжелая земля.

R. *Barytae*, vel *Carbonatis* ejusdem quantum placet,

Acidi muriatici, quantum satis ad perfectam saturationem. Vel

R. *Sulphatis Barytae* bilibram,

Carbonis lignarii in pulverem triti uncias quatuor.

Sulphas torreatur igne, quo facilius in pulverem tenuiri queat, cui carbo pulveratus admiscendus. Materia dein crucibulo immittatur, atque operculo adaptato, fortiori igne, per sex horas urgeatur. Probe trita immittatur aquae bullientis libris sex in vitro vase, vel figulino et permisceatur agitatione, aëris aditu, quantum fieri potest, præcluso. Vas in balneo vaporis stet, donec pars neutram soluta subsederit; dein liquor effundatur. Adfundantur illi denuo aquae bullientis libræ quatuor, quæ post agitationem ac subsidentiam liquori priori addantur. Liquori adhuc calenti, vel si friguerit, iterum calefacto, instilletur Acidum muriaticum, donec moverit effervescentiam; dein coletur ac vaporet, ut crystalli formentur, in bibula siccandæ, et vase clauso servandæ. Hæ crystalli, si bruneum referunt colorem, submittuntur iterum per semihora in incandescentiae, ac dein in aqua destillata solutæ, ut supra dictum est, in crystallos reformatæ, fiunt purissimæ.

Q. Sic e Barytae 0,65, Acidi muriatici p. 0,18; et aquæ p. 0,16. (BUCHHOLZ) coalescens effingit crystallos primordiales e prismatibus cum basi quadrata (HAUY,) interdum subpyramidales, et octogonales, quæ in aëre, non mutabiles quadupla aquæ frigidae copia solvuntur. Sunt albæ, amariuscæ, acres et nauseosæ.

V. Stimulans (citra calorem;) præcipue vasa absorbentia adficiens; deobstruens, sudorem quoque et lotium movens; anthelminthica.

U. In morbis plerumque systematis absorbentis valet; hinc in scrofulosis affectionibus a CRAWFORDIO primum laudatus, subscriptore dein ill. HUFELANDO, quod malum, si non semper ex toto amovere potest, levat tamen symptomata, tumores glandularum discutit, polymorpha exanthemata e morbis vasorum absorbentium originem trahentia, tollit. Laudatur etiam

in chlorosi. *Aquæ destillatae*, vel *aromaticæ septupla* quantitate solvitur, et addito, vel *Syrupo*, vel in scrofulis, *Vino stibiato*; in chlorosi vero *Muriate Ferri*, a guttis viginti ad triginta ter per diem datur. Commendabatur in mesenteremphraxi, atroplaxi, asthmate, tuberculis pulmonum, hæmoptysi, blennorrhœa, leucorrhœa, haud secus ac in fœditatibus cutis: psora, herpetibus, lepra, carcinomate etc. Extrinsecus in *solutione* (drachma aut semi drachma ejusdem in uncia aquæ,) scrofulosis localibus affectionibus, eruptionibus cutaneis, tumoribus glandularum; ophthalmitidi et maculis corneæ curandis admovetur.

D. ab I ad duo grana ter de die, vel in *solutione*. His subsistere exiguis dosibus satius est, præsertim, si coger mobili nervorum systemate prædictus est; oriuntur enim usu majorum præbiorum: anxietas, nausea, vomitus, vertigo, artuum tremores cum sudore frigido. Quo, præter opinionem, facto, *lac*, *mucilaginosa*, *Sulphur Soda* etc. obviam eunt.

V. Solutio Muriatis Barytae.

M U R I A S C A L C A R I A E.

CALCRIA MURIATICA Ph. Bor.; CALX SALITA. Ph. Ross.

С о л е к с и с л а я и з в е с т ь.

R. *Carbonatis Calcariæ* præparati (depurati,) quantum lubet, *Acidi muriatici*, quantum sufficit
ad solutionem saturandam.

Humor percolatus in vitro vase ad siccitatem vaporet. *Sal calens* indatur vitreæ lagenæ, illico obturandæ, pro usu servandus.

Q. Sic pronatus constat e *Calcariae* p. 44, *Acidi muriatici* p. 31 et *aqua* p. 25, sistitque crystallos pyramidales ad alterum citio deliquescentes, in *Alcohole diluto* et *aqua* (sub frigoria exuberantia) solubiles, saporeque pollentes protinus refrigerante, mox acri, pungente et amaro, cui sensus caloris accedit.

V. Eadem quæ *Muriatis Barytae* (FOURCROY,) stimulans; excitans; emetica; deobstruens; diuretica.

U. Incitando mucosam intestinorum tunicam, auget secretiones, pituitam solvit educitque, hinc efficacia ejusdem repetenda in affectionibus pulmonum, et pituitosa primarum viarum colluvie, vasa absorbentia glandulasque adficiendo stagnantes in iis humores reserat, quapropter scrofulalis obponitur (Wood) morbisque congenitibus, præsertim vero fœditatibus cutis, imo etiam helminthiasi. *Extrinsicus* in tumoribus articulorum laudatur.

D. *Solutionis* guttæ triginta infantibus; adultis vero drachma ter de die. Majus præbium vomitum movet. *Extrinsicus* non male, pro re nata, *frigidis fomentis* additur.

V. *Aqua marina* artefacta; *Solutio Muriatis Calcariæ*.

MURIAS MAGNESIE.

Солекислая Магнезія.

R. *Subcarbonatis Magnesiae*, quantum lubet,
Acidi muriatici, quantum satis,
ad plenam saturationem.

Filtra et ad siccitatem evapora, vasisque probe clausis, ne deliquescat, servato.

V. *Aqua marina*, *artefacta*.

MURIAS SODÆ DEPURATUS.

Солекислая сода; соль поваренная
очищенная.

R. *Muriatis Sodaæ venalis* quantuin lubet,
solvito tripla quantitate
Aquaæ bullientis.
Solutioni fervidæ instillato:
Subcarbonatis Sodaæ solutionem, donec nulla amplius turba oriatur.

Sedimento sponte posito, humorem per chartam cola, ac de-in leni evaporationi, ut surgant crystalli, exponito, quæ in bibula charta siccentur.

Q. Ex *Acidi muriatici* 52, *Sodæ* 42 et *aquaæ* 7 portionibus (secundum BERGMANNUM) constans, *aqua* facile (in *frigidatæ* $2\frac{1}{4}$, *bullientis* $2\frac{1}{4}$ partibus) solubilis, dissipata sensim leni eoque continuo calore, *aqua*, in crystallos cubicas aggregatus, delabens, quæ prunis inspersæ cum crepitu in minora frustula, et cum *aqua* ad crystallorum formam et pelluciditatem faciente, utriusque hujus dotis jacturam faciunt, *aëri* libero expositus, neque fatiscens, neque, si, quod raro occurrit, omnino purus sit, humescens; *saporis* est proprie salsi, minime amari.

V. Ejus dynamica et præcipua est, qua sollicitat vasa tunicæ mucosæ capillaria, ut videlicet uberior muci nativi copia, secernatur educaturque, hinc maxime idoneus est, hanc activitatem intendendo, quin systema musculosum et nerveum irritet, ut etiam stomachi vires, grato modo erigantur. Majoribus porrectus præbiis, sitim causat, alvum subducit et vomitiones provocat. Antiseptica vi gaudere existimatur, protractiori tamen usu proclivitatem ad crasin scorbuticam inducere videtur.

U. Irritando fibras primarum viarum, easque ad vividiores lacescendo contractiunculas, tenacem esculentorum humoru[m]que chylopoëticorum pituitam resolvit, hinc vulgatissimum est edulium condimentum, quo homines perinde ac veterina aliaque domestica animantia, quorum pabulo inspergitur, adversus multivarios morbos ex labore hujus officinæ ortum ducentes, muniuntur. Cum servandis quoque per annos carnisbus et piscibus aptum esse experiundo quotidie discamus, hinc consectorium esse videbatur magnam ei inesse vim pronitati in putredinem resistendi, ast pericula ab ill. PRINGLIO capta huic sententiæ refragari videntur, qui nisi enormi copia, cui corpus vix ferendæ est, ingestum, eo gradu, hanc virtutem haud exserere, ut ægrotis, opis indigis, multum exin-

de sperare liceat, minori copia adjecta, corruptelam potius arcessi expertus est, ut verisimile sit crebrum et quotidianum *carnis salitae* usum ex præcipuis esse causis scorbuti classiariis persæpe infesti, et si quando mortales a pestilentia (DIEMENBRECK) tutos præstiterit, vix tamen facultate putredini adversante, id perfecisse. WRIGHTIUS tamen in initio putridarum febrium utilissimam invenit ejus in *succo Citri medicae solutionem*, additis *aqua aromatica* et *syruvo*, vel *Saccharo*. Britanni in dissipandis scrofulis e cochleari minori per dies exhibito, optatum experti sunt successum. Exterminandis et necandis, tum vermibus, tum muscarum larvis, aliquando nidulantibus in ventriculo, egregie inservit, ipsam adeo epilepsiam, forsitan ex hac causa ortam, tribus quotidie, per trimestre continuum, cochlearibus deglutitis, propulsatam esse memoriae proditum est. *Hirudines* incaute deglutitæ, *solutione Muriatis Sodaæ depurati* necantur certissime. Stimulo, quem in ventriculum exserit, nimias humorum aversus alias partes congestiones divertendo, observante ill. RUSH, perspicacissimo olim Americæ borealis Clinico, in hæmoptyseos accessu ipso, si cochleare ejus, aut alterum, ægroto propinatur, adeo prodet, ut deglutito *Sale* sanguis profluere desinat. Eum effectum a se quoque confirmatum MEZA e frigore subitaneo exponit, quod e soluto in *aqua Muriate Sodaæ* oriri debet, quo vasa statim constringuntur. Adhibitum etiam in aliis quoque sanguifluxibus (RICHTER: Bibl. chir.) similis eventus exceptit. Extus scopo incitandi et adstringendi ad *fotus* antisepticos et discutientes recipitur, nec non ad *clysteres*. Ita asthenicis inflammationibus, ecchymomati, tumoribus œdematosis (si siccus imponitur) cysticis, præsertim palpebrarum (DESHATS, GENDRON,) imo et albis fotu superdatur. Per modum *clysteris* aperientis in obstipatione a drachma ad semunciam; forma *balnei* in cachexiis, rachitide, psora, herpetibus, myodynia rheumatica chronica (BUNGE) commendatur. Si *solutione Muriatis Sodaæ* vulnera recentia a cane rabido inficta, ad crux oris cessationem eluantur, atque idem dein adsiduo admove-

atur, eadem brevi curationem, citra hydrophobiæ, manifestationem recipere, nuperrima docuere experimenta. Lipothymia correptos, si ori infricitur, aut si tales ægroti, in calefactum cineribus hunc *salem*, aut arenæ reinistum collotenus se dimiserint, in asphyxiā toxicatricam delapsos, vel appoplecticos, si clysteribus vel suppositoris uncia ejus adjiciatur, stimulo suo sæpe suscitat. Decrepitatione, *aqua* sua orbatus *sal cibarius*, aquosos humores trahit, hinc *sacculis* sæpius renovatis indutus, et calefactus, scroto impositus in medicatione hydroceles, aliis partibus œdemate affectis, ab ill. **ВОЁРХААВІО**, laudatissimæ, dum viveret industriæ viro, commendatus, nec hydrocephalo, orchiocèle, bronchocele et id genus aliis, alienus. Fontes nativi *muria* scatentes, (quales sunt *salini* in Kirgisorum desertis, Hetskaja Saschitta, dicti itinere unius diei Orenburgo distantes, atque in psoriasis a cl. **HILDEBRANDT**, Professore Mosquensi eme:ito, laudati) balineis adhibiti cutim incitant, proficique sunt in fœditatibus ejus. Eodem consilio *aqua marina* a **RUSSELIO** in scrofulis usurpata est, quam salubri esse stimulo corpori aliorum quoque Medentium experientia satis comprobavit. Si *aqua salita* suffervefacta steatoma, atheroma, vel meliceris, laventur decies per diem, cito curationem recipere feruntur (*B. bl. Brit. Sc. et Arts* vol. XXIX p. 356.) Habetur etiam pro antidoto *Nitratis Argenti*, vel *ejusdem fusi*.

D. Qua digestivum ad drachinam sumitur, in hæmorrhagiis ad semunciam vel unciam. Pro usu externo ab uncia ad quatuor *aquaæ* solvitur.

V. Acidum muriaticum; — oxymurioticum; Aqua marina artefacta; Cataplasma Secalis muriatum I; — — II; Clyster communis; — Muriatis Sodaæ; Vapores Acidi muriatici; — — oxy muriatici.

N I T R A S A M M O N I A E.

С е л и ш р о к и с л а й А м м і а к ь .

R. *Acidi nitrici diluti*, quantum vis,
Subcarbonatis Ammonias, quantum satis,

at fiat perfecta saturatio.

Solutionem exinde ortam cola per chartam emporeticam, et enissimo calore ad punctum crystallisationis evapora.

Q. Crystalli effectae sunt columnæ hexaëdræ albæ, aliquantum flexiles, ex 67,625 *Acidi nitrici* 21,143 *Ammoniae* et 11,132 *Aquaæ* partibus constantes. *Sapor* earum amarus, acridulus; in duabus *aquaæ frigidae* partibus, dimidioque fervidæ solvuntur. Sub 400° F. th. sub initium liquescunt; dein vero destruuntur, et convertuntur in *aquam* et *gas asoticum oxydulatum*.

V. Diaphoretica; diuretica.

U. Adversus malignas, atque exanthematicas febres, salutarem ejus vim, a granis sex ad semiscrupulum exhibiti, impense extollit **FASELIUS**. Oppositus etiam est febribus catarrhalibus malignis.

V. *Gas asoticum oxydulatum.*

N I T R A S A R G E N T I.

ARGENTUM NITRICUM Ph. Bor.

Селищрокислое серебро.

R. *Argenti cupellati*, quantum placet,

Acidi nitrici diluti, quantum sufficit ad solutionem saturatam.

Solutio leni calore instituatur, humorque limpidus, ubi refrigeratus fuerit, reponatur; materia vero floccosa, si quæ observata fuerit, in vas aptum vitreum deferatur. Evaporatione crystalli surgent, intra bibulam siccandæ, usuique in vase clauso, et loco obscuro servandæ.

Q. Crystalli referunt lamellas plerumque sexlateras, quadrilateras, et trilateras. *Aqua æquales* earum partes ad gr. 10 Th. R. solvuntur, et *Alcoholis diluti* (*Spiritus Vini*) suffervefacti partes 240; quæ vero, dum refixerit menstruum, maxima ex parte, præcipitantur.

V. Caustica; adstringens; tonica; antispasmodica. Fibras musculares excitans easque arrodens, aut bruneo nigro colore indebili tingens?

U. In morbis rebellibus; in primis vero in epilepsia, stenocardia (aptatis etiam internis femoribus fonticulis) scelotyrbe (chorea,) tentatus cum successu, nactusque est subscriptores, qui solutionem *Nitratis Argenti* in *aqua distillata*, præcipue *Menthae*, eam, ut sesquigranum initio, dein plus sumeret epilepticus, adhibuere. Ita etiam in hydropisi laudatur in *pilulis*; sed eæ minus tutæ, ob effectus, solutionisque incertitudinem, magnæque interdum earum doses vix impune sumi videntur, procedenti tempore, stimulo permanenti, nocituaræ, hinc prudenter administrandæ.

D. Gr. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$ ad granum gradatim usque adscendendo, ter de die, vel in solutione: *Nitratis Argenti* granum solvit in *aqua destillata* uncia, terque de die sub initio tertia pars exhibetur.

V. *Nitras Argenti fusus*; *Solutio Nitratis Argenti*; *Pilulae Nitratis Argenti*.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

ARGENTUM NITRICUM FUSUM Ph. Bor. LAPIS INFER-NALIS Ph. Ross.

Сереброселитряный прижигательный камень.

R. *Nitratis Argenti*, quantum placet.

In crucibulo argenteo (quod præstat) vel porcellaneo, leni igne fundito sub camino, ut vapores noxii evitentur; cavens etiam, ne carbonum particulæ incident, movendo sæpius bacillo vitro. Fugata sic omni crystallisationis *aqua* augeatur ignis, et materies colorem olivaceum leviter fuscescentem adepta, simulac perfecte fusa fuerit, effundatur dein in modulos ferreos, parum calefactos, aut *sebo*, vel *oleo* leviter illitos, ut inde bacilli formentur, qui frigefacti in *vitro* probe clauso, in loco serventur obscuro.

Q. *Aqua* crystallisationis privatione differt a præcedenti

stque massa grisea, intus acus radiatas habens, ad aërem quescens.

V. Ob defectum aquæ, crystallis effingendis idoneæ, concentratam acidì nitrici indolem, et oxydationem Argenti plenam præsefert, atque vires summe causticas exserit, corpus nimale cito in escharam combusturus, minime tamen, tanto mbitu, ut fusa Potassu cutim arrodens. Aqua dilutus, in corpore epidermide orbato, inflammationem cit.

U. Ejusdem internus est idem, qui Nitratis Argenti, meoque arbitratu, efficacior. PARACELSUS et BOYLE commendaverunt eum in hydrope, SIMMS (*Mem. of the Medical Society of London Vol. iv*) ut antiepilepticon. NORD epilepticis et maniacis (cum symptomatibus epilepticis) $\frac{1}{2}$ gr. cum mica painis in pilulis ter de die dedit. CL WILSON grana duo et semis non dubitavit præbere, citra ullum incommodum, si excipias nauseolam, sumta. Extrinsecus adhibetur utiliter ad destruendam carnem, varia ratione, supercrescentem, vel ubi eshara opus est. Hinc ad callos, fungosas carunculas, verrucas, nævos maternos, parvos polypos, ulceras syphiliticas, eorumque et cacoëtheorum hypersarcosin, caneros syphiliticos, condylomata, carunculas urethræ aliaque impedimenta, varicosos tumores corneæ, scirri reliquias, mala multifariam male habentia, demenda pluriuum valet; imo et in tumoribus inflammatoriis malignis, quibus materies caustica inclusa est, ut bubonibus syphiliticis, pestilentialibus, tum et in aliis, a morsibus venenatorum animalium exortis, ut ipsum in labiis vulneris hærens venenum, citius, quam in sanguinem suscipi queat, destruatur, magni æstimatur. In curatione ulcerum sinuosorum solutus ejusdem scrupulus in tribus aquæ destillatae unciis per modum injectionis post discisos sinus profuit, nec minus utilitatis præstare fertur eadem injectio ad curandam hydrocelen excitatione inflammationis, suppurationisque tunicæ vaginalis. Ut bubo asthenicus, ægre abscedens, aut resolvi nescius, aperiatur, suasu PLENKII, impunitur Nitras Argenti fusus magnitudine pisi per bihorium, de-

in unguente, *Acetatem Cupri*, tenente, locus, ne amplitudo exesi (loci) noceat, delibendum est, sed id caute faciendum, ne (si æger, vel mobili nervorum systemate præditus, vel humorum dyscrasia laborat) ulcus cacoëtheum gangrænosum, ægreque medicabile oriatur. In ectopio, ulceribus corneæ, et staphylomate incipiente laudatur congrua solutio. Ranulam denique **CAMPERUS** ita curavit, ut tumorem apertum *Nitrate Argenti* soluto tractaret. **Louisius** usum ejus in fistulis salivalibus suadet, si eæ parvam habent aperturam. Tangit scilicet eam, escharamque externe producit, sub qua, gliscente inflammatione, fistula claudi fertur; eschara vero interea siccantibus remedii sustentatæ. *Solutio Nitratis Argenti fusi* in ulceribus etiam syphiliticis, scrophulosis, scorbuticis, canceraticis, admodum efficax, imo etiam per modum *injectionis* in pseudosyphilide (ulceribus faucium orisque ex *Hydrargyro*) cynanche putescenti ulcerosa, aut fistulosis, ut fistula lacrymali (**IANIN**) profuit. *Solutio* diluta psorophthalmiæ et blennorrhœæ obponitur. Exfoliatio ossium quotidiano ejusdem tactu promovetur. Protracto ejusdem interno usu partes corporis aëri cum primis expositæ nigrescunt; interdum bruneum induunt colorem?

V. *Solutio Nitratis Argenti*; — — — *opiata*.

NITRAS HYDRARGYRI LIQUIDUS.

Селипрокислая ртуть разведенная.

R. *Hydrargyri depurati*, quantum libet,
Acidi nitrici, quantum satis,
 ut *Hydrargyrum* solvatur.

Si pars hujus, cum sex aquæ communis partibus commisceatur, surgit: **NITRAS HYDRARGYRI DILUTUS**, pro externo felici usu, **BELLOSTII** famam adeptus.

V. *Oxydum Hydrargyri rubrum*; *Unguentum Nitratis Hydrargyri fortius*.

NITRAS POTASSÆ DÉPURATUS.

KALI NITRICUM Ph. Ber., NITRUM DEPURATUM Ph. Ross.

Селипра очищенная.

R. *Nitratis Potassæ* venalis; quantum placet,
solvito in

Aquæ fervidae ea quantitate,

ut solutio frigida haud ponat crystallos, dein instilla:

Subcarbonatæ Potassæ liquidum quamdiu liquor exinde turbatur, dein posito sedimento per chartam cola; igne leni evapora, donec gutta corpori frigido imposta spiculas salinas, offerat, tum in loco frigido ad crystallisandum seponito. Crystalli collectæ bibula siccantur. Iterata evaporatione, ut ante aliquas crystallos de lixivio excutito.

Q. Ita *Nitras Potassæ*, jam purus ex *Acidi nitrici* p. 44,0, *Potassæ* 51,8, et *aquæ* 4,2 constat, crystallique ejus sistunt onga, et pellucida prismata hexagona, spiculis desinentia, am pyramidalibus, quam obtusis, transversis. In septem partibus *aquæ frigidæ*; in ebullientis vero pari ponderis sui parte, olvitur; aëre immutabilis; igne vero fusus *gas* in primis *xygenium* dein vero *nitrogenium* largitur, cum corporibus oxylabilibus ignitus detonat.

V. Frigerans, debilitans actionem cordis arteriarumque; ilvum et lotium movens; protracto usu ventriculi energiam rangens.

U. E salibus neutrīs, qui vim refrigerandi possident, fortasse *Vitras Potassæ* optimum est, validissimum medicamen, et paud raro, et cum insigni beneficio adhibendum in iis morbis qui hypersthenia oriuntur, sic in synocha, inflammatione pulmonum, pleuræ, stipata, idque cum *sero lactis*, *potionibus mucilaginosis*, *emulsione*. In febribus sthenicis catarrhalibus (*Malaria*), rheumaticis, in congruorum connubio, non est alienus; experiendo didicimus miscelam e granis quindecim *Nitratis Potassæ depurati* et *Camphoræ* duobus constantem, secunda vel teria quaque hora datam ex potu tepido, salubrem diaphoresin mo-

vendo, hoc in casu, respondisse. Febris exanthematicis, ubi ob hypersthenicam maxime diathesin, exanthema non rite formatur, aut supprimitur caute adhibitus est, opportunum remedium. Gastritidi, hepatitidi, enteritidi, nephritidi, ob partium affectarum sensibilitatem, dum hic uti topicus stimulus immediatim fere agit, vix ac ne vix quidem convenit. In myodynia rheumatica sthenica drachmæ duæ ad semunciam viginti quatuor horarum spatio in decoctura *Hordei d. Avenae s. tepida*, vel in emulsione aliove potu solutæ, propinantrur. Alii in sanguinis profluviis quum orgasmum inhibeat commendarunt. Adversus haec pro specifico habuit DICKINSON. In hæmoptysi asthenica *Muriati Soda* junctus utilissimum se præstitit. Scorbuto occurtere BEDDOËS, PATTERSON opinatur; vix tamen tuto, quum sit officinæ digestionis infestus, datur. Externus quoque *Nitratis Potassae*, vel *aqua*, vel *aqosis humoribus* soluti usus, tentatus, et commendatus fuit, ita BROCKLESBY, armigeris myodynia rheumatica ethenica laborantibus, præter internum usum, optimo cum eventu, ad aperiendam alvum clysteres injici jussit, qui *Nitratem Potassæ* recipiebant. Additur etiam refrigerandi, vel constringendi scopo *gargarismis* in variis anginæ speciebus, adhibendis, et quum, eo præsertim tempore, quo *aquam* subit, huic frigus notabile conciliet; fomentorum frigidorum adversus sanguifluxus efficacitas ejus auxilio mirefice augeri potest. Interdum pro ratione morbi fomento *Acetum cum Muriate Soda*, vel *Murias Ammoniae* in vulneribus capitis; clysteri *Murias Soda*, *Acetum*, *Oxymel* et. *Gargarismo mel rosatum*, *Murias Ammoniae* etc., recte adjicitur.

D. A granis quinque ad scrupulum per se, vel cum *Saccharo*, saepius in *aqua*, decoctione aut aliqua *misturâ mucilaginea* aut *emulsione* solutus, propinatur. Ne ventriculum gravet, cum *Opio* et *aromate*, *gummi Acaciae verue*, aliisve *muciluginibus* subministrari bene potest. Magna curâ cavendum, ne misceatur: cum *Muriate*, *Acetate Barytae*, et *Soda*, *Ammoniae*, *Magnesiae*, *Aluminae*, *Soda Sulphate* et *Acido sulphurico*, quibus decompositionem subit. Si paulo largiori ma-

nu perque longius temporis spatium, aut debilibus exhibeatur, digestionis officinam mirifice turbat, cardialgiam, pectoris oppressiones, vomitiones violentas, interdum cruentas, alvi profluvium, et his pejora, pro ratione dosis, excitat, hinc non est, ad imitamen Brocklesbyi, intrà nychthemeron, ad unciam porrigendus.

V. Acidum nitrico-nitrosum; Mistura Nitratis Potassae; Pulvis ejusdem compositus; Succus Oxycocci nitratus; Vapores Acidi nitrici.

I. O L E A F I X A.

O L E A P I N G V I A; — U N G V I N O S A.

Масла жирныя постоянныя.

I. O L E A C O C T A.

M. В а р е н ы я.

O L E U M C H A M O M I L L È.

M. Ромашковыхъ цвѣтovъ.

R. Florum Matricariae Chamomillae recentium selibram,
Olei olivi sesquilibram.

Coque leni calore ad humiditatis consumtionem; de-
in exprimendo cola.

U. Præcipue externus forma *clysteris*, vel abdomini illi-
tum, fatus dissipat, tormina sedat. Sic paratur:

O L E U M H Y O S C Y A M I N U M.

O L E U M F O L I O R U M H Y O S C Y A M I N I G R I.

M. Листовъ Белены.

Cl. Busch (Ueber die Lungensucht p. 72.) paravit *Oleum hyoscyaminum* ex herbae recentis *Hyoscyami* parte cum partibus quatuor *Olei olivi* cocta, commendavitque *misturam* ex parte hujus *Olei cocti* cum partibus *Olei amygdalini* duabus.

U. Præcipue externus: forma *clysteris*, *linimenti* etc. *cephalæa*, *enterodynæ* spasmodica; algema hæmorrhoidale; dysuria; spasmi etc. *BUSCHIANUM* vero tribus cochlearculis pro desi-
ter de die in hæmoptysi porrigitur.

OLEUM SULPHURATUM.
BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.
M. С ъ р и о е.

R. *Sulphuris sublimati sescunciam,*
Olei Lini usitatissimi, vel
— olivi selibram.

Coquito igne moderato in vase ferreo, vel lapideo amplio
 (ne massa ad ignem tumescens flamمام concipiat, operculo,
 si id evenit, tegendo,) eousque spatha movendo, donec coie-
 rint; tum vero, ab igne remotum, refrigerera et servetur. Si,
Olei sulphurati pars, cum partibus quinque Olei Pimpinellae Ani-
si, vel partibus octo Olei pineo-laricini, commisceatur, tunc
dat: OLEUM SULPHURATO-ANISATUM (Balsamum Sulphuris
anisatum), et OLEUM SULPHURATUM CUM PINEO-LARICINO
(Balsamum Sulphuris terebinthinatum.)

V. Secretiones incitans.

U. Ad delibuendos tumores duros ipsorum etiam ossium,
 ulcera cacoëthea, callosa, vel ad injiciendum in sinus eorun-
 dem, dum margines callis induruere. Juvat etiam inungere
 artus œdematosos resolutosque. Dum *Oleo Anisi* solvitur effi-
 caciā adversus rheumaticas stases et psoricas, pectus gra-
 vantes, exserit; si vero cum pineo-laricino commiscetur, splanch-
 emphraxin abdominalem reserat. Utrobique haud male *Aeth-*
re sulphurico maritatur.

2. O L E A E X P R E S S A.

Масла выжатыя.

OLEUM CANNABINUM.

OLEUM SEMINUM CANNABIS SATIVÆ.

M. Конопляное.

Semina bene matura, flagellis excussa, vel allisione, fasci-
 culorum colligatorum, ad ligneum lingurium, separata, agitan-
 do vel cribrando, a paleis liberantur, dein contunduntur sac-

culoque inclusa, prelo frigide exprimuntur, *Oleum* largitura. In Casanensi provincia, ubi quintam *seminum* partem *Oleum* constituit, elicitor id seminibus, per malleos ligneos, in mola equo circumducta, conquassatis vasisque magnis inditis, quibus probe excalfactis, massa intra pannum cannabinum prelo submittitur. Libra civilis dat *Olei unguinosi* uncias tres et gr. 30 et unciae tres drachmas septem et scrupulos duos *principii glutinosi*.

Q. *Oleum* est pellucidum, flavo-brunnei coloris, interdum virescentis, saporis cannabini, singularis ingratique odoris, non nisi *Hydrargyro* in th. *Fahr.* ad gradum o decidente coiens, in aëre atmosphærico exsiccatur, ardet flamma lucida parum fuliginosa.

V. Cum aliis *unguinosis oleis* convenit; hinc demulcens; nutritiens; præterea sopiens; subnarcotica.

U. A parvo-russis, Russis Lithuaniæ et Polonis additur cibis. Laudatur in blennorrhagia; adhibitum etiam cum successu contra ictum tarantulae in Perside teste W^lA^DIMIRSKY (Совѣшы военнымъ людямъ къ сохраненію здоровья на Кавказской Линії въ С. Петерб. 1806 р. 63.) Pabulum ignis in lampadibus haud incommodum. Eodem modo parantur:

OLEUM LINI.

М. лъниое.

Q. Odor et sapor *Olei* etiam recentis aliquantum ingratus; in calore rancescit.

V. Nutriendis; relaxans; saporem blandum concilians; extrinsecus: emolliens; relaxans.

U. Laudatum olim fuerat in gravioribus pectoris inflammationibus (SYDENHAMUS,) pleuride (BAGLIVIUS, HAGENDORNIUS,) hæmoptysi (MICHEL,) etc. A DODON^{JO}, SWIETEN, GALLESKY, ileo cum successu obpositum fuerat, ita etiam alvi obstructioni pertinaci (LENTIN,) enterodynæ plumbeæ (in quo malo *oleosa* et *pingvia* cujuslibet generis, tam ad prophylaxin, quam therapiam, prosunt.) Dysenteriæ, præsertim

clysteris forma. In helminthiasi quoque laudatur (HEBERDEN,) uti etiam adversus ictum tarantulæ (W LADIMIRSKY.) Si *Camphora* in eo solvit, inunctum dolores pleuriticos, nephriticos, aliosque compescit; calefactum vero hæmorrhoidales forma clysteris lenit.

OLEUM JUGLANDIS.

OLEUM NUCUM JUGLANDIS REGIÆ.

M. В о л о с к о - о р ъ х о в о е .

E nucleis maturis, demta cuticula, expressum.

Q. Blandum est et unguinosum, flavicans, dulce, si recens.

U. In helminthiasi præcipuus. Ad aliquot uncias epotum superbibito aliquot horas post, *vino* alicantino (aut alio quolibet) dulci (PASSERAT,) tæniæ subigendæ par fuit; de FRANCIERE etiam specificum sub hoc connubio reputat; la CHAPELLE vero negat id, propria et sibi priva adversus vermem solitarium vi, præ aliis oleis, gaudere. Extus in leucomate, seu albagine quotidie ad aliquot guttulas oculo admotum, præstans est. In impetiginibus etiam utile reperit ill. HUFELANDUS, sed ad hunc usum e nucibus recentibus sine calore expressum esse debet.

V. Linimentum *Oxydi Hydrargyri rubri.*

OLEUM NAPINUM.

OLEUM SEMINUM BRASSICÆ NAPI.

M. Р ъ п н о е .

Q. Luteo-brunnei coloris; odoris saporisque *Sisymbrium Nasturtium* æmulantis.

U. Videsis: BRASSICAM NAPUM.

OLEUM OLIVUM.

OLIVUM (PLINII;) OLEUM OLEM EUROPEÆ e fructibus frigide expressum.

M. О л и в н о е ; О л и в а .

Q. Coloris diluto-straminei, odoris fere prorsus expers, sa-

poris blandi, sub exiguo frigoris gradu coalescit in massam albam, et granulatam. *Album* optimum; *viride* vilius est.

V. Nutriens; relaxans; involvens; saporem blandum concilians.

U. Videsis: **OLEAM EUROPAEAM.** Passim ad cibos, tempore jejunii, pinguefaciendos, a ruricolis et Cœnobitis, loco butyri, adhibetur. Plerumque cum *Aceto* mistum, pro grato *acetarium* condimento, usu venit.

OLEUM PAPAVERIUM.

OLEUM SEMINUM PAPAVERIS SOMNIFERI.

M. M a k o b o e.

Q. Est pellucidum, flavescentis coloris, grati et blandissimi saporis.

V. Eadem, quæ *Olei olivi*. Omni vi narcotica caret.

U. Pereuntibus brumali frigore 1710 in Gallia *Oleis Europaeis*, *Oleo olivo*, surrogatum est, adhibitum quoque loco butyri ad cibos citra noxam (ROZIER *Observat. sur la Physique* 1776.) Usus *Olei* hujus pictorius est notissimus.

OLEUM SESAMINUM.

OLEUM SEMINUM SESAMI ORIENTALIS.

M. К у н ж у ш н о е.

Q. Recens turbidum est, procedenti tempore fit clarum, coloris lutei, inodorum, saporis blandi, subdulcis, gratissimi. Difficulter rancescit, hinc ad corrumpenda alia *olea* et *balsama*, e. g. *Balsamum de Mecca* (HASSELQUIST's *resa* p. 330) adhibetur.

V. Ut *Olei olivi*, cui, si recens est, pro usu interno, præfertur merito.

U. In enterodynbia, *clystere* injectum, juvit. In culina commodum. Gangaridibus aliisque Indis, ad quosvis *cibos* pingues reddendos, inservit. Osmannorum matronæ faciem oblinunt eodem, cutis pustulas, asperitates et maculas in primis solares, abacturæ. In bilychnibus quoque lucernis usitatur. Fosk. *Flora Aegypt. Arab.* Videsis: **OLEAM EUROPAEAM.**

OLEUM SINAPINUM.

OLEUM SEMINUM SINAPEOS NIGRÆ.

M. Горчичное.

U. Videsis: OLEAM EUROPAEAM.

II. O L E A E M P Y R E U M A T I C A.

(Fœtida; — adusta.)

Масла вонючія; — пригорѣлые.

OLEUM PYRO-ANIMALE.

OLEUM CORNU CERVI Ph. Ross.

Масло пригорѣлое животное.]

R. Ramentorum Cornu Cervi, vel

*Ossium mammalium, (omni pinguedine liberatorum et
in frustula redactorum,) quantum lubet,
immittit retortæ ferreæ vel terreæ, furno impositæ, ut ignem aper-
tum experiatur, excipulum amplum foramine in superiori ven-
tris parte præditum, tubo vitro intermedio admove, atque junc-
turis omnibus (relicto pro lubitu aperiendo foramine) clausis,
igne reverberio gradatim aucto, destillationem institue, donec
retortæ fundus candeat. Ubi adparatus ad refrigerium redit,
collige seorsim Sal sublimatum (*Sal Cornu Cervi*) liquorem alca-
linum (*Spiritum Cornu Cervi*) et oleum, quæ excipulo continentur.
Oleum aqua calida sic abluitur, ut nihil salini adhæreat. Ab
aqua iterum separetur, serveturque.*

V. Eadem, quæ depurati, haud raro præstantior est.

V. Oleum pyro-animale depuratum.

OLEUM PYRO-ANIMALE DEPURATUM.

OLEUM ANIMALE MTHREUM Ph. Bor.; OLEUM ANIMA-
LE DIPPELII Ph. Ross.

M. пригорѣлое животное очищенное.

R. *Olei pyro-animalis*, quantum placet.

Infundito cucurbitæ vitreæ ope infundibuli vitrei, longo col-

lo instructi, ne cucurbitæ latera inquinentur, tum alembico et excipulo, probe luto junctis, tamdiu lenissimo balnei arenæ calore destilla, quamdiu *oleum limpidum* tenuerit elicitum. *Oleum* hoc rectificatum sub eadem cautela novæ cucurbitæ infundito addens quadruplum *aquaæ* pondus atque ad applicato alembico et excipulo purissimo, blando calore iterum destilla, donec decolor, *aquaæ* instar, adparuerit, quod illico lagenulis vitreis accurate replendis epistomio vitro probe firmandis, atque sub *aqua* demergendis, immissum usui servetur. Hoc *oleum* quidam e COMITIBUS de WITTGENSTEIN, non minus omnigena eruditione, quam natalium splendore, conspicuus, primis præteriti sæculi annis, e stercore humano, infinita fere rectificatione primus Berolini paraverat, unde etiam notitiam DIPPETII, eotum Berolini vitam degentis, haud effugit, conjectura dein adsecuti, id ex qualibuscumque animalium partibus, confici posse.

Q. Quum bene paratur, est pellucidum, saltem stramineum, limpidissimum, *odoris* penetrantis, balsamici; *saporis oleosi*, amariuscui, aromatici. *Aceto* et *Alcohole* solvitur; accessu autem aëris in *oleum pyro-animale* (*foetidum*) transmutatur.

V. Excitans; antispasmodica; diaphoretica; *extrinsecus* resolvens.

U. Spasmi apyreti et convulsiones ex nimia irritabilitate; hysteria (propinatis quatuor guttulis *Saccharo* pulverato exceptis,) epilepsia (guttis 30-40 datis,) vel cum *extracto Opii* (WERLHOFF), scelotyrbe (HERZ,) catalepsis et id genus alia. In dialepyris etiam laudatur, præsertim, quæ spasmos adjunctos habent, mox ante paroxysmum, præcipue ubi frigoris stadium excedit (HALLER.) Externe: debilitas partium, amaurosis, tumores frigidi glandularum scirrhosi, fungi articulorum, perniones, contracturæ. Per modum clysteris: morbi spasmодici, epilepsia etc. et inungendo spinam dorsi. Huic substitui potest *Oleum pyro-animale* (*foetidum*) non minoris efficaciæ.

D. Guttæ quinque, quindecim ad triginta cum *Saccharo*, vel

Aethere sulphurico, vel eodem alcoholisato. Pro usu externo: cum Camphora, Solutione Saponis, vel cum quopiam pingui Oleo.

OLEUM SUCCINI DEPURATUM.

Масло янтарьное очищенное.

R. *Olei Succini, quod sub præparatione Acidi succinici collectum est, quantum lubet.*

Cum sextuplo aquac, e vitrea retorta, admoto excipulo, sifmatisque juncturis, igne leni destilla, donec duæ tertiae partes aquæ transiverint, dein oleum caute separa, vasisque clavis serva.

Q. Est pellucidum, flavicans, odoris non ingrati; saporis aromatici.

V. Incitans; resolvens; varias corporis excretiones, (sudoris præsertim et urinæ,) potenter promovens; sopiens; menagogæ.

U. Internus in hysteria, deliquiis animi, asphyxiis parturientium a nimis accelerato partu cum liquido Ammoniae Subcarbonate (Ламоттius) commendatur. Valet etiam in paralysi, apoplexia nervosa, amenorrhœa, dysmenorrhœa, variisque spasmodicis convulsivisque morbis, ut in epilepsia, etc. Sunt, qui internum guttarum quinque ad quindecim usum in tenuo commendant; efficax in hoc morbo debellando comprehendit Rush (*Memoir. of the medic. Societ. of London. Lond. 8, Vol. I 1787.*) In variis etiam morbis, retrogressis, vel haud rite succendentibus, e. g. arthrodynia, podagra, myodynæ rheumatica, exanthematibus variis, certum, et satis cito, auxilium adfert, sudoreque moto, qui empyreumaticum spargit odo rem, hos morbos pro, vel revocat. Extrinsecus exserit vires resolventes et anodynæ, quapropter in tumöribus frigidis, paralysi, spasmis, optimo cum effectu, infriatur. Temporibus admotum cephalalgiam, a causa serosa, vel nervosa ortam, præsertim hysterical, persæpe supra omnem exspectationem, celerrime tollit. Adposite tum cum Oleo nucis Myristicae mo schatae, si præsto est, in balsami formam redigitur. Rheumaticos

aurium dolores, dentiumque sedare potest, si gossypio exceptum, in aures immittatur.

D. Guttæ quinque ad quindecim exhibentur.

V. *Moschus artificialis*.

III. O L E A V O L A T I L I A.

ÆTHEREA.

Масла лепучія; — Еєирныя.

Plantae recentes, (dum florent, aut *semina* formant,) aut eorumdem partes, (ut *radices* vernali tempore, *cortices lignaque* hyemali, *flores* dum perfecte explicati sunt, *fructus* et *semina* ad maturitatem perducta, sicco præsertim tempore, eoque, quo maximarum esse virium, ob *Olei* abundantiam, existimantur) collectæ, interdum etiam parum, leni calore furni super lamination metallicam siccatae, aut etiam incidente necessitate, id est, si duræ sunt, addito *aquaæ Muriate Sodaæ*, maceratae, consinduntur vel contunduntur, vel in *pulverem* tenuantur, atque cum *aqua*, igne mox ab initio operationis, ut massa ebulliat, auctiori, destillentur, et quidem *olea volatilia*, leviora ex alembico in *balneo aquæ*; ponderosiora vero e retorta in *balneo arenae* posita, eosque, donec liquor in excipulum transiens colorem nactus fuerit lacteum turbidum. *Oleum* separetur ab *aqua*, vel simplici per chartam bibulam filtratione, vel filis gossypinis, quæ altero apice in *oleum*, altero in lagenulam excipuli collo adpersam, demergunt, vel infundibulo vitro separatorio atque vasis, ut radiorum solarium accessus inhibatur, rite clausis, usui servetur. Sic parantur sequentia *olea*:

OLEUM BACCARUM JUNIPERI COMMUNIS.

M. Можжевеловыхъ ягодъ.

Q. Exæstuans, acris; est subviridis coloris.

V. Stomachica; diuretica.

U. Exrinsecus linimentis diureticis, et nervinis utiliter additur. Cum *Oleo lumbricorum terrestrium*, et *Alcoholæ Juniperi*

perino commistum, arthrodyniam sopivit, membrisque contractis et paralyticis motus potestatem restituit (LANGE.) *Saccharo* ad aliquot guttas instillatum blennorrhœam, et tumorem testiculi syphiliticum dispulisse fertur, imo etiam helminthiasi et inflationi obponitur.

D. Guttæ duæ (ad decem) præbentur.

OLEUM BACCARUM MYRTI PIMENTÆ.

OLEUM AMOMI; OLEUM MYRTEUM (PLINII)

M. Мирто-перечное.

Q. Coloris est e rubro-bruni, odoris et saporis ad *oleum Eugeniae caryophyllatae* propius accedentis; sed blandius.

OLEUM CORTICIS CITRI AURANTII.

vulgo ESSENTIA de PORTUGAL, per destillationem obtentum.

M. Померанцовой корки.

Q. Est pellucidum, lutei coloris, sit ætate fuscum; mora vero aliquot annorum concrementum haud satis notum depositum, odore *corticem Citri Aurantii* æmulatur, saporis est aromatici exæstuantis.

U. In spasticis ventriculi et intestinorum constrictionibus, atque orta hinc gastrdynia, vel enterodynus, aliquot guttæ *Saccharo* instillatæ, porriguntur cum successu, præsertim si inflationi originem debeant.

OLEUM CORTICIS FLAVI CITRI AURANTII.

ESSENTIA BERGAMOTTA.

M. Желтой помер. корки выжатое.

Obtinetur in regionibus calidis, acu pertundendo exprimendoque *corticem flavum fructus Citri Aurantii* maturi et venale occurrit.

Q. Colore dilutius, odore suaveolentius, gratumque, sapore mitius, sed præcedentibus longe præstantius.

OLEUM CORTICIS CITRI MEDICÆ.

per destillationem paratum.

М. Лимонной корки перегнанное.

Q. Coloris sub-lutei, odoris *Corticem Citri medicæ æmulantis*, saporis aromatici.

V. Carminativa; analeptica.

OLEUM CORTICIS CITRI MEDICÆ.

OLEUM de CEDRO.

per expressionem paratum.

М. Лимонной корки выжатое.

R. Est pellucidum, coloris expers, odore saporeque præcedens æmulans; sed præstantius.

OLEUM CORTICIS LAURI CASSIÆ.

М. Корки кассии коричневой.

Q. Coloris flavescentis, odoris *Cort. Lauri Cinnamomi æmulantis*, saporis acris, dulciusculique; in aquam se demergens.

OLEUM CORTICIS LAURI CINNAMOMI.

М. Корицы; — лавро-коричное.

Q. Color recentis luteus, a profundiori ætate fit aurantiacus, odor penetrans fragrantissimusque, *corticem Lauri Cinnamomi æmulans*, sapor exæstuans, admodum acutus dulcisque. Gravitate specifica aquam destillatam superans.V. Analptica; refocillans; intestinis jucunda. Extus in glos-soplegia valet. Laudatur in carie ossium, odontalgia. *Unguentis nervinis* additur.

D. Gutta (ad tres) porrigitur.

OLEUM FLORUM CITRI AURANTII.

(OLEUM Нарнæ, seu ESSENTIA NEROLI.)

М. Цвѣтковъ померанцовыхъ.

Q. Initio cœrulescens est, dein vero fit rubidum; odor

eius gratissimus, eum *florum Jasmini officinalis* æmulans; sapor aurantiacus, subamarus, aromaticus.

U. Hypochondriacis, hysterics convenit. Ob magnum, quo venit pretium et frequentem adulterationem, per se perraro in usu est; plerumque ei *Aqua florum Citri Aurantii* substituitur.

D. *Aquæ cochlear theanum* et plus datur.

OLEUM FLORUM EUGENIÆ CARYOPHYLLATÆ.

M. Цвѣтъ гвоздики.

Q. Recens coloris prorsus expers, cum ætate vero permittatur in fusco-luteum, odor penetrans, *Eugeniam caryophyllatam* æmulans, sapor exæstuans, aromaticus. Pondus specificum aquam destillatam superans, *Phosphorus* in eo solvitur facilis, quam in aliis *volatilibus oleis*.

U. Ob causticam indolem haud præbetur interne, ast extrinsecus in carie ossium et sphacelo auxilium spondet, gosypio etiam exceptum, atque denti carioso inditum, si nervum contigerit, eum certo destruit, limitesque cariei ponendo, odontalgiam sedat. Ast cavendum, ne crebro hujus, aliorumque acrionis oleorum usu, dentibus noceatur. Videsis: **EUGENIAM CARYOPHYLLATAM.**

OLEUM FLORUM ANTHEMIDIS NOBILIS.

M. цвѣтъ Римск. Ромашки.

Q. Coloris lutei in viridem, vel brunum inclinantis.

V. Videsis: **АНТНЕМИДЕМ НОБИЛЕМ.**

OLEUM FLORUM LAVANDULÆ SPICÆ.

M. цв. Лаванды.

Q. Est coloris læte flavidi, odoris suaveolentis, *flores plantae* æmulantis; sed intensoris, saporis acriculi, balsamici.

V. Nervina, hinc inservit conficiendis illis *unguentis*, quæ tali virtute prædita sunt.

D. Guttæ duæ dantur.

OLEUM FLORUM MATRICARIÆ CHAMOMILLÆ.

М. цв. обыкновенной Ромашки.

Q. Coloris intense cœrulei, admisso autem crebrius aëre, et vetustate, albescens; odoris saporisque flores *Matricariae Chamomillæ* æmulantis, sed gravioris multo.

V. Antispasmodica; anthelminthica.

U. In helminthiasi et spasmis, pauculis guttis exhibetur; in cardialgia vero et enterodynìa drachma ejusdem combinatur *Succinatis Ammoniae* (*Spiritus Cornu Cervi succinati*) drachmis sex, et hæc miscela ad guttas viginti, ter de die, in *infuso calido florum M. Chamomillæ* datur. Inunctum, cum *anethino oleo*, vertebrali thecæ, dialeipyræ insultum arcebat (FORESTUS.) Est succedaneum *Oleo foliorum Melaleucae Leucadendri*.

OLEUM FLORUM ROSÆ CENTIFOLIÆ.

М. цв. садовой Розы.

Q. Coloris expers, odoris fragrantissimi, *floribus Rosae centifoliae* simillimi, sed multo intensioris, saporis blandi dulciusculi, rosacei. Sub Φ 6° *Rheum. Therm.* coalescit in massam albam, butyraceæ consistentiæ.

V. Eximie nervos reficit.

U. Variis mixtis ob suavitatem odoris additur; in oriente vero inungitur cuti, ut odorifere spiret, et hunc in finem, quantum acu attollitur, sufficit.

OLEUM FLORUM TANACETI VULGARIS.

М. цв. Пижмы.

Q. Color e viridi luteus; odor singularis, *Tanaceto vulgari*, similis; sapor amarus acerque.

V. Anthelminthica; aliquantulum roborans.

D. Guttæ quatuor ad sex. Infantibus abdomini illinitur; aliis etiam anthelminthicis additur.

OLEUM FOLIORUM JUNIPERI SABINA.

М. лист. Сабинныхъ.

Q. Coloris, aut prorsus expers, vel diluto-straminei, odor et sapor *folia J. Sabinae* æmulans, sed longe intensior est.

V. Eximie stimulans, lotium, et sudorem movens, circumtum sanguinis incitans, suppressa menstrua revocans, abortum accelerans.

D. Gutta, (vel pro re nata ad quatuor) exhibetur.

OLEUM FOL. RORISMARINI OFFICINALIS.

М. лист. Розмариновыхъ.

Q. Coloris flavicantis, vel subviridis est, odor fragrans, *foliis Rorismarini off.* similis, sapor aromaticus camphoraceus. Sub lenissima evaporatione dat $\frac{1}{16}$ partis *Camphorae* (PROUST) ætate etiam ejus odorem adquirit (GEOFFROY.)

U. Paucis guttis nervos stimulat, inflationem levat.

OLEUM HERBÆ ARTEMISIÆ ABSINTHII.

М. травы Полынной.

Q. Recens viridis coloris, ætate vero fit densius et permittatur in fusco-bruneum colorem; sapor aromaticus, amarulentusque; odor ipsam *plantam* æmulans, sed fortior.

V. Nervina; stomachica; anthelmintica.

U. Convenit in languore post febres, concoctione depravata, in enterodynæ spasmodica, vomitu, singultu, spasmisque ventriculi et diarrhoeis efficax est medela. In affectionibus verminosis abdomini illitum valet, imo etiam *clystere* injectum, ascarides in intestino recto necat.

OLEUM HERBÆ MENTHÆ CRISPÆ.

М. травы Мяты кудрявой.

Q. Ab initio pallide flavi, ætate profunde lutei coloris,

odor fortis herbæ *Menthæ crispaæ* similis, sapor pungens, aromaticus.

U. *Saccharo* instillatum datur intrinsecus; extrinsecus vero abdomini illinitur in inflatione, enterodynia, vomitu etc.

OLEUM HERBÆ MENTHÆ PIPERITÆ.

М. пр. Мяты перечной.

Q. Coloris ex viridi lutei, ætate profundioris; saporis fervidi atque odoris fortis.

V. Carminativa; nervina.

U. *Rotulas, elaeosaccharum et aquam Menthæ piperitæ extemporaneam* ingreditur.

D. Gutta, duæ.

OLEUM HERBÆ ORIGANI VULGARIS.

М. пр. Душицы обыкновенной.

Q. Coloris lutei, odoris suaveolentis, saporis fervidi, aromatici.

U. Denti carioso instillatum gossypio, inditum, odontalgiam sopit; imo etiam in carie ossium laudatur (LANGE.)

OLEUM HERBÆ THYMI SERPYLLI.

М. пр. Бородкой; — Θиміамное.

Q. Rubri coloris, penetrantis, gratique odoris, atque pungentis, aromatici saporis.

U. Denti carioso immissum, odontalgiam lenit (MILLER.)

OLEUM PINEO-LARICINUM.

М. Лиственница.

OLEUM PINEO-LARIGNUM; — PINI LARICIS; — TEREBINTHINÆ Ph. Ross.

Prostans venale; si vero necessitas urserit, id parari, sequenti modo fit:

R. *Balsami pineo-laricini partem,*

Aquaæ partes duas.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu *oleum* prodierit.

Eodem modo *Oleum e ceteris Balsamis*, ut e *Balsamo pineo-sylvestri*, *pineo-piceo* (*PINUS PICEÆ*,) *pistacio-terebinthino* (*PISTACIÆ TEREBINTHI*,) *Pistacio-chio* (*PISTACIÆ CHIÆ TOURNEF.*) fit; sed *pistacio-terebinthinum balsamum* (*Terebinthina vera*,) quod etiam e *PISTACIA CHIO* de promi probabile est, adeo rarum est etiam in ipsa insula Chia, ut ad nos non pervenerit, nisi multo *pineo-laricino balsamo* adulteratum, quod adulterium Venetæ perficiebant. Vix vigesimam veri *terebinthini* admistam fuisse partem du *HAMEL* testatur; ipsa autem raritas, vel in ipsa insula Chia (*Scio*,) debetur, partim rariori *arborum* preventui ex relatione *CONSINERI* ad du *HAMEL*, partim exiguae copiæ *balsami*, quod incisæ *arbores* fundunt. Massa post distillationem in retorta remanens, est *RESINA PINI FLAVÀ* (*vulgo Terebinthina cocta*,) quæ fusione super ignem, donec aquosæ partes avolarint, in *COLOPHONIUM* mutatur, seu *RESINAM BALSAMI PINI*. E *ligno* leniter ardente, nec non e *radicibus* harum *Pinus specierum*; præsertim vero *Pini sylvestris*, distillatione per descensum, *resina empyreumatico-oleosa*, fumo inquinata: *OLEUM EMPYREUMATICUM PINEO-SYLVESTRE*, (*Pix liquida Ph. Ross.* Деготь, *Oleum pissinum PLINII*, vulgo *Oleum picis*) obtinetur. *Residuum* in retorta, si ad siccitatem evaporet, est *RESINA PINI EMPYREUMATICA* (*Pix navalis, solida*, vel *sutoria Ph. Ross.* рутическое варенье.) quæ a *balsamo pineo-laricino* eo differt, quod *oleum ejus aethereum*, (seu *volatile*,) sit factum *empyreumaticum*, et adhuc portionem *acidi empyreumatici* continet, unde et in *aqua* ex parte solubilis est. *Oleum pineo-abiegnum* (М. сосно-еловое) non potest e *balsamo pineo-abiegno* obtineri, adeo bonum, ut e ceteris *Pini speciebus*; obtinetur quidem *Oleum stillatitium*, si *balsamum pineo-abiegnum* cum *aqua* destillatur, sed longe inferius *Oleis pineo-laricino*, *pineo-piceo*, *pineo-sylvestri*, neque iisdem pollens dotibus, et proinde pro

succedaneo horum neutquam haberi potest. *Oleum pineo-balsamicum*; in primis vero *pineo-larinum*, vel *pineo-sylvestre* interdum *Oleo empyreumatico pineo-sylvestri* malesuada fraude inquinatur.

V. *Olei pineo-larinici*: totum stimulans organismum; præcipue vero renes; secretionem lotii augens, illique odorem violaceum impertiens; zooctona; in primis anthelmintica; lexipyreta; *Olei empyreumatici pineo-sylvestris*: resolvens; zooctona.

U. *Oleum pineo-larinum* in systema uropoëticum agendo, in retentione lotii, mucique adcumulatione asthenica plurimum pollet, ita quidem, ut calculosis, sabulum everrendo, profusse feratur. In ictero a calculis biliosis, qui ob spasmum ductuum biliferorum excerni nequeunt. WHITT et PERCIVAL dederunt cum *Alcohol*; DURANDÉ vero, solutionem calculorum biliariorum moliens, miscelam e tribus partibus *Olei pineo-larinici*, et duabus *Aetheris sulphurici* drachma, jejune quovis die capta, laudat. Hanc copulam et WITTINGIUS probat. Famigeratissimus demagogus et sutelocaptiotrica MARRATIUS, et mane et vesperi per 60 guttas propinabat. BERHAAVIUS quoque, ut habet GESENIUS, hoc *oleum urolithiasi* obponere solitus fuerat. Recenter contra hydropisin a cl. POPP commendatum est. In hac infriticatur; dein vero parvis præbiis interne datur, immo etiam cum gummiresina *Aloes perfoliatae* et *Opio* conjungitur. Tanta profecto *oleo pineo-larinico* penetrabilitas inest, ut cuti infricatum ipsam urinam odore violaceo dotet. In hæmorrhœis in dosi decem guttarum sumtum efficaciter agit, sic in hæmatemesi etc. In myodynia rheumatica, præsertim, si æger non est mobili nerveo sistente præditus, neque febit, uti etiam in arthrodynia, cum primis in ischiade et podagra. CHEYNÉ propinavit *Olei pineo-larinici* partem, mellis limpidi partes duas, cujus remedij parvum cochlear mane et vesperi porrexit. Inter præbia hæc Serum lactis vinosum exhibuit; urgente vero dolore *Olium*. HOME, THILENIUS, HERZ, efficaciam hujus remedii confirmarunt. Cl. CULLEN memorat *oleum* hocce spinæ dorsali ante paroxysmum febris intermittentis infricatum virtutem le-

xipyretam exseruisse, quæ methodus Aegyptiis Medentibus
 crebro in usu fuisse fertur. Præsentanea ei vis est adversus
 interaneorum animalia; in primis vero *taeniam solium*. In
 gangliis solvendis, et in incitabilitate partium paralysi labo-
 rantium restauranda, id justis de causis pro efficaci habetur
 incitamento. Ganglion, quod ad carpum ortum fuit, (eo quo-
 tidie illito,) PLENCKIUS dispulit, consulto igitur in tumoribus
 frigidis, et ad tonum restituendum in paralyticis membris in-
 fricatur. Valet etiam partibus gangrænosis et sphacelosis an-
 tea scarificatis applicatum, nec minus in ossium carie exfo-
 liationem promovet. Membranarum, nervorum, tendinumque
 noxis, si calefactum admoveatur, dolorem levat, spasmos-
 que, qui illos haud raro comitantur, tollit. OLEUM EM-
 PYREUMATICUM PINEO-SYLVESTRÆ (ruthenice дёромъ
 per modum potionis cum aqua commendatur in tussi
 chronicâ, asthmate pituitoso, scorbuto, helminthiasi etc.
 videsis: POTUM PICEUM; qui vero ad BERKELEYUM refer-
 tur, coalescit ex aquae frigidae congio et sextario Olei
 empyreumatici pineo-sylvestris, agitatis ope spathulæ li-
 gneæ per tria, vel quatuor temporis minuta, dein vase quieti
 tradito, per duo nycthemera, donec omnis pix subsederit. Ole-
 um ipsum per modum fumigationum magni fit in phthisi, jam-
 que a cl. MUDGE adversus hoc malum adhibitum fuerat, quod
 aliorum etiam Medicorum multiplici experientia (*Relation de quel-
 ques expériences faites avec la vapeur du Goudron dans le traitement
 de la phthisie pulmonaire par A. Crichton à St. Petersbourg
 1817,*) comprobatum est. Extrinsecus ulceribus asthenicis, caco-
 ëtheis, putescentibus convenit, imo non tantum mammarum scir-
 rhos ad carcinomata jam proclives, sed etiam aliarum quoque,
 ut mesenterii glandularum tumores dissipatos fuisse legimus,
 affectis partibus, Pissocero (*Cerato cum pice*) et balneo, admo-
 tis. Si ulcera carcinomatosa cum eo deligantur, ea reddit mun-
 da, ichorem emendat, fœtorem corrigit, et dolores mitigat.
 RESINA EMPYREUMATICA PINEO-SYLVESTRIS antiquitus,

in connubio *cerae* sub nomine, ni fallor, *Pissoceri*, in dysenteria dabatur; sed sub finem magis convenit.

D. *Oleum pineo-larinum* communiter a quinque ad quindecim guttas cum *Saccharo*, vel *Vitello Ovi* porrigitur. ADAIR a decem ad quindecim guttas quavis hora propinavit in haematemesi. FENWICK adversus *taeniam* a semuncia ad duas uncias exhibuit per se optimo cum successu. Si dosis haec *taeniam* non reddit extorrem; effectus tamen ejusdem gravabiles pro certo tollit. (*The Edinburg Medical and Chirurgical Journal* i April. 1810.) Majori dosi interdum vertiginem, quae temulentiam aemulatur, producit, alvum subducit, rarius nauseæ, stranguriæ causa. *Resina empyreumatica pineo-sylvestris* optime in *pilulis* datur.

V. *Fomentum pineo-oleosum compositum*; *Linimentum acidum pineo-oleosum*; — *resinosum*; — *Saponis rubefaciens*; *Potus piceus*; *Sapo* — ; — *pineo-oleosus*.

OLEUM RADICIS INULÆ HELENII.

OLEUM INULINUM.

М. корне-девесильное.

Q. Sub frigore concretum atque crystallinum est, coloris albi, odoris non tam fortis, saporis irritantis *radicis Inulae Helenii* similis. Pond. specifico aquam destillatam superans.

OLEUM RADICIS VALERIANÆ OFFICINALIS.

М. корне-маячное.

Q. Recens subviridis; ætate vero profundioris lutei, aut flavescentis coloris; penetrantis, camphoracei odoris; aromatici, frigidiusculi saporis.

V. Nervina; excitans; sopiens.

U. In nervorum debilitate, morbis spasmodicis, ipsaque epilepsia (THILENIUS,) singulu, et id genus aliis, non male adhibetur. Hypochondriacis et hysterics in primis convenient.

D. Gutta tres ad octo cum *Saccharo*, *Vino*, *Aethero sulphu-*

vico, vel in adpropriata *aqua destillata*. Aptius *pilulis* addi posse existimatur. (ЯАН.)

OLEUM SEMINUM ANETHI FœNICULI.

OLEUM ANETHINUM.

М. съмянь укропныхъ.

Q. Coloris sublutei, odoris atque saporis *seminum Anethi Fœniculi* similis, sed fortioris, frigore coalescit in spissitudinem butyraceam coiens.

V. Aromatica; stimulans; carminativa.

U. In variis infimi ventris vitiis e. g. torminibus, flatulentia debilitatio ventriculo. In clysteribus, qui adversus inflationem et spasmos sunt, una cum *Oleo olivo*, ad scrupulum, loco consuetorum oleorum coctorum, addi potest.

D. Guttæ duæ, sex.

OLEUM SEMINUM CARI CARVI.

М. съмянь пиминныхъ.

Q. Coloris lutei, exæstuans; odoris fortis, *semina Cari Carvi* æmulantis; saporis aromatici.

U. Præbetur interne et externe abdomini illitum adversus inflationem usurpatum.

OLEUM SEMINUM PHELLANDRII AQUATICI.

М. съм. водо-укропныхъ.

Q. Coloris subflavi, odoris penetrantis, *Seminum Phellandrii aquatici* similis; saporis acris aromaticique.

V. Lotium movens; tumultus febris hecticæ sedans.

D. Guttæ quatuor ad octo.

OLEUM SEMINUM PIMPINELLÆ ANISI.

М. съмянь анисовыхъ.

Q. Coloris sublutei, odoris fragrantissimi *semina Pimpinellæ Anisi* æmulantis; saporis dulciusculi; in frigore coalescit in radiatam crystallisatamque massam.

U. Aliquot guttulæ *Saccharo* adstillatæ adversus inflationem et enterodyniam flatulentam dantur. Guttulæ sex decem semuncia *Alcoholis diluti* solutæ, et *clysteri* additæ in affectibus canalis intestinalis utilitatem promittunt. Capillis adstillatum phthiroctona virtute pollere creditur; an vero guttæ ejusdem duodecim ad quindecim, cum *simplici*, vel alio congruo *syrupo*, pro antidoto *Oxydum Arsenici album*, obtundente, haberi queant? (*MAJAULT*) dubito.

OXYCARBONAS ZINCI PRÆPARATUS.

Окись углекислая цинковая приготовленная,

R. *Oxycarbonatis Zinci*, quantum placet.

In crucibulo exponatur igni, ut candefactum extinguatur in *aqua frigida*, quod iteratis vicibus repetendum, donec massa debitam adepta fuerit fragilitatem. Dein, ubi siccata fuerit, in tenuem tundatur *pulverem*, qui porro in pelvi ampla cum copiosa *aqua pura* diffundatur; ita tamen, ut rudior remanens in pelvi materia post exsiccationem denuo contundatur ac diffundendo depuretur, ut ante, quoadusque tota in *pollinem* subtilem fuerit conversa.

V. Externe exsiccans.

U. *Emplastris, Unguentisque* admiscetur. In ulceribus scrididis et intertrigine inspergi potest.

V. *Ceratum Oxycarbonatis Zinci.*

OXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

Окись ртутно-красная.

HYDRARGYRUM OXYDATUM RUBRUM Ph. Bor.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER — Ross.

R. *Hydrargyri depurati uncias quatuor,*
solve in

Acidi nitrici diluti sufficienti quantitate,

In cucurbita vitrea balneo arenæ usque ad siccitatem evaporet. Massa dein exempta in crucibulo idoneo ignis gradu, sub continua baculi vitrei agitatione eousque calcinetur, donec colorem læte rubrum et splendentem induerit.

Q. Squamulis minutis, rubicundis, splendentibus adparet, iisque inodoris, saporisque vix sensibilis.

V. Corrosiva.

U. Usibus tantum externis inservit, nec communius adhibetur, nisi sub *unguenti* forma. Aptissimum est, quod **TITTMANNUM** refertur, ex drachma *eiusdem* et *insulsi butyri* semuncia, adjecto consistentiæ ergo, *cerae* tantillo. Cum sufficienti quantitate *adipis suillae depuratae* commistum, ulcera syphilitica efficaciter curat; escharoticon quoque in ulceribus supercrescientibus callosis aut fungosis, non spernendum præbet in *pulvere*.

D. Secundum sensibilitatem partis, cui adplicatur, determinanda est; semidrachma *eiusdem* subtilissime triti, vel et drachma cum uncia *adipis suillae depuratae*, aut *butyri insulsi* terendo miscetur, si hoc remedium cuti extrinsecus admovendum est. Ad *unguentum ophthalmicum* grana tria ejus subtilissime triti ad semunciam *unguenti* a principio sufficient.

V. *Linimentum Oxydi Hydrargyri rubri*; *Unguentum* ---;
--- *aluminatum*; --- *hyoscyaminum*; --- *Zincique*.

O X Y D U M Z I N C I.

ZINCUM OXYDATUM ALBUM Ph. Bor.;

FLORES ZINCI Ph. Ross.

Окись цинковая бѣлая.

R. *Sulphatis Zinci*, quantum placet.

Aquaæ servefactæ decuplum.

Solve, filtra, et præcipita sufficienti quantitate

Subcarbonatis Sodaæ depurati in aqua soluti.

Præcipitatum album, probe ablutum, incandescat in crucibul per horæ quadrantem. In vitro clauso serva.

Q. In aqua nequaquam; in acidis vero prorsus solubile. Ex aëre acidum carbonicum adtrahit, eoque imprægnatur. Odoris saporisque est expers.

V. Antispasmodica; tonica; anthelminthica et dum oxydulatum, Zinci Oxydo fuerit immistum, aut cum acidis porrectum, emetica.

U. In multivariis spasmodicis infantum adfectionibus, ubi nimirum primæ viæ acere vitiosæ sunt, aut illi dentientes eclampsiis corripiuntur, aut qui in primo variolarum stadio, ita se male habent, ut e vermium vellicatione in eadem incidisse mala obseruentur, dein, si spasmata, functione dermatica suppressa, sunt exorta, si forte, (sceletyrbes exemplo,) pubertatis initium, corporisque evolutionem comitantur, non vana est in Oxydo Zinci spes, et tum in forma pulveris non male cum Castoreo, Moscho, Opio aut radice Valerianæ officinalis conjunctus ad semigranum, granum, aut duo datur. Laudatur etiam in pertussi, astmate convulsivo, præcipue stasibus abdominalibus cum colluvie pituitosa producto, risu sardonico, singultu et id genus aliis. Extrinsecus utilitatem promittit, in morbis oculorum chronicis, humidis, scrofulosis, eorundem inflammationibus et psorophthalmiis, et in iis, quæ variolas, aliaque exanthemata, subsecutæ sunt. Hunc in finem valet pulvis e sesquidrachma Oxydi Zinci, siclico Sacchari et semi-drachma gummi Acacie verae factus, aliquoties de die adhibendus. Juvat etiam in ulceribus cutis cancrrosis, humidis herpetibus etc., vel inspergendo, vel per modum unguenti. Ulceribus pedis dolorificis, inveteratis, obponitur cum successu Unguentum ex Oxydi Zinci et seminum Lycopodii clavati semi-drachma, Unguenti simplicis uncia. A grano ad octo cum duplo adipis suillæ commistum, trichiasi et excoriationibus papillarum mammæ, non ineptum. Nervis denudatis solamen esse existimatur (NIEMANN.) Oxydum Zinci interne sumtum interdum vomitus producit, tonicas intestinorum constrictiones, inflammations, nervorum distensiones et resolutiones, externe etiam, nisi caute et prudenter adhibeatur, noxas profecto metuendas, illaturum.

D. Aptissime porrigitur *pulveris* forma cum *Saccharo*, aut *Magnesia*, ubi acoris in ventriculo metus a semigrano ad duo infantibus; adultis vero ad grana quatuor vel sex. Interdum, pro re nata, *Camphora* et alia, quorum supra mentio injecta est, adduntur.

O X Y M E L S C I L L I N U M.

Уксусомедъ морсколуковой.

R. *Aceti scillitis* partem,
Mellis optimi partes duas.

Misce et in vase figulino leni igne ad *syrupi* consistentiam decoque.

D. A drachmis duabus ad semunciam exhibetur.

V. *Mistura scillina*.

O X Y M E L S I M P L E X.

Уксусомедъ простой.

R. *Acidi acetici diluti impuri*
Mellis optimi, utriusque pares portiones.

Misce et in vase figulino, vel vitro leni igne ad *syrupi* crassitudinem decoque.

U. Interne perraro solum præscribitur, saepius *misturis* additum, vel *potionibus* a semuncia ad duas uncias. *Aqua dilutum* gargarisationi et antiphlogisticis *collutoriis* servit; imo cum congrua *Acetatis Cupri* portione commistum, loco *unguenti*, vulgo *aegyptiaci* dicti, adhibetur utiliter, plumaceolis exceptum.

V. *Linimentum Acetatis Cupri*.

O X Y M U R I A S H Y D R A R G Y R I.

HYDRARGYRUM MURIATICUM CORROSIVUM *Ph. Bor.*

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS *Ph. Ross.*

Солепресыщенокислая ртуть; сулема ъдкая.

R. *Hydrargyri depurati* partes quatuor,

Acidi nitrici; quantum sufficit,
ut solvatur. Solutionem in massam siccum evaporatione redactam, in pulverem redigito, et adde:

Muriatis Sodaे depurati et exsiccati,

Sulphatis Ferri exsiccati, utriusque partes quinque.

Hæc tritura probe commista in phialam immittantur, cujus partem dimidiam impleant. Ignis lenis latusque in balneo arenæ ad novendus phialæ, aperto orificio, donec *aquosi vapores acidique* fuerint egressi. Tandem cono chartaceo leviter claudito, ac sensim ignem augē. Sublimatione finita, phiala confringantur, massaque splendens, alba, eximatur, a materia rubra in fundo residua, probe separanda, vel, quod levioris pretii est,

R. *Hydrargyri depurati* bilibram,

Acidi sulphurici libras duas et semis;

Muriatis Sodaे exsiccati libras quatuor.

Hydrargyrum cum *Sulphurico acido* in vitro vase super arenam coquatur, donec materia fuerit sicca. Hanc frigefactam vitro vase cum *Muriate Sodaे* commisceto, dein sublima in vitro cucurbita, igne gradatim auctiori; tandem sublimata materia a scoriis separanda est.

Q. Iuxta DAVVUM e duabus *chlorinae* partibus unaque metalli, vel secundum CHNEVIXIUM e *Hydrargyri* p. 69, *Acidi muriatici* 18, et *Oxygenii* 12, constat. *Crystalli* ejus acus e parallelipedis formatas referunt et sunt *inodorae*; *saporem* vero præ se ferunt causticum metallicum, in ære non mutantur, in aqua vicies tanto addita, *frigida*, solvuntur, haud secus ac in æquali portione *Aetheris sulphurici*; *Alcoholis* vero tripla.

V. Caustica; validissime resolvens; antisyphilitica; vasa in primis absorbentia stimulans.

U. Medicorum experientia comprobatum est in syphilide inveterata præcipue fauibus exulceratis, nodis tophisque magnæ esse efficaciam, et in primis utilitatem promittere illis ægris, qui ceteroquin sat valent, neque stomacho imbecillo laborant, vel sunt mobili nervorum systemate prædicti. Quanvis hoc forte remedium syphilidem per se vix

curet radicitus, attamen dolores, ei originem debentes, sedat, et mitiorum *Hydrargyri praeparatorum* per frictionem effectum adjuvat. **SWIETENIUS** in *solutione* eo uti praeccepit; sed quoniam in *Spiritu Frumenti* difficulter solvitur, facile ad fundum vitri portio ejus remanet, noxam illatura, hinc alii pilularem formam praeferunt. Si ægroti sunt irritabiles spasmodique, aut cita alvo laborare posse observantur, aut debilitate ventriculi, tum *Opium*, vel *amara* adduntur. In bubonibus et tumoribus testiculorum et in genere, ubi in lymphaticum systema agendum est, vix commendandus, utut, in his a **CYRILLO** adhibitus; sed sub *unguenti* forma. Quod ad eum refertur habet drachinam *Oxymuriatis Hydrargyri* cum *Adipis suillæ* uncia per 12 horas jugiter contritam. Admovetur frictio sub planta pedum ejusdem suasu, dimidio drachmæ, qualibet vice insumto, ast satius existumo id in interiori femorium, crurum, brachiorumque parte fieri. Laudatur *Oxymurias Hydrurgyri* in algematinibus, ut in myodynbia rheumatica (chronica,) podagra, et id genus aliis, quo in casu **RICHTERI**, **VOGLRI** aliorumque suasu, *Opium*, *Succus Aconiti spissatus*, *Gummiresina Guajaci officinalis*, eidem adduntur, subscriptore etiam **HECKERO**. **CYRILLO** fricatione, cujus supra mentio injecta est, curavit coxalgiam. Prosopalgia etiam ipsa, si nervus infraorbitalis, aut facialis, *opiata Oxymuriatis solutione*, delibuat, cedit, vel si idem pro usu interno, cum *gummiresina Assæ foetidae* et *Succo Conii spissato* conjungatur. Fœditates cutis profligat, obponiturque herpetibus, tineæ capitis etc., externo usu *solutio*ne verbi gratia grani in *aqua destillata* uncia, humefiunt partes fœditatibus contiguæ, vel admovetur eadem. **Hoffmannus** fortiorum adhibuit. In curatione scabiei refractariolæ *solutio*n*i fortiori Murias Ammoniae* utiliter adjungitur. Non desunt exempla curatæ helminthiaseos (**GARDINER CLARKE**), blennorrhœæ (cum *Opio*), leucorrhœæ etc. Valet etiam adversus ulcera cacoëthea, fungosa, callosa, phagedænica, cariem ossium, scirrum, carcinoma, gangrænam, vel *solutio*nis, vel *unguenti* forma. Solvit nimirum in *aqua destillata*, addita mucilagine congrua, vel fit *Unguentum*

ex Oxymuriatis Hydrargyri, et *Muriatis Ammoniae* paribus portionibus, quibus in *aqua fontana* solutis *Adeps suilla* adjicitur atque totum id in murrino mortario leni igne conteritur, donec *aqua fontis* prorsus avolarit: additur tande n *Oleum Citri*. Hec extus admota, datis simul interne *Opii* et *Submuriatis Hydrargyri* dosibus, praesentaneo sunt auxilio. In carie additur interdum *Oxymuriati Hydrargyri pulvis Juniperi Sabinae*; in cancro autem (auctore JUSTAMONDIO) æqua *Oxydi Arsenici albi* portio. *Solutio ejusdem opia*ta est proficia in ophthalmiis chronicis pervicacibus, quibus palpebræ presertim adficiuntur in pannis et maculis cornea, in incipiente staphylomate. **WARE** commendat eundem contra amaurosin, dolore, coarctatione, et obscuratione pupillæ stipatam; **Rowley** vero interno ejusdem usu cataractam dissipavit. Meminisse juvat remedii adeo caustici usum imbecillis, sensibilibus, phthisiscentibus, hæmoptoicis, aut hæmorrhagiis, scorbuto, rachitide, atrophia, marasmo senili, et id genus aliis, laborantibus, esse alienissimum.

D. Gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$ ita, ut per nycthemeron administretur granum. *Forma pulveris* pro interno usu nunquam porrigitur; ast in genere *solutio* ejusdem, ceteris administrandi modis, a quibusdam præfertur, scilicet: soluitur is in *aqua destillata*, (que ceteris vehiculis præstat,) aut *Alcohol diluto*, servata hac proportione, ut quodlibet granum ad minimum duas vehiculi uncias teneat, *solutio*que, vel *Saccharo*, vel *melle* edulcoretur, vel *mucilagine gummi Acaciae verae* temperetur. Hujus *Solutionis cochlear*, vel duo, bis in diem, propinantur. Adhibetur etiam per modum *pilularum* cum *mica panis*, vel cum *Anulo triticino radice Althaeæ off. gummi Acaciae verae*, vel *Syrupo*, aut *extracto* quolibet congruo. *Melle* etiam pro conficiendis pilulis excipitur haud inepte, addito quovis ad easdem involvendas *pulvere* Extrinsecus adhibetur pro *lotionibus*, *col'yriis*, *gargarismatis*, *injecti'nis*, *clysteribus*, *pediluviis*, ino a quibusdam (**BAUME**) pro *balineis*; quem in finem, pro re nata, magis, vel minus concentrata *solutio* fit. Pro *aqua ophthalmica*, aut *gargarismate* granum in se libra *aqua* soluitur. Pro *injectione*, verbi gratia, in *blennorrhœa*

aut leucorrhœa urethræ, tantundem, in duabus aquæ unciis, Pro clysteribus (secundum VOLMAR) gr. $\frac{1}{4}$, vel semigranum in semuncia aquæ, addito Opio, aut, (suadente RYERO,) Camphora. Quodsi dosis ad granum, augeatur interne, exorietur gastrodynæ, angor, vomitutio, quin protracto usu, formina ventris atrocia, vomitus cruentus, prasino-biliosi, cum meteorismo, enteritis, in gangrænam, vel sphacelum atque ineluctabilem mortem, desitura. Magna proinde cura caudendum est, ne auctioni præbio, æger, loco quæsitæ salutis, præcipitetur. Hinc ab initio, si metus horum subest, obviam eundum est, adjecto volatili stimulo, aromaticis aquis, cortice L. Cassiae, Citri aurantii, Opio, Camphora. Noxa præpostero consilio illata, antidota celebratissima aptissimaque sunt aqua Calcariaæ, Sulphuretum ejusdem, Potassa, Subcarbonas ejusdem in aqua solutus, (adjecto Olivi pauxillo,) aut ejusdem, vel Soda Hydro-sulphuretum, Cortex Cinchonæ off. vel Quercus R. aquæ incoctus, Sapo, et generatim potiones demulcentes, emulsiones, lac, Albumen in aqua solutum et filtratum, juvant. Ad detegendum Oxymuriatem Hydrargyri adhibebantur solutiones Alcalium fixorum, Subcarbonatum, vel aqua Calcariaæ hucusque, e cujus præcipitatione sedimentum aurantii coloris surrexit; sed Murias Stanni, nuper detectus, præferri meretur, qui in primis griseum; dein vero fuscum colorem prodit.

V. Aqua Hydrargyri caustica; Collyrium Hydrargyri opiatum; Gargarisma Oxymuriatis Hydrargyri; Linimentum Oxymuriatis Hydrargyri; Submuriæ Hydrargyri; Pilulae Oxymuriatis Hydrargyri; Solutio --.

P H O S P H O R U S.

Φοςφορός.

R. Acidi phosphorici concreti partes tres,

in crucibulo fusis adde continuo movendo:

Carbonis lignarii pulverati partem.

Massam adhuc calentem in mortario lapideo probe terito, dein retortæ loricatæ immittito et junge mediante luto pingui

excipulum amplum, *aqua frigida* ad medietatem repletum, tubuloque parvo in parte superiori instructum, per quem *gas* exire possit. Destilla in furno reverberii, igne sensim auctiori ad retortæ candescentiam, donec guttæ transire cesserent. Frigefacto adparatu liquorem infundibulo inde et *aquam* separa, dein inferiori infundibuli orificio clauso, *aquam* calidam autunde *phosphoro*, (in infundibulo contento,) ipsumque infundibulum *aquaæ bullienti* immerge movendo massam bacillo vitro, donec in collo infundibuli in massam coëat. Tum in *aquam frigidam* immitte, ut solidescat ea, quam inverso infundibulo **exime** & sub *aqua frigida* in vasis terreis, probe clausis, serva.

Q. Est substantia solida, tenax, subpellucida, albido-flava, consistentiae *cerae*, pondus ejus specificum est 1770, si pura fuerit, calore fundenda, quæve in *aëre* ad 100° *Fahr.* accenditur flamma clara, fumoque albo, qui ad frigidiora corpora delatus liquecit et *Acidum phosphoricum* format *Luce* splendet interna, si temperies infra centesimum F. HRENHEITIANI thermometri gradum fuerit, combustionem prodit lentam, attracto ex atmosphæra *oxygene*, quo *acidum imperfectum phosphorusum*, alliaceo odore manifestum, evolvitur. In *aqua* non solvitur, optime vero in *oleis unguinosis*, *aethereis*, *Alcohole*.

V. Admodum excitans; exhilarans, sub incremento caloris adurens.

U. In summa virium prostratione, quæ a febribus malignis efficitur, ita in gravissimo typhi stadio, ubi labefactis viribus, pulsus arteriarum sunt molles, exiles, exoriuntur singultus, subsultus tendinum, respiratio stertorosa, sudores tenaces, deliramenta tacita, auxilium spondet, ast si inflammatio topica, aut nimius sanguinis ad interna nobilia organa impetus, urget, omnino alienus est ejus usus. Profuit etiam in variolis, morbillis, scarlatina, aliisque exanthematibus retrogradis, actionem vasorum et cutis augendo, haud secus ac in tetano, epilepsia, commendabatur. Solebat etiam dari in arthritide anomala, ut excitatis viribus et dia-phoresis et ipsi articulorum tumores renascerentur, cui fini

idoneum TRAMPELIUS invenit. An febribus intermittentibus obponi possit, ulterior experientia docebit. Usu ejus aliquot dierum, non modo leucophlegmaticus evanuit habitus; sed etiam febris ipsa plus simplici vice a me curata est; alienum tamen illis existumo, qui adtenuatis ventriculi viribus, aut saburra primarum viarum, aut splanchemphraxy, aut anarrhopia, laborant. Extrinsecus Oleo olivo mistum inungi suadent, isque tum, cuti admotus, sensum pungentem, urentem et ruborem producit.

D. Optime porrigitur ad octavam, aut rarius quartam grani partem in emulsione, vel solutione oleosa, ita, ut æger nequam ultra grani dosin intra nycthemeron sumat. Quindecim, verbi gratia, Phosphori grana solvuntur (digestione) in duabus unciiis Aetheris sulphurici, atque huius solutionis guttae decem exhibentur, vel grana quatuor Phosphori in olei amygdalini drachmis duabus soluta miscere expedit cum gummi Acaciae verae et Sacchari tanta copia, ut addita aqua, leviter aromatica, surgat emulsio. (Videsis Emulsionem.) Doses remedii hujus non sunt sæpe repetendæ, ne Phosphorus in ventriculo accumuletur, neque etiam magna sorbitionis copia ad semel paranda, ne is, adtracto oxygene, iterum præcipitetur. Oriuntur interdum, remedio insubide dato, æstus, anxietas, nimius sanguinis impetus, tormina, vomituritio, enteritis, gangræna, in mortem abitura, hinc provide et circumspecte administrandus.

V. Emulsio phosphorata; Linimentum Phosphori ammoniatum; Solutio Phosphori aetherea.

P I L U L Æ A L L I A T Æ.

П и л у л и ч е с н о ч н ы я .

R. Radicis Allii sativi recentis,

Saponis oleosi, utriusque semunciam,

Radicis Glycyrrhizae glabrae pulveratæ quantum satis sit,

ut fiat massa, e cujus singulis drachmis formentur pilulæ quindecim.

D. Pilulæ quinque (ad decem) bis terve de die porriguntur.

Si singulis dosibus *Submuriatis Hydrargyri* granum, vel duo, addideris, vis pilularum diuretica et anthelminthica intendetur.

P I L U L A E A L O E S .

II. С а б у р н ы я .

R. *Gummiresinae Aloës perfoliatae*, in pulverem subtilissimum tritæ,

Saponis oleosi, utriusque pares portiones, quibus, si lubet, adde *Olei* cuiusvis carminativi tantillum. Subige cum syrupo simplici, vel mucilagine *Acaciae verae*, ut fiat massa, ex qua formentur pilulæ pondere granorum trium.

D. Pilulae tres (ad octo) hora decubitus Interdum ad ditur *gummiresinae Myrrhae* tertia pars, et in alvo cum dolore suppressa sesquigranum (ad tria grana) succi *Hyoscyami spissati* singulis dosibus, addita autem decima grani parte *Tartratis Stibii* et *Potassae* (singulis dosibus,) vis *Aloës cathartica mirum* in modum intenditur; sed tum imminuendum est præbium.

P I L U L A E A L O E S e t S T A L A G M I T I D I S .

II. С а б у р о - г у т о п о в ы я .

R. *Massæ pilularum Aloës* partes tres,

Gummiresinae Stalagmitidis Cambogiodis partem.

Misce, fiant pilulæ pondere granorum trium.

U. In obstipatione habituali rebelli pilulæ duæ dantur; si vero intentio est alvum semel, vel bis movendi, tum pilulæ quatuor hora somni, porriguntur.

P I L U L A E A L O E S F C E T I D I E .

II. С а б у р о - в о н ю ч і я .

R. *Gummiresinae Aloës perfoliatae*, vel

— — — — — *spicatae*,

— — — — — *Ferulæ Assæ foetidae*,

Saponis oleosi, singulorum paria pondera.

Olei Juniperi aliquot guttas,

Subige cum *Mucilagine Acaciae verae* in massam, ex qua fiant pilulæ pondere granorum trium.

U. Imbecillo ventriculo, dyspepsia, inflationi, compressæ alvo, adcommodatae sunt, pilulis tribus (ad septem) bis de die propinatis.

PILULÆ AMARÆ FERRATÆ.

П. Горько-желъзистыя.

R. *Bilis taurinae spissatae,*
Extracti Gentianæ luteæ,
Radicis Rhei palmati pulveratæ,
Subcarbonatis Potassæ,
Sulphatis Ferri pares portiones.

Misce, fiant pilulæ solutione *Myrrhae*, si opus, excipiendæ; pondere granorum trium.

U. In acore ventriculi, dyspepsia, soda, (propinatis bis de die pilulis quatuor, sex et amplius;) valent.

PILULÆ ASSÆ FOETIDÆ COMPOSITÆ.

П. Дурно-пахучія сложныя.

R. *Gummiresinae F. Assæ foetidae drachmas duas,*
Submuriatis Hydrargyri grana decem,
Camphoræ semidrachinam.

Misce fiant lege artis cum *mucilagine Acaciae verae* pilulæ pondere granorum trium.

U. In myodynia rheumatica (chronica,) arthrodynia et in primis coxalgia, propinatis sex, decem, bis de die, pilulis.

PILULÆ CATHARTICO-DIURETICÆ.

П. Слабительно-мочегонныя.

R. *Pulveris radicis Scillæ maritimæ grana sex,*
Convolvuli Falappæ grana decem,
Submuriatis Hydrargyri grana quatuor;
Pulveris aromatici grana sex.

Cum syrupo Zingiberis, vel oleo pineo-laricino, vel Juniperi fiant pilulæ quatuor granorum pondere, una vice, noctibus alternis, propinandæ, et pulvis Supertartratis Potassae compositus, quovis idoneo liquido solutus, mane insequenti exhibendus. Granum Opii subinde additum non erit alienum.

P I L U L Æ C H E L I D O N I I.

II. Экстрактно-чистяковые.

R. *Succi Chelidonii spissati unciam,*

*Pulveris radicis Chelidonii majoris, quantum satis, ad consistentiam massæ, e qua formentur pilulæ pondere granorum duorum, pulvere (seminum) *Lycopodii* conspergenda.*

U. Mane et vesperi, (per binas pilulas, sensim adscendendo ad decem,) suntæ, efficaci sunt auxilio. Virtutes etiam *succi spissati Chelidonii*, quas in hydropisi præstat, confirmavit cl. CONRADI.

P I L U L Æ C H E L I D O N I I C O M P O S I T Æ.

II. Чистяковые сложные.

R. *Succi Chelidonii spissati,*

Saponis oleosi,

Gummiresinae Heraclei gummiferi, singulorum drachmam. Misce fiant pilulæ (per pondus) granorum duorum.

D. Decem (ad quindecim) pilulæ exhibentur.

P I L U L Æ C O L O C Y N T H I D I S F E R R A T Æ.

II. Колоцинто-желъзистые.

R. *Extracti Colocynthidis compositi drachmas tres,*

Gummiresinae Ferulae Assae foetidae,

Saponis oleosi, vel

— *pineo-oleosi, vel*

Bilis taurinae spissatae,

Muriatis Ammoniae ferrati,

Succi Chelidonii spissati, singulorum drachmam,

*Tartratis Stibii et Potassae grana novem,
Olei Chamomillae guttas triginta.*

Misce et lege artis fiat massa, in pilulas pondere granorum duorum dividenda.

D. Tres ad sex propinantrur.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS STIBIATÆ.

П. Колоцинто-сурьмяные.

R. *Extracti Colocynthidis compositi drachmas tres,
Gummiresinae Heraclei gummiferi,
Ferulae Assae foetidae,
Saponis pineo-oleosi,
Succi Chelidonii spissati, singulorum drachmam,
Tartratis Stibii et Potassae grana novem,
Olei Chamomillae guttas triginta.*

Misce lege artis fiat massa, in pilulas per pondus granorum duorum dividenda.

V. Pilulæ utriusque compositionis; in primis vero hæ, sunt resolventes, aperientes, catharticæ, stimulo in viscera et intestina impresso, secretioni humorum, haud secus ac absorptio- ni calcar addunt, lentescentis in portarum vena sanguinis transmeatum reddunt expeditiorem; ast protracto usu corpus exinaniant et infirmant.

U. In splanchemphraxy abdominali, infarctu intestinorum pituitoso, si indoles, aut complicatio mali expostulat. Formulis propositis haud inepte additur *Submuriatis Hydrargyri* drachma. Post singulum præbium non male bibitur *infusum specierum Chamomillæ compitarum*.

D. Pilulæ tres ad sex dantur.

P I L U L Æ D I G I T A L I S.

П. Листовъ Наперстника.

R. *Pulveris foliorum Digitalis purpureæ scrupulun;*

*Gummiresinus Ferulae Assae foetidae (Alcoholis diluti
ope ad aptam mollitiem redactæ), vel
Roob Juniperi communis, vel
Extracti amari, quantum satis,
ut fiat massa, in pilulas viginti æquales, dividenda.
D. Pilula (duæ) bis terve de die exhibetur.*

PILULÆ GUMMIRESINOSÆ FŒTIDÆ.

II. Камедо-смолистыя вонючія.

R. *Gummiresinae Ferulae Assae foetidae,*
Lauri Myrrhae,
Aloes perfoliatae,
Pulveris Juniperi Sabinae,
Carbonatis Ferri, singulorum partes quatuor,
Olei Succini (empyreumatici) partem,
 subige in massam cum sufficienti quantitate *syrupi simplicis.*

V. Tonica; antispasmodica, emenagoga, grana decem ad scrupulum, bis de die, porrigendo.

PILULÆ GUAJACI COMPOSITÆ.

II. Бакаушные сложные.

R. *Gummiresinae Guajaci officinalis partes quatuor,*
Camphorae partes duas,
Succi Aconiti spissati,
Suboxydi Stibii hydrosulphurati, utriusque partem,
Alcoholis, vel Olei pineo-laricini, si opus, quantum satis,
 ut fiant pilulæ granorum quatuor pondere.

D. Pilulæ duæ.

P I L U L Æ H U M U L I L U P U L I .

II. Хмѣлевыхъ верхушекъ.

R. *Pulveris conorum Humuli Lupuli,*
Extracti ejusdem utriusque partes quatuor,

Camphoræ partem,

Excipe *Tinctura Humuli Lupuli*, ut fiat massa, cuius grana quinque gradatim adscendendo ad scrupulum, vices *Opii* supplerent. Myodynæ etiam rheumaticæ et podagræ peridoneæ sunt,

PILULÆ NITRATIS ARGENTI.

II. Селинтрокислого серебра.

R. *Nitratis Argenti* grana quinque,
Extracti Glycyrrhizæ scrupulum,
 Misce, fiant pilulæ viginti æquales.
 Usus in epilepsia probatus.

Pilularum dosis, ab una incipiendo, sensim sensimque quotidie augetur ad sex usque, (partitis vicibus,) vel donec nausea fuerit mota. Si vires intendere lubet, *Nitras Argenti* jussus præferri meretur eadem dosi propinandus.

PILULÆ OXYMURIATIS HYDRARGYRI.

II. Солепресыщенной ртути (сулемы.)

R. *Oxymuriatis Hydrargyri*,
Muriatis Ammoniae depurati, utriusque grana decem,
Aquaæ destillatae drachmam,
Gummi Acaciae verae pulverati scrupulos octo,
Mellis drachmam.
 Fiat massa in pilulas octaginta æquales dividenda,

D. Duæ ad quatuor bis terve de die. Sumto singulo pilularum præbio, *mucilaginosa* potui danda vis *Oxymuriatis Hydrargyri corrosivæ* obtundendæ causa. Interdum addere licet massæ superius indicatae, *Opii* vel *Succi Aconiti*, aut *Conii* (*spissatum*) scrupulos duos et *Tartratis Stibii* et *Potassæ* grana octo, vel *Subphosphatis Calcuriae stibiati* semidrachmam, et tum ostealgiæ (doloribus osteocopis), lenimen, in cutim vim medicamentosam exserendo, præstat.

P I L U L A E P I C E A.

II. Деготнио-смоляные.

R. *Olei empyreumatici pineo-sylvestris*, quantum vis,
Pulveris radicis Glycyrrhizae glabrae quantum sufficit,
 ut fiat massa in pilulas granorum quinque dividenda.

V. Sudorifera; diuretica; antiseptica.

U. Scorbatus, fœditates cutis, psora, herpes, tinea etc.

D. Pilulæ quatuor, sex, bis terve de die, superbibendo
 DECOCTURAM SPECIERUM GUAJACI COMPOSITARUM.

P I L U L A E R H E I C O M P O S I T A E.

II. Ревеневые сложные.

R. *Pulveris radicis Rhei palmati* semunciam,
Gummiresinae Aloës perfoliatae drachinas tres,
 ————— *Lauri Myrrhae* drachmas duas,
Saponis pineo-oleosi tantumdem,
Olei Menthae piperitae guttas quindecim.

Cum Syrupo Zingiberis subige in massam, ex qua fermentur
 pilulæ pondere granorum trium.

U. Dyspepsia, inflatio, alvus adstricta.

D. Pilulæ quinque ad octo et amplius bis de die, superbibendo
 aquam tepidam, vel infusum Matricariae Chamomillæ.

P I L U L A E S C I L L A E.

II. Морсколуковыя.

R. *Radicis Scillæ maritimæ* siccatae, et in pulverem subtilem tenuatæ,
Gummiresinae Heraclei gummiferi depuratæ, vel
 ————— *Ferulae Assue foetidae*,
Pulveris aromatici, vel
 ————— *radicis Amomi Zingiberis*, vel
 ————— *seminum* ————— *Cardamomi*,

Saponis pineo-oleosi, singulorum pares portiones,
excipe;

Tincturae Guajaci, vel

Olei Juniperi sufficienti quantitate,
et subige in massam justæ spissitudinis, ex qua formentur
pilulæ pondere granorum duorum.

U. Morbi pulmonum asthenici pituita stipati; hydrops.

D. Pilulæ quinque (ad duodecim) bis de die dantur.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ I.

II. М о р ск о - л у к . с л о ж н ы й 1.

R. *Submuriatis Hydrargyri* partem,

Pulveris radicis Scillæ maritimæ partes duas,

— — — *aromatici* partes tres,

Syrupi simplicis quantum satis,

subige in massam, ex qua formentur pilulæ pondere granorum duorum.

U. Ut et præcedentium. Insuper in hypochondriasi, præsertim addito *Aloes* et *Saponis* pauxillo, commendari merentur.

D. Pilulæ tres ter de die, vel a quinque ad scrupulum et amplius, noctu dormituriis et *pulverem Superturtratis Potassae* et *Stalagmitidis Cambogioidis* mane insequenti, addito interdum *pilulis*, *Opii* grano, præberi expedit.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ II.

II. м о р ск о - л у к . с л о ж н ы й 2.

R. *Olei sulphurati* cum *pineo-laricino* drachmas tres,

Gummiresinae Assae foetidae drachmam,

Submuriatis Hydrargyri,

Radicis Scillæ maritimæ,

Foliorum Digitalis purpureae pulveratorum, singulorum
scrupulum.

misce fiat massa, e qua formentur cum *Tinctura Digitalis purpureae*, vel *Aethere nitrico alcoholisato* (si opus) pilulæ pondere granorum duorum, pulvere *Lycopodii* conspergenda.

U. Eximiæ sunt in hydropisi efficaciam, si sex (ad duodecim) ter de die, exhibeantur.

P I L U L A E S O D A E.

II. Углекислой соды.

R. *Subcarbonatis Soda* depurati exsiccati semunciam,
Saponis oleosi drachmas tres,
Syrupi Zingiberis, vel
 ————— *simplicis*, quantum satis,

ut fiat massa in pilulas, (per pondus) granorum quinque dividenda.

U. In urolithiasi valent propinatis duabus, tribus quatuorve pilulis de die.

PILULÆ SUBMURIATIS HYDRARGYRI.

II. Солекислой услащенной ртути.

R. *Submuriatis Hydrargyri* grana sex,
Camphorae grana duodecim,
Pulveris gummiresinae Guajaci officinalis scrupulum,
Mucilaginis Acaciae verae, quantum satis,
 ut fiat massa in pilulas duodecim æquales dividenda.

D. Pilulæ duæ ad quatuor bis de die. Quandoque quatuor *Opii* grana, aut *succi Aconiti* aut *Conii (spissatorum)* grana octo, vel *succi Hyoscyami spissati* tantumdem præcedenti massæ, pro rei necessitate, addi possunt. Præter effectus *Camphoræ*, *Hydrargyri* etc., privos eosque multis modis inque variis morbis salutares, in trismo etiam dolorifico, attestantibus luculentis scriptoribus, laude sua non fraudantur.

PILULÆ SUBMUR. HYDRARGYRI STIBIATE.

II. Услащенной ртути сурьмянья.

R. *Submuriatis Hydrargyri*,
Suboxydi Stibii hydro-sulphurati, utriusque partes tres, vel

*Subphosphatis Calcariae stibiati partes quatuor,
Extracti Gentianae luteae, vel
— amari,
Saponis pineo-oleosi, utriusque partem.*

Duobus primis ingredientibus, simul tritis, adde *extractum, saponem et Tincturae Opii*, si opus, sufficientem quantitatem, ut fiat massa, ex qua formentur pilulæ pondere granorum duorum.

D. Pilulæ tres ad quinque. Vel

R. *Tartraris Stibii et Pottassae grana quindecim,
Submuriatis Hydrargyri,
Camphorae (ope aliquot gutterum Alcoholis in pulverem redactæ), utriusque drachmam,
Opii puri semidrachmam, vel
Succi Conii spissati, vel
— Aconiti — vel
— Hyoscyami — scrupulos duos, vel
Extracti Humuli Lupuli drachmam.*

Mucilaginis Acaciae verae quantum sufficit, ut fiat massa in pilulas sexaginta æquales dividenda.

U. In myodynia rheumatica, ostealgia syphilitica, porrectis duabus, aut tribus, et amplius, caute adscendendo, bis die, pilulis, commendantur.

P I L U L Æ S U B O X Y D I H Y D R A R G Y R I .

П. ртущая, (полуокись ртутиой.)

R. *Hydrargyri depurati unciam,
Balsami pineo-laricini semidrachmam,
conterito, donec globuli Hydrargyri disparuerint, addendo, si opus fuerit, gradatim Mucilaginem Acaciae verae, tandem cum sufficienti quantitate pulveris radicis Glycyrrhizae echinatae, vel Amyli triticini formentur pilulæ octaginta æquales.*

D. Pilula, vel duæ, mane et vesperi ad ptysmatis lenioris adparitionem. Pilulae hæ metallum in minimo oxydationis gradu tenentes, vices frictionum mercurialium supplent.

PILULÆ SUBOXIDI HYDRARGYRI NIGRI.

П. Черно-ртупшной полуокиси.

R. *Suboxydi Hydrargyri nigri* drachmas duas,

Extracti Glycyrrhizae echinatae, vel

Mellis, quantum sufficit,

at rite conterendo fiunt pilulæ centum viginti, conspergendaæ *Lauri Cassiae corticis pulvere*. Interdum recte additur *Opii* dimidia quantitas, quæ *Suboxydi Hydrargyri nigri* est. Subinde loco hujus recte sumitur *Submuriæ Hydrargyri*, et tunc dosis minuenda est.

U. In syphilide, datis duabus bis de die, pilulis.

PILULÆ SUBSULPHATIS CUPRI.

П. Полуокиси мѣдно-амміакової.

R. *Subsulphatis Cupri* et *Ammoniae grana* sedecim,

Micae panis scrupulos quatuor,

Subcarbonatis Ammoniae liquidi, quantum satis sit,

ut fiat massa in pilulas triginta duas æquales dividenda. Vel

R. *Subsulphatis Cupri* et *Ammoniae grana* sedecim,

Succi spissati Hyoscyami nigri, vel

— — — *Conii maculati*, vel

— — — *Aconiti neomontani* drachmain,

Pulveris radicis Valerianæ, quantum satis,

ut fiat massa, in pilulas triginta duas æquales dividenda. Quantum subinde singulis dosibus addantur *Oxydi Zinci* grana duo.

U. In epilepsia, porrigo pilulam bis terve de die, sensim augendo dosin.

POTASSA FUSA.

KALI CAUSTICUM SICCUM Ph. Bor; ALCALI CAUSTICUM
Ph. Ross.

Поташъ ъдкій; щелокоприжигательной камень.

R. *Potassae liquidae quantum velis.*

Tamdiu in ferreo vase vaporet, donec instillata frigido lapi-
di guttula indurescat. Tum *sal* indatur crucibulo eique calor
admoveatur, usque dum forma *olei* fluxerit, quod illico in
canalem ferreum calentem, *olivo* illitum, effundatur, qui an-
serinæ pennæ magnitudinem habet. Denique in apta frustula
secatur et vitro bene clauso servanda.

Q. Hic *acidi carbonici* orbus *sal* *kalinus*, *aëri* expositus, ad-
tracto undique *carbonico acido*, deliquescit et per id causti-
cate sua privatur, adtractis aliis *acidis* exaestuat quidem; sed
cum iis nunquam effervescit; cum *oleis* vero *unguinosis sapo-*
nem constituit. *Sapore* gaudet caustico linguamque excoriat, a
Potassa liquida compagine tantum sua differt et prout *Soda*,
Ammonia, *Baryta*, *Strontiana*, *Calcaria* aggere galvanico tracta-
ta metallicam indolem, secundum **Davyana** experimenta,
manifestat.

V. Corrosiva, quippe quæ partes corporis organicas exest
et destruit; ubi vero satis diluitur, actionem vasorum lym-
phaticorum nervorumque serosas arterias musculosque pene-
trantium, intendit, iisque stimulum impertitur, quo nervorum
in secretionibus vis mutatur atque metasyncrisis efficitur.

U. Facultate sua caustica proficit adversus hypersarcosin,
callosos inertesque ulcerum margines, verrucas, tumores cy-
sticos etc., lentius quidem agendo, sed non causat adeo vehe-
mentes, ut alia, caustica dolores, serique effusionem promovet.
Si ad aperiendos callos, tumores ulcerosos et verrucas ne-
cessitas incidit ejus adhibendæ, loca hæc prius *emplastro fo-*
rato, ne ultra foramen effectus caustici progrediatur, tegenda
sunt. Porrigo, ut escharæ spissæ moliantur, removeanturque

non inepte lavatur drachma cum *olei* dupla portione in uncia *aquaæ* soluta. Ad radicalem hydropis tunicæ vaginalis testium curam, usus est **LEVRETUS** injectione ex *solutione* duorum ejusdem granorum in selibra *aquaæ*. **DESSAULTIUS** elychnia *solutione* ejusdem imbuta, vaginali tunicæ inserebat, arrosione suppurationem novam et coalitum, moliens. Quatenus **extus** admota activitatem lymphaticorum vasorum sollicitat intenditque, adhibetur ad resolvendos tumores adenemphracticos; sed in *solutione* adeo diluta, ne inflammationem excitet. Miasmatibus etiam et contagiosis obviam it, vulnera a canibus rabidis inficta, si neque excindi, neque aduri commode queant, dilatata prius lavari suadet **MEDERERUS** *solutione* *Potassae fusæ* aliquoties de die atque dein *aqua* elui; vel vero vulnéri, si non est sensibile, linteum carptum, *solutione* imbutum, admovetur. Hæc methodus **SIMONSIO** etiam arrisit. Remedio est etiam, attestante **FONTANA**, adversus viperarum ictum, imo diluta ejusdem *solutio*, interne sumta, morsuræ venenatorum serpentum occurrisse fertur, haud secus ac eadem, illato stupro, confestim in urinæ iter injecta, (non neglecta glandis collis ablutione, blennorrhœam, teste **FORDYCE**, averruncavit; **ALT-HOFIUS** tamen contrarium refert. Ulcera syphilitica incipientia identidem tractata *Potassa fusa* facilius curationem recipiunt. Intendendo actionem nervorum in serosis arteriis vallet adversus neuroblaciam quarundam partium, cui interdum myodynia rheumatica et podagra originem debet. Hunc in finem proponuntur *topica*, pro affecta parte, *balnea*, vel etiam *fotus* e *solutione* ejusdem. **HAGGENMÜLLERUS** pediluvia e *solutione* ejusdem cum successu opposuit podagræ, singulo vespere per semihoram primo; dein vero per horam administrata. Non male, si morbus is apyretus est, *Potassæ fusæ* *tinctura* interne subjungitur. Corrigendo morbosam secretionem proficit in ulceribus asthenicis flaccidis, putescentibus etc., in *solutione*, qua madefiunt. Secundum **STRÜTZ** partes exulceratae *balneo calido*, in quo *Potassa* soluta est, per aliquot minuta fovendæ sunt, quo inertes ulcerum margines lacescunt, sensim

meliorescunt, novamque benigni puris secretionem admittunt. In fistulis etiam lacrimalibus aliisque fistulosis ulceribus administrari potest *solutio* per modum *injectionis*. In blennorrhagia urethræ a GIRTANNERO, MÖNCHIO, WEIKARDIO etc., diluta *solutio* pro *injectione* commendatur; injicitur autem incipiente ea, ita, ut granum *Potassae fusæ* in *aqua destillata* uncia solvatur, ne alium, quam fugacem æstus sensum in urethra producat. GIRTANNERUS initio primi blennorrhagiæ stadii injiciebat *solutionem* e *Potassae fusæ* drachma et *aqua destillata* libra; sed concentratior *solutio* aptior est blennorrhœæ, quam præcedenti. *Opium* non male additur. Ad sollicitandos etiam nervorum organicorum fines valet, ut consumtio imponderabilium acceleretur, spasmatibusque hac ratione finis ponatur. *Balnea* scilicet parantur, quæ quotidie semel vel bis in trismo, scelotyrbe aliisque id genus nervorum distentionibus imo et eclampsii infantum commendantur. Recenter adversus tetanum traumaticum proponitur tale, una cum usu interno mutuo *Opii* et *Subcarbonatis Potassae*, nec non *fomentum* (STRÜTZ.) Solvitur *Potassae fusæ* uncia sensimque concedente morbi natura, unciae duæ in semicupio, quod ex lixivio fit, quale e communi *lignorum cinere* parari solet (*Salzb. Mediz. Chir. Zeitung.*) Pro fomento adhibetur *Potassae fusæ* uncia in *aqua destillata* mensura sesquialtera soluta, quod ventri applicatum spasmum gravidæ clonicum submovit (BRÜNNINGHAUSEN.) *Acidum uricum* prædominans mitigando idque neutralisando, laudes tulit in urolithiasi (HOME, BLANE,) tumoribus arthriticis (SWIETEN,) rigiditate articulorum post sclopetaria vulnera.

D. Ad tangendas partes, vel in substantia, vel in *solutione*, vel cum *simplici* quopiam *digestivo unguento* adhibetur. Pro *solutionibus* adhibetur *aqua destillata*. In blennorrhagia incipiente, vel in ipsa blennorrhœa semigranum, vel duo grana solvuntur in uncia *aqua* pro *injectione*, in ulceribus granum; si vero ea insensibilia sunt, duo vel quatuor, pro vulnere a rabido cane inficto cauterisando semidrachma pro uncia *aqua* sufficit. Si adhibenda est pro interno usu, subsistere oportet gra-

nis tribus, incipiendo ab uno, eaque solvi, vel in *aqua*, vel in *mucilaginosis*, aut *jure carnium*. Utentes hoc remedio vitare debent *acida*, aut *oleosa* nutrimenta; alvus vero, si dura est, emollientibus ducenda est lotionibus. Connubium *eius* cum *acidis*, aut *Salibus metallicis*, omnino damnandum.

V. Solutio Potassae camphorata; Tinctura Potassae fusae.

P O T A S S A L I Q U I D A.

L I Q U O R K A L I C A U S T I C I Ph. Bor.; L I X I V I U M C A U-
S T I C U M S A P O N A R I O R U M Ph. Ross.

Щелокъ ъдкопомашный, мыловарный.

R. Subcarbonatis Potassae depurati bilibram,
vasi ferreo inditis adfundet:
Aquae communis fervidæ decuplum,
successive adde:
Calcariae pulveratae libras tres,
coque per quadrantem horæ spathula movendo.

Si liquor cum *acido* quoconque commistus, nullam producit effervescentiam, *Calcaria* addatur. Cola per linteum. Liquor vi- treis lagenis obturatis infusus, ubi subsederit, decantetur atque evaporet, donec *eius* unciæ quatuor vas compleverint, quod capax foret unciarum trium *aquaæ simplicis*. In lagenis minoribus obturamento vitro adcurate muniendis, usui servetur.

Q. Potassa liquida, si rite parata est, *coloris et odoris ex-*
pers habetur, nec cum *acidis* effervescit, nec cum *aqua Calca-*
riae lactescit, nec ab addito *Subcarbonate Potassae* turbatur. Si lactescit super *Calcaria* denuo colanda est; si turbatur *Subcar-*
bonas Potassae liquidus tamdiu instillandus est, donec nulla amplius fiat præcipitatio.

V. Cuticulam adurens, eamque erodens. Dilutæ: fibram
muscularem vellicans, lotium movens, acidum adtrahens, eo-
que etiam, ut verisimile est, lithontriptica.

U. ejus in urolithiasi, (præeuntibus JURINE & CHITTICK) invaluit; examinata enim, adcurata mentis trutina, calculorum urinariorum natura, inconfesso est, quosdam eorumdem e solo *Urate Ammoniae* aut *acido urico (lithico)* compositos, *Potassa*, seu *acido carbonico* juncta, seu eodem orbata, dissolvi posse; quantum enim experiri licuit, nullum de *urici acidi* in cálculis praesentia dubium est, præcipitatum quippe *Acido muriatico* in redditu urina exortum, postquam ægris administrata fuit *Potassa*, id extra omnem dubii aleam ponere videtur. Vulnera a cane rabido inficta eluuntur apte *Potassa liquida*, haud secus ac ulcera, quæ cacoëthe vocant, maxime syphilitica, quæ per hydrargyrosin malum characterem sunt adepta, delibuntur cum successu eadem. Aptæ quoque est *injectio ejus dilutæ* in tunicam vaginalem testis, si hydrocele occupatur. Nervorum resolutiones cum neuroblacia conjunctæ sat bene cedunt *frictionibus* cum eadem institutis.

D. Guttæ decem ter vel quater de die in urolithiasi, vel ne ventriculum gravet, guttæ quindecim in *jusculo e Carne vitulina* exhibentur. *Solutio*, quæ ad *СОЕНІУМ* refertur, habet *Potassæ liquidæ* guttas decem vel viginti, *decocturas baccharum Iuniperi* libram, per diem sumenda. Inter usum ejusdem internum portio adæquata e guttulis *Potassæ* viginti, *aqua destillatae* libra, dilutis, matutino tempore reddito *lotio*, catetheris ope, tempore 90 gr. *Th. F. urocystidi* a RITTERO est injecta.

V. *Potassa fusa.*

POTUS ACIDUS MINERALIS.

Питье окисленное сърною кислотою.

R. *Decocturae Furfuris, vel*
Hordei, vel
Aquaæ panis biscocti bilibram,
Acidi sulphurici diluti drachmam,
Mellis despumati semunciam, vel

*Syrupi simplicis, vel
Roob Oxycocti unciam.*

U. Synocha, synochus miliaris, varicella, et alii sthenici morbi; sub initio pemphigus.

POTUS ACIDUS VEGETABILIS.

П. окисленное винокаменною солю.

R. *Decocuriae Furfuris, vel
——— Hordei, vel
Aquae panis biscocti bilibram,
Supertartratis Potassae unciam,
Syrupi simplicis, vel
Mellis despumati semunciam.*

U. Idem, ut et præcedentis. Huic tamen recte substituitur posca, Ruthenice квасъ, dicta.

POTUS PICEUS.

П. Деготино - смоляное.

R. *Olei empyreumatici pineo-sylvestris partem,
Aquae depuratae partes quatuor,
Commisce, et bacillo ligneo valide per bihorium agita, dein
liquor stet in vase ligneo per biduum, et tandem per subsi-
dentiam depuratus effundatur.*

V. Diuretica; sudorifica.

U. In humorum dyscrasia: scorbuto (ELLIS;) psora; chlo-
rosi; leucorrhœa; hydrope; ulcere renum, aut urocystidis; mor-
bis viscerum pituitosis; hypochondriasi (QUADRIO) videsis:

OLEUM PINEO-LARICINUM.

D. Unciae tres et plus, ter de die, administrantur.

POTUS REFOCILLANS.

П. Ободряющее.

R. *Aetheris sulphurici alcoholisati drachmas duas,*

*Aquaæ fontanae, vel
Decoctionæ Furfuris, vel
— Hordei bilibram,
Sacchari puri semunciam, vel
Mellis flavi unciam,
frigide commisceantur.*

U. Typhus, aliique consimiles morbi. In vicem hujus *potio gentilitia*, збитень rathenice dicta, adjectis *aromaticis herbis*, ex melle et aqua decoctis, aut ex melle, admisto fructus *Piperis*, vel *Capsici annui* tantillo, pro re nata, etiam cum *Alcoholi diluto* facta, non est despiciunt ducenda, præsertim, ubi adtenuatis armigerorum, longinqua itinera facientium, viribus, succurendi necessitas incidit.

P U L P A P O M O R U M.

Мякоть яблочная.

R. *Pomorum dulcium*, quantum vis,
coque ex aqua et transprime per cibrum.

U. Pro *Cataplasmate ophthalmico*.

P U L P A P R U N O R U M.

М. Сливеная.

R. *Fructuum Pruni domesticæ*, exemptis nucleis, quantum lubet.

In sufficienti quantitate aquae ebulliant ad idoneam parenchimatis mollitudinem, quod per setaceum trajectum ad mellis crassitudinem evaporet, et addendo singulis libris, duas *Sacchari* uncias, leni igne ulterius inspissando, fiat *pulpa*.

D. Interne: a semuncia ad duas uncias, modo sola, modo cum alio medicamine, soluta in aqua, sero, aut simili *vehiculo*, jam sub forma *electuarii* cum aliis ingredientibus *catharticis*, ut *Supertartrate Potassæ*, *Sulphate Magnesiae*, foliis *Cassiae Sennæ*, radice *C. Jalappæ*, et similibus. Vices aliarum pulparum, ut *fructus Cassiae Fistulæ*, *Amlicae indicae* haud mediocri-

œconomiae emolumento supplet, addito in primis, ut posteriori sit analoga, Supertartrate Potassae, vel Acidō tartarico, absque mistione Sacchari.

V. Electuarium Sennat.

P U L V I S A B S O R B E N S.

П о р о ш о къ в с а с ы в а ю щ і й.

- R. Carbonatis Calcariae pulverati,
Farinae avenaceae, utriusque pares portiones.
Misce.

U. Extus erysipelati, eryhemati abmovetur. Sub initium horum vitiorum plerumque antisthenica (antiphlogistica,) præcipue cathartica, diaphoretica, refrigerantia, interne suinta, actionem vascularem et sensilitatem inhibentia, convenient; procedenti vero tempore, simulac metus typhi gravioris, vel gangrenæ subest, vel oppressionis encephali indicia, puta: apathia, stupor, urgent, scire licet mala hæc, jam retrograda, vesicantibus nuchæ admovendis, stimulantibus aliisque internis pharmacis revocanda esse. Singulis Absorbentis pulveris selenbris Oxycarbonatis Plumbi semuncia et semidrachma Camphorae addita, eundem reddit efficaciorem et quibusdam in cibis aptiorem.

P U L V I S A D S T R I N G E N S.

П. в я ж у щ і й.

- R. Sulphatis Ferri,
Succi Eucalypti concreti, vel
Extracti Tormentillæ erectæ, vel
— Catechu, utriusque pares portiones,
misce. Vel
- R. Supersulphatis Aluminæ et Fotassæ partes quatuor;
Succi Eucalypti concreti, vel
Extracti Tormentillæ erectæ partem.
Redigantur in pulverem tenuissimum.

V. Prioris adstringens; tonica.

U. Extrinsecus præcipuus. Uterque pulvis externe ad sistendum sanguisfluxum minorum vasorum, ad coercenda ulcera scorbutica, atonica, adspergendo idoneus.

PULVIS ALUMINIS COMPOSITUS.

II. квасцовыи сложный.

R. *Supersulphatis Aluminæ et Potassæ fusi,*
Oxydi Hydrargyri rubri,
Acetatis Cupri, singulorum partem,
Summitatum ramorum Juniperi Sabinae, vel
Radicis Rhei palmati, vel
— Acori Calami, vel
— Colombae partes duas, vel
Carbonis lignarii tantumdem.

Fiat pulvis perquam subtilis.

V. Excitans; adstringens; rodens admodum.

U. Ulcera supercrescentia, phagedænæ, rhagades, verrucas, psoriasis et alia similia vitia.

PULVIS AROMATICUS.

II. пряный.

R. *Seminum Amomi Cardamomi,*
Radicis — Zingiberis,
— Acori Calami,
Fructus Piperis longi, vel
— nigri, singulorum partes æquales.

Tere simul in pulverem tenuissimum, in vase bene obturato, servandum. Vel

R. *Corticis Lauri Cassiae pulverati,*

Seminum Amomi Cardamomi,

Radicis — Zingiberis, singulorum pares portiones

In pulverem subtilissimum tenua, in vase vitro probe obturato, servandum.

V. Stimulans; calefaciens; peptica.

U. Dyspepsia, inflationes. Supervenietem scarlatinæ angino-sæ aliisque febribus asthenicis alvi resolutionem, ægro discrimen minitantem, *vino nuptus*, cohibet.

D. A granis decem ad scrupulum et amplius per se, sæpius in connubio aliorum.

V. *Tinctura aromatica.*

PULVIS ASPIDII COMPOSITUS.

П. папоротного корня сложный.

R. *Pulveris radicis Filicis maris* drachmam,
 —————— *Convolvuli Jalappaæ*,
 —————— *Gummiresinae Stalagmitidis Cambogoidis*,
 —————— *foliorum Centaureæ benedictæ*,
Subphosphatis Calcariae, singulorum semidrachmam.

Misce fiat pulvis subtilissimus in tres partes æquales dividendus.

U. Nisi eliminetur tænia prima dosi, post bihorium altera et sic porro tertia, sumenda est, sumto videlicet pridie **PULVERE SUBMURATIS HYDRARGYRI COMPOSITO**. Hi duo *pulveres*, pro remedio *antitaenioso*, habitu, ab exc. Beck Archiatro Pe-tropolitano, publici juris, facti sunt.

PULVIS CARBONIS ACIDULUS.

П. Угольный кисловатый.

R. *Carbonis lignarii* scrupulum ad drachmam,
Acidi citrici concreti grana quinque,
Pulveris Gummi Acaciae verae,
Sacchari, utriusque scrupulum.

Misce fiat pulvis tenuissimus, ter de die propinandus.

U. Alvi dejectionibus, fætidis, dysenteria declinante, quandoque idoneus. Loco *Acidi citrici concreti*, *succus Citri*, sumto *pulvere*, (parvo cochleari,) convenit.

PULVIS CINCHONÆ SUCCEDANEUS.

II. Хину замѣняющій.

- R. *Corticis Aesculi Hippocastani,*
— Salicis cuiuslibet,
Radicis Gentianæ luteæ,
— Acori Calami,
— Gei urbani, singulorum quantum vis.

Misce, fiat pulvis subtilissimus, in vitro obturato, servandus.

D. Scrupulum (ad duo) datur.

PULVIS GUAJACI COMPOSITUS.

II. Смолы бакаутной сложный.

- R. *Gummiresinae Guajaci officinalis,*
Elaeosacchari Foeniculi, utriusque scrupulum,
Camphoræ grana sex,
Nitratis Potassæ depurati grana octo,

Misce fiat pulvis, cuius altera dimidia pars mane, altera vespera sumenda. Loco Nitratis Potassæ, grana quatuor *Subphosphatis Calcariae stibiati*, persæpe non inepte, adhibentur.

PULVIS GUAJACI AMMONIATUS.

II. Бакаутно-амміаковый.

- R. *Gummiresinae Guajaci officinalis scrupulum,*
Subcarbonatis Ammoniae grana quinque,
Elaeosacchari cuiuslibet scrupulum.

Contere, ut fiat pulvis, ex melle, vel Syrupo simplici, dormituro noctu, porrigendus. Quandoque et huicce grana Camphoræ tria, quatuor addita, non officiunt.

U. Myodynia rheumatica, astheniæ notam ferens, arthrodynia, exanthemata asthenica retropulsa.

PULVIS GUAJACI OPIATUS.

П. Бакаумно-опиатный.

R. *Gummiresinae Guajaci officinalis grana decem,*
Pulveris Ipecucuanhae opati grana quinque ad decem.
 Misce.

V. ut praecedentis, præstantior tamen; huic interdum adduntur:

Camphorae, (ope aliquot gutterum Alcoholis pulveralæ)
grana quatuor,
Sacchari albi grana decem.
 Pro dosi propinatur.

PULVIS GUAJACI STIBIATUS.

П. Бакаумно-сурьмяный.

R. *Gummiresinae Guajaci officinalis drachmam,*
Tartratis Stibii et Petassæ granum,
Supertartratis Potassæ drachmas duas,
 Misce fiat pulvis subtilissimus.

V. Excitans; sudorem et alvum movens.

U. In myodynia rheumatica egregius.

D. A scrupulo ad semidrachmam e syrupo opato, vel alio convenienti.

PULVIS JALAPPÆ COMPOSITUS.

П. Ялапный сложный.

R. *Pulveris radicis Convolvuli Jalappaæ,*
Supertartratis Petassæ, vel
Sulphatis ejusdem, utriusque pares portiones,
 Misce, fiat pulvis subtilissimus.

U. Alvo compressa exhibendus.

D. Scrupulum ad semidrachmam. Loco radicis Jalappaæ,
Rhei palmati radix substitui potest, tunc detur compositionis
semidrachma ad drachmam. Elatosacchara eidem audi queunt,

PULVIS JALAPPÆ et SUBMURIATIS HYDRARGYRI.

II. Я л а п и о - р т у ш н ы й.

R. *Pulveris radicis Convolvuli Jalappae* scrupulum,
Submuriatis Hydrargyri grana quinque,
 Misce, fiat pulvis tenuissimus pro dosi e syrupo, vel melle su-
 mendum mane; cui interdum adduntur:
Gummiresinae Stalagmitidis Cambogiooidis grana duo ad sex.

V. *Cathartica*; anthelminthica, diuretica.

U. *Alvus adstricta*, hydrops, mania, vermes intestina occu-
 pantes.

P U L V I S I P E C A C U A N H Æ.

II. Р в о п н а г о корня.

R. *Radicis Callicoccae Ipecacuanhae* pulveratæ,
Sacchari albi, utriusque scrupulum.
 Misce, fiat pulvis una vice administrandus, vel divide in qua-
 tuor partes æquales, quarum una omni quadrante horæ, do-
 nec vomitus insequetur, sumenda est.

P U L V I S I P E C A C U A N H Æ O P I A T U S.

P U L V I S D O V E R I.

II. И п е к а к у а н ы опиатный.

R. *Pulveris radicis Callicoccae Ipecacuanhae*,
Opii, utriusque partem,
Sulphatis Potassae partes octo.

Tenua in subtilissimum pulverem.

V. Excitans; sedans; eximie sudorifica; antispasmodica.

U Myodynia rheumatica, aliive morbi a perfrictione oriundi;
 diarrhœa; dysenteria; hydropsis, ubi exhalatio cutanea suppri-
 mitur, vel eandem provocare expedit.

D. A granis decem ad scrupulum. Sumto remedio nil illico

bibendum, ne vomitiones provocentur. Si loco *Suiphatis Potassae, Subcarbonis Sodis* accipiatur, tunc praecedenti valen-
tior erit in pertussi, præsertim præmisso *vomifilio* quo-
diām *stibiato*, et tum pro ratione ætatis, quarta quaque
hora, per aliquot dies, ex *syrupo* exhibetur. Si vero, sub
iusu ejusdem, alvus est compressa, eandem *Sybmuriate Hydrar-
yri* et *radice Rhei* subduci juvat. Idem effectus cum *Tinc-
ura Opii, Vino Ipecacuanhae et Subcarbonate Potassae*, habita
proportionis ratione, in formula liquida commistis, produci-
potest. (PEARSON.)

PULVIS IPECACUANHÆ STIBIATUS.

II. Ипекакуаны сурьмянныи.

R. *Pulveris radicis Callicoccae Ipecacuanhae* scrupulum,
Tartratis Stibii et *Potassae* granum.

Misce, ut fiat pulvis subtilissimus pro dosi sumendus, super-
bibendo affatim tepidam aquam, *infusum florum Chamomillæ*,
et Centaureæ benedictæ, simulac vomitiones fuerint provo-
catæ.

PULVIS MURIATIS AMMONIE STIBIATUS.

II. Солекислаго Амміака сурьмянныи.

R. *Muriatis Ammoniae depurati unciam*,
Suboxydi Stibii hydrosulphurati semidrachmam,
Elaeosacchari Chamomillæ drachmas quinque,
Radicis Glycyrrhizæ glabrae,
— *Acori Calami*, utriusque drachmam, duas,
'ulverata commiscentur, in vase vitro epistomio munito, ne
umiditatem attrahant, usui servanda.

U. Febribus intermittentibus gastricis dicatur. Datur extra pa-
oxysmum, aut immediate post eundem (corpore adhuc ma-
ente, qnod vomitum a majori dosi *Suboxydi Stibii*, metuen-

dum præcavet,) secunda quaque hora, dosi cochlearis minoris, (usui infusi Theae destinati,) cum aqua; si nausea conatusque vomendi subsequuntur, scopo vomitum ciendi, eadem dosis quavis semihora porrigitur, aquam tepidam superbibendo. Quo facto febris plerumque cessat, et tum vires attenuatae *Corticis Cinchonae* integrandæ sunt.

PULVIS NITRATIS POTASSÆ COMPOSITUS.

П. Селитряный сложный.

R. *Nitratis Potassæ depurati,*
Sacchari albi, utriusque semunciam,
Gummi Acaciae veræ unciam, ad sescunciam.
Misce, fiat pulvis.

D. Drachma ad sesquidrachmam, sæpius aut rarius, pro scopo, qui intenditur.

PULVIS PRO SUFFITU.

П. Курительный.

R. *Gummiresinae Juniperi Lyciae,*
Succini, utriusque partes tres,
Florum Lavandulae Spicae partem.
Misce.

Baccæ Juniperi communis, super prunas ustæ, odorifera virtute, præcedenti suffitui, æquiparabiles.

PULVIS QUERCUS COMPOSitus.

П. Дубовой корки сложный.

R. *Pulveris corticis Quercus Roboris,*
— radicis Acori Calami,
I oliorum Anthemidis nobilis,
Muriatis Ammoniae depurati, singulorum partes æquales.
Misce, fiat pulvis subtilissimus, cui adde, (si vis,)

Pulveris corticis Lauri Cassiae, vel
aromatici dimidiam, quæ singulis ingredienti-
bus inest, quantitatem.

V. Tonica; peptica; lexipyreta.

U. Ut succedaneus *Cinchonae*, intermittentes febres, sæpe curat.

D. Scrupulum (ad drachmam,) secunda vel tertia quaque ho-
ra, tempore apyrexias, exhibendum est.

PULVIS RHEI COMPOSITUS.

II. ревенной сложный.

R. *Pulveris radicis Rhei palmati,*
Subcarbonatis Magnesiae,
Sulphatis Potassae, singulorum scrupulum (ad duo,) vel
Tartratis Potassae tantumdem,
Pulveris Ipecacuanhae granum ad duo,
— aromatici grana decem ad scrupnlm.

In pulverem quam maxime subtilem tenua,

V. Est stomachicus; absorbens leniter; vi, (qua pollet,) stimu-
lante, alvum movens.

U. In cruditatibus, inflatione ventriculi, intestinorum et alvi
profluvio ab iisdem proveniente, utile remedium.

D. A drachma ad duas ex quovis apto vehiculo. Si vim ca-
harticam augere ejusdem placuerit, *radicis Jalappae* addita-
nentum decem granorum, erit proficuum.

PULVIS RHEI ET SUBMURIATIS HYDRARGYRI.

II. ревено-ртутьный.

R. *Pulveris Radicis Rhei scrupulum,*
Submuriatis Hydrargyri grana sex.

Hisce, fiat pulvis, pro dosi e *Melle* vel *Syrupo*, dandus alvo
coacta, vel tribus vicibus intervallo duarum, triun., quatuor,
vel quinque horarum. Subinde, si huicce *pulveri*, *Jalappae* gra-
na decem addideris, multis casibus omnino aptior erit.

PULVIS SABINÆ COMPOSITUS.

II. сабинный сложный.

R. *Summitatum Juniperi Sabinæ,*
Carbonatis Ferri praecipitati,
Radicis Amomi Zingiberis, vel
Pulveris aromatici, singulorum partem.
Misce, ut fiat pulvis.

U. *Hypochondriasis, dyspepsia, amenorrhœa, dysmenorrhœa.*
D. *Semidrachma (ad scrupulos duos,) bis de die. Interdum ad*
duntur singulis dosibus, gummiresinae Myrrhae grana sex ad
decem, vel Aloës perfoliatae grana quinque separatim, vel
conjunctim.

PULVIS SALICIS COMPOSITUS.

II. вербной корки сложный.

R. *Corticis Salicis uncias novem,*
Radicis Gei urbani uncias duas,
— Gentianæ lateue unciam,
— Rhei palmati semunciam,
Olei aetherei cuiusvis drachmam, vel duas,
Simil contrita et tenuata, vasi bene dauso, committantur.
V. U. et D. eadem, ac CINCHONÆ OFFICINALIS.

PULVIS SPONGIÆ COMPOSITUS.

II. жженой Губки сложный.

R. *Carbonis Spongiae officinalis scrupulum,*
Submuriatis Hydrargyri grana duo,
Radicis Rhei palmati grana octo,
Muriatis Ammoniae ferrati grana sex,
Corticis Lauri Cinnamoneae grana quatuor.
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

U. *Infestante struma pulvis per septimanam bis cum tantillo*
jujuslibet Syrupi a dormituro noctu capiatur. Præterea sumantur,

ut præscriptum est, TROCHISCI SPONGIÆ COMPOSITI, ad
motis EMPLASTRO ad STRUMAM et LINIMENTO BILIS
SALINO.

PULVIS SUBMURIATIS HYDRARGYRI COMPOSITUS.

II. услащенной Ртути сложный.

R. *Submuriatis Hydrargyri scrupulum,*
Sulphurcti Hydrargyri Stibii rubri (vulgo *Cinnabaris*
Antimonii,)

Subphosphatis Calcariae, utriusque grana decem,
Misce fiat pulvis subtilissimus.

U. Infestante tænia hora quarta, vel quinta pomeridiana
sumendus. Vesperi superbibantur *Olei amygdalini* uncia duæ;
insequenti vero die mane sumatur jejune PULVIS ASPIDII
COMPOSITUS. Videsis: PULVEREM ASPIDII COMPOSITUM.

PULVIS SULPHURIS COMPOSITUS.

II. очищенной Съры сложный.

R. *Sulphuris sublimati* partes duas,
Supertartratis Potassae partes tres,
Pulveris radicis Amomi Zingiberis, vel
— aromatici, vel
Elaeosacchari Cari Carvi, vel
— *Anethi Foeniculi* partem.

V. Leniter alvum sollicitans; zooctona.

U. Fœditates cutis, psora, achores, non neglectis externis re-
mediis; morbi pulmonum pituitosi; haemorrhœis.

D. Drachma ad duas, e syrupo idoneo hora decubitus. Quan-
doque *Supertartras Potassæ*, pro re nata, emittitur.

PULVIS SUPERTARTRATIS POTASSÆ COMPOSITUS.

II. винокаменной Соли сложный.

R. *Supertartratis Potassæ* semunciam,

Gummiresinae Stalagmitidis Cambogicoidis grana duo.
ad quatuor,

Pulveris aromatici grana decem, vel
— radicis Amomi Zingiberis scrupulum.

In subtilissimum pulverem tenua et usui serva, cui, si lubet, Nitratris Potassae depurati grana decem & radicis Scillae maritimae grana duo (ad tria) addi possunt,

U. Hydrops, anasarca, ascites.

D. Semuncia (ad unciam) summo mane ex Infusi baccarum Juniperi, vel decocturae Hordei cyatho administratur.

PULVIS SUPERTARTRATIS POTASSÆ et DIGITALIS.

П. винокаменной Соли съ Наперстянкою.

R. Supertartratis Potassae scrupulum,

*Pulveris foliorum Digitalis purpureae granum ad se-
squigranum,*

*— radicis Amomi Zingiberis grana decem, vel,
Elacosacchari Juniperi scrupulum.*

Misce, fiat pulvis perquam tenuis.

V. Sedans; diuretica; cathartica; aliquando emetica.

U. Hydropisis, anasarca, hydrothorax.

D. A semidrachma sensim sensimque dosin augendo ad sesquidrachmam bis terve de die.

PULVIS TANACETI COMPOSITUS.

П. Пижмовыхъ цветковъ сложный.

R. Florum Tanaceti vulgaris,

*Seminum Artemisiae Judaicae, utriusque sesquidrach-
mam,*

Sulphatis Ferri semidrachmam,

Pulveris radicis Valerianae officinalis drachmam.

Misce, fiat pulvis, cuius scrupulum (ad duo) adversus lumbricos præcipue valet, bis de die, exhibendum et post aliquot dies catharticon fortius propinandum est.

R O O B C A R O T E.

Кисель морковный.

R. *Radicum Dauci Carotae recentium quantum placet, mundatas et concisas, dimidio aquae superfusas coque in vase stanneo, ut mollescant; dein exprime succum, quem semel ebulliendo clariflca et leni calore ad mellis consistentiam evapora.*

V. *Cataplasma Carotae compositum.*

R O O B J U G L A N D I S.

К. воложско-ореховый.

R. *Succi e fructibus immaturis Juglandis regiae expressi, Mellis, utriusque partes æquales.*

Coque ad debitam mollitatem.

U. *Morbi cutis rebelles; pseudosyphilis (ulcera oris et fau- cium ex Hydrargyro) huic persæpe cedunt,*

D. *Videsis: JUGLANS REGIA.*

R O O B J U N I P E R I.

К. можжевеловый.

R. *Baccarum Juniperi recentium maturarum conquassata- rum partes octo.*

Ex sufficienti quantitate fontinalis aquae, donec mollescant, decoque, tum paulum exprimantur per setaceum. *Succus hinc obtentus, cum parte una Sacchari, vel mellis, leniori calore ad crassitudinem idoneam redigendus est.*

V. *Eadem, quæ baccarum Juniperi communis.*

D. Ad uncias duas. L. B. a SWIETEN Roobis Juniperi unicam in aquae ejusdem selibra, dilutam, addita Alcoholis Juniperi diluti semuncia, exhibuit, propinatis ægrotanti tertia quaque hora duabus unciis,

R O O B O X Y C O C C I.

К. клюквенный.

R. *Succi baccarum Vaccinii Oxycocci maturarum partes sex, Sacchari (vel potius Mellis) partem,*

Calere leni, sub jugi motu, ad aptam redige spissitudinem.

D. Ad unciam.

S A P O G U A J A C I N U S.

М ы л о б а к а у ш н о е.

R. *Potassae liquidae* partem.

Aquæ ferventis partes duas,

sub ebullitione leni (movendo massam continuo) successive inspergito:

Gummiresinae Guajaci officinalis pulveratæ, quantum solvi potest.

Dein colla, caloreque leni ad consistentiam massæ pilularis evapora.

S A P O R I C E U S.

М. д е г о ш н о е.

R. *Potassae liquidae*,

Olei empyreumatici pineo-sylvestris, utriusque pares portiones;

Commisce *Oleum pineo-sylvestre* cum *Potassa* lenique calore sub perpetua agitatione in sartagine ferrea coque ad consistentiam supponis. Est semper mollis, niger.

V. *Cataplasma maturans*.

S A P O P I N E O - O L E O S U S.

М. с к и п и д а р н о е.

R. *Balsami pineo-laricini* partes duas,

Olei — partem,

— *amygdalini* (si præsto est,) vel

— *olivi optimi*,

Subcarbonatis Potassae, utriusque partes duas.

Balsamum pineo-larinum cum *oleis* leni commisceatur calore; dein vero *Subcarbonas Potassae*, addatur. Post dies decem in saponem coalescet.

V. *Lotium* cit, *europoëticis systematis relaxationem* (incitando) corrigit.

U. In blennorrhœa (gleet,) ischuria asthenica, myodynia rheumatica, et arthrodynia (chronica MARTIN) est efficax.

V. Linimentum *Saponis rubefaciens*.

S A P O S T I B I A T U S.

M. сюръмъяное.

R. *Suboxydi Stibii hydrosulphurati unciam*,
digerendo
in *Potassae liquidae* sufficienti quantitate,
solvito;
in liquido dein triplici *aqua destillatae* quantitate diluto
dissolve:
Saponis oleosi rasi selibrام.

Leni calore ad crassitudinem massæ pilularis evaporent, addendo, si massa rubet, tantum *Potassae liquidae*, quantum sat is est, ut colorem ex albido cinereum præ se ferat. Videsis:
SUBOX YDUM STIBII HYDROSULPHURATUM.

U. Ejusdem in splanchemphraxy, adfectibus arthriticis, hæmorrhoidariis, scrofulosis, fœditatibus cutis rebellibus, non spernendus optimeque conjungitur in *pilularum* formam cum *gummiresina Guajaci officinalis*, *Heraclei gummiferi*, *Assae foetidae* et pro re nata, aliis. Utimur eo, e. g. in adfectibus scrofulosis cum *gummiresina Haraclei*, utriusque ad drachmam, quibus duæ drachmæ extracti *Centaureae benedictae* adjiciuntur, ut inde *catapotia granorum* duorum calescant, quorum duodecim mane et vesperi ingerenda. In pseudo-syphilide et præcipue, quum stases lymphæ cum herpeticis arthriticis, aliisque adfectionibus male habent, *Sapo, Stibiatus cum succo*, vel *Conii*, vel *Aconiti (spissatis,)* *Campphora* et *gummiresina Convolvuli Scammoniae*, præsentaneo est remedio. Expedit quoque eundem in *aqua stillutitia foliorum Pruni Laurocerasi*, si præsto est, solvere, ejusque solutionis guttas viginti gradatim adscendendo ad quadraginta in pervicaci vincique nescia, splanchemphraxy (spasmis, convulsionibus et ceteris abnormitatibus systematis nervosi stipata,) administrare.

D. A quinque ad octo grana ter de die optime in forma *pilularum* administratur.

SERUM LACTIS ACETATUM.

Сыворотка уксусная.

R. *Lactis vaccini*,*Aqua purae*, utriusque bilibram,

Expone igni, ut ebulliant, dein adde:

Acidi acetici diluti impuri sescunciam,
aufer coagulum. Subinde *Acido acetico* substitui possunt;*Supertartratis Potassae* drachmæ duæ, vel
inter coquendum:*Fructus Amlicae indica*, si præsto est, vel
Succi antiscorbutici unciæ duæ.

V. Acidulum, frigerans, alvum liquans.

D. Unciæ tres, octo et amplius, quibus ad gratum saporem
Saccharum, si lubet, addito.

SERUM LACTIS ALUMINATUM.

С. квасовая.

R. *Lactis vaccini* recentis libram,*Supersulphatis Aluminae* et *Potassae* pulv. drachmam.
Coquito paulisper, etauf er coagulum; liquori autem
colato adde:*Sacchari albi* unciam.Fit autem limpidum et pellucidum, quod addito *Albumine ovi*,
vel *Cornu Cervi* raspato, efficitur.

V. Nutriend, mitis tonica.

U. In laxitate solidorum, in primis ex hæmorrhagiis orta
(LENTIN;) in profluviis diuturnis; hæmorrhœis (sanguinis pro-
fusionibus asthenicis,) et febribus putridis (STROEM).D. A sescuncia, ad duas, tres uncias, bis terve de die pro-
pinatur.

SERUM LACTIS.

С. сладкая.

R. *Lactis vaccini* recentis (per duodecim horas loco fri-
gido a *Cremore Lactis* separati) libras sex.

Superitartratis Potassae drachmas sex, vel quantum satis sit.

In vase fictili cooperto stent per aliquot horas super calidis neribus, donec lac dense coagulatum fuerit. Sero separato per linteum colato admisce: *Albumina trium Ovorum*, innumam agitando, coacta. Bulliant paulum, serumque iterum per linteum coletur, ut evadat clarificatum.

V. Dulcescens; frigerans; alvum liquans; leniter nutriens.

Cachectis, phthisiscentibus, asthenicis alvi profluvii laborantibus, aptum. Ex eo subinde, ineunte vere, varia extracta, scilicet dicta resolventia, puta: *L. Taraxaci*, *Fumariae off.* etc., vel crudem succi expressi propinantur, Videsis: *Bos Taurus*.

D. A quatuor uncias ad libram et amplius datur.

S E R U M L A C T I S S I N A P I N U M .

С. Г о р ч и ч на я.

R. *Seminum Sinapeos* pulveratorum unciam, rendo successive affundito:

Lactis vaccini libram,

ein adde :

Vini Rhenani; (si præsto est,) vel cuiusvis eidem similis, quantum sufficit, siat coquendo coagulum, dein cola.

V. Excitans systema vasculare; peptica.

U. Myodynæ rheumaticæ, nevroblaciæ, paralysi, morbis iscerum asthenicis, pituitosis, stomacho imbecillo, dyspepsiæ, eridoneum.

D. Selibra summo mane et tantumdem hora, decubitus, bibitur.

S E R U M L A C T I S V I N O S U M .

С. в и н и я.

R. *Seri Lactis vaccini* libras tres,

Vini albi generosi selibram ad libram.

Commisce.

V. Nutriens; leniter excitans.

U. In asthenico pneumonitidis stadio ad promovendos screatus a cl. REIL laudatur.

SOLUTIO ACETATIS CUPRI et MURIATIS AMMONIE.

AQUA OPHTHALMICA CERULEA Ph. Ross.

Распиворъ уксусо-кислой мѣди и солекислаго Аммиака.

R. *Aquaæ Calcariae* recentis uncias octo,
Muriatis Ammoniae depurati scrupulos duos,
Acetatis Cupri grana quatuor.

Misce et digere per viginti quatuor horas, dein per chartam
cola.

U. Externus: phagedæna, palpebræ exulceratæ. *Aquaæ* du-
plici quantitate diluta, ophthalmitidem asthenicam, maculas
corneæ curat.

SOLUTIO ACETATIS ZINCI.

P. УКСУСО-КИСЛАГО ЦИНКА СЛОЖНОЙ.

R. *Sulphatis Zinci* drachmam,
Aquaæ destillatae uncias decem.
Solve et dein

R. *Superacetatis Plumbi* crystallisati scrupulos quatuor,
Aquaæ destillatae uncias decem, solve.

Commisceatur utraque solutio, quiescat paulisper, ut *Sulphas*
Plumbi præcipitetur, dein solutio *Acetatis Zinci* coletur.

V. Adstringens; sedans, ut SOLUTIONIS SULPHATIS ZINCI.

U. Videsis: SULPHATEM ZINCI.

SOLUTIO ARSENICI et NITRATIS POTASSI.

P. мышько-селипряной,

R. *Oxydi Arsenici albi scrupulum,*
Nitratis Potassae depurati scrupulos duos,
Aqua fontinalis (pondere) uncias decem.

Committito vitreæ lagenæ, subere, ut *vapores evadere queant;* leviter occlusæ, quæ in ducentorum duodecim graduum calore thermometri FAHRENHEITIANI, vel octaginta REAUMURIANI posita, aut suspensa in *bulliente aqua*, interdum lagena agitetur quoadusque *Oxydum Arsenici* perfecte fuerit solutum; dein per chartam colatis adde:

Tincturae A. Calami guttas ducentas, (plus vel minus,) ut pondus *solutionis* decem unciarum, et drachmæ (unius) sit accuratum.

U. In primis (sordibus importunis primarum viarum subductis,) febris intermittentibus admodum data; præterea in laude eidem ponitur, quod psoriasis, phthiriasi, elephantiasi, porrigni, impetigini, herpetibus, achoribus propulsandis sit pars. Pertussi SIMMONS; nuper vero alii epilepsiæ opposuerunt.

D. Hujus *solutionis* guttæ viginti, (sensim sensimque, idque cautissime, dosin ad quadraginta augendo, guttas) dentur. Si mulac, aut nausea, aut vomitus, (qui perraro occurunt,) provocati fuerint, aut tormina, vel alvi profluvium supervenerit, diluentes potionem interponere juvat; a medicamento vero interea abstinentum. Ex quo vis vehiculo conveniente sumitur. Attenuatis viribus debilitatis medicamina (*roboran*) interponere, apyrexias tempore, expedit, ut iisdem, quæ labefactæ fuerunt integratis, ad præcedens remedium tuto confugiatur. Alvis, si adstricta est, liquanda congruis remediorum adminiculis, ut, e. g. pilulis *Alös*, radice *Rhei palmati*, aliisque. *Oxydum Arsenici album*, arbitratu DARWINI, in systema absorbens agit, ventriculum stimulat, torporem systematis arteriosi cohibet, & sic dialeipyras propulsat, cui opinioni, num adstipulari liceat, subactiori aliorum judicio relinquimus. Haec *solutio*, in variis

morbis; præsertim vero in curatione dialeipyrarum, cautim tamen adhibita, nullo non tempore mihi respondit, ita quidem, ut milleni febrentium non sine voluptatis sensu, salutem suam huic remedio in acceptis retulerint, idque brevissimo tempore. (Videsis: *Observationes Medico-Chirurgorum Ruthenii Imperii Petropoli, 1805 p. 197.*) Medicamen efficax, ne noxas inferret, satius est a Medentibus ipsis, qui salutem suorum ægrorum cordi habent, præparari & præberi, quam administris credere,

SOLUTIO ARSENITIS POTASSÆ.

Р. мышьяко-помашной.

R. *Oxydi Arsenici albi,*

Subcarbonatis Potassae depurati, utriusque grana duo,

Aquæ destillatae uncias quatuordecim.

Priora duo ex aqua in vitrea coquito lagena, donec soluta fu-

erint; frigefactum liquorem col. per chartam, dein adde:

Tincturae aromaticæ uncias duas.

D. Semuncia (ad unciam) bis de die exhibetur.

Solutio hæc (FOWLERI) ad Chemiæ regulas exactior quidem est; sed quoniam virtutem ejusdem medicamentosam, nequaquam explorare mihi licuit, illam *Oxydi Arsenici & Nitratis Potassæ*, experientia multiplici nixam, lubens præfero.

SOLUTIO ASSÆ FŒTIDÆ.

Р. вонючей камеди.

R. *Gummiresinae F. Assæ foetidae drachmas duas,*

solve l. a. in

Aquæ fontanae, vel

— — Menthae crispaæ,

— — Anethi Foeniculi unciis octo.

V. Stimulans; antispasmodica; pituitam & catamenia sollicitans; anthelmintica.

U. Pertussis, dyspepsia, amenorrhœa, chlorosis, dyspnoea, hysteria, tympanitis, helminthiasis.

D. Uncia (vel duæ) bis terve de die, porrigitur.

V. *Mistura Assae foetidae composita.*

SOLUTIO HYPEROXYMURIATIS POTASSÆ.

P. соле - пресыщенного Поташа.

R. *Hyperoxymuriatis Potassac drachmam,*

Aquaæ destillatae libram,

Misce et solve.

U. Ulceribus herpeticis, atonicis, penicillo, aut linteo carpato, excepta, adplicetur semel, vel bis de die. Si loco libræ quantitas aquæ trilibris sumatur, fiet *potio oxygenata*, quæ in asthenia generali, cachexia, scorbuto, hepatitis chronicæ, herpete, psora etc., laudatur.

U. Libra *potionis* ad bilibram de die; *solutionis* vero tercia pars administratur.

SOLUTIO MURIATIS AMMONIÆ ACETATA.

P. нашатыро-уксусный.

R. *Muriatis Ammoniae depurati unciam,*

Acidi acetici diluti impuri uncias duas,

Aquaæ communis uncias quatuor.

Misce.

D. Drachma, (continens *Muriatis Ammoniae grana decem*) ad semunciam, vel etiam sex drachmas detur. Attamen maxima dosis intra nychthemeron solummodo semel est danda.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

P. солекислаго Тяжелозема.

R. *Muriatis Barytae partem,*

Aquaæ destillatae partes sex.

Solve.

D. Guttæ decem, viginti, administrantur.

SOLUTIO MURIATIS CALCARIAE.

Р. соле-кислой Извести.

R. *Muriatis Calcariae,**Aqua communis pares portiones.*

Solve.

D. *Guttæ quadraginta (ad drachmam) in uncia aquæ adversus scrofulam præbentur.*

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

Р. селиптро-кислого Серебра.

R. *Nitratis Argenti scrupulum,**Aqua destillatae semunciam.*

Misce, et solve.

U. Interne eximius in epilepsia a guttis tribus sensim sensimque dosin augendo usque ad guttas sedecim bis terve de die ex quovis idoneo potu. Externe: ulcera sordida aliave rebellia linteo eadem madido marginem tangendo; *aqua* autem libris tribus diluta, ulcera oris, blennorrhœam curat. *Solutionis hujus guttæ tres continent gr. $\frac{1}{4}$, duodecim guttæ, granum, sedecim guttæ granum $1\frac{1}{2}$.* Si vim remedii intendere lubet *Nitras Argenti fusi omnino præferendus est.*

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI OPIATA.

Р. селиптро-кислого Серебра опіяшний.

R. *Nitratis Argenti fusi drachmam,**Aqua communis libram,**Tincturæ Opii drachmam.*

U. Ulcera, luxuriante carne, fœda, efficacissime curat.

SOLUTIO OXYMURIATIS HYDRARGYRI.

LIQUORI VAN SWIETENII aequiparabilis.

Р. солеперекислой Ртути.

R. *Oxymuriatis Hydrargyri grana sex,*

*Muriatis Ammoniae depurati grana duodecim,
solve in*

*Aquae destillatae, vel
Alcoholis diluti libra.*

D. Drachmæ due (ad unciam) bis de die ex decocturae
Guajaci specierum compositarum unciis tribus sumuntur.

SOLUTIO PHOSPHORI AETHEREA.

P. Фосфора эфирный.

R. *Phosphori granum,*
Aetheris sulphurici drachmam,
Olei Menthae piperitae guttas decem.

Fortiter agitando inter solvendum, in vase vitro, fiat solutio.

V. Egregie sub initio excitans; narcotica; actionem morbosam totius systematis nervosi illico tollens; alteram vero secundam eidem substituens, hac ratione in quibusdam morbis adhibetur, præcipue dialeipyris non male opponitur, myodynæ etiam rheumaticæ occurrit; accuratissime tamen præparari et cautissime exhiberi debet.

D. A decem ad viginti guttas, id est singula præbia a sexta ad tertiam (*Phosphori*) partem grani habere debent.

SOLUTIO POTASSÆ CAMPHORATA.

P. Поташа камфорный.

R. *Potassae fusae drachmam,*
Camphoræ scrupulum,
Sacchari albi unciam,
Aquæ fontinalis libram.

U. Hac solutione ulcera, callosa inveterata, carne luxuriosa, livida, obducta, utiliter eluuntur.

SOLUTIO SAPONIS.

P. мыльный.

R. *Saponis sebacei uncias quatuor,*

Alcoholis diluti bilibram.

Fiat solutio, et si opus, coletur.

U. Extrinsecus: myodynbia rheumatica, arthrodynia, contusura, distorsio.

V. Linimentum Saponis ammoniatum.

SOLUTIO SUBACETATIS CUPRI.

P. уксусо-кислой Мѣди.

R. *Acetatis Cupri* drachmam,

Ammoniae liquidae unciam.

Misce fiat solutio.

U. Ulcera syphilitica et similia, additis singulis aquae frigidae unciis, decem hujus solutionis (plus vel minus) guttis, linitem carptum hacce aqua madidum, iisdem saepius imponendo, curantur, praemissis, ubi ulcera recentia sunt, ne ab initio, quod fieri adsolet, irritando, virus resorbeatur, mercurialibus, vel interne per aliquot tempus sumendis, vel extus fricatione inge rendis.

SOLUTIO SULPHATIS ZINCI.

P. сърнокислого Цинка.

R. *Sulphatis Zincii* scrupulum,

Aqua ferventis sescunciam.

Fiat solutio, sumto veneno, confestim, ubi prompta exinanitio ventriculi opus est, pro dosi, exhibenda.

SOLUTIO SULPHATIS ZINCI ALUMINATA.

P. Сърнокислого Цинка квасцовыи.

R. *Sulphatis Zincii*,

Supersulphatis Aluminae et *Potassae*, utriusque sem unciam.

Aqua servidae bilibram.

Misce in vase vitro, ut fiat solutio et cola.

U. Vulnera, ulcera phagedænica, cutis vitia, ophthalmitis, blennorrhœa. Ceterum eadem, quæ supra, sunt observanda.

SOLUTIO SUPERACETATIS PLUMBI.

AQUA VEGETO-MINERALIS Ph. Ross.

Р. Уксусо-свинцовый.

R. *Superacetatis Plumbi liquidi drachmam,*
Aquaæ destillatae vel
— fontanae selibram. Misce.

U. In inflammationibus topicis, adustis, pernionibus, erysipelate a contusionibus, vulneribus et ulceratione partium valet; in blennorrhagia etiam pertinaci, inflammatione testiculorum, quæ eam excipere solet et phimosis proficit. In ulceribus pedum inveteratis cum *Camphora* profuit, imo etiam in psorophtalmiis; minime tamen, (ut ARNEMANNUS et HIMALY scite observant,) idonea est ulceribus corneæ.

SOLUTIO SUPERACETATIS PLUMBI ALCOHOLISATA.

Р. Уксусо-свинцовый спиртный.

R. *Superacetatis Plumbi liquidi scrupulos quatuor,*
Alcoholis diluti, vel
— — — impuri,
Acidi acetici diluti, vel
— — — impuri, utriusque uncias duas,
Aquaæ destillatae, vel
— fontanae libram.
Misce et solve.

U. Commandanda est in inflammationibus, vi extrinsecus illata, motis, hinc (constrictis revehentibus vasis,) proficit in suppurationibus, quæ plagas et contusiones concomitantur, in

ambustis, inflammationibus oculorum, œdematisbus, quæ causis mere topicis excitantur, atque in humorum cursu, e laxitate topica oriente, reprimendo, quem in finem *Solutio Superacetatis Plumbi alcoholisata*, ne vasa nimis constricta efficaciam eludant, magni æstimatur.

V. *Cataplasma Superacetatis Plumbi.*

SOLUTIO SUPERSULPHATIS ZINCI.

P. Сърноперекислого Цинка.

R. *Sulphatis Zinci grana sedecim,*

Aquaæ fontanæ uncias octo,

Acidi sulphurici diluti guttas sedecim.

Solve *Sulphatæ Zinci* in *aqua*, dein addito *acido*, per chartam *cola*.

U. Frequentissime adhibetur in blennorrhœa, leucorrhœa, ophthalmitide atonica, fistula lacrymali (operatione peracta) ast *adstringentes solutiones ophthalmicae*, non nisi præmissis catharticis, vel pro re nata, sanguinis detractione (vel incisa ve na, scarificationibus, vel sanguisugis,) superato jam primo inflammationis acutæ stadio, morboque, si toti corpori inest, congruis remediorum adminiculis propugnato, adcommoda esse possunt.

SOLUTIO TARTRATIS STIBII.

P. Винокислой сурьмы.

R. *Tartratis Stibii et Potassæ grana tria,*

Aquaæ destillatae uncias totidem.

Solve.

V. Emetica, nonnunquam cathartica. Latibulante in ventri culo cruditatum colluvie porrigenda.

D. Uncia, singulis horæ quadrantibus, donec vomitiones motæ fuerint, est danda.

SOLUTIO TARTRATIS STIBII CAMPHORATA.

P. Винокисл. сурьмы камфорный.

R. *Tartratis Stibii et Potassae* drachmam,

solve in

Aquæ ferventis libra,

adde:

Camphoræ mucilagine gummi Acaciae tritæ semiscrupulum,

Alcoholis unciam.

Panno xylico, hac solutione imbuto, pectorique demum ad moto stenocardia (angina pectoris) cessisse fertur. Adhiberi extrinsecus potest, ubicumque irritationem dermaticam derivationemque a partibus internis moliri expedit. *Linimentum quoque stibiatum* adversus stenocardiam fuit efficax.

SPECIES ALTHÆ COMPOSITÆ.

Сборъ Просвирняка сложный.

R. *Radicis Althææ officinalis* concisæ,

Herbae Tussilaginis Farfarae, utriusque partes tres,

Radicis concisæ Inulae Helenii,

— — — *Glycyrrhizæ glabrae*,

Florum Arnicae montanae,

Capsularum seminalium Papaveris contusarum, singulorum partem.

Misce.

U. *Specierum semuncia* in bilibra *aquaæ* ad selibram decoquuntur, sumiturque cyathus saepius de die in morbis pectoris.

SPECIES AROMATICÆ.

З. Ароматический.

R. *Herbae Artemisiae Absinthii*,

— *Menthae crispaæ*,

— *Origani vulgaris*,

— *Thymi Serpylli*,

Florum M. Chamomillae, singulorum pares portiones.
Concisa misceantur.

U. Extus *cataplasmatis* et *fomentis* variis, pro re nata, admovendis, inserviunt, variisque morbis internis, nec non ulceribus putescentibus, cacoëtheis, sinuosis, convenient.

V. *Fomentum aromaticum*; *Infusum* —.

SPECIES CHAMOMILLE COMPOSITÆ.

3. Ромашковый сложный.

R. *Florum Matricariae Chamomillae*,

Radicis Valerianae officinalis,

Herbae Chenopodii Ambrosiodidis, singulorum unciam,

— *Menyanthidis trifoliatae*,

— *Achilleae Millefolii*,

Seminum Anethi Foeniculi, vel

— *Pimpinellae Anisi* singulorum drachmas duas.

Concisa, contusaque misce, ut fiant species.

V. Leniter peptica; carminativa; antispasmodica.

D. Sescuncia pro *infuso* in *aqua* ferventis libra, pro potu.

SPECIES GUAJACI COMPOSITÆ.

3. Баккаушный сложный.

R. *Scobis ligni Guajaci officinalis* partes tres,

Radicis Arctii Lappae,

— *Caricis arenariae*,

— *Saponariae officinalis*, singulorum partes duas.

Stipitum Solani Dulcamarae partem.

V. Videsis; DECOCTURAM GUAJACI et

— — — — — cum MEZEREO.

S P E C I E S P I N I C O M P O S I T A E.

3. Сосновый сложный.

- R. *Turionum pineo-sylvestrium,*
Herbae Achilleae Millefolii,
 —— *Fumariae officinalis,*
 —— *Menyanthidis trifoliatae,*
Rasurae ligni Juniperi communis,
Radicis Acori Calami, singulorum pares portiones.

U. Inservit ad decocturam earundem parandam, in scorbuto proficuum.

V. Decocitura antiscorbutica; — *Malti composita I;* — — — *II.*

S P E C I E S R E S O L V E N T E S.

3. разрѣшительный.

- R. *Radicis Leontodontis Taraxaci,*
 —— *Saponariae officinalis, utriusque uncias duas,*
Herbae Gentianae Centaurei,
 —— *Marrubii vulgaris, utriusque unciam,*
Florum Tanaceti vulgaris semunciam,
 —— *Matricariae Chamomillae sescunciam,*
concisæ, fiant species.

U. Adhibentur pro clystere in infarctibus abdominalium viscerum, eorumque obstructionibus, hypochondriasi, melancholia, et aliis, e viscerum infarctibus, pendentibus morbis, laudante impensius КÆМРФІО, ZIMMERMANNO. Videsis: MISTURAM TARAXACI, et — — COMPOSITAM. Circa clystres resolventes, et sopientes (videsis: SPECIES SOPIENTES) notare expedit sequentia: Mane alvo, vel sponte, vel clystere irritanti, subducta, clyster hic injicitur tepide, ad plenariam consumptionem retinendus. Decocitura debet esse saturatissima, et ut crassioris fiat consistentiæ, cuilibet specierum unciaæ Furfurum triticeorum vel silagineorum drachmæ duæ admiscendæ; quan-

titas vero subterdanda, non debet selibram transgredi, et quotidie per certum tempus injicienda est, donec porta malorum pulsata, contumacium obstructionum claustra, fuerint perrupta. Interdum КАЕМРFIUS hasce resolventes species aqua etiam *Calcaria* decoqui jusserat.

S P E C I E S S O P I E N T E S .

3. успокаиваю щий.

R. *Radicis Valerianae officinalis* uncias tres,
Foliorum Citri Aurantii uncias duas,
Herbae Achilleae Millefolii unciam.

Ex incisis grosso modo fiant species pro clysteribus.

U. Ad ductum ill. КАЕМРFIUS et ZIMMERMANNI, in illis pertinacibus nervorum morbis, qui cum infimi ventris obstructionibus, conjuncti sunt, præscribuntur. Ab addita gum-miresina *Assue foetidae*, quæ ad plures drachmas, fuit præscripta, in solvendis infarctibus et compescendis spasmis, magna vidit PIDERITUS. Videsis: MISTURAM TARAXACI, et —— COMPOSITAM.

D. Hæ species in aqua communi decoquuntur, et quidem, quam saturatissima expetitur decoctura; ad aquæ unciam, specierum drachmæ tres veniunt, et sic clyster injicitur. Vide-sis: SPECIES RESOLVENTES.

S P O N G I A C E R A T A .

P R E P A R A T A Ph. Ross.

Губка Гречкая вощная.

R. *Spongiae officinalis* quantum vis,
ab heterogeneis adhærentibus probe purgatam coctione sufficienti, in aqua fontis lotam, dein perfecte siccata, cera flava liquefacta imprægna et inter folia chartæ ceratæ fortiter expressam, in portiones variæ magnitudinis et formæ concide, usuique serva.

U. Adhibetur pro *turundis*, quæ angustis vulnerum, ulcerum et fistularum orificiis, inditæ, eadem intumescendo dilatant, purique exitum conciliant.

S T I B I U M .

S T I B I U M P U R U M Ph. Bor. R E C U L U S A N T I M O N I I Ph. Ross.

С ю р ь м а.

R. *Frustulorum Ferri puri* selibram, immitte in crucibulum amplum, atque igne intenso furni anemii urge ad candescentiam, tum addito:

Sulphureti Stibii nativi grossiuscule comminuti uncias octodecim.

Colliquecant simul, dein sensim adjice:

Nitratis Potassae perfecte siccatai uncias quatuor.

Simulac ad instar aquæ fluxerint, effunde in conum fusorum leniter concutiendum, ut subsidat *metallum* reductum. Ubi refrigeruit, a scoriis separa, cique in pulverem tenuato adde:

Nitratis Potassae perfecte siccatai partem octavam, denique igne validiori colliqua, et in conum fusorum transfunde, atque post refrigerationem *metallum* purum a scoriis separatum, usui serva.

Q. Sic surgens crystallos effingit lucidas, dendriticas, vel octaedras, *odoris saporisque* est expers, nec ad aërem, nec in aqua mutationem subit. *Ignis* leni et accidente aëre in pulvrem griseum hemioxydatum fatiscit, auctiori (*igne*) in albidum vaporem sublimatur, tandem splendidis acibus solidescentem.

V. Emetica; cathartica; sudorifica.

U. Ejusdem internus, quum sit neutiquam tutus, in desuetudinem abiit, prælatis ejusdem melioribus formis, in quibus ratio oxydationis, quam *Stibium* subiit, definiri potest; sed etiam *praeparata* caute et circumspecte adhibenda sunt; constat enim novissimus cl. BRODIE experimentis, ea vi vitali insidias struere, atque in primis cor et cerebrum adfligere, imo

etiam, quæ pro mitioribus habentur, ut Tartratem Stibii et Potassæ, Vinumque stibiatum, infantibus administrata, citra vomitum, alvique purgationem, lethifera exstisset.

V. Suboxydum Stibii fuscum.

S U B C A R B O N A S A M M O N I A E.

A M M O N I U M C A R B O N I C U M Ph. Bor; S A L V O L A T I L E S A L I S
A M M O N I A C I Ph. Ross.

Амміакъ углекислый.

R. *Muriatis Ammoniae depurati siccatai et pulv. partem,*
Carbonatis Calcariue nativi —————— partes
duas.

Commista accurate in retortam collo amplio præditam immitte. Adaptato excipulo capaci, aquæ frigidae, ubi opus fuerit, renovandæ immerso et juncturis leviter clausis, sublimationem in balneo arenæ instituto, igne ab initio leni, sub finem auctiori; sublimatum vase vitro clauso serva. Ubi vasa conservare interest, in vicem Carbonatis Calcariæ, Subcarbonas Potassæ adhiberi potest proportione partium trium ad partem *Muriatis Ammoniae*. Singulis Subcarbonatis Ammoniae drachmis, additis, sex *Olei pyro-animalis*, guttis, Subcarbonatæ *Ammoniae* *pyro-oleosum* (*Salem volatilem Cornu Cervi*) obtinebis.

Q. Continet in centenis partibus *Ammoniae* 43, *Acidi carbonici* 45, aquæ 12, sistit crystallos tetraëdras aëris afflatu fatiscentes, cum acidis effervescentes, Alcoholum diluto et dupla aquæ quantitate solubiles; minime vero Alcoholum, Acthere, oleis unguinosis aethereisque. Est odoris penetrantis peculiaris; saporis lixiviosi, pungentis.

V. Excitans; (systema sanguiferum usque ad ipsos ramos minimos,) resolvens; diaphoretica; absorbens.

U. Cerebrum stimulando in deliquiis animi (a nervorum debilitate,) apoplexia (citra sanguinis impetum et extravasationem in cerebro,) nervosa cephalalgia, vertigine, le-

thargo passim adhibetur. Potenti, penetrante et pœne universali stimulo, quo totum sistema nervorum, organicum et encephalicum incitatur in pure nervoso typho cum spasmis, vel aliis astheniae symptomatibus, sub pulsu tremulo, æquali, intermittente, nec duro (FRANK,) magnæ est efficaciæ. In dialeipyris nervosis non male additur, sub ipso algoris accessu *Tinctura Opii*. In paralysi (*fumigatione*,) amaurosi (almotu *vaporum oculis*,) spasmis, tetano, trismo, gangræna, necrosi tentatus est cum successu. Stimulando pulmones asthamati convulsivo, pertussi, auxilio fuit; organon vero cutis, exanthemata, aut inertia protrusit, aut retrograda resuscitavit. In febre urticaria, pemphigo, zona etc., partes affectas lavari *solutione suadent*. In arthrodynia et podagra, si potens ad promovendam cutis exhalationem, stimulus opus est, vel ubi arthritica (morbifica) causa interiora penetravit, non male datur intrinsecus. Tracheitidi ipsi cum æqua *Camphorae* portione et sextuplo pulveris *gummi Acaciae verae*, sub initium tamen, obponitur exhibitis pro dosi tribus granis. Irritando vasa absorbentia, topici *resolventis* vices gerit, ejusque utilitas in primis emitet in hydrope locali, post erysipelas, myodyniam rheumaticam etc., exorto, quem in finem, vel siccis *fomentis* additur, vel forma *vaporum* admovetur. In tumoribus glandularum confit *unguentum ex eodem et Camphora*; in cysticis vero *solutio*, vel *vapores* valent. *Injectio* in paracusi et cophosi in tubam **EUSTACHIANAM**, si obstructa est, efficax. Manifesta etiam est ejusdem chemica actio in prævalentia acida, et acrimoniam enim *succi gastrici* mitigat, et *oxyda metallorum* noxifera, domat. Virus animale viperarum, serpentum, canumque rabidorum, tollere experiundo dedicimus. Cautè adhibendum est hoc remedium interne; a tenero autem ventriculo haud raro vomitu rejicitur variique effectus spastici, tussis et nervorum distensiones sequuntur; prohibendum etiam est, quum multum febris est, aut ingens sanguinis abundantia, aut distributio, aut congestio ejus abnormis, ne vel priora mala augeat, vel nova forsitan graviora efficiat.

D. Nunquam in pulveris forma datur; sed semper solutus a grano ad quatuor, in aquæ unciis tribus, vel in infuso *Valerianaæ officinalis*, vel decoctura *Cinchonæ officinalis*. Forma etiam vaporum in affectas partes extricatur. Commiscetur pars *Muriatis Ammoniae* cum duabus partibus *Subcarbonatis Potassæ*, vel potius *Calcariae*, fitque hac ratione Sul *Anglicanus volatilis extemporaneus*, in vitro probe clauso, servandus, qui non modo extus nares ferit et sensorium commune simul incitat, sed etiam fomentis aromaticis in paralysi artuum, eorumque rheumatica affectione potest.

V. *Acetas Ammoniae liquidus; Gargarisma ammoniatum; Nitras Ammoniae; Subcarbonas Ammoniae liquidus.*

SUBCARBONAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

Liquor Ammonii carbonici aquosus Ph. Bor.

Spiritus salis ammoniaci aquosus Ph. Ross.

Углекислый Амміякъ жидкий.

R. *Subcarbonatis Ammoniae unciam,*

Aqua destillatae uncias tres.

Solve.

Q. Est liquor clarus, admodum redolens *Ammoniam*, cum acidis, quin sedimentum ponat, effervescentia.

V. Eadem, quæ præcedentis.

U. Idem, qui præcedentis. Laudatur in primis contra mortuum viperæ et effectus deleterios *acidi prussici*. Exanthemata etiam a locali et cutaneo vitio oborta, cedunt saepè lotioni ex eodem. In hydrcephalo semel *OERRIUS* ad aliquot guttas utiliter administravit.

D. Exhibetur aqua dilutus, a triginta ad sexaginta guttas.

V. *Alcohol ammoniatum; Gargarisna —.*

S U B C A R B O N A S M A G N E S I A E.

MAGNESIA CARBONICA Ph. Bor. MAGNESIA AERATA

Ph. Ross.

Углекислая магнезия.

R. *Sulphatis Magnesiae,**Subcarbonatis Potassae utriusque pares portiones,**Aqua destillatae calidæ duplum,**solve separati atque per chartam cola, dein commi-
stis statim adjice:**Aqua bullientis octuplum,*

denique bulliat paulisper moveaturque *liquor* ac post brevem quietem, imminuto videlicet paulum calore per linteum coletur, super quod remanens *Subcarbonas*, *aqua pura*, vel potius *destillata* fervida, donec insulsus fuerit, eluat, siccat usuique servetur.

Q. Est pulvis candidus, admodum levis, laxus, *saporis odo-*
risque expers. Constat e *Magnesiae* p. 0,45 *Acidi carbonici*
0,25 et *aqua* 0,30, cum *Acido sulphurico* effervescent, et in *di-*
luto aliquantum eodem solvitur.

V. Egregia (acidum rancidumque absorbens; *succo Citri* satu-
ratæ: blande purgans; *ecoprotica*; *carbonicum* explicans *aci-*
dum antiseptica, (ut quibusdam videtur;) *lithontriptica* vero
productioni *acidi* in ventriculo et interaneis remoram po-
nendo.

U. Idem ac *Magnesiae* et præcipue ad omnia valet, quæ a-
cido primarum viarum originem debent, hinc in inflatione,
ructibus, pyrosi, vomitionibus etc., efficax, proinde etiam hypo-
chondriacis, hystericsque, huic obnoxiosis incommodo, commen-
dabilis. Rachiticis, scrofulosis, arthriticis ab eadem causa, haud
secus ac infantibus ægre dentientibus, alvo in primis vi-
ridi, vel achore laborantibus, mollimentum non spernendum
præstat. Hæmorrhoidis alvi liquandæ causa opportunus. Sæpe
ob *gas acidum carbonicum*, in ventriculo exticatum, flatus,
enterodyniam et anxietatem causat, hinc *Magnesiam* in ge-
nere præferendam reor.

D. Provectæ ætatis hominibus a scrupulo ad drachmam, absorbendi scopo; alvi autem purgandæ ergo a drachma ad duas, vel in *aqua*, vel in *infuso Theæ* ditioribus. *Saccharum* etiam recte *eidem* additur; subinde vero res exigunt circumstan-tes, ut stimulantibus, vel tonicis conjunctus, majorem promittat utilitatem, aciditate videlicet veluti effectu ab imbecillitate orta. Ubi *gas carbonicum* extricari e re est, cum *acido citrico*, vel *ace-tico* effervescat oportet. Infantibus ad unciam *syrupi* quatuor scrupuli cochlearibus parvis sæpius in die propinan-tur.

V. *Magnesia*; *Mistura ejusdem*; *Murias ejusdem*.

SUBCARBONAS POTASSÆ DEPURATUS.

KALI CARBONICUM Ph. Bor.; CINERES CLAVELLATI
Ph. Ross.

Углекислый Помашъ очищенный.

R. *Subcarbonatis Potassae venalis* quantum vis,
in vas ferreum immitte et affunde tantundem *frigidae aquæ*
atque spathula ferrea sæpius agitando tere simul, donec omnes
partes *Subcarbonatis Potassae venalis* dilabantur. Solutum a non
soluto per linteum novum separa et fluidum limpidum colatum
vas ferreum ad evaporandum transmitte et donec cuticula sa-
lina supra manifestetur sustine, tunc per diem, aut biduum
loco frigido repone et postea fluidum a residuo effunde, dum-
que illud, non uti *Alcalia*; sed uti *Sulphas*, aut *Murias Potassae*
saporem habet, tunc evaporatio *liquidi* iterum ad cuticulam
salinam condensam repetenda est et in frigidulo loco ad cry-
stallisandum reponendum est; si quidem iterum crystalli non
sunt, *sal* purum *alcalinum*, tunc adhuc simili modo bis aut
ter cum fluido remanente descripta operatio repetenda est, do-
nec *Subcarbonas Potassae* purus sine aliis heterogeneis *salibus*
restat. Sic modo *Subcarbonas Potassae*, obtentus, et ab ali-
is, quantum possibile, *salibus depuratus*, in vase ferreo puro ad
siccitatem evaporet, in phialam bene obturatam siccam immit-
tatur et ad usum in loco sicco servetur.

Q. Hac ratione obtentus constat crystallis prismaticis, rhomboideis, regularibus, in *aëre* haud raro liquecentibus, sublixivioso et peculiari *Potassae sapore* præditis, quæ habent *Potassae* p. 30, *Acidi carbonici* p. 43, *aquaæ* p. 17 secundum PELLETIER.

V. Humanum corpus desoxydans, prævalentem morbose acorem, quum in alimentari canali, tum etiam in remotis partibus infringens, *mucum* et *gelatinam* solvens; diuretica; varia *salia metallica venenosa*, ut verbi gratia, *Oxymuriatem Hydrargyri* (decomponendo) obtundens.

U. Multum prodest in sanando ventriculi acore, aut ejusdem raucore et hinc pullulantibus malis, puta: colluvie pituitosa, viriditate excrementorum, pyrosi, cardialgia, gastrodynia, enterodynæ, aphthis, excoriatione etc. Ratio docet et experientia ostendit, eum aliis etiam morbis prodæsse, qui, vel oriuntur ab acore, vel conjunguntur cum eo, cuius rei ratio a natura illorum morborum petenda. Laudatur proinde in lymphaticis glandularum tumoribus, pancreatemphraxi, atrophia, scrofulis (præsertim in connubio amaro-aromaticarum tincturarum) rachitide cum cortice *Cinchonæ officinalis* (THEDEN, ABILGAARD.) Acidum in uriniferis viis figendo secretiones lotii auget, eoque aduersus stranguriam et ischuriam potest; in urolithiasi (FORDYCE, HUFELAND, BLANE) laudes tulit concrementis calculosis obicem ponendo eaque solvendo. Non est etiam laude sua orbanda *Aqua mephistica xalina*: e Subcarbonatis *Potassæ* drachmis duabus in *Aquaæ Selterænae*, *Geilnaviensis*, aut alias *acidulae* libra, rite solutis, paranda, quæ potio intra nycthemeron consumitur. In remediis pollet contra *venena acida*, *Oxydum Plumbi* et *Hydrargyri sales*; in primis vero *Oxymuriatem Hydrargyri*, *Oxydum Arsenici album*, *Acidum nitricum* (DUMONCEAU, PLANCHON.) MITCHILLIUS initio febrium malignarum extulit eundem, ut acidum septicum, a quo illas derivavit, redderet neutrum; sed commenititia hæc sententia explosa est. In morbis vasorum absorbentium glandularumque utilitatem promittit miti incita-

mento, stases systematis lymphatici, soluturo. In metastasibus lacteis (TISSOT,) impetiginibus et diuturnis exanthematibus proficit interno externoque usu. In hydrope, præsertim ascite, prodest conjunctus cum gummiresina Heraclei et extractis amaris. In ulceribus inveteratis, fungosis cum callosis marginibus (SAVIARD, CONRADI,) syphiliticis (donec immunda sunt,) ulceribus vesicæ et renum (THOMANN,) phthisi ulcerosa (BARKER,) interno usu in furunculis (HUNTER,) non minoris est efficiaciæ. In spasmodicis affectionibus magni fit, quatenus energiam nervorum, inusculis providentium erigit, et exhibetur heic suasu STÜTZII cum *Opio* alternatim sumptus; sic in tetano, hysteris nervorum distentionibus, asthmate spasmodico, pertussi, epilepsia, catalepsi, scelotyrbe, raphania, singultu, rabie hydrophoba etc., si videlicet scrupuli duo Subcarbonatis Potassae in aquæ destillatae unciis duabus soluti, sic sumuntur, ut secunda quoque hora cochlearia duo alternentur cum granulo *Opii*, sensim aucta dosi, immisso etiam ægrotō in balneum lixivii caustici, alvoque per aquam saponatam, addito Subcarbonate Potassæ eluta.

D. In chronicis morbis a duobus ad decem grana, in urolithiasi drachma ejusdem in bilibra aquæ soluta quotidie datur. In spasmodicis adfectionibus grana decem ad scrupulum; in beneficio a semidrachma ad drachmam porrigitur. Pro externo usu in uncia aquæ scrupulus ejusdem (vel duo) solvitur. In pulvere, aut pilulis nunquam exhibendus; sed semper solvendus est. Interdum cum diureticis conjungitur, aut *Opio*; quandoque catharticis additur, præsertim si acoris metus subest.

V. Aetas Potassæ liquidus; Aqua Supercarbonatis Potassæ; Haustus carbonicus; Hyperoxymurias Potassæ; Infusum Chamomillæ xalinum; — Rhei; Mistura Acetatis Potassæ juniperina; — Citratis Potassæ stibiata; Subcarbonas Potassæ liquidus; Sulphas Potassæ.

SUBCARBONAS POTASSE LIQUIDUS.

LIQUOR KALI CARBONICI Ph. Bvr. OLEUM TARTARI PER
SOLUTIONEM Ph. Ross.

Растворъ углекислаго Поташа.

R. Subcarbonatis Potassae depurati libram,

Aqua destillatae bilibram,

solve et filtra; vel

R. Subcarbonatis Potassae depurati, quantum velis.

In loco humidio, aëri expone, ut sensim deliquescat.

V. Ut præcedentis.

U. Ut præcedentis; præprimis tamen commendari meretur in colluvie pituitosa canalem alimentarem gravante, si quindecim ejusdem guttæ, paulatim aucta dosi ad triginta, ter quotidie cum *aqua destillata* sumantur, quo per aliquot hebdomadas continuato, ingens pituitæ copia cum salinis concrementis excernitur. Simplicissimus est etiam isque adcommodatissimus eundem miscendi modus cum *Infuso Rhei* (*Tinctura Rhei aquosa*,) cuius misionis cochlear unum aut alterum exhibetur in variis asthenicis (longis morbis,) puta: atrophia, rachitide etc. In dysenteria populari, si ructus acidi, prasina alvi excrementa, vomituritioque similis, præsto sunt urgentque, haud inepta est ejus cum *gummi Acaciae verae* miscela (CAUSLAND, RADEMACHER.) Tumores lactei, recens e frigore excepto, vel terrore, vel pressu exorti, si, vel lavantur eodem, vel fricantur, cedunt (CONSBRUCH.) Idem etiam in tumoribus et tophis arthriticis observatum est.

D. In chronicis morbis, verbi gratia, arthrodynia decem, viginti guttæ quarta quaque hora exhibentur. In convulsionibus secunda quaque hora viginti, vel quadraginta guttæ sufficiunt. In veneficio singulo quadrante horæ quinquaginta, imo centum guttæ, exhiberi possunt; sed pro interno usu *aqua* diluendus est, e. g. singula dosis cum semuncia, vel uncia *Aqua flororum Citri Aurantii*, aut *Lauri Cinnamomi*, vel *florum M. Chamomillae*, vel *mucilaginosarum potionum* administranda.

SUBCARBONAS SODÆ DEPURATUS.

NATRUM CARBONICUM Ph. Bor.; ALCALI MINERALE
Ph. Ross.

Углекислая Сода очищена.

R. *Muriatis Sodaæ vel*

Sulphatis —— *partes triginta duas,*

Subcarbonatis Potassæ *partes quatuordecim.*

Sulphati Sodaæ, in lebete *Stanno* obducto, *aquaæ fervidae sexaginta* *quatuor partibus soluto*, *Subcarbonatæ Potassæ* in æquali *ejus quantitate aquæ solutum sub continuo (spatula ferrea* *aut lignea) motu adde*, ut *liquor bulliat*, quem a *præcipitato*, *tempore coctionis forma pulveris*, *Sulphate Potassæ*, in unum *aut plura argillacea cratera effunde*, atque ad *refrigerandum* *et crystallisandum per 24 horas repone*. Postea *liquorem a* *residuo defecatum ad cuticulam salinam supranatantem evapora* *et evaporationem, refrigerationem et crystallisationem liquoris* *eousque repeate*, donec prorsus ea (*crystallisatio*) cessat. Sic *obteritas crystallos Subcarbonatis Sodaæ in vas ferreum pu-* *rum immittet et sensim sensimque aucto, sub jugi motu, i-* *gne, donec omnes crystalli in aqua crystallisationis diluantur,* *coque, ac post brevem quietem, imminuto paulum calore, ut* *heterogenea salia præcipitentur, permitte: liquorem cautissime* *in lebetem Stanno obductum effunde et adde $\frac{1}{2}$ aquæ purissimæ* *pondere, utque bulliat, decoque, et per linteum cola,* *atque in frigidulo loco ad crystallisandum depone; supranatantem* *liquorem effunde et repeate evaporationem supradictam, donec* *nullæ crystalli Subcarbonatis Sodaæ concrescant. Crystalli simul* *accumulatæ in aëre libero, ne faticant tamen, siccentur in char-* *ta bibula, in vase idoneo bene occluso ad usum serventur.*

Q. *Subcarbonas Sodaæ* *purus, hac ratione surgens, constat: e Sodaæ p. 20, Acidi carbonici p. 16 et aquæ p. 64, sistitque crystallos octaedras cum angulis duobus acutis et obtusis, quæ Acidum carbonicum prompte; nullum tamen ex aëre humorem adtra-*

hunt; sed fatiscunt potius albido pulvere, tripla aquae destillatae portione, solubiles.

V. Eadem, quae Subcarbonatis Potassae.

U. In omnibus morbis, in quibus Subcarbonas Potassae laudatus fuit, etiam hic efficax est, et ob mitiorem indolem saepe pro usu interno præferendus pauloque majori dosi sumitur. Hinc a cl. UDENO (per excellentiam) maritatur solutionibus extractorum: (Академическая членія о хроническихъ болѣзняхъ. С. Петербургъ, 1814.) Aphthis lactentium præcipue infantum, ut succedaneus Subborati Sodaе, obponitur; eæ enim, quum haud raro a gingivis incipientes, palatum totumque os occupant, tum ad uvam faucesque descendunt, atque his obsessis, periculum minitantur, recte datur ad purganda hæcce ulceræ, devorandus. Pustulosis etiam ab eadem causa sicisque laborantibus, aut achore, rachitide, scrofulis, exhibetur (HAMILTON,) nec in infarctibus glandularum mesenterii mucosis atrophiaque infantum frustrari fertur, imo ad curandas podagræ aptus esse censemur (TODE,) nec injusta spes est, ut calculo urinario, acido urico compaginem debenti, prævertat. Venenorum etiam acria acida continentium est antidotus celebratissima, quapropter adversus Oxymuriatem Hydrargyri, Oxydum Arsenici album per cibos, vel potionem corporibus nostris inserta, valens. Extrinsecus forma balnei, fatus, lotionis etc., in tumoribus glandularum ex lacte, aliisque causis, orchiocèle scirrhosa, psora, herpetibus, tinea capitis, scrofulis, imo ulceribus syphiliticis, proficit.

D. Auctior, an exigua sit danda, ex ratione quantitatis acidæ absorbendi et ætatis ægri, æstimari oportebit; plerumque tamen a quinque ad quindecim grana, usque ad semidrachmam adultioribus datur cum congruis remediorum additamentis, vel in solutione, habita semper soluti ad solvens ratione. Subcarbonas Magnesiae, vel alii pulveres, nulla acida, aut ferentes, aut extricantes, ut Saccharum etc., recte adjunguntur eidem. In pilulis, extracto amaro, debili in primis stomacho, excipitur utiliter; urgentibus autem aphthis solutus ex melle

devorandus propinatur, et in urolithiasi cum *Sapone oleoso* vi-
ces *Aqua Supercarbonatis Sodaे* supplet. Ubi usus ejusdem
protrahendus est, ut in urolithiasi, infarctu glandularum et
intestinorum, achore, rachitide, et id genus aliis, tum magna
cura cavendum, ne, dum salutem molimur, majori dosi ægrotis
struamus insidias.

V. Aqua Supercarbonatis Sodaе; Pilulae Sodaе; Subphosphas—;
Sulphas—.

S U B M U R I A S H Y D R A R G Y R I .

H Y D R A R G Y R U M M U R I A T I C U M M I T E *Ph. Bor.*; **M E R C U R I U S**
D U L C I S *Ph. Ross.*

Солекислая услащенная Ртуть.

R. *Oxymuriatis Hydrargyri* partes quatuor.

In mortario vitro, aut lapideo cautim tere *Alcoholis* aliquot
guttulas interdum adspergendo; dein adde:

Hydrargyri depurati partes tres,
misce terendo, donec globuli *Hydrargyri* perfecte disparue-
rint, dein pulvis in cucurbitam vitream oblongam, cuius ter-
tiam duntaxat partem impleat, inditus, ex arena sublimetur
calida. Massa sublimata teratur et denuo sublimetur, tandem
in pulverem subtilissimum redigenda, *aqua destillata* fervente
lavandum et pro usu medico siccandum.

Q. Sic paratus tenet **C H E N E V I X I O** teste: *Hydrargyri he-*
mioxydati p. 88, *Acidi vero muriatici* p. 11 e centenis, format-
que crystallos prismaticas, tetraëdras, candidissimas, nec *aqua*,
nec *Alcohol*e solubiles, *saporis* expertes, *phosphorica* luce, si in
tenebris terantur, inicantes; luce autem solari, dum *Acido muri-*
atico orbatæ sunt, nigrescentes.

V. Stimulans; resolvens; antiphlogistica; anthelmintica; anti-
syphilitica; sialagogia; chologoga; verbo, secretiones et excre-
tiones fere omnes promovens; cathartica in primis.

U. Omnia e *Hydrargyro præparatorum* præstantissimum
æque, ac usitatissimum est, *Submuriæ Hydrargyri*, et delicatis
matronis, et teneris infantibus, et febrentibus, si circumspecte
administretur, adcommodum. Quatenus heterogenea, organismio
per contagionem illata, potis est destruere, tutum præbet in
salutari nobis professione refugium administratio ejus adver-
sus syphilidem, quacumque demum sub forma, manifestam,
latissime ergo patet usus *eiusdem* nominatim: in ulceribus,
tumoribus mollium et solidarum partium, excrescentiis, pseu-
do-organisationibus, ostealgia etc. Si tamen malum jam est
inveteratum, organismus torpet et quædam insensibilitas ob-
servatur, tum fortiora e *Hydrargyro* præparata, ut *Oxymuriæ Hy-
drargyri*, exiguntur, vel etiam mitiora, si insignis pulmonum,
vel ventriculi debilitas, vel irritabilitas male habet, neque al-
terna remediorum plus, vel minus oxydatorum, exhibitio, in-
terdum pro re nata, necessaria, officit laudibus *Submuriati Hy-
drargyri* adstructis. Quibusdam præcipue irritabilibus, ant aco-
re ventricuti vexatis, si tormina et diarrhæam causat, addito
Opio subvenire licet, quo etiam actioni *eiusdem* in glandulas
salivales prævertitur. Eodem nomine adversus fœditates cutis
(*Dermatodes*,) sive illæ forinsecus accessere, seu in pene-
tralibus corporis exortæ sint, commendatur, valetque pluri-
mum in psora, herpeticæ, tinea capitis, crusta lactea, lepra,
pemphigo etc., externo et interno usu, vel utroque simul. Non
male tum additur *Oxydum Stibii hydrosulphuratum* et *decoctura*
corticis radicis Daphnes Mezerei, aut *Tritici repentis* etc.; extrin-
secus autem *unguentum sulphuratum*, *pulvis radicis Veratri albi* etc.
Trichomati etiam obponitur. Canibus ad salivationem usque
datus adversus rabiem hydrophobam profuit, nec minus homini-
bus a talibus demorsis. In helminthiasi (RUSH, ANDRY) et
quidem in ipsa tænia laudabatur, partim zooctono, partim
cathartico scopo, atque etiam ingreditur hunc in finem decan-
tata quædam *specifica*. Febres, quæ miasmati originem debent,
plerumque typhodes, atque maxima ex parte affectione ali-
cujus visceris, puta: ventriculi, intestini dodecadactyli, jeci-

noris, pulmonum, glandularumve, stipatae, optime curantur *Submuriate Hydrargyri*, praesertim fermentibus subsidiariam operem *Opio*, *Camphora*, *Valeriana officinali*, *Aristolochia Serpentaria*, *Angelica Archangelica*, *balneis tepidis*, *topicis frictionibus* per modum *unguenti* ex eodem. In peste etiam efficacia ejusdem rite administrati non est spernenda; in febri vero americana flava (RUSH, CLARKE) unicum fere est et eximum artis praesidium, maxime cum *Oxydo Stibii hydrosulphurato*, aut *Tartrate Stibii et Potassae, Camphora* etc. Valet etiam in febribus malignis, typhodibus (MURRAY, LIND,) pneumonitide typhode (HAMILTON.) In dysenteria (WILSON, PRINGLE,) usus ejusdem suadendus est, si, vel rheumatica est, vel inflammatoria et nervosa. Vis *Submuriatis Hydrargyri*, antiphlogistica extra omnem dubii aleam posita, nititur incitatione vasorum absorbentium multumque potest adversus inflammationes topicas, rheumaticas e nervorum ataxia, seu irregulari conductione, profectas; sed non illico incipiente malo, dum energia niniusque sanguinis impetus urget, sed praemissa sanguinis detractione, adnotis sanguisugis, eluta alvo, cuteque congruis *portionibus laxata*, prodest. Exhibitetur hoc facto cum *Opio* ad granum auctis sensim dosibus in encephalitide, cum primis ea, quae febrem nervosam comitatur. Proficit etiam in ophthalmite rheumatica, scrofulosa, syphilitica (WARNER, RICHTER,) si in pneumonitide, praegressa methodo antiphlogistica, respiratio aegri non est liberior, doloris vero vehementia remittit quidem; sed is prementior fit, tussis manet sicca, tum *Submuriatis Hydrargyri* praesentaneo est remedio, exhibeturque secunda, vel tertia quaque hora a duobus ad tria grana, maritus cum semigrano, vel integro *Opiji*, *succo Hyoscyami spissato*, partim, ut aucta pulmonum irritabilitas minuatur; partim vero, ut catharticæ ejus vi prævertatur. In hepatitide internus ejusdem usus adjuvatur externo, adfricto adfectæ parti *linimento Suboxydi Hydrargyri* (CLARKE, LIND.) Eadem ratione gastridi, enteritidi et metritidi (HAMILTON) obponitur. *Balneis tepidis* et *fotu* remedii actio intendantur. In tracheitide (angina mem-

branacea,) auctoritate præsertim Britannorum et Americanorum valet plurimum; **RUVSCHIUS** profecto habet eum pro *specifico* adversus hoc malum. Puerulis porrigitur secunda quaque hora a duobus ad tria grana adfricto simul *unguento* colli parti. Non male tum conjungitur cum *Camphora* vel *Opio*, ne, vel catharsin, vel salivationem moveat. In febribus exanthematicis, scarlatina (**BAILLIE, MICHAELIS,**) variolis (**LETTSON,**) morbillis, præsentanea præstat commoda, si status putrido-nervosus urget, vel topica inflammatio accedit; in primis vero in copula *Camphorae*, *stibiatorum*, *balneorum*. Stimulando periphericos nervorum fines contribuit ad curationem convulsionum et spasmorum; nam, vel causam summovet rheumaticam, promota perspiratione; vel metasyncrisin producit. Peropus est tum, si votis perfui lubet, eidem *Opium* et *Oxydum Stibii hydrosulphuratum* jungere, tum magnis dosibus ad grana quinque, vel sex porrigure, nec extimescere salivationem, quæ interdum impediri nequit, tum simul ab *acidis* abstinere, victumque functionibus cutaneis restituendis parem, eligere. Haud desunt exempla tetani (**RENAUT,**) trismi (**MONRO,**) eclampsiae (**CLARKE,**) dysphagiæ et ischuriæ spasmodicæ (**GILCHRIST, PERCIVAL,**) hac ratione curatæ. Agendo in fines hæmatophororum vasorum myodynæ rheumaticæ (chronicæ) obponitur, in coxalgia autem et prosopalgia (**STARK,**) et interno et externo usu efficax (**LENTIN.**) Id ipsum etiam de podagra, si syphiliticæ indolis est, intelligendum. Non male his in casibus additur ei *Oxydum Stibii hydrosulphuratum*, *gummiresina Guaiaci officinalis*, *succus spissatus Aconiti*, *Camphora*, *Opium* etc. Incitando enixius fines vasorum, stases jecinoris, lienis, venæ portarum, pancreatis, mesenterii etc., reserat, quo vis ejus eminet in ictero, melancholia, dialeipyris splanchemphracticis refractariolis, in primis quartanis (**SELLÉ,**) ubi cum *cortice Cinchonae officinalis*, *Suboxydo Stibii hydrosulphurato*, aut *Opio* conjungitur, ita etiam in hydropsi cum *Scilla maritima* et in primis hydrocephalo (**DOBSON, PERCIVAL.**) Iuvat etiam in debilitate et stasis lymphatici et glandularis systema-

tis, hinc laudatur in atrophia (**CHEYNE**), scrofulis (**ROWLEY**), struma etc. Ab initio datur per se; dein vero in connubio *Stibiorum*, *Conii maculati*, vel, pro re nata, *Opii*, subjunctis tandem *tonicis*. Commendatur etiam adversus indurations, inflammationibus prægressis, superstites, e. gr. ventriculi cum *Opio*, *Conio maculato*, *Arnica* etc., aut *veneficio plumbeo* ortas, rigiditatem articulorum etc. Secretiones corrigendo pollet in remediis adversus inveterata ulcera, præsertim, si aut syphiliticæ, aut scrofulosæ indolis sunt; minime vero putescientia, aut scorbutica. Carcinoma scrofulosæ indolis curationem, ejus usu, recepisse apud **GATACKER** legimus. **CLUTTERBUCK** habet eundem pro antidoto *Plumbi*. Scopo purgandi datur in variis morbis, ubi, vel cruditates subducere, vel plethoræ in abdominalibus organis occurrentum est, interdum tale purgans in splanchemphraxi, spasmodica enterodynia, ileo, herniis incarceratis etc., utile est. Plerumque cum aliis *catharticis* conjungitur, e. g. *radice Rhei palmati*, vel, si validiore opus est pulvere, *radicis Convolvuli Jalappae*, *extracto Colocynthidis composito* etc. Sæpe et lumbricos eorumque nidum mucosum educit.

D. Ad excitandum stimulum præsertim in chronicis morbis datur a semigrano ad granum adscendendo, si opus sensim sensimque ad octo. Infantibus ab $\frac{1}{4}$ ad semigranum porrigitur. Ad exitandum in acutis morbis stimulum, e. g. inflammationibus, exhibetur secunda, vel tertia quaque hora a grano ad tria. Infantibus porrigitur, e. g. in febri scarlatina ter de die granum; in hydrocephalo autem omni vespere tantudem. Observandum est in genere acutis morbis plenas doses accommodatores, easque gradatim imminuendas esse; in chronicis vero a refractis incipiendum esse et sic sensim ad majores progrediendum. Scopo cathartico adulti grana quinque ad sex sumant; infantibus vero grana duo ad quinque sufficiunt. Infestante tænia majores doses, imo scrupulum datum fuisse legimus. Plerumque in connubio *Sacchari lactis*, *radice Glycyrrhizæ glabrae* etc., administratur. Persæpe additamentum *Opii* juvat; ad-

singulam, e. g. dosin grani, adjicitur grani *Opii* quarta, vel sexta pars. In arthrodynia, myodynia rheumatica et morbis cutaneis peradcommoda est additio *Oxydi Stibii hydrosulphurati*, sumunturque, vel utriusque pares portiones, vel *Submuriatis Hydrargyri* duæ et *Oxydi Stibii hydrosulphurati* una, atque granum, duo, sensim augendo, datur. Non malum est connubium *Camphorae* prævertende salivationis causa. LŒFFLERO copula *C. Ipecacuanhae* arridet. Cum salibus non est miscendus, aut iis, quæ *Acidum muriaticum* tenent, vel *zalinis salibus*, aut *terris*, vel *Hydrosulphurato Potassae*. Pro interno usu, vel *pulveris*, vel *pilularum* forma idonea, sumitur, e. g. *Extracti Glycyrrhizae glabrae* drachma et *Submuriatis Hydrargyri* (*Calomelanos*) semi-drachma, fiuntque sexaginta *catapotia* mane vesperique singulatim (quotidie duo) ingerenda. Pro externo usu confit *unguentum* e duobus *Submuriatis scrupulis*, et semuncia *Cerati*. Quandoque permiscetur etiam cum *melle rosato*. Si secretio salivæ apud ægrotum non est morbosa, tum *Submuriatis Hydrargyri* cum saliva permistus infricatur, neque proinde spernendum est *CLARI* consilium eundem ope *salivæ* ad internas genas inungere, præsertim, si locales oris adfectus curandi sunt. Pulveratus pro inspersione perraro adhibetur; pro provocandis vero sternutamentis, ubi usus est, in connubio congruorum potest. *Injetio* non est commendanda; facile enim in *solutione* fundum petit.

V. Pilulae Submuriatis Hydrargyri; — — — stibiatae; Pulvis Submuriatis Hydrargyri compositus.

S U B N I T R A S B I S M U T H I .

N I T R A S B I S M U T H I ; B I S M U T H U M O X Y D A T U M A L B U M
Ph. Bor.

Селищрокислый Висмутъ; Окись Висмутовая.

R. *Acidi nitrici diluti purissimi quantum vis,*
Bismuthi quantum satis.

Bismuthi in frustula difracti, vel in subtilissimum pulverem tenuati, exiguae portiones *Acido nitrico* partitis vicibus injici-

antur, donec *metallum* fuerit solutum; solutio ab insolubili nigrante residuo per chartam bibulam filtratione separetur, et vas vitreum, *aqua destillatae* viginti partes jam in se continens, infundatur. Liquor natans decantetur in aliud vitrum, cui *solutio Subcarbonatis Potassae*, seu *Sodae* successive instilleretur ad perfectam *Oxycarbonatis Bismuthi* præcipitationem; denique utraque hæc præcipitata, *aqua destillata* edulcorentur et loco umbroso, nec non calido, exsiccentur ac serventur.

V. *Subnitras Bismuthi* in *aqua* non nisi *bullientis* ingenti quantitate solubilis, olim *cosmeticis* adnumeratus fuerat; nunc vero jam *antispasmodicis* accensetur.

U. Laudatur in asthmate spasmodico, pertussi, gastrodynia, vomititione cardialgia nervosa, quæve nimiæ ventriculi teneritati et irritabilitati ortum debet (**BEAUME, CARMINATI, ODIER,**) in helminthiasi (**KERKSIĆ.**) Externe in psora etc., (**HAHNEMANN,**) et odontalgia tentatus.

D. A grano adscendendo gradatim ab decem, scrupulum per se, vel cum *Saccharo*, *gummi Acaciae verae*, vel *amaronum*, pro re nata, vel in haustu *aqua*, vel *syrupo*. **ODIER** brevi ante prandium exhibebat. Maioribus dosibus, anxiatem, vomitum, alvi obstructionem, aut fluxum, producit.

SUBOXYDUM FERRI PRÆPARATUM.

RUBIGO FERRI PRÆPARATA.

Желѣзная окись приготовленная.

Ferrum limatum sæpius *aqua* humectetur, ut fatiscat in *ruginem*, quæ siccata in mortario ferreo tenuetur in pollen.

U. Idem ac *Ferri limati*; solubilis vero hoc.

V. *Tinctura Muriatis Ferri.*

SUBOXIDUM HYDRARGYRI NIGRUM.

HYDRARGYRUM OXYDULATUM NIGRUM Ph. Bor.; MERCURIUS SOLUBILIS Ph. Ross.

Ртутная черноосадочная окись.

R. *Acidi nitrici diluti partes tres;*

admisce gradatim:

Hydrargyri depurati partes duas.

Commista per aliquot dies maneant in phiala leviter clausa (vase in *aqua frigida* suspenso, ne inter solvendum calor augetur,) interdum agitando, donec *Hydrargyrum Acido nitrico* nup-tum, in crystallos concrescat. Crystallos collectas in copiosiori quantitate (20 partibus) *aqua*, solvito. *Liquori* limpido a sedimento ægre solubili, decantato, sensim instilla: *Ammoniam liquidam* tamdiu, nec ultra, quam *præcipitatum* inde enatum, colore nigro adparet. Pulverem subsidentem *aqua destillata* perfecte abluito, solita temperatura, locoque umbroso, siccato, atque in vitro probe obturando, serva. Convenit cum hoc, *Suboxydum Hydrargyri cinereum Ph. Edinb.*, seu *Subnitras Hydrargyri* et *Ammoniae*, eoque duntaxat differt, quod in vicem *Ammoniae liquidae* ad *præparationem* ejus *Subcarbonas Ammoniae* adhibeatur. Talis etiam forma est *SAUNDERI*, quam *Collegium Londinense*, ejus consilium sequens, adoptavit, *Submuri-as* nempe *Hydrargyri* in *aqua Calcariae* coquitur, donec *Suboxydum cinereum* subsidat.

Q. Est *oxydulum* admodum parum *Ammoniae* et *Acidi nitrici* tenens. In *aqua insolubile*; in *Aceto* autem bulliente et facile et perfecte solvitur.

V. Antisyphilitica, *Submuriati Hydrargyri*, subpar; multo minus salivam et alvum ciens, quam alia *præparata*.

U. In affectionibus syphiliticis; cum *Opio* autem in inflammationibus topicis valet, imo a *LOEFFLERO* myodynæ rheumaticæ cum successu obpositum. Simulac æger eo utens, febit, inalgescit; gingivæ vero tument, indicium est salivatio-

nem instare, ejusque usu supersedendum esse, vel pauxillum *Hydrosulphureti Potassae* vel *Sodae*, in dilutioribus *acidis*, propinanum esse. **HAHNEMANNUS**, ad quem hoc remedium referatur, adserit ea, quæ esui potuique dantur, insulsa esse oportere, imo et a *pomis*, ejusdem suasu, abstinentum esse. Ex-trinsecus per modum *unguenti*, *frictionis*, fœditatibus cutis: *psoræ*, herpetibus, etc; imo adversus oculorum valetudinis genera idoneum esse perhibetur medicamen.

D Exhibetur in syphilide a semigrano adscendendo sensim ad grana quinque vel sex. In typho et inflammationibus majores doses e re sunt et brevioribus intervallis repetendæ. Fortioribus intra nychthemeron sex ad decem grana; debilio-ribus vero quinque, vel sex exhibentur, atque portio hæc in tria, vel sex præbia, dividitur. Plerumque administratur in pulvere, sed nunquam in copula *salium*; ast, vel cum *Saccharo*, *ra-dice Glycyrrhizæ gl.* etc., vel pro re nata cum *Opio*, *Camphora*, *Ipecacuanha* etc. Forma pilularis chronicis præcipue morbis adcommoda. *Unguentis* etiam addi potest, aut cum *saliva* et *bile* inungi; monendum tamen, si cum animalibus humoribus teritur, reduci, ut globuli *Hydrargyri* iterum adpareant.

V. *Unguentum Suboxydi Hydrargyri nigri*; ----- compositum; *Pilulae Suboxydi Hydrargyri nigri*.

S U B O X Y D U M S T I B I I F U S C U M.

S T I B I U M O X Y D U L A T U M F U S C U M *Ph. Bor.*; **C R O C U S A N T R -**
M O N I I *Ph. Ross.*

Т е м н о - с ю р м я н а я о к и с ь .

R. *Sulphureti Stibii nativi*,

Nitratis Potassae depurati et siccatai, utriusque par-
pondus,
in pulverem tenuata et exacte commista per vices carenti cru-
cibulo indantur. Post detonationem materia metallica gravior,
hærens in fundo crucibili, ab albicantibus *scoriis* separetur,

atque in pulverem redigatur, repetita aquae ferventis ad fusione rite abluendum ac siccandum.

Q. Est imperfectum *Stibii oxydum* ad vitreata (*Stibii oxyda*) referendum. Mistum est cum *Potassa*, *Acido hydrothionico* et *Sulphure*. *Potassa liquida* perfacile solvitur et plurimis acidis.

V. Violenter vomificia.

U. Internus respuitur, nec nisi etiamnum ad parandum *Tartratem Stibii* et *Potassae* adhibetur. videsis: **TARTRATEM STIBII ET POTASSAE.**

SUBOXYDUM STIBII HYDROSULPHURATUM.

SULPHUR STIBIATUM AURANTIACUM Ph. Bor.; SULPHUR AURATUM ANTIMONII Ph. Ross.

Окись сърносюрьмянная златоцвѣтная.

R. *Sulphureti Stibii laevigati* partes duas,
Sulphuris sublimati partes tres,
Potassae liquidae,
Aquaes pluviaitis, utriusque partes triginta duas.

Lixivio aqua diluto in lebete ferreo ebullienti addito Sulphur et Sulphuretum Stibii, rite in pulverem tenuata commistaque coquito spathula movendo ad plenariam solutionem, *aquam evaporatione consumtam subinde restituens*. *Liquori refrigerato et per chartam colato instilla successive*: *Acidi sulphurici diluti sufficientem quantitatem ad Hydrosulphuretum omne dejicendum*, quod per chartam separatum, *aqua tepida abluatur et tandem leni calore in loco umbroso sicetur, usui servandum*. Ut a *Suboxydo Stibii hydrosulphrato rubro-fusco* (*Kermete minerali Ph. Ross.*) distingui queat, *Suboxydum Stibii hydrosulphratum aurantiacum*, adposite dicitur.

Q. Continet in centenis: *Oxyduli Stibii* p. 68, *Sulphuris* p. 12, *Acidi hydrothionici* p. 18; et *aquaes* p. 2, *colorem præ se fert aurantiacum, saporis odorisque est expers*.

V. Vasa absorbentia incitans; resolvens; sudorifica; maiori dosi, vel dum *ucida* obvia sunt, vomitum ciens.

U. Ejusdem non spernendus in splanchemphraxy, quæ etiam pituitosa colluvie stipatur, quapropter laudatur etiam in dialeipyris, ab his stasibus profectis, præcipue in connubio *Sulphatis Potussae*, *Muriatis Ammoniae depurati*, *florum M. Chamomillæ*, *extractorum amarorum*, et (dum major irritabilitas est,) *Opii*. Maxime autumnalibus et quartanis convenit. Sensibilius et irritabilibus *Sapo stibiatus* adcommodatior est. Proficit etiam in sequelis harum febrium, ictero (cum *gummiresina F. Assae foetidae*, *oleo pineo-laricino* etc.,) hydrope, vel stasibus organorum, vel prægressis exanthematibus, emergente, cum *extracto Menyanthidis trifoliatae*, *Sulphate Potussae* (SELLÆ.) Incitando vasa capillaria tunicæ mucosæ, fistulam spiritalem obvestientis, prodest in adfectibus pulmonum spasticis nuptum *Opio*; videtur enim symbolam suam contribuere *hydrogenis sulphurici* evolutio ad resolvendos stagnantes humores et tollendas constrictiones spasticas, quem in finem et *Sulphatis Potussae* additio non est vana. In catarrhis inveteratis (citra inflammationem) laxitate tunicæ mucosæ sustentatis præsentanea præstat commoda cum *extracto Centaureæ benedictæ*, — *Glycyrrhizæ glabrae*. Peculiarem commendationem meretur in pneumonitide asthenica chronica (citra sanguinis orgasmum) stasibus glandularum bronchialium ac laxitati tunicæ mucosæ natales debente, quo in casu et *radicem Polygalæ amarae* et *Senegae* etc., addere juvat; dum vero nervosa urgent symptomata, aut spasmi, aut torpor notabilis est, tum, vel *Camphora*, vel *Opium*, vel *gummiresina Heraclei*, subsidiariam opem ferunt. In asthmate etiam et incipiente hydropisi pectoris cum radice *Scillæ muritimæ* et *extracto Arnicae montanae* laudes tulit, uti nec in tracheitide (angina membranacea,) imminuta videlicet inflammatione et tenaci muco gravante, frustratum est. In prima phthiseos periodo, si aut scrofulosa, aut herpetica diathesis est, aut stasibus abdominalibus sustinetur, vel post acutas pectoris adfectiones exorta est, omnino utilitatem promit-

tit conjunctum cum *cortice Cinchonae* off. vel *gummiresina Guajaci* off. vel *extractis amaris*, vel *Opio* etc. In spasticis adfectionibus pectoris e. g. in pertussi, *narcoticis* jungitur *remediis*, e. g. cum *Opio*, *succo Hyoscyami* spissato etc., vel cum *Moscho* etc. Etiam in stenocardia (angina pectoris) a *WICHMANNO* tentatum. Agendo in vasa dermatica fœditates cutis profligat, syphiliticas nimirum cum *Submuriate Hydrargyri*, herpeticas cum *Solano Dulcamara*, psoriasis cum *Sulphure sublimato*. In arthrodynia et myodynia rheumatica cum *Camphora*, *Opio* et *Guajaco* off., valet. Tandem curatio etiam metasyncritica, quæ permutationem totius systematis motorii et sensorii complectitur, haud raro optime absolvitur eo cum *Submuriate Hydrargyri*, copulato. Exinde contribuit ad curationem ataxiæ, quæ incipientes nervosas febres stipare solet.

D. Pro adultis granum, vel duo; infantibus vero porrigitur ab $\frac{1}{2}$ ad semigranum ter de die. Si vero immobilitas nervei systematis est, aut pervicacia stasium id exigit, dantur interdum quatuor, vel sex grana, imo etiam plura in chronicis malis. Pulveris forma omnino præferenda est, et tum apte conjungitur cum *Saccharo*, *Saccharo lactis*, radice *Glycyrrhizae gl.* etc. dum æger irritabilis est, viresque ventriculi adtenuatas sentit, non male *aroma* additur; ubi vero acoris metus subest *Magnesiam* addendam suadent. Forma etiam pilularum adhibetur, præsertim in chronicis morbis, excipiturque tum, vel *Sapone*, vel *extractis*, quorum dupla quantitas nubitur. *Acidorum* in genero connubium, haud secus ac *salium acidorum*, culpatur.

V. *Sapo stibiatus*; *Pulvis Muriatis Ammoniae stibiatus*.

S U B P H O S P H A S C A L C A R I Æ.

C O R N U C E R V I U S T U M.

Фосфоро-кислая известь.

R. *Frustorum Cornu Cervi*, quantum lubet.

Integra, vel, (si horum copia est,) *ramenta*, a quibus omne volatile abstractum est destillatione candefactis in furno carbo-

nibus exponantur, donec tota etiam diffracta albescant; dein terantur in mortario, et pulvis trajiciatur per tenue cibrum.

Q. Continet tum *Acidi phosphorici* gr. 0, 41, et *Calcariae* o, 59. Ustione *gelatina* (pars 27) evertitur superstite *Subphosphate Calcariæ* cum pauxillo (parte centesima) *Carbonatis ejusdem*.

V. *Ossa restaurans?*

U. In rachitide. Titubantem *eius* in hoc morbo famam **BONHOMME** sustinet; exhibuit enim *eum*, et *Subphosphate Sodæ* adversus hoc malum manifesto cum effectu, sed adhibuit etiam ad lotiones externas *aquam destillatam*, in cuius libra soluta fuit *Subcarbonatis Potassæ* semuncia. In Germania etiam laudata est nuperrime vis *Subphosphatis Calcariæ* medicatrix a cl. **GÖLIS**. Negantibus tamen quibusdam *Subphosphate Calcariæ* solvi posse *liquoribus corporis humani* (utut, *eum* in *Sero lactis*, et *seminali liquore* inveniri **FOURCROY** et **VAUQUELIN** contenderint) adhuc de agendi modo, et specifica *eius* utilitate, sub judice lis est.

D. Grana decem, viginti porriguntur.

V. *Acidum phosphoricum concretum; Subphosphas Calcariæ stibiatus.*

S U B P H O S P H A S C A L C A R I Æ S T I B I A T U S.

Pulveri: James's Powder, æquiparabilis.

Фосфорно-сурмянная известь.

R. *Sulphureti Stibii laevigati* in grossiusculum pulverem redacti,

Cornu Cervi Elaphi rasi, utriusque pares portiones.

Misce atque ollæ ferreæ latæ injicito ad rubedenem calefactæ, ac assiduo agita, donec colore cinereo fuerint. Ubi materia refrigeraverit in pulverem teratur ac loricato immittatur crucibulo. Huic crucibulum aliud inversum, cui parvum sit foramen in fundo, conjunge luto ignemque subministra ad rubedenem sensim auctiorem et ita auctum serva per duas horas; tandem frigefactam massam in subtilissimum pulverem tere.

V. Stimulans; sudorifica.

U. Febres ex persfrictione, astheniae notas ferentes (ad critin in primis promovendam,) typhus mitior, remittens, dysenteria, subductis prius sordibus.

D. Grana quinque ad octo, semel, vel pro re nata etiam bis in die; major vero dosis, vel emesin, vel alvum cit, quapropter his subsistere (dosibus) expedit. Persæpe in connubio Submuriatis *Hydrargyri* et *Camphoræ* datur. Si pauluin *Supertartratis Potassæ* adjectum fuerit, tum vis ejusdem et cathartica et vomificia efficacius emicat; sudorifica autem additione *Subcarbonatis Ammoniae*, *Camphoræ*, *Opii* etc. Utentibus eo diluentes largæ potiones sunt commendandæ.

S U B P H O S P H A S S O D Æ.

N A T R U M P H O S P H O R I C U M *Ph. Bor.*

Ф о с ф о р о - к и с л а я с о д а .

R. *Acidi phosphorici aquæ* duplo diluti, quantum iubet.

Sensim admisce:

Subcarbonatis Sodaæ depurati, aqua soluti, quantum satis, vel etiam, quod melius est, majorem quantitatem. Humorem cola per chartam, dein evapora, donec gutta crystallos excutiat ad marmor frigidum; dein iterum cola et ad crystallisandum sepone. Collectas crystallos etiam post repetitam evaporationem siccato, vaseque obturando serva.

Q. Ex *Acidi phosphorici* p. 15, *Sodaæ* p. 19. et *aquaæ* p. 66 coalescens, crystallos sistit rhomboidales, elongatas cum obtusis angulis, quæ ad aërem fatiscant; *aqua* vero quartam earendem partem solvit.

V. Blande laxans.

U. In saburra canalis alimentaris, ubi cathartica lenia atque debili constitutioni, labefactis præcipue viribus, adcommoda, e re sunt. Videsis: **S U B P H O S P H A T E M C A L C A R I X E.**

D. Uncia pro præbio ex *aqua*, vel *jusculo vitulino*. Decomponitur *Acido sulphurico*, *Potassa*, *Sulphate* et *Muriate Ferri*.

SUBSULPHAS CUPRI et AMMONIÆ.

CUPRUM SULPHURICO-AMMONIATUM. *Ph. Bor.*CUPRUM AMMONIACALE *Ph. Ross.*

Сърнонашашыриая Мѣдь.

R. *Supersulphatis Cupri*, subtilissime pulverati, partem,
Ammoniae liquidae partes tres et semis.

In vitro pharmaceutico bene obturato conquassetur, donec
Supersulphas Cupri prorsus fuerit solutus. *Liquori cyaneo* jam
per chartam bibulam filtrato, adde: *Alcoholis* partes quatuor,
vel

R. *Supersulphatis Cupri* partes duas,
Subcarbonatis Ammoniae partes tres,
Aqua communis partes quatuor.

In mortario rite subigit, donec effervescentia finita placide
in violaceum coiverit liquorem; liquori a sedimento in aliud
vitrum, decantato admisce: *Alcoholis* partes quatuor, vel am-
plius, crystallosque ex utroque liquore excussas, cæruleas,
aciniformes, lenissimo calore siccato, in vitro probe obturato,
servandas.

Q. Est sal triplex: *Sulphatem Ammoniae*, *Supersulphatem Cu-
pri*, et *Ammoniam* continens; crystallos sistit læte cæruleas, sa-
poris nauseosi, ammoniacalis, metallici, in aquae sesquitanta
copia solubiles; in majori vero discidium patientes.

V. Pro varia dosi, irritans; adstringens; tonica; antispas-
modica.

U. In spasmodicis morbis ad metasyncrisin efficiendam util-
liter adhibetur, ita profuisse fertur: in epilepsia (ARETÆUS,
DUNCAN, GREGORY,) scelotyrbe (WALKER, WILLAN,) hyster-
ricis insultibus (THUESSINK,) tussi spasmodica (BELL,) spa-
smo ventriculi (BRERA,) dialeipyris refractariolis (CAUSLAND,
BRERA.) Extrinsecus *solutio* ejusdem ad purganda cacoëthea

ulcera ac pterygia oculorum, (licet tenellas partes plerumque admodum irritet,) laudatur.

D. Initio ad semigranum per se, vel cum quovis idoneo *anodynō* et *radice Valerianaē* datur; dein vero dosis sensim augetur ad tria vel quatuor grana, vel donec nausea (non tamen vomitus) mota fuerit, administratis simul *demulcentibus potionibus*. *Pilularum* etiam forma est idonea.

V. *Pilulae Subsulphatis Cupri.*

S U C C U S C O C H L E A R I A E C O M P O S I T U S.

Сокъ хрѣновый сложный.

R. *Succi radicis Cochleariae Armoraciae* bilibram,
 —— *herbae Veronicae Beccabungae*,
 —— —— *Sisymbrii Nasturtii*,
 —— —— *Fumariae officinalis*, singulorum libram,
 —— *fructus Citri Aurantii* uncias viginti,
Tincturae Acori Calami selibram.

Misce,

et cum subsederint fæces, liuorem effundito et cola.

V. Leniter stimulans; diuretica; antiscorbutica; persæpe alvum leniter sollicitans.

D. Ab uncia ad duas, quatuor, bis terve de die, in cachexia, scorbuto etc., administratur.

S U C C U S O X Y C O C C I N I T R A T U S.

С. клюквенный селипряный.

R. *Nitratis Potassae depurati* unciam,
Succi baccarum Vaccinii Oxycocci libram.

Misce, cui, si libet, duas, vel tres *tincturae Acori Calami* uncias, utiliter addes.

V. Refrigerans; actionem cordis, et micatus arteriarum minuens; parum diuretica; antiseptica. Majoribus in dosibus antiscorbutica esse fertur?

U. *Scorbutus; dysenteria scorbutica? In morbis inflammatoriis, myositide rheumatica, haud inefficax.*

D. *Uncia ad selibram partitis vicibus portionibusque quotidie datur. PATTERSON usque ad libram per diem optato cum successu propinavit. Ubi nauseam, enterodyniam et oppressionem ventriculi producit, tunc *Camphora* a grano ad quatuor, singulis dosibus, addi debet. Succus *Oxycocci*, vel fructus *Citri medicae*, *Aceto* a PATTERSON commendato, præferri merentur. Extus lotionis forma in ecchymosi crutum utilitatem promittit.*

SUCCI PLANTARUM SPISSATI.

SUCCUS FOLIORUM ACONITI NEOMONTANI SPISSATUS.

E X T R A C T U M A C O N I T I Ph. Ross.

С. прострѣльной травы сгущенный.

R. *Foliorum Aconiti neomontani recentium, ante anthesin collectorum, quantum vis.*

In mortario lapideo, adspergendo aquae paulum, contundito; dein exprimoto succum, quem statim absque defæcatione, in balneo aquae, movendo spathula, ad crassitudinem mellis evapora. Succus hic, ne noceat, sit recens, neque super anni tempus, paratus; iners enim evadit. Methodus cl IAENISCH, Professoris Mosquensis, succos narcoticarum plantarum densandi, ea est, ut ii in vasis minime profundis, in stratis cum *Muriate Calcariae* alternatim positi, aëre antlia pneumatica exantlato, evaporent, quo, imminuto calore, humor absorbetur a *Muriate Calcariae* succusque spissatur, cunctis plantæ virtutibus, ne pigmento (*materia colorante*) quidem excepto, retentis, et quidem in pressiori forma.

U. *Præente stoerckio in arthrodynia laudatur dosi grani (cum Saccharo) sensim sensimque augenda; non male etiam succi spissati semidrachma in Vini stibiati uncia solvitur, atque solutio hæc ad triginta et plures guttas præbetur (RICHTER.) BERGIUS effectum ejus expertus est (Mat. med. t. 1. p. 483) in ischiade, myodynia rheumatica, febribus intermittentibus*

protractis cum statu leucophlegmatico, haemorrhœa uteri (chronica.) In cephalalgia serosa KÆMPFIUS cum successu exhibuit. In oculorum morbis: ophthalmiis rheumaticis chronicis, cataracta incipiente, guttae serenes metu, solutio (drachmarum durarum succi in *Vini stibiati uncia*) profuit.

D. A grano gradatim adscendendo usque ad tria et quinque datur, ter de die, vel in pilularum forina, vel *Saccharo* mixtus. STOËRKIUS haud raro cum *succo Conii spissato* miscuit, interdum etiam his *mercurialia* addiebat, alii in connubio *extracti Gentianae* obtulerunt. Videsis: **A CONITUM NEOMONTANUM.**

SUCCUS FOLIORUM HYOSCYAMI NIGRI SPISSATUS.

EXTRACTUM HYOSCYAMI Ph. Ross.

С. Бълени сгущеный.

U. Illustris STOËRKIUS in melancholia, mania; FOTHERGIL etiam in mania melancholica et puerperarum utilem repetit, et quidem, ut relatum accepimus, summa cum euphoria, exhibitum; a GREDINGIO autem atro carbone notatus est. Fortisan majori cum fructu exhiberi potest in omni nervorum nimia irritabilitate, morbis convulsivis et spasmodicis, ut epilepsia (STOËRK.) cardiopalmo, pertussi, catarrhali tussi, mera pulmonum sensibilitate, protracta, (quo in casu *linctibus* admiscetur, e. g. sumitur *pulveris gummi Acaciae verae, Aquae florrum M. Chamomillae, utriusque semuncia, succi Hyoscyami spissati* semiscrupulum, *syrupi Althæae*, vel alterius congrui, uncia, atque quavis hora cochlearcolum (WOLLKOPF) præbetur. Hæmoptoicis etiam et phthisiscentibus commendatus ad infringendam irritationem, et præ *opiatis*, quod alvi excretionem non supprimat, et in somno et quiete inducenda aliquando potentius agat, prærogativam habere censetur; laudibus his et COLLINUS (*Observat. T. 2. p. 148*) subscrispsit. Laudatur quoque in menstruis dolorificis, stranguria, ischuria et doloribus post partum. Infantibus et tenuioris texturæ hominibus, præ *Opi*, commendandus (HUFELAND.) Videsis: **H Y O S C Y A M I**

MUM NIGRUM. *Huic etiam extractum Humuli sæpe potest, ut Clio, subrogari, ita parandum, ut decocta strobilorum (conorum) *Humuli Lupuli* parte, in aquæ fontis partibus sedecim, ad octo, liquor dein, adhuc calens, colatus, ad idoneam densitatem spissetur.*

D. A grano pedetentim ad quinque est dandus.

V. *Collyrium Hyoscyami opiatum.*

SUCCUS HERBÆ ATROPAE BELLADONNÆ SPISSATUS.

С. сонной Одури сгущенный.

U. In epilepsia habituali tentatus, atque levamen conciliasse fertur succo spissato cum pulvere foliorum (in massam commistis,) ad grana tria pro dosi, porrecto, in ictero etiam proficit, qui hepatemphraxi natales debuit, oblata mane vesperique sesquigrani pilula (GREDING in LUDWIG. *Advers.*) Vide-sis: **ATROPAM BELLADONNAM.**

SUCCUS HERBÆ CHELIDONII MAJORIS SPISSATUS.

С. Чистяка сгущенный.

Videsis: CHELIDONIUM MAJUS.

V. *Mistura Chelidonii majoris.*

SUCCUS HERBÆ CONII MACULATI SPISSATUS.

EXTRACTUM CONII MACULATI Ph. Ross.

С. Омега сгущенный.

Videsis: CONIUM MACULATUM.

SUCCUS PUTAMINIS IMMATURE JUGLANDIS REGIÆ S P I S S A T U S.

С. Грецкихъ незрѣлыхъ орѣховъ сгущенный.

R. *Putaminum immaturorum Juglandis regiae comminutorum quantum vis,*

Aqua communis, quantum sufficit.

Putamina in mortario lapideo, adspergendo aquam paulatim, contundito in massam pultaceam; dein succum per linteum no-

vum exprime, quem in balneo mariæ, movendo spathula, ad extracti mollieris spissitudinem evapora.

Videsis: JUGLANDEM REGIAM.

V. *Mistura Juglandis.*

S U L P H A S F E R R I.

FERRUM SULPHURICUM CRYSTALLISATUM *Ph. Bor.*

VITRIOLUM MARTIS. *Ph. Ross.*

С ърнокислое желеъзо.

Quum venalis, plerumque *Cupro* contaminatus sit, satius est eum præparari a Pharmacopeis, quod fit sequenti modo:

R. *Ferri limati*, quantum lubet,

per vices in vitrea cucurbita immittito in

Acidi sulphurici quantitatem sufficientem, *Aqua* quadruplo, dilutam.

Ubi fervore cessarit, liquorem supra calentem arenam per horam digerito, tum filtra et post exhalationem debitam sepone, ut crystalli formentur, clauso vase et in obsculo loco, servandæ.

Q. Hæ læte virides, sunt prismata lateribus rhomboidalibus, saporis austeri aciduli, peradstringentis. Centenis partibus insunt: 39 *Acidi*, 38 *aqua* ac 23 *Oxyduli Ferri*, ad aërem, adtracto *oxygene*, fiunt opacæ et flaviusculæ, in *aqua* *tepidæ* æqua fere portione solvuntur, fatiscant facile cum pelluciditatis, formæ et cohæsionis jactura, in ochraceum, si *igne*, (quo satis modico opus est,) liquantur, primo album, ulteriori (*igne*) in flavum, extrema vero ejusdem vi, (qua omnis fere *aqua* et *Acidum* expellitur,) per varias flavedinis et rubedini tinturas, in profundo rubrum pulverem. Discidium patiuntur a principio *scytodepsico*, *Potassa*, *Soda*, *Ammonia*, *Nitrato Potassae*, *Acetate Ammoniae*, *Muriate ejusdem*, *Aqua Calcariae* et *Supone*.

V. Ejusdem adstrigens; tonica; anthelminтика; lexipyreta.

U. Sacra olim anchora fuit in profluviis sanguinis sistendis, (ne scorbuticis quidem, ubi *limatum Ferrum* nil juvat, exceptis,) quo fine, tum interne, quum etiam extrinsecus, partibus sanguinem fundentibus ipsis, adhibitus fuerat.

Interne mira præstisso decantatur, paucorum quamvis granorum pondere deglutitus in hæmaturia et sanguinis ex ute-
ro secessu, præsertim periculosissimo illo, qui partus vio-
lentos, abortus, molæ excretiones, sequitur. In aliis eti-
am morbis a nimia partium debilitate atque relaxatione or-
tis, et interno usu, et pro re nata, in balneis, proficit, ex. gr.
in pollutionibus nocturnis, enuresi, polyuria (diabete,) hy-
drosi, chlorosi, rachitide, atrophia etc., opem tulit. Egregium
præstat usum in bradypepsia (torpore digestionis) et col-
luvie pituitosa, quæ generandis lumbricis favet, recteque tum
conjungitur cum seminibus *Artemisiae Iudaicae*, cortice *Cinchonae*
officinalis, et radice *Valeriana officinalis*, vel *pulveris*, vel *electuarrii* forma: grana duo, vel quatuor pro dosi adultis sufficiunt.
ILL RUSCH tantum vermis fugæ ejus virtuti tribuit, ut tæniæ
profligandæ parem esse, se usu cognovisse, fateatur. Dia-
leipyris epidemicis, præcipue autumnalibus MARX cum suo-
cessu opposuit? Adversus phthisin nervosam, quæ homines
lustris vinoque confectos, corripit, imo etiam pituitosam lau-
datur (STRANGER;) sed aptius in formula, quæ ad GRIFFI-
THIUM refertur, convenit. Quidam ob corrodentem virtutem
vomitumque carent, vix unquam, nisi a temerariis in usum
internum vocari posse, existimant.

D. Propinatur pulveris forma, granum, duo, ad quinque
præsertim *Saccharo* intertritus; in helminthiasi tamen ab initio
duo etiam grana porrecta sunt; alii solutum in *aqua* et *syrupo*
quodam edulcatum, præbent, aliis *electuarium* præplacet; sed
quum ob ingratum saporem repugnanter sumatur, *pilularum*
forma, meo arbitratu, aptissima esse videtur. Pro balneis duæ
drachmæ ad semunciam pro infantibus sufficiunt; progrediént-
ibus vero ætatibus uncia ad sescunciam et tum addere licet
flores M. Chamomillæ, — *Lavandulae Spicae*, *herbam Origani Ma-*
ajoranna, — — *vulgaris*, — *Thymi Serpylli*, — — *vulgaris*, — *Melis-*
sæ officinalis, quæ in Russia, præcipue australi, vel spontaneæ
sunt, vel in hortis cultura vigent.

V. *Carvonas Ferri præcipitatus*; *Pulvis adstringens*.

S U L P H A S P O T A S S E.

KALI SULHURICUM. Ph. Bor.; TARTARUS VITRIOLATUS
Ph. Ross.

С є р н о к и с л о й П о т а ш ь.

R. *Acidi sulphurici, aquae sextuplo pondere, diluti, quantum libet.*

In amplum vas vitreum infunde ac gradatim *Subcarbonatis Potassae depurati*, sextuplo *aqua soluti pondere*, sufficientem quantitatem ad perfectam *acidi saturationem* instilla. Finita effervescentia, *liquorem* filtra, atque evapora ad punctum crystallisationis et postea sepone in loco frigido, ut crystalli formentur. Commode fit quoque *Sulphas Potassae ex residuo post destillatum Acidum nitrico-nitrosum, in aqua calida, soluto et Subcarbonate Potassae saturato.*

Q. Continet *Acidi sulphurici p. 0,40, Potassae p. 0,52, aquae p. 0, 08, sisticque crystallos hexaëdro - prismaticas in aquae frigidæ decupla fere, in ferventis vero quadrupla quantitate solubiles, ad aërem non satiscentes; intensiori vero igne liquecentes. Sulphas Potassae in particulæ constituentes sedicit admisto *Acido tartarico, Muriate Barytae, Nitrate Argenti, Acetate Plumbi*, et id genus aliis.*

V. Leniter alvum ducens; resolvens.

U. Quum minus crystallisationis *aqua* et plus *Potassae* teneat, stimulum omnino præbet tunicæ ventriculi intestinorumque mucosæ, quo torpida incitantur viscera, digestio secretioque *bilis* augetur, pituitosa colluvies resolvitur, hinc multivaria præstat comoda in stasis abdominalibus, ictero, atrophia, rachitide, hydropisi etc., quo in casu *aromatica* eidem non male junguntur et interdum, pro re nata, *radix Rhei*, vel *extracta amara*. Ablactantibus etiam feminis suadetur ad secretionem *lactis* minuendam; posse tamen eum a metastasisbus lacteis præcavere, dubito. Tandem scopo purgandi com-

mendatur adversus pervicaces alvi constipationes, spasmis, aut flatulentia incommoda, stipatas.

D. Scopo digestivò datur a granis decem ad drachmam; pro laxante duæ (ad sex drachmas) sufficient, subjuncta aquæ calidæ potione. In primo casu et pulveris et solutionis forma adcommoda; in secundo autem pulveris forma præstat; multum enim aquæ ad solutionem salis requiritur; aqua vero calida solutus, haud bene sumitur.

S U L P H A S S O D E.

N A T R U M S U L P H U R I C U M C R Y S T A L L I S A T U M Ph. Bor.; S A L MIRABILIS G L A U B E R I Ph. Ross.

С є р н о к и с л а я С о д а.

Invenitur, ut naturæ productum in Russia; præsertim vero in provincia Astrachanensi, ubi sub vulgari nomine *Salis Astrachanensis*, prostat venalis, ita etiam in aliis Europæ regionibus, in America, nominatim in provincia Kentucky, in Japonia, etc; si tamen præparandus est, fit sequenti ratione:

R. Subcarbonatis Sodaæ depurati aqua frigida soluti, quantum lubet,

Acidi sulphurici diluti, quantum satis ad saturationem. Liquorem ad neutrum statum reductum colatumque, calore leni evapora, donec gutta frigido marmori immissa, spiculas crystallinas emittat, dein in frigido loco sepone, ut fiant crystalli. Obtinetur etiam, si quidquid *acidi* ex destillatione *acidi muriatici* superest, in aqua communi solvatur, addito Subcarbonate Sodaæ, ad perfectam saturationem. Lixivium præcipitata Magnesia et adhibito Subcarbonate Sodaæ, obtentum, dat Sulphatem Sodaæ.

Q. Sic pronatus tenet Sodaæ p $\frac{13}{100}$. *Acidi sulphurici* $\frac{27}{100}$ et aquæ $\frac{58}{100}$ effingitque crystallos prismaticas. In aqua promissime solvitur requiritque tres ejusdem frigidæ partes et unam ferventis. Crystalli loco calido, sicco expositæ aëri, in album

æquabilem pulverem fatiscunt (*Sulphas Sodaæ siccus.*) Additis acidis non decomponitur; facile vero, quum, aut *Potassa*, aut *sales* eam tenentes, adjunguntur.

V. Stimulans; resolveas; lotium movens; cathartica.

U. Minoribus dosibus scopo digestivo et resolvente in pituita primarum viarum plurimum valet, haud secus, ac in splanchemphraxi abdominali atque hinc emergente ictero, rachitide, atrophia, hydrope (*LANGE*) etc. Sed tunc apte addi possunt *amara aromatica*. Juvat etiam eo alvum ducre in biliosis, si turgent, sordibus et pituitosis, utilis etiam est in inflammationibus topicis, rheumaticis, in ophthalmmitide, quæ derivando, usu ejus, si leves sunt, curantur. Nec in erysipelate, ac in exanthematibus febrilibus irritus. Scarlatina primo statim insultu levatur, si *Sulphas Sodaæ minoribus* detur dosibus, imo etiam variolarum suppuratio, si morbus est benignus, haud male cedit, si febrenti nil, nisi huius *solis solutio*, cum *Acidi sulphurici* prævalentis pauxillo, porrigitur. *WEIGELIUS* ejusdem multa aqua diluti protracto usu, tamen fuisse expulsam, adseverat. In haemorrhoidे variisque adfectibus a menstruorum cursu, vel intercepto, vel irregulari, oriundis, eo potissimum nomine expedit, quod, vel nimum impetum sanguinis compescat, vel emphraxes et pituitam, quæ plerumque conjuncta est, solvat educatque. In synocharius adhibetur ad reactionem arteriosi systematis minuendam eique hoc in casu *Nitras Potassae depuratus* merito præfertur. Pro antidoto, adversus *Barytue* et *Plumbi præparata*, habetur.

D. Scopo digestivo a decem granis ad duos scrupulos imperatur; ad sthenicas febres moderandas duo scrupuli ad binas drachmas administrantur; si vero pituita solvenda est, et intestina mitius incitanda, ad drachmas aliquot paulatim ingeneritur. Scopo cathartico a semuncia ad sescunciam porrigitur, plerumque in *solutione*; si vero *pulveris* formam adhibere lubet, tum *Sulphas Sodaæ siccus*, præferri meretur; sed minori dosi, quum fortius agat, propinandus. Utrobique additamenta *aromaticorum* non sunt inutilia. *Mannac* etiam, aliisque

catharticus, stimuli mitioris instar, sociatur.

V. *Clyster communis.*

S U L P H A S Z I N C I.

ZINCUM SULPHURICUM *Ph. Bor.*; VITRIOLUM ALBUM
Ph. Ross.

Сѣрнокислой Цинкъ.

R. *Acidi sulphurici depurati uncias quatuor,*
Aquae depuratae uncias decem,
Zinci Indici in frustula comminuti, vel granulati quan-
tum sufficit ad saturitatem.

Acido, aqua diluto, per vices Zincum granulatum immittito, do-
nec plane saturatum fuerit, solutionem calentem per chartam
cola, et per evaporationem, atque subsequens refrigerium cry-
stallos excutito, in bibula siccandas, ac clauso vase servandas.

Q. *Sulphas Zinci*, hac ratione obtentus, præter quadraginta par-

tes *Acidi sulphurici*, totidem *aquaæ* ad formandas crystallos ido-

neæ et viginti e centenis partibus *Oxydi Zinci* continet, cry-

stallis prismatico-tetraëdris coalescens, quæ se ad aërem fri-

ant et ad gr. 10 th. *Reaum.*, in duabus *aquaæ* partibus solvun-

tur, additis *Alcalinis* et plerisque *salibus* discidium patiuntur.

Sunt sapore styptico, sub-acidulo.

V. Parvis præbiis adstringens; tonica; aucta vero dosi,

emetica.

U. A priscis jam diu in usum tractus, jamque ætate no-

stra abiisset in desuetudinem, ni Britannerum encomiis orna-

tus, revixisset jure meritoque. In febribus, sic dictis putridis,

ubi *mineralia acida* indicantur, præsertim nervosis symptomâ-

ibus stipatis, interdum profuit; sed dum acor ventriculi subest,

alienus est ejus usus, nec facile in resolutione humorum, sua-

sore *WIEL*, concedendus. In dialeipyris efficacior, subduc-

tis prius cruditatibus, si a duobus ad tria grana in *infuso Ma-*

tricariae Chamomillæ administretur. Præcipuus sane est in ve-

neficiis (a narcoticis,) variisque morbis spasmodicis, dum sumuntur, nauseam movet, qua continuata, it obviam spasmis; hinc in epilepsia, affectionibus hystericis atque nervorum distensionibus a grani $\frac{1}{4}$ p. adscendendo ad integrum granum, juvat. Dum hunc in finem in pilulis datur, recte ei adduntur: gummiresina *Assae foetidae*, radix *Valerianae*, et extracta *amara*, quarum quæque quartam grani partem, contineat, oportet. In dyspepsia idonea cum amaris consociatione, datur, magna cura cavendo, ne vel nausea, vel vomitus orientur, quod adaptatis rite præbiis præcavetur. Communior receptione *Sulphatis Zinci* usus est externus: in ulceribus scorbuticis, flaccidis, saniosis, blennorrhœa obscenarum partium, tum etiam lacrymali, e laxitate et torpore lacrymalium ductuum, orta, in inflammationibus oculi glandulosis, asthenia productis, quibus varices vasorum conjunctivæ accedunt, per modum *collyrii* in illis, *collutoriis* in anginis serosis, aphthis (ARMSTRONG, PLENCK,) *injectionis* pro re nata. Laudatur etiam in fœditatibus cutis, psora humida, herpete, porrigine. Sanguinis etiam profusiones e naribus, gingivis, sistit. *Sulphas Zinci* non adeo acer et venenatus est, quin satis tuto, vomendi scopo, dari possit, et simul adeo validus est, ut quasi punto temporis plenissimam cieat vomitionem, ideoque præ omnibus fere hujus generis remediis convenit, si quid perniciosi aut venenati in ventriculum fuerit ingestum, vel si hunc quacunque de causa, subito et plene exinanire expedit. Antidotum ejus *Sapo*, *Conchae praeparatae*. Decomponitur *Calcaria*, *Magnesia*, *Potassa* et *Soda*.

D. Scopo roborandi a grano, ad duo, e quovis vehiculo conveniente bis, terve de die; emetico autem a grānis decem, ad quindecim, scrupulum administratur.

V. *Solutio Acetatis Zincii*; — *Sulphatis Zincii*; — *Supersulphatis Zincii*; — *Sulphatis Zincii aluminata*; *Oxydum Zincii*.

S U L P H U R S U B L I M A T U M.

SULPHUR DEPURATUM Ph. Bor.; FLORES SULPHURIS
Ph. Ross.

С ъра очищенная.

R. *Sulphuris* (*vulgo venalis*) quantum lubet, in clauso vase balneo arenæ sublima; dein magna quantitate aquæ ferventis probe ab omni *Acido Sulphurico* adhærente abluito, siccato, usuique servato.

Q. Videsis: **SULPHUR.**

V. Nervos organicos, præcipue finibus arteriarum et vasis capillaribus providentes, incitans; exhalationem cutis, et pulmonum promovens; resolvens præcipue stases in vena portarum; majoribus dosibus alvum laxans; zoothona, cum primis antipsorica. Illud in systema recipi indicat, et odor exhalationis *gas hydrogenium sulphuratum*, sub usu *ejus*, redolens, et effectus *ejus* in metalla propinquia eo nigrescentia.

U. Adhibetur ubi vasorum superficialium, et systematis venæ portarum actio intendenda est. Sic pulmonalem halitum augendo, in morbis asthenicis pectoris, asthmate pituitoso, catarhis, tussi a perfrictione (WERLHOFF, SIMS, THILENIUS,) in organon cutis agendo, est in psora remedium fere specicum, acoros enecans, quod *in et externe* in usum trahitur. Sub actione *ejus* impetigo ex initio plerisque magis prorumpit, dein evanescit. *Internus usus*, tum præcipue indicatur, ubi psora, vel *perfrictione*, vel intempestiva *inunctione* retrogressa est, atque pectoris, et alia interna mala, excitavit; saepe hocce auxilio illa in pristinam sedem restituitur. Exhibetur autem *Sulphur sublimatum* simul cum *unguento Sulphur excipiente*; sufficit per aliquot dies scrupulum *ejusdem* tertia quaque hora ingerere; *unguentum* vero e *Sulphure* et duplæ *suillae adipis depuratae* portione, partibus affectis admovere; ubi vero rebelle, et inveteratum cutis vitium est, juvat addere æquam portionem *Sulphatis Zinci unguento*; *Sulphuri* autem ingerendo grana quinque *Sulphureti Hydrar-*

gyri nigri (*Aethiopis mineralis Ph. Ross.*) Laudatur etiam in herpe-
te (**Poupart**,) crusta lactea, (præsertim puerperarum (**Löffler**)) tinea capitis, trichomate (**Lafontaine**), variolis æ-
gre prorumpentibus (**Pfaaff**), haud minus in arthrodynia et
myodynbia rheumatica (**Barthez**), in connubio *gum-miresmae*
Guajaci off., etc. (**Quarin**.) In his sane adiectibus imperfecte
solutis, quibus, vel œdemata, vel nervorum distensiones ac-
cedunt, magni æstimator *Sulphur* cum *Stibiatis*, *Ipecacuanha*
Opioque. Laudatur etiam ad sananda glandulosarum partium ul-
cera, et ad pannos oculorum tollendos a **WINTERO** (*Observatio-
nes Medico-Chirurgorum Rutheni Imperii, Petropoli. WIEN 1805*)
Dum venosas congestiones in systemate venæ portarum mutat,
proficit etiam in stasibus abdominalibus, malorumque hinc
pullulantibus caterva. In hypochondriasi valet additis con-
gruis remediorum adminiculis, etiam hæmorrhoidi subvenit
hic simul alvum leniter, additis præsertim salibus, exstimulando,
dolores et alia mala ab obstructione pendentia, tollit; restituit
quoque suppressum eorum fluxum. Feminis etiam, quibus san-
guis per menstrua non respondet, utile (**Stark**.) Aduersus
dysenterias cum *gummi Acaciae* utiliter exhibebatur (**Wede-
kind**.) Ptyalismum quoque ex usu *Hydrargyri* sistit. Pro an-
tidoto tandem *Oxydi Arsenici albi*, *Oxymuriatis Hydrargyri*,
Plumbi et *Cupri* habetur (**Navier**;) *Hydrosulphuretum* tamen *Potassae* est hoc scopo præferendum. *Sulphur* sub diathesi hyper-
sthenica, plethora et sub proclivitate ad hæmoptysin, hæmor-
rhagias alienum. *Extrinsecus* per modum *unguenti*, vel *balnei*,
adhibetur.

D. *Sulphur sublimatum* plerumque per se datur in *pulvere*, rari-
us in *pilulis*, perraro in *mistura*, idque a granis decem, scrupulo
aliquando usque ad drachnam, aut simpliciter *Saccharo* uni-
tum, aut *Supertartrati Potassae*, pulveri *radicis Rhei* *palmati*, aut
aliis, pro re nata, *stimulantibus*, *roborantibus*, vel in *electuario*.
Sulphuris connubium cum *oleis* et *unguinosis* et *volatileibus*, non est
despicatui ducendum; sunt enim illa præsertim *unguinosa*
haud imparia solvendo *eidem*, si coquuntur, idque quater

copia superant; successu nempe Oleorum, Sulphuri carbonicum et hydrogenes impertitur.

V. *Hydrosulphuretum Potassae; Oleum sulphuratum; Pulvis Sulphuris compositus; Sulphuretum Calcariae; — Ferri.*

S U L P H U R E T U M C A L C A R I A E.

CALCARIA SULPHURATA Ph. Bor.

Сърно-известная печень.

R. *Calcariae partem,*

Sulphuris sublimati partem unam cum dimidia.

Commista in crucibulo probe tegendo, per quadrantem horæ calcinatur, eo dein (crucibulo) ab igne remoto, massa adhuc calens in vas vitreum probe claudendum immittatur usuique servetur.

Q. *Sulphuretum Calcariae* est albo-flavescens, solvitur plenarie sedecim partibus aquæ bullientis, e solutione hac citrina, ova putrida redolente, acida omnia (excepto nitrico et oxymuriatico) multum gas hydrogenii sulphurati evolvunt et *Sulphur hydrogenatum (Lac Sulphuris)* præcipitant.

U. Antacida; diaphoretica; *salia metallica*, eorumque indolem causticam, infringens, auferens.

U. Internus respuitur; MÖNCHIUS tamen etiam interne id exhibuit, ut non citra quædam incommoda, etiam adversus *metallica* beneficia valet, in primis vero *Cuprum*; optime tamen adhibetur in *balneis*, si unciæ ejusdem duæ in totidem aquæ libris coctæ *balneo* adfunduntur. Talia *balnea* utilitatem promittunt in pseudosyphilide (sequelis hydrargyro seos) artrodynia anomala, scrofulis.

D. Pulveris grana duo (ad decem) exhibentur, vel *Sulphureti Calcariae* drachma in aquæ ferventis unciis duabus solvitur, atque cochleari parvo (rarius magno) datur. Aptius et tu tius adhibetur hæc solutio, vel dilutior, ad abluenda ulcuscula psorica, brevi sic curationem, admissura.

V. *Aqua hydrosulphurata acidula.*

SULPHURETUM STIBII LÆVIGATUM.

STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM LÆVIGATUM Ph. Bor.,

ANTIMONIUM CRUDUM PRÆPARATUM Ph. Ross.

Сюрьма пріугомовленная.

Sulphuretum Stibii electum, in mortario ferreo contritum, super lapidem expolitum et durum, adfusa paululum *aqua*, lævигetur, ut fiat pollen subtilissimum, loco tepido, siccandum.

Q. Videsis: **SULPHURETUM STIBII NATIVUM.**

V. Minori dosi agit in sistema lymphaticum, functionem cutis, pulmonum et renum lente promovet, majoribus dosibus vomitum cit, vel alvum dicit.

U. Agendo in vasa peripherica exhibetur in fœditatibus cutis, ut in psora, herpete, tinea capitis, crusta lactea, præsertim si cum statu scrofuloso, vel arthritico hæcce mala conjuncta sint, nec non, ubi illa (mala) retropulsa fuere atque exinde spasmi etc., provenere, et tum apte conjungitur cum succo *Conii*, *Aconiti* (*spissatis*), *gummiresina Guajaci officinalis*, *Hydrargyro*. In arthrodynia et myodynia rheumatica (asthenica,) diuturna, præcipue cum morborum cutaneorum impedita solutione cohærente; in malis *Plumbo* et *Arsenico* productis, uti paralysi et contracturis (KLEIN, GESENIUS.) In pertinacibus dialeipyris quotidianis et quartanis, si cum cachectico scrofulosoque statu procedunt, vel cum stasibus abdominalibus junctæ sunt, ubi cum sapone, *gummiresina Guajaci*, *Heraclei*, *extracto etiam M. Chamomillae* et *Gentianae luteae* in pilulis exhibetur. Agendo in sistema lymphaticum remedium præstans dat in scrofulis, adenemphraxi et splanchemphraxi, nec non in malis inde dependentibus, imo in syphilide inveterata cum herpetibus, arthrodynia, scrofulisque complicata.

D. Porrigitur in *pulvere*, vel in *pilulis*, vel per modum *boli*; non vero, uti antea, in *decocturis*, quia insolutum fundum petet. Initium fit tuto a decem granis gradatim ad scrupulum adscendendo. Magna cura, sub usu *ejus*, cavendum ab *acidis*, ne

enterodynia, diarrhœa, vomitus suboriantur; ideo recte *eidem* addantur *absorbentia*. Connubium cum *Salibus* non convenit.

V. *Suboxydum Stibii hydrosulphuratum.*

SUPERACETAS PLUMBI CRYSTALLISATUS.

PLUMBUM ACETICUM Ph. Bor.; SACCHARUM SATURNI

Ph. Ross.

Уксусо-кислый Свинецъ.

Superacetos Plumbi primum apud Batavos; nunc vero optimus apud Britannos præparatur, atque levi pretio venalis, prostat Pro usu medico depuratur *solutione in aqua destillata calida*. *Solutio* filtratur, atque loco frigido ad crystallisandum seponitur. Liquor, qui remanet, evaporet ad dimidium, ut de novo crystalli effingantur. Præparatur sequenti modo:

R. *Oxycarbonatis Plumbi*, quantum lubet,

Acidi acetici diluti, quantum opus,

ut *Oxycarbonas Plumbi* solvatur. *Solutio* effusa evaporet et ad crystallisandum seponatur.

Q. Et sal medius metallicus, *Plumbo* et *Acido acetico coalescens*, crystallos albidas, subdiaphanas, aciculares, aut hexaëdras, sistens. In duabus *destillatæ aquæ* partibus solvitur, item in *Alcohole*. Igne liquecit, orbaturque *acido*.

V. Motus fibræ muscularis immixtuens; adstringens; tandem destruens. Videsis: *Plumbum* et *Oxycarbonatem ejusdem*.

U. Ejusdem internus, licet sit anceps, concedendus tamen circuinspectissimis Medicis; experiundo enim didicimus, eum coërcendis sangvinis e pulmonibus profluvis aliiisque (REYNOLD,) phthisi pulmonali, hæmoptysi, menorrhagiæ, leucorrhœæ, sudori colliquativo, cum successu fuisse obpositum, præsertim, si concomitans malum febris, non est notabilis; pulsus vero licet celer, sed minime exilis observatur, calor corporis manifestus; citra tamen frigidorum, tenacium sudorum profusionem; aut

citam alvum. Jam post triduum, aut quatriduum talis curatio-
nis phthisiscens se, remittentibus morbi symptomatis, melius
habere sensit. Si dolores ventriculi, aut intestinorum excitarit
ab usu ejus per tempus aliquod abstinentum esse etiam me-
tacente liquet. Haud defuerunt, qui in aliis etiam eum mor-
bis commendarent, ut in epilepsia, pertussi, melancholia etc.
Sed quum tutiora suppetant, facile, hoc in casu, eo carere pos-
sumus. Ulcus pedis phthisiscentis cujusdam cacoëtheum, sa-
niosum, fuisse interno ejusdem usu curatum AMELANGIUS
memoriæ prodidit. Carcinomata utilius deligantur pulte e ra-
dicibus Dauci Carotae cum Superacetate Plumbi crystallisato et
fomentis ex eodem ac herba Conii maculati. Dyspepsia nota-
bilis et diarrhoea, usum ejus vetant.

D. Ab $\frac{1}{3}$ grani ad semigranum adscendendo gradatim ad
grana duo bis de die, cum Elaeosaccharo Anisi, aut Opio, vel
succo spissato Hyoscyami nigri, imo subinde extracto gummiresi-
nae L. Myrrhae, seminibus Phellandrii aquatichi etc. His subjun-
gatur decoctura quævis mucilaginosa.

V. Acidum aceticum; Cataplasma Superacetatis Plumbi; Cera-
tum ejusdem; Collyrium Plumbi opiatum; Solutio Superacetatis
Plumbi; — — — alcoholisata; Superacetas Plumbi liquidus; Vapores
Acidi acetici.

SUPERACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

АСЕТИУМ САТУРНИ Ph. Ross.

Уксусъ свинцовый.

R. *Superacetatis Plumbi crystallisati* partem,
Aquæ distillatae partes duas.

Commiscendo solve. Hæc formula, licet majoris sit dispendii,
meretur præferri; tuius enim faciliusque proportio ingredien-
tium determinari potest; ubi tamen ratio parsimoniae habenda
est, tum *Oxycarbonas Plumbi* adhiberi potest, vel *Oxydum Plumbi*
semivitreum e. g.

R. *Oxydi Plumbi semivitrei* (in pulvere) partem,
Acidi acetici diluti impuri partes duodecim.

Lebeti *Stanno* obducto immitte, ut ebulliat, eousque spathula lignea (sapientis) movendo, donec liquor chartam cœruleam non amplius rubeo tingat colore. Tum amoto lebete clarus a sedimento effunditur liquor, usuique servatur.

Q. Est liquor pellucidus, *coloris* flavescentis, *saporis* adstringentis et dulcescentis; ad aërem atmosphæricum et cum *aqua* dilutus deponit albidum pulverem; ubi vero evaporarit, *Extractum Saturni Ph. Ross.* largitur.

V. Ut præcedentis, externo usui præcipue serviens et quacunque demum forma admoveatur, par est compescendo æstui, topicæ inflammationi mitigandæ, nimio humorum cursui reprimendo.

U. Utilitas ejus in inflammationibus est notissima, infringendo quippe exaltatam activitatem organicam, his obviam it. Usus ejusdem in inflammationibus oculorum; in primis vero asthenicis humidis (rarius sthenicis, nec nisi ab initio,) omnium consensu probatur, præcipue, si *solutioni ejusdem*, vel *Tinctura Opii*, vel (suasus **JANINI**) aliquot guttae *Alcoholis diluti camphorati* addantur. Inflammationes, quæ plagas, luxationes, fracturas et operationes chirurgicas sequuntur, optime reprimuntur eodem remedio, si, et *Tinctura Opii*, eidem adjungatur. Denique ad constringendas partes prolapsu et hernia laxatas, utiliter adhibetur. Obponitur etiam primo blennorrhagiæ stadio, tenui *solutione* in urinæ iter injicienda, quo et inflammationi et doloribus occurritur; in blennorrhæa vero cum *Opio*, in leucorrhœa cum *gummiresina Myrrhae*, *Camphora* etc., conjugitur.

V. *Cataplasma Superacetatis Plumbi*; *Ceratum ejusdem*; *Solutio Superacetatis Plumbi*; — — — *alcoholisata*.

SUPERSULPHAS ALUMINÆ FUSUS.

ALUMEN USTUM Ph. Bor. et Ross.

Квасцы жженые.

R. *Supersulphatis Aluminae et Potassae*, quantum vis.

Expone igni in crucibulo, vel fictili vitro non obducto, ampio, donec liquescens massa ebullire cessen, atque abacta sic omni crystallisationis aqua, in massam albam levem spumosam convertatur, usui externo, servandam.

V. Intense styptica; paululum caustica.

U. Siccus duntaxat extus ad carnem luxuriosam ulcerum exedendam, et ad maculas corneæ discutierendas (scrupulo cum Succhari drachma) adhibetur. Ex eo olim *Lapis divinus* parabatur, qui aptius ex *Acetate Cupri*, *Nitrate Potassae*, *Supersulphate Aluminae et Potassae* colliquefactis, confit, atque apud nos sub nomine: MASSÆ ACETATIS CUPRI COMPOSITÆ notus est.

V. *Pulvis Aluminis compositus.*

S U P E R S U L P H A S C U P R I.

CUPRUM SULPHURICUM Ph. Bor.; VITRIOLUM CÆRULEUM Ph. Ross.

Сѣрно-окисленная мѣдь; мѣдной купоросъ.

Nitore cœruleo perquam spectabili e Cypro adportatus venit; in officinis vero e ramentis Cupri in *Acido sulphurico* parumper diluto, parari potest, sequenti modo:

R. *Cupri limati*, quantum libet,
Acidi sulphurici triplum,
Aquæ communis tantundem.

Commisce et in vitrea retorta distillando *acidum sulphurosum* elicito. Massam, quæ remanet contritam in ferventi aqua dissolvito; solutum vero filtra, et, ut fermentur crystalli, seponito, quæ artis lege siccandæ, usui serventur.

Q. E Cupri p. 0,23, Oxygenis 0,07, Acidi sulphurici 0,50, et aquae 0,40, coalescens, sistit crystallos azureas, parallelepipedas, ad aërem fatiscentes, in aquae quadrupla portione ad grad. 10 th. R. solubiles; saporis acris, nauseosi, metallici et styptici.

V. Emetica; purgans, (cum imminentे inflammationis periculo;) adstrictoria; haemostatica.

U. Adhibebatur olim adversus exedendas verrucas, condylomata, scabritiem oculorum et pannos tollendos, ad destruendas carunculas luxuriantes, ulceræ putescentia et syphilitica curanda. Reprimendis etiam ob stypticam vim sanguinis profluviis obponebatur; sed meliori successu in aqua solutus et pro injectione in blennorrhœis inveteratis, sexus præcipue sequioris, curandis, exhibitus. Usus ejusdem internus est anceps, minusque, quum sit admodum exedens, aptus; nihilo tamen minus a Britannis tentatus cum successu in hydrope (WRIGHT,) phthisi tuberculosa (SIMMONS;) exhibentur autem sex ad decem grana, vel in aquae unciis duabus, vel additis totidem granis C. Ipecacuanhae, idque mane jejuno ventriculo bis aut ter per septimanam, quo facto et tuto, (quin stomachum relaxet, intestina irritet, aut oneri sit ægro) et perfecte agit. Potio sumto remedio, ob promptum, quem exserit effectum, superflua; inter vomisia vero præbia a quibusdam MISTURA MYRRÆ FERRATA commendatur, ægro ceteroquin in cubiculo minus Oxygenis habente, aut cuius aër odore piceo leniter inprægnatus est, in librati motu servato. ADAIR observavit ejus usu nocturnos sudores inhiberi. Laudabatur etiam in scorbuto, haemorrhagiis scorbuticis, hæmoptysi (MARX,) scrofulosis glandularum tumorigibus (PEARSON,) enterodynia plumbea (CHALMER,) dysenteria epidemica, dialeipyris (ADAIR, MONRO,) in beneficio ab Opio et Oxydo Arsenici albo, ob certitudinem effectus, in avertendo per emesin periculo, valet. Adversus noxas ciborum in cupreis vasis præparatorum commendatur, HAUSTUS CARBONIS ALBUMINOSUS: e Carbonis lignarii drachma exacte cum Albumine Ovi subacta, solutis dein in aquae purae unciis tribus, vel

quatuor admiscetur *Sacchari albi* sicilicus. *Cuprum*, addita *Ammoniae solutione* pura, fluidis id continentibus, suberto vi-
ridi-cæruleo colore, probatur.

D. Datur in *pulvere*, *pilulis*, *solutione* ab octava grani parte ad granum. Scopo vomitam ciendi, quatuor, sex, aut decem grana exhibentur. Nausea, vomitu peracto, perdurante, æger cochlearia duo *Alcoholis diluti (frumenti)* aut, si licet, *scyphum aquae Selteranae* cum *Vino et Saccharo* sumat.

V. *Subsulphas Cupri et Ammoniae.*

S Y R U P U S A L L I A T U S.

Сиропъ чесночный.

R. *Radicis Allii sativi recentis contusæ partem*,
Acidi acetici diluti impuri, vel
Aquæ ferventis partes duas.

Macera radicem vase clauso per duodecim horas, et colato li-
quido adde:

Sacchari albi, vel
Mellis despumati quantum satis, ut fiat *syrupus*, vel
Oxymel alliatum

V. Eadem, quæ plantæ, vicesque fere ubique *Scillæ mari-
timæ* supplet.

S Y R U P U S C I T R I A U R A N T I I.

С. померанцовой.

R. *Corticis flavi Citri Aurantii selibram*,
Aquæ communis fervidæ libras tres,
per biduum in vase clauso macerentur et colaturæ depuratæ addito:

Sacchari albi libras quatuor.

Misce fiat *syrupus*.

S Y R U P U S H E R A C L E I.

C. А м м о н і а к о в ы й.

R. *Gummiresinae Heraclei gummiferi* depuratæ uncias duas,

Gummi Acaciae verae unciam,

In mortario lapideo contunde, et per aliquot minuta, pistilli ope, terito, sub trituratione successive addendo:

Vini Sudacensis uncias decem.

Massam per aliquot minuta probe tritam exprime per linum novum. Emulsioni ita obtentæ addito:

Sacchari purissimi pulverati uncias sedecim.

Agitentur in sartagine bene Stanno obducta leni igne, usque dum syrapi consistentiam habuerint.

S Y R U P U S O P I A T U S.

S Y R U P U S D I A C O D I I.

C. опіашний.

R. *Capsularum seminalium Papaveris somniferi* mediocriter maturarum, siccatarum contusarumunque selibram.

Aquaæ ferventis bilibram.

Macera per duodecim horas, et dein leniter coque, ut humoris inde expressi, et colati supersit libra,
cui adde;

Sacchari albi bilibram.

Unica ebullitione fiat syrpus, colandus, usuique servandus.

S Y R U P U S S C I L L E.

C. Морсколуковой.

R. *Aceti scillitis* bilibram,

Sacchari albi libras tres et semis.

Fiat leni calore solutio, ut sit syrpus.

D. Drachma ad tres per se, vel in connubio aliorum.

V. *Mistura scillina.*

S Y R U P U S S I M P L E X.

C. простой.

R. *Aquae fontanalis* bilibram,
Sacchari albi libras tres et semis.

Misce et leni cocta igne cola.

U *Decocturae, Infusiones, Misturae, Haustus,* eo edulcorantur; ad formandas quoque *pilularum* massas adhibetur.

S Y R U P U S Z I N G I B E R I S.

C. инбирный.

R. *Radicis Amomi Zingiberis* tritæ sescunciam,
Aquae communis sesquilibram,
Alcoholis diluti libram,
Sacchari puri libras tres et semis.

Radicem digere vase leniter clauso in *Alchohole diluto* per nychthemeron, dein colato liquori adde: contritum *Saccharum*, ut syrpus fiat.

Et *aromate suo*, et *gratia*, qua se commendat, merito præferatur ceteris.

T A R T R A S S T I B I I et P O T A S S Æ.

TARTARUS STIBIATUS Ph. Bor.; TARTARUS EMETICUS
Ph. Ross.

Соль рвотная виносюрьмяная.

R. *Supertartratis Potassae* triti partes quatuor,
Suboxydi Stibii fusi partes tres.
Commista injiciantur in
Aquæ communis partes decem.

In vase vitro arenæ imposito, ebulliant per sesquihoram. Calentia adhuc filtrantur et ad crystallisationis momentum

evaporata, per noctem reponantur. *Liquor* residuus a crystallisatione evaporet, ut denuo crystalli effingantur. Collectas dein et siccatas simul in mortario lapideo, aut vitro in pulverem terito, vitro probe clauso, adservandum.

Q. Continet, si *THENARDO* fides habenda, in centenis partibus: *Suboxydi Stibii* 38, *Acidi tartarici* 34, *Potassae* 16, et *aquae* 8. Format crystallos tetraëdra referentes, metallici stypicique saporis. Ad gr. 212 th. *F.* solvit pars earum *aquae destillatae* partibus tribus; ad gr. 60 ejusdem th. part. quindecim (*DUNCAN.*) Aëri expositæ albescunt et opacæ sunt.

V. Stimulans, refracta dosi nauseam, sputum, lotium sudoremque (constrictionem vasorum exhalantium abnormem sublevando) promovens; antispasmodica; majori vero emetica, haud raro cathartica. Cuti inficatus irritat pustulasque elevat, quæ *frictione* repetita exaggerantur.

U. Commendatur initio febrium acutarum, in typhum proclivium, ubi exiguis dosibus cum *Submuriate Hydrargyri* et *Opio* exhibetur; in aliis etiam diuturnis morbis cum nevroblacia vasorum absorbentium conjunctis, in scrofulosis adflectibus, in hydropisi, melancholia, in suffocationibus, devoratis *narcoticis venenis*, aut e mephyticis exhalationibus, ortis; in apoplexia hydrocephalica utilis esse censetur, uti etiam, ubi contenta exinanitione per superiora educi juvat. Hunc in finem apte cum *C. Ipecacuanha*, ad vim ejusdem augendam conjungitur; minus vero commode, ut *MARRYAT* vult, cum *Subphosphate Cupri*. Ubi alvum ab inferiori simul parte evocari lubit, pauxillum *Amyli triticini* et *Supertartratis Potassae* adjectum prodest. Non ita huic connubio aptus est *Sulphas Soda*e, aliive *Sales neutri* ob decompositionis metum. Cum *Muriate Soda*e, ut scite observat *LESSONE*, *aquæ* portione mistus, naturam cathartici induit. Scire licet, ut cate innuit cl. *GOVOROW* (*Dissert. febrium nervosam epidemicam exhibens Petropoli* 1809 p. 57) Tartratem *Stibii* et *Potassae*, minus convenire hominibus mobili nervorum systemate præditis, ac potissimum febribus sthenicis esse alienum, cum haud imminuat, sed potius

adaugeat systematis vasculosi reactionem, periculum sub emesi, pro certo, minaturum. Extrinsecus forma *emplastri*, *solutio-*
nis, *unguenti* admovetur, ut stimulans, calefaciens, rubefaciens,

pustulas producens; *unguentum* hoc stimulat, resolvit; admota
 vero ab omnini frictione provocat vomitiones, imo, adjecto *Sub-*
muriate Hydrargyri in tumoribus glandularum, jecinoris, te-
 sticularum, respondisse experimenta testantur. In alvum subter-
 datus plerumque dicit eandem, subinde vomitum cit et
 sic in herniis incarceratis et enterodynia prodesse fertur. Ul-
 cera rebellia supercrescentia recte respurguntur *pulvere* ejus-
 dem. *Solutio* vix tantam in curanda ophthalmitude et maculis
 corneae promittit utilitatem, quanta a quibusdam prædicatur;
 commendatur etiam pro *balneis ablutionibusque*, si fortior erit,
 verrucas venereas egregie eradicat.

D. An ad vomitum ciendum auctior, aut exigua sit propinanda
 dosis ex ratione ætatis irritabilitatisque æstimari oportebit; in an-
 nicalis ab una quarta grani parte ad dimidium ejusdem; bi-
 mulis vel trimulis a dimidio grani ad integrum; ætate majo-
 ri usque ad octennem; fortioris habitus a grano ad sesquigra-
 num, adultis demum a duobus ad tria grana, in totidem un-
 ciis *aquaæ soluta*, cochleari pro re nata majori vel minori,
 omni quadrante vel semihora, donec vomitum ciet propinan-
 da. Si pro varia ægrorum indole in minori dosi, quam pro
 vomitione cienda opus sit, præscribatur, tum passim vicario
 catharticorum munere fungitur et additus catharticis, eorum
 vim intendit; in dosi vero adhuc minori alterantis, antispasmo-
 dici, sudorifici vices implet, addito præcipue *Carbonate Cal-*
cariae, idque a sexta ad tertiam grani *Tartratis Stibii* et *Po-*
tassae partem et *Carbonatis Calcariae et Sacchari*, utriusque gra-
 nis quinque, tertia vel quarta quaque hora auctore FORDYCE.

V. *Emplastrum ad strumam*; — *Conii compositum*; — *Galbani*
stibiatum; *Linimentum stibiatum*; *Solutio Tartratis Stibii*; — — —
camphorata; *Unguentum stibiatum*; *Vinum stibiatum*.

TINCTURA ACONITI.

Н. прострѣльной травы.

R. *Foliorum* recenter exsiccatorum *Aconiti neomontani* semunciam,

Alcoholis diluti uncias duas.

Macera in vase clauso per septimanam saepius agitando et
cola.

U. Myodyniae rheumaticæ, arthrodyniae, notas astheniae fe-
rentibus, a guttis decem, ad viginti per se, vel in connubio
aliorum, exhibita, cum successu obponitur.

TINCTURA ACONITI COMPOSITA.

Н. простр. пр. сложная.

R. *Succi Aconiti* recenter spissati,

Camphorae, utriusque drachmas duas,

Tartratis Stibii et *Potassae* scrupulum,

Alcoholis diluti uncias quinque,

in vas vitreum dimitte agitando, ut solvantur et cola.

V. Excitans; narcotica; antispasmodica; secretiones, exhala-
tionem præsertim cutaneam, et sputum sollicitans.

D. Guttæ viginti, dosin gradatim, pro re nata, ad drach-
mam, augendo.

TINCTURA AROMATICA.

Н. ароматическая.

R. *Pulveris aromatici* uncias duas,

Alcoholis diluti libras duas et semis,

digere per hebdomadem, et cola.

D. A drachma ad semunciam præbetur.

TINCTURA AROMATICA ACIDULATA.

SULPHURICA.

ACIDUM SULPHURICUM AROMATICUM.

Н. аром. кисловая.

R. *Corticis Lauri Cassiae* semunciam,
Radicis Amomi Zingiberis sescunciam,
Alcoholis bilibram,
digere lenissimo igne in vase clauso per septimanam,
colaturæ adde guttatum:
Acidi sulphurici selibram,

Cola per chartam bibulam super infundibulum vitreum posita-

U. Imbecillo stomacho, notis lentæ febris stipato, post dialeipyras, superstite, conducit propinatis decem ad triginta, in convenienti aquæ quantitate, guttis.

TINCTURA ASSÆ AMMONIATA.

Н. вонючая спирто-амміаковая.

R. *Alcoholis ammoniati* uncias novem,
Gummiresinae Assæ foetidae semunciam,
in vase clauso digere per decem horas, tandem aquæ bullientis calore unciæ novem, in receptaculum destillent.

V. Stimulans; antispasmodica.

U. Adversus varios asthenicos morbos, stomachi languorem, inflationem, spasmos hystericos: a semidrachma ad drachmam, ex quavis convenienti aqua aromatica exhiberi potest.

TINCTURA CÁLAMI.

Н. ирная.

R. *Radicis Acori Calami* sescunciam,
concisæ adfundito:
Alcoholis diluti libram.

Vase clauso ad sufficientem extractionem digeratur; *tinctura* filtretur, usui servanda. Perraro sola a drachma ad duas, et

amplius propinatur, saepius *misturis* additur, ut succedanea, exoticis *aromatibus* majoris dispendii, haud immerito subrogatur.

TINCTURA CATECHU.

Н. ЯПОНСКАГО СОКА.

R. *Extracti Catechu semunciam,*
Corticis Lauri Cassiae unciam,
Alcoholis diluti, vel
— — — impuri libram.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

U. In profluviis et sanguinis et alvi, et pituitae, quæ solam agnoscent laxitatem, et torporem vasorum, auxilium fert.

D. Drachma (ad tres) in quolibet vehiculo idoneo datur. Eodem modo paratur: *Tinctura Tormentillae erectae*, medicamentosa virtute vix postponenda præcedenti, quibus haud male *anodynæ*, et *aromatica* adduntur, præsertim ubi citæ alvo medicinam fieri expedit.

TINCTURA CINCHONÆ.

Н. Х и н ы.

R. *Corticis Cinchonæ officinalis uncias quatuor,*
Alcoholis diluti libras duas et semis.

Digere per septimanam, et cola.

D. Drachma (ad semunciam) exhibetur.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

Н. Х и н ы с л о ж н а я.

R. *Corticis Cinchonæ officinalis pulverati selibram,*
Radicis Acori Calami concisæ,
Fructus Citri Aurantii immaturi, utriusque semunciam,
Alcoholis diluti libras quatuor.

Digere per septem dies atque cola.

D. Drachma ad tres per se, vel in quovislibet convenienti liquido.

TINCTURA COCCIONELLÆ SEPTEMPUNCTATAE.

Н. Козявки семипочечной.

R. *Coccionellas septempunctatas* recentes No IX.

In mortario lapideo comminutas cum uncia *Alcoholis diluti* conterito, atque per septimanam, sub frequenti motitatione, vas soli exponito, et *Tincturam tela lanae colatam*, atque in vase rite obturato usui servandam, habebis.

V. Stimulans; narcotica; in odontalgia etiam efficax. Laudatur etiam in morbis nervorum, et doloribus. (SAUTER.)

D. Guttæ viginti ad triginta ex quovis vehiculo convenienti administrantur.

TINCTURA DIGITALIS.

Н. Наперсточной травы.

R. *Foliorum recentium Digitalis purpureae* unciam *Alcoholis diluti* uncias octo.

Misce et digere leni calore per hebdomadem, dein *tincturam* per chartam cola (MACLEAN.) Hujus guttæ quindecim ad viginti *foliorum* grano æquiparabiles.

D. Guttæ decem, adscendendo gradatim ad triginta, et amplius ter de die cum uncia *aquaæ* cuiuslibet *aromaticae* v. g. *Menthæ*, vel *infusi amari* propinantur. Addito *succo Citri medicae* maiores quoque doses feruntur. Vel

R. *Foliorum Digitalis purpureae* in pulverem crassum redactorum unciam,

Alcoholis diluti uncias quinque.

Digere leni calore per dies septem, dein per chartam colato.

D. Guttæ quindecim, viginti, adscendendo ad nonaginta, vel centum (DRAKE.)

TINCTURA DIGITALIS COMPOSITA.

Н. Наперст. пр. сложная.

R. Foliorum exsiccatorum *Digitalis purpureae* drachmas sex,
Radicis Scillae maritimae recens siccatae drachmas quatuor,
Aetheris nitrici alcoholisati uncias octo.

Macera in vase vitro clauso per hebdomadem sub temperatu frida, inter macerandum saepius agitando, et cola.

V. hujusce diuresin movens efficacior est, quam præcedentium.

U. Guttae decem, (sensim sensimque dosin ad quadraginta augendo) mane et vesperi propinatae hydropicis utilitatem promittunt.

TINCTURA EUCA LYPTI.

Н. Ершеника смолистаго.

R. Succi *Eucalypti concreti* unciam,
Alcoholis diluti selibram,
Digere per septimanam, et cola.

TINCTURA GEI URBANI.

Н. Гвоздичника.

R. Radicum *Gei urbani* unciam,
Alcoholis diluti libram.

Digere per septimanam, ut fiat *Tinctura*, filtranda, servanda-que usui.

V. *Tincturæ Cinchonæ succedanea.*

D. *Cochlearis mensura exhibetur.*

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

Н. Горечавки сложная.

R. Pulveris radicis *Acori Calami*,
----- *Gentianæ luteæ*, utriusque unciam,

*Fructus Citri Aurantii immaturi,
Pulveris aromatici, utriusque drachinam,
Alcoholis diluti sesquilibram.*

Digere per quatriduum, cola et servato. *Tincturae Whyn-*
tii, in privatis obtentae officinis, subpar.

D. A semidrachma ad duas drachmas commode datur.

TINCTURA GUAJACI.

Н. бакаутной смолы.

R. *Gummiresinae Guajaci officinalis uncias quatuor,
Alcoholis diluti libras duas et semis.*

Digere per dies septem et per chartam cola.

U. In myodynia rheumatica, arthrodynia, auxilium spondet.

D. A drachma ad tres, bis terve de die, in quovis idoneo
vehiculo.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

Н. бакаутно-аммиаковая.

R. *Gummiresinae Guajaci officinalis uncias quatuor,
Alcoholis ammoniati sesquilibram.*

Misce et macera per septimanam in vase bene clauso, et per
chartam cola.

D. Drachma (ad duas,) mane et vesperi e quovis vehiculo,
(lacte præsertim, vel sero ejusdem) administratur.

TINCTURA HUMULI.

Н. хмельная.

R. *Pulveris conorum Humuli Lupuli unciam,
Alcoholis diluti selibram.*

Digere per dies octo, et cola.

D. Guttæ triginta ad sexaginta (vel deficiente *Tinctura* hac)
exhibe: *Pulveris conorum Humuli Lupuli grana decem ad scrupu-*
lum hora decubitus, superbibendo succi Citri medicae, vel
Acidi acetici diluti impuri, cochlear. Iisdem fere virtutibus gau-
det, ut Opium.

TINCTURA HYOSCYAMI.

H. б е л е н ы.

R. *Foliorum Hyoscyami nigri siccatorum unciam,*
Alcoholis diluti uncias octo.

Digere per dies septem et per chartam cola.

V. *Tincturae Opii, medicamentosa virtute, in variis, præ-*
sertim externis morbis, vix cedit.

D. *Guttæ viginti ad sexaginta præbentur.*

TINCTURA LYTTÆ.

TINCTURA CANTHARIDUM Ph. Ross.

H. шпанскихъ мухъ.

R. *Lyttæ vesicatoriae pulveratæ unciam,*
Alcoholis diluti libram.

Digere per quatriuum et per chartam cola.

U. *Hydrops; polyuria (diabetes) utraque, mellita pariter ac insipida; gonorrhœa; enuresis a paralysi urocystidis orta; anaphrodisia; raro tamen interne adhibetur, idque a guttis sex, decem, viginti, aucta cautim dosi, in vehiculo quopiam idoneo, uti cum aqua, vel aptius cum mucilagine gummi Acaciae verae, vel mistura gummiresinae Heraclei gummiferi, ad guttas triginta ter quaterve de die. Interdum singulis præbiis, Tincturae Opii camphoratae drachma additur, præcipue in pertussi, quoadusque levis stranguria fuerit oborta. Extrinsecus: in primis pro fricationibus, vel sola, vel cum linimento quovis irritante, adversus arthrodynamiam, myodyniam rheumaticam, debilitatem membrorum, paralysin adhibetur.*

V. *Linimentum Saponis rubefaciens.*

TINCTURA MOSCHI.

H. м е с к у с о в а я.

R. *Moschi Sinensis drachmam,*
Alcoholis diluti selibram.

Digere per septimanam, et colla.

U. In typho, subsultibus tendinum, aut convulsionibus, stiptato; in merbis spasmodicis etc., commendatur.

D. Drachma, duæ, in idoneo vehiculo aliquoties de die.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

Н. Солекислого желѣза.

R. *Ferri limati* uncias tres, vel
Suboxydi Ferri praeparati, vel
Carbonatis — *praecipitati* tantundem,
Acidi muriatici uncias circiter decem, vel
 quantum sufficit ad solvendum pulverem.

Digere leni calore et solutioni adde:

Alcoholis, quantum sufficit,
 ut sint totius liquoris libræ duæ et semis.

U. Est excellens *antiasthenicon*, leniter adstringens, quod in omnibus adhiberi potest casibus, ubi debilitatis *medicamina*, e re fore existimantur, et quidem a guttis decem ad viginti bis terve de die; in dysuria, strictura urethræ spasmodica guttæ decem ad quindecim singulis horæ quadrantibus, donec nausea aliæve universalis relaxationis notæ, supervenerint. Externe: tumores scirrhosi; verrucæ, etc., *eadem*, tractantur.

TINCTURA MURIATIS FERRI ALCOHOLISATA.

Н. соленокислого Желѣза спиртная.

R. *Ferri limati* partem,
Nitratis Potassae depurati partes duas,
Muriatis Sodaæ depurati,
Acidi sulphurici,
Aquæ communis, singulorum partes quatuor.

Prima *solida* ingredientia in subtilissimum pulverem tenuentur atque vitro pharmaceutico immittantur, quibus admisceatur primo *aqua communis*; dein vero *Acidum sulphuricum* sub continua concussione sensim sensimque instilletur, orta exinde

solutio lenissimo calore ad siccitatem evaporet, huic salinæ (flavo-brunei coloris) massæ infundantur: *Alcoholis (Vini)* partes octo, quæ *tinctura* eousque digeratur, donec *Alcohol* flavo-bruneum colorem acceperit; tunc autem per chartam bibulam filtretur et pro usu in vitro bene obturando servetur. *Tinctura* hæc, *Muriatæ Ferri* tenens, methodo cl. NELVUBIN præparata, est levioris pretii, semihora parari potest, nec facile decomponitur, atque ceteris merito anteponenda est.

V. *Mistura Myrrhae ferrata; Murias Ammoniae ferratus.*

T I N C T U R A M Y R R H E.

H. Мирры или Смирны.

R. *Gummiresinae Myrrhae* tritæ uncias tres,
Alcoholis diluti uncias viginti,
Aquaæ puræ uncias decem.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

U. In primis externus: cariei ossium ulceribusque sordidis apta; *gargarismatibus* pariter, ac *lotionibus* quoque non est aliena. Interne: rarius asthenicis, dyspepsia laborantibus a semidrachma ad drachmam, propinatur.

T I N C T U R A O P I I.

H. Опия.

R. *Opii puri* (in pulvere) unciam,
Alcoholis diluti libram.

Terendo solve, dein leni calore digere per dies septem, et tunc colaturam, per chartam coactam, serva. Drachma *Tincturae*, (vel guttae 100 ejusdem,) *Opii* grana quinque continent; evaporatione attamen grana tria et semis tantummodo redintegrantur.

D. Guttæ viginti (granum,) ad quadraginta guttas, (grana *Opii* duo continentes,) in quovis vehiculo idoneo, per se, vel in

connubio aliorum, quæ effectum ejus intendunt, vel morantur, vel mutant, vel temperant, adposite administrari possunt.

V. *Clyster opiatus; Haustus —.*

TINCTURA OPII AMMONIATA.

Н. Опія спиртно-амміакова.

R. *Opii puri* semunciam,
Olei Pimpinellae Anisi drachmam,
Alcoholis ammoniati uncias triginta duas.

Macera frigide per septimanam, et per chartam cola. Drachma (100 guttæ) granum circiter *Opii* continet.

D. A guttis triginta ad drachmam offertur.

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

Н. Опія камфорна.

R. *Opii puri*,
Camphorae,
Olei Pimpinellae Anisi, singulorum drachmam,
Alcoholis diluti bilibrام.

Digere per quatriduum lenissimo calore et cola. Semuncia *tincturae* hujus (mensura,) continet granum circiter *Opii*.

D. A guttis triginta ad drachmam, duas, exhibetur. Addita tercia parte *Tincturae Scillæ* egregium aptumque fit, tussi, catarrhoque incipienti, medicamen. Addita *Acidi benzoici* drachmæ, fiet *Elixir paregoricum*, a Britannis usitatum.

TINCTURA OPII CROCATA.

LAUDANUM LIQUIDUM Ph. Ross.

Н. Опія шафранна.

R. *Opii puri* uncias quatuor,
Stigmatum pistilli Croci sativi sescunciam,

*Florum Eugeniae caryophyllatae immaturorum,
Corticis Lauri Cassiae, utriusque drachmas duas,
Vini Malacensis bilibram.*

Infunde ac digere donec *Opium* fuerit solutum, tum expime, cola et post subsidentiam filtra. Guttæ ejus sex, *Opii* granum habent.

D. A guttis tribus ad sex, et ultra, exhibetur.

V. *Collyria varia.*

TINCTURA POTASSÆ FUSÆ.

Н. Ъдкопомашная.

R. *Potassae fusae*, recenter paratæ, uncias duas, in ferreo calente mortario in pulverem tenuatam immittito in *Alcoholis*, (in cucurbita leviter calefacti,) libram. Agitentur bene, tum imposito alembico digerantur arenæ balneo per aliquot dies. *Tinctura usui* servetur.

Q. *Tinctura*, hac ratione obtenta, est rubicunda. Interdum singulæ ejusdem unciæ addere licet scrupulum *Olei Cari Carni*, vel — *Pimpinellae Anisi*.

V. Fines serosarum arteriarum sollicitans; resolvens pituitam, sub morborum, hinc pullulantium, nevroblacico apyretoque statū.

U. In hypochondriasi, colluvie primarum viarum pituitosa, incipiente hydropisi, scrofulis, rachitide, urolithiasi (ДЕННЕ,) arthrodynia, podagra, tumoribus adenemphracticis (ТНЕДЕН,) scirrhis, herpetibus, blennorrhœa, vel eadem suppressa resuscitanda, ardore lotii (ДЕННЕ,) leucorrhœa, ulceribus canceraticis etc., (ТНЕДЕН.)

D. A decem ad viginti, quadraginta, imo etiam sexaginta guttas, in uncia aquæ destillatae diluendas, porrigitur.

TINCTURA RHEI AMARA.

Н. Ревенная горькая.

R. *Radicis Rhei palmati* unciam,
— *Gentianæ luteæ* drachmas duas,

Radicis Amomi Zingiberis drachmam,

Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere per dies septem et per chartam cola.

D. Semuncia (ad sescunciam) præbetur. Interdum præcedenti additur: *gummiresinae Aloës perfoliatae* semuncia et tunc habebis: *Tincturam Rhei* et *Aloës*, sic dictam, cuius semuncia ad unciam propinatur, si alvum ducere lubet; quibus vero ea habitualiter adstricta est, iis minores doses, quotidie aptiores sunt.

TINCTURA SCILLÆ.

Н. Морского лука.

R. *Radicis Scillæ m. exsiccatæ et contusæ uncias duas,*

Alcoholis diluti libram. Misce.

Digere per dies septem, et cum subsederint fæces, liquorem cola.

D. Guttæ decem (ad quinquaginta) administrantur.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

Н. Александрийской Сennы сложная.

R. *Foliorum Cassiae Sennæ unciam,*

Radicis Convolvuli Jalappæ semunciam,

Seminum Cari Carvi,

Radicis Amomi Zingiberis, singulorum drachmas duas,

Alcoholis diluti uncias viginti.

Digere per dies septem et tincturæ colatæ addito:

Sacchari purissimi uncias duas.

D. Ex quovis vehiculo apto ad semunciam, (vel in connubio aliorum, præsertim salium neutrorum, eadem virtute, pollen-tium,) administrari cum fructu potest.

TINCTURA VALERIANÆ AETHEREAL.

Н. Мауна эфирная.

R. *Pulveris radicis Valerianae officinalis unciam,*

Infunde:

Aetheris sulphurici uncias octo.

Macera vase clauso, sine calore, per dies septem et per chartam cola.

V. U. et D., ut *Aetheris sulphurici;* præstantior tamen est haec quibusdam in casibus.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATÆ.

Н. Мауна спирто-амміаковая.

R. *Radicis Valerianæ officinalis uncias duas,*

Alcoholis ammoniati libram.

Macera frigide, vase clauso, per quatriduum, dein cola.

U. Morbi spasmodici, epilepsia etc., ea curantur.

D. Drachma (ad tres,) in vehiculo idoneo, porrigitur.

TINCTURA VALERIANÆ CAMPHORATA.

Н. Мауна эфирно-камфорная.

R. *Tincturae Valerianæ aethereæ drachmas sex,*

Camphoræ drachmam. Solve.

U. In arthrodynia retrograda (anomala,) variisque spasmodicis adynamiis, in ea præsidium est.

D. Guttæ viginti (ad quinquaginta) pro dosi dantur.

TROCHISCI SPONGIÆ COMPOSITI.

Лепешки Гречкой губки сложные.

R. *Carbonis Spongiae officinalis uncias duas,*

Pulveris gummi Acaciae verae drachmas totidem,

— *corticis Lauri Cinnamomi semidrachmam,*

Syrupi — Citri Aurantii, quantum satis,

ut fiat massa, longiori lentaque trituratione, addito sensim sensimque Syrupo, subigenda, ex qua formentur *Trochisci* viginti quatuor, super patinam *Oleo illitam*, siccandi.

U. Quotidie *Trochiscus*, summo mane, est continendus ore, donec solutus fuerit, dein sensim devorandus; præterea subsidiariam opeū ferent: **PULVIS SPONGIÆ COMPOSITUS**, (ut præscriptum est, sumendus,) **EMPLASTRUM ad STRUMAM**, et **LINIMENTUM BILIS SALINUM**, extrinsecus admovenda.

UNGUE NTUM ACETATIS CUPRI.

Мазь уксусокислой мѣди.

R. *Unguenti resinosi* partes quindecim,
Acetatis Cupri partem.

Commisceto. Quandoque pauxillum *Adipis suillae depuratae*, crassitudinis debitæ ergo, additur commode.

V. Stimulante, detergente, leniter escharotica vi, phagedæcæ cum successu, medetur.

UNGUE NTUM ACETATIS CUPRI COMPOSITUM I.

М. уксусокислой мѣди сложная 1.

R. *Acetatis Cupri* semunciam,
Oxydi Zinci impuri (*Tutiae,*)
Camphoræ ope aliquot guttarum *Alcoholis* in subtilem
pulverem tenuatæ, utriusque sescunciam,
probe contritis in calenti mortario adde:

Adipis ovillæ depuratae,
— *suillæ* —, utriusque uncias quatuor. Vel

UNGUE NTUM ACETATIS CUPRI COMPOSITUM II.

М. уксусокислой мѣди сложная 2.

R. *Acetatis Cupri*,
Oxycarbonatis Zinci praeparati,
Camphoræ, singulorum drachmas sex,

*Oxydi Zinci impuri (Tutiae) drachmam,
Adipis suillae depuratae uncias octo.*

Conterendo examussim longiori tempore, fiat lege artis unguentum.

U. Utrinque hoc UNGUENTUM ACETATIS CUPRI COMPOSITUM in ophthalmite palpebrarum chronica, trichiasi etc., palpebras (noctu dormituris) iungendo, proficuum est, illi, quod Londini, *Smellome's Ointment*, nomine insignitur, vix non æquiparabile. Posterior formula antiquior est.

UNGUENTUM ACIDI SULPHURICI.

M. Сърнокислая.

R. *Adipis suillae depuratae unciam,*
Acidi sulphurici guttas triginta.
Commisceto.

In foeditatibus cutis: psora, herpete etc., auxilium spondet.

UNGUENTUM BETULINUM.

M. Березовыхъ свѣжихъ листовъ.

R. *Foliorum recentium Betulae albae partem,*
Adipis ovillae depuratae, vel
— suillae — partes duas.

Contunde et fortiter tere in mortario lapideo per aliquot horas, donec adeps viridescet, dein massa leni calore, quoad omne humidum avolarit, colliquescat, atque per linteum expressa servetur.

U. In ulceribus psoricis, herpeticis, scrofulosis, scorbuticis, imo et gangraenosis, cum tertia lignarii carbonis (betulini) parte, est efficacissimum.

UNGUENTUM CONII.

M. Омеговая.

R. *Succi foliorum Conii recenter expressi selibram,*
Adipis suillae depuratae bilibram.

Coque leni igne donec omne humidum avolarit.

U. Ulcera carcinomatosa, scrofulosa, aliave phagedænica
rebellia, tumores glandularum etc., recte curantur eo.

UNGENTUM INULINUM.

М. Девясильная.

R. *Radicis Inulae Helenii* pulveratae selibram,
Aquae fontinalis libram,
coque ad consistentiam pultis, dein probe movendo
adde:
Adipis suillae depuratae selibram,
et coque simul leni igne, (donec omne humidum a-
volarit,) ut fiat unguentum.

U. In fœditatibus cutis: psora, herpētē etc., partes adfectas
omni vespere inungendo, est efficax.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS.

UNGENTUM CITRINUM.

М. Селипроптупная сильная.

R. *Hydrargyri depurati* partem,
Acidi nitrico-nitrosi partes duas,
Adipis suillae depuratae partes tres,
Olei napini, vel
— *olivi*, vel
alterius congrui partes novem.

Hydrargyro cum *Acido* super arenam rite digesto, fiat solutio,
quæ adhuc calens, cum *adipe* commisceatur denuoque frige-
scens, in mortario vitro probe subacta, *unguentum* exhibet.
Haud dispari ratione cum triplici *adipis* quantitate sit:

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS,

(М. проптупно-селиптральная слабая)

variis palpebrarum indurationibus et ulcusculis, astheniae no-
tas ferentibus, illinendo, peridoneum.

UNGuentum NITRICATUM FORTIUS.

М. селипрокислая сильнейшая.

R. *Adipis suillae depuratae recentis uncias octo,*
Acidi nitrico-nitrosi unciam.

Adipi in vase figulino vitreato, calore leni liquefactæ, adfunctur *Acidum*, ebulliente dein massa, vas ab igne removetur, ut frigescat eadem. Dum hæc fiunt, *acidum* decomponitur, *oxygene* cum *adipe*, conjuncto; *azoto* autem avolante. Vase clauso obscuroque loco, servetur.

U. Indurationibus glandularum, ulceribus syphiliticis, herpeticis, psoræ et id genus aliis, extrinsecus ungendo, admotum, est efficax.

UNGuentum NITRICATUM MITIUS.

М. селипрокислая слабая.

R. *Adipis suillae depuratae recentis libram,*
Acidi nitrico-nitrosi unciam.

Massa igni exposita, baculo vitro jugique motu, diligenter agitetur, donec ebullire cœperit; dein ab igne remota teratur, quoad frigefacta fuerit.

UNGuentum OLIVI CERATUM.

М. оливовощаная.

R. *Olei olivi partes tres,*
Cerae albae partem,
Liquescentia lege artis commisce.

UNGuentum OXYDI ARSENICI ALBI.

М. мышьяковая.

R. *Oxydi Arsenici albi subtilissime pulverati grana decem,*
Butyri recentis insulsi sescunciam,
Cerae albae semunciam.

Colliquefactis adde Oxydum Arsenici album et fiat unguentum, ulceri carcinomatoso, ter in die, illinendum.

UNGUENTUM OXYDI ARSENICI COMPOSITUM.

М. мышьяковая сложная.

R. *Oxydi Arsenici albi grana sex,*
Aqua destillatae drachmas totidem,
solve et admisce:
Superacetatis Plumbi liquidi,
Extracti Cinchonae officinalis,
Succi Conii spissati, singulorum unciam.

Misce fiat unguentum, ter vel pluries de die, carcinomati admovendum.

UNGUENTUM OXYDI HYDRARGYRI RUBRI.

М. красно-осадочной Ртути.

R. *Unguenti Olivi cerati, vel*
Butyri recentis insulsi semunciam,
Oxydi Hydrargyri rubri, subtilissime pulverati, grana
decem.

Misce (ut fiat lege artis unguentum) exactissime.

Interdum, pro re nata, etiam quindecim grana *Oxydi Hydrargyri rubri* adhibentur. Si huic *Succi spissati Hyoscyami* semi-scrupulum, vel scrupulum, aut *Aluminac* tantumdem addideris, tum habebis: **UNGUENTUM OXYDI HYDRARGYRI ALUMINATUM, vel — — — HYOSCYAMINUM.**

UNGUENTUM OXYDI HYDRARGYRI ZINCIQUE.

М. ртутьно-красной и цинковой Окиси.

R. *Unguenti Olivi cerati, vel*
Butyri recentis insulsi semunciam,
Oxydi Hydrargyri rubri subtiliss. pulv. grana decem,
— Zinci grana sex.

Misce exactissime, ut fiat unguentum, cui si lubet adde; Tincturae *Opii crocatae* guttas duodecim, vel *Opii grana* duo.

U. Quodlibet horum **Oxydi Hydrargyri Rubri** unguentorum bis de die internis palpebris, cum successu admodum potest, lenti magnitudine, secretionemque asthenicam præternaturaliter auctam magnopere reprimit, humores, qui modo ipsum oculum, modo angulos, aut palpebras, exasperant, coercent, easque crassas, duras resolvit, ac corneæ maculas transparentis, extenuat, ad glandulas induratas, trichiasin, distichiasin, hypopion, et vitia similia dissipanda haud parum confert, et ulcera istarum partium cicatriscat. In universum, quum de compositione eorum agetur, ratio sensibilitatis affectæ partis, est habenda.

UNGuentum Phosphoricatum.

М. Фосфорно-кислая.

R. *Acidi phosphorici* drachmam,

Adipis suillae depuratae unciam,

Leni igne fusa probe commisceto.

U. Arthrodynia; tumor ossium rachiticorum, ei cedunt.

UNGuentum Picis Ceratum.

UNGuentum Basilicum Ph. Ross.

М. варо-вощаная.

R. *Resinae empyreumaticae pineo-sylvestris* uncias duas,

Ceræ flavæ unciam,

Olei olivi semunciam.

Commista liquefiant leni calore in unguentum.

UNGuentum Picis Sulphuratum.

М. деготинно-сърная.

R. *Olei empyreumatici pineo-sylvestris* libram,

Sulphuris sublimati uncias quatuor,

Ceræ flavæ unciam.

Cerae et *Oleo* colliquefactis gradatim addito *Sulphur*, ut in unguentum coéant. Idem subinde etiam sine *cera* est parabile.

U. In fœditatibus cutis: psora, herpete, tinea etc., adhibetur.

UNGENTUM RESINOSO-CERATUM I.

BALSAMO ARCEI (*Ph. Ross.*) succedaneum.

M. смоляно-восковая 1.

R. *Adipis suillae depuratae,*
Resinae balsami pineo-sylvestris,
Cerae flavae,
Olei olivi, singulorum partem.

Misce et colliquefiant, lege artis, in unguentum.

UNGENTUM RESINOSO-CERATUM II.

M. смоляно-восковая 2.

R. *Adipis suillae depuratae partes octo,*
Resinae balsami pineo-sylvestris partes quinque,
Cerae flavae partes duas,

Misce, colliquefiant in unguentum.

V. Linimentum resinosum.

UNGENTUM RESINOSUM.

M. канифольная.

R. *Resinae balsami pineo-sylvestris,*
Adipis suillae depuratae, utriusque pares portiones.

Colliquefacta lege artis, misce.

UNGENTUM SIMPLEX.

M. восковая.

R. *Adipis suillae depuratae partes quatuor, vel*
Olei olivi partes quinque,
Cerae albae, vel flavae, partem.

Commista liquefiant in unguentum. Si singulis ejusdem liquefactis et jam frigescientibus unciis, addideris: *Tincturae Lyttæ drachmas duas, vel semunciam, erit egregium stimulans unguentum, fonticulis et fricationi paralyticorum, accommodatissimum.*

UNGuentum STIBIATUM.

M. випо-сюрьмянай.

R. Tartratis Stibii et Potassae scrupulum,

Adipis suillae depuratae unciam,

Commisce. Interdum additur:

*Submuriatis Hydrargyri, vel**Suboxydi Hydrargyri nigri,**Camphorae tritae, utriusque scrupulum,*

V. Excitans; rubefaciens.

UNGuentum SUBOXYDI HYDRARGYRI.

UNGuentum MERCURIALE Ph. Ross.

M. р т у ш и а л.

R. *Hydrargyri depurati unciam,**Balsami pineo-laricini semunciam.*Contere, quamdui guttula, vel minima *Hydrargyri* adparuerit,
dein addito;*Adipis suillae depuratae drachmas quatuordecim, vel*
*Unguenti simplicis tantundem.*U. In syphilide drachmam, ad tres, pro una frictione, adhibendo. Si *balsamum pineo-laricinum*, hoc unguentum ingredens, irritando pustulas erythema æmulantes, excitari, adpliantibus *id remoram*, posituras, tum subsequens præfertur:R. *Hydrargyri depurati bilibram,**Adipis suillae depuratae uncias viginti tres,**Sevi praeparati unciam,**Hydrargyro* cum *Sebo* et pauxillo *adipis* in mortario lapideo, rite, donec globuli evanuerint, trito, admisce reliquias *adipis*. *Unguentum* hoc est valens et dum per frictionem, juxta decursum lymphaticorum vasorum internis femoribus, cruribus, brachiisve, vel ubi cuticula tenuior est, admoveatur, perfacile et absorbetur, et interiora penetrat; sed, ut *Hydrargyrum* oxydetur, multum temporis insumentum est triturationi.

Procedenti tempore fit fortius et rancidum, formatione in primis acidi sebacei plus oxydationis metallo impertientis. Ad facilitandam *Hydrargyri* extinctionem proponitur, ut trituratum cum portione antiqui unguenti instituatur, addendo subinde debitam adipis quantitatem, vel, ut ea, jam rancida, adhibetur, rancedine sensim trituratione, et pro ratione oxydationis *Hydrargyri*, privanda; incipendum tamen est pauxillo *Sebi ovillini*, si resistere lubet. Adhibita quoque adipe recenti, si addas tantillum *Acidi nitrico nitrosi*, quo extinctio *Hydrargyri* peragitur.

D. Drachma pro frictione mane et vesperi sufficit, quoad systema glandulare fuerit adfectum.

V. Linimentum Suboxydi *Hydrargyri*.

UNGUENTUM SUBOXYDI HYDRARGYRI NIGRI.

М. Черно-осадочная ртутная.

R. *Suboxydi Hydrargyri nigri* partem,

Adipis suillae depuratae partes quatuor,

Commisce. Admota internis femoribus, cruribus, brachiisve, juxta vasorum lymphaticorum decursum, fricatione, valens est adversus syphilidem, et in primis tumores syphiliticos; sed praecedentibus duobus unguentis postponendum est, cum non tam facile absorbeatur.

D. Drachma (et ultra) infricatur.

UNGUENTUM SUBOXYDI HYDRARGYRI NIGRI

COMPOSITUM.

М. Черноосадочной Ртутной сложная.

R. *Suboxydi Hydrargyri nigri*,

Oxydi Zinci, utriusque partem,

Adipis suillae depuratae partes quatuor.

Commisce.

U. In syphilide commendatur; præsertim vero ophthalmi-

tidi syphiliticæ, et ulceribus ejusdem indolis resistit cum successu. Nec frambæsiæ, ut quidam referunt, est alienum.

UNGENTUM SULPHURATUM.

Мазь сърная.

R. *Sulphuris sublimati* partem,
Adipis suillae depuratae partes quatuor.

Commisce lege artis in unguentum.

UNGUENTUM SULPHURATUM COMPOSITUM.

М. сърная сложная.

R. *Sulphuris sublimati* selibram,
Radicis Veratri albi pulveratæ uncias duas,
Nitratis Potassae depurati drachmam,
Saponis picei selibram,
Adipis suillae depuratae sesquilibram.

Commisce, ut fiat lege artis unguentum.

U. In psoræ curatione est maximæ efficaciæ. Libra hujuscæ unguenti quatuor frictionibus inservit, ideoque noctu dormituro quarta pars adsiduo, corporis prius in *balneo saponato* loti, quartæ parti est infrianda; dein vero eæ partes per aliquot noctes tangendæ, quæ plus foedatæ sunt. Quamvis morbus externo usu una portione profligari possit; nihil tamen minus tutius exhibetur cum **PULVERE SULPHURIS COMPOSITO** interne sumendo. Propulsata psora iterum *balneum saponatum* ad lavandum corpus adhibeatur.

UNGENTUM SUPERACETATIS PLUMBI.

UNGENTUM SATURNINUM.

M. уксусо-кислого Свинца.

R. *Cerati Superacetatis Plumbi*,
Olei olivi, utriusque pares portiones.
Colliquecant in unguentum.

U. Ut *Cerati* ejusdem nominis.

VAPORES ACIDI ACETICI.

И пары уксусокислые.

R. *Superacetatis Plumbi crystallisati*, vel
Acetatis Potassae liquidii, vel
 —— *Cupri*, quantum vis,
Acidi sulphurici, —— satis,
 ad *Acidum aceticum* penitus liberandum. Committito phialæ.

VAPORES ACIDI MURIATICI.

II. солекислые.

R. *Muriatis Sodaee depurati* et pulverati libras quinque.
 Committe vasi vitro amplo et gradatim adfundito :

Acidi sulphurici libras quatuor.

Contagionem correcturus vas vaporiferum de loco in locum,
 per cubiculum, transferto (GUYTON MORVEAU.)

VAPORES ACIDI NITRICI.

II. селишрокислые.

R. *Acidi sulphurici*,

Nitratis Petassae depurati et pulverati, utriusque pares
 portiones.

Salti in vase aperto, super arenam leniter calefactam, sensim
 additur *Acidum*, et vapores a JOHNSTON olim laudati; nunc
 vero a CARMICHAEL SMITH ab obliuione vindicati, surgent.

VAPORES ACIDI OXYMURIATICI.

II. Соленопресыщенно-кислые.

R. *Oxydi Mangani* pulverati drachmas sex,
Muriatis Sodaee depurati,

Nitratis Potassae —— utriusque uncias duas.

Commisce terendo, dein vasi vitro committe et addito:

Aquae purae semunciam.

tandem gradatim adfundito;

Acidi Sulphurici uncias duas, vel,

R. *Oxydi Mangani* pulverati drachmas sex,

Muriatis Sodaे ——— uncias quatuor¹,

Misce terendo; dein vasi vitreo committe et adde:

Aquae purae semunciam.

Tandem gradatim affunde:

Acidi sulphurici uncias duas.

V. *Vapores* a GUYTON MORVÉAU propositi, efficaciter adversus effluvia putrida, possunt, contagionem valetudinario-rum, carcerum, navium tollunt et eandem vestibus inhærentem destruunt; in quarantenis præcipue sunt magnæ efficaciæ. Vel

R. *Oxydi Mangani* grosso modo pulverati drachmam.

Committito phialæ vitræ, duas circiter uncias continent, eique adfundito:

Acidi nitrico-muriatici, quantum satis,

ut phiala ad duas circiter tertias repleatur, atque obturamen-to vitreo clade. *Vasa fumigatoria antiloimica*, nota sunt sub nomine: *flacons de desinfection*. Liquor hic, (levioris pretii,) duobus præcedentibus, præferendus est, ut diu conservabilis; attamen post aliquod tempus, pauxillo *Mangani* subinde addito, renova-tur. Antequam fumigatio instituitur, ægroti amovendi sunt, ne pul-monibus noxa inferatur. **VAPORES ACIDI SULPHURICI**, (*Gas sulphuricum*,) combustionē *Sulphuris* producti, a BUQUETO in suffocatione et asphyxia toxicathmica, naribus admovebantur; sed ob vehementem, quam illico excitant, tussim, merito damnantur.

V I N U M I P E C A C U A N H A E.

Вино рвотного корыня.

R. *Radicis Callicoccae Ipecacuanhae* contusæ unciam,

Vini albi uncias quindecim.

Macera per septimanam et per chartam cola.

D. Semuncia (ad unciam,) scopo vomitum ciendi, datur. Minoribus vero dosibus a guttis duodecim ad quadraginta, vices sup-

plet C. *Ipecacuanhae*, refracta dosi, propinatae, videsis: C. **IPECACUANHAM.** Si singulis præbile, succi *Hyoscyami spissati*, vel *Conii matulati* granum, vel *Opii* tantundem additur, vis ejusdem medica in catarrho intenditur; asthma etiam spasmodicum, declinante dysenteria, diarrhoea, eo curatur. In pertussi guttæ ejusdem quinque, *Tincturae Opii* una et *Subcarbonatis Soda* grana duo, quarta quaque hora (præmissis *emeticis*,) dantur infantibus.

V. Mistura Carbonatis Calcariae composita.

VINUM LUSITANICUM ARTEFACTUM.

Anglice *Port Wine.*

B. Португальское искусстvenное.

R. *Liquoris pomacei fermentati (Cyderae,) vel*
— napini — libras tres,
Alcoholis diluti (Spiritus vini gallici) libram,
Succi Eucalypti concreti drachmam,

Misce, et obturatum probe servetur. Si loco *succi Eucalypti concreti*, *Aetheris nitrici alcoholisati* drachmam addideris, *Vinum æmulans vetustum rhenanum* (britannice *Old Hock dictum*) habebis.

V I N U M S C I L L I T E S.

B: морско-луковое.

R. *Radicis Scillæ maritimæ recentis contusæ semunciam,*
Corticis fructus Citri Aurantii contusi,
Radicis Acori Calami contusæ, utriusque draclimam,
Vini albi libram,
digere per triduum et colatis adde:
Oxymellis scillini unciam.

U. Ob vires diureticæ in hydropisi et asthmate pituitoso, utilitatem promittit. Vis *Scillæ debilitans, incitantibus adjectis*, corrigitur et tum stomacho fit aptior.

D. *Cochlearii mensura sorbendum.*

VINUM SCILLITES JUNIPERINUM.

B. Морского Лука можжевеловое.

R. *Pulveris radicis Scillae m. contusæ drachmam,*
Baccarum Juniperi contusarum unciam;
Seminum Amomi Cardamomi contus. semidrachmam, vel
Pulveris aromatici tantundem,
Vini Sudacensis libram.

U. In hydrope magni aestimatur, propinato ter in die cochleari.

VINUM STIBIATUM.

B. сурьмяное.

R. *Tartratis Stibii et Potassae grana viginti quatuor,*
Vini albi dulcis libram.

Misce et solvito. In singulis unciis *Vini* hujuscे continentur grana duo *Tartratis Stibii et Potassae*.

U. In morbis ex transpiratione suppressa valet; laudatur etiam a quibusdam in pertussi, præsertim addito *Althææ syrupo dulcificatum* (BUCHHOLZ) vel—*opiato* atque omni quadrante horæ cochleari parvo, donec vomitus fuerit insecutus, porrectum. Præbia pro ratione ætatis adcommodata. Adultis semidrachma (ad drachmam) bis tere de die exhibetur; si vero vomitionem movere libet, semuncia (ad unciam) datur. Juvat etiam singulo præbio minori addere granum, aut sesquigranum *succi spissati Aconiti*, aut *Conii maculati*, aut *Hyoscyami*, vel grana quinque ad decem *extracti conorum Humuli Lupuli*, et tum adversus catarrhum, myodyniam rheumaticam, pertussim, aliaque similia mala, efficacius aget.

MULTUM EGERUNT, QUI ANTE NOS FUERUNT; SED NON PEREGERUNT; MULTUM RESTAT OPERIS MULTUMQUE RESTABIT, NEC ULLI NATO POST SÆCULA PRÆCLUDETUR OCCASIO ALIQUID ADHUC ADJICIENDI. SENeca.

I N D E X

**PAGINARUM, PHARMACA SIMPLICIA, PRÆPARATA,
ET COMPOSITA, SISTENTIUM.**

A.

Pars. Pagina.	Pars. Pagina.
Absinthium vulgare . . . I.	56. Adeps ovillina . . . I. . 51.
Acacia Catechu . . . — .	1. — suilla depurata . . II. . 17.
— vera	2. — Tauri pedum . . I. . 66.
Acetas Ammoniae liquidus II. .	3. Aerugo crystallisata . . II. . 4.
— Cupri	4. Aesculus Hippocastanum . I. . 13.
— Potassæ liquidus	5. Aether nitricus . . . II. . 18.
Acetum camphoratum	6. — — — alcoholisatus — . —
— destillatum	8. — sulphuricus 19.
— Saturni	281. — — — alcoholisat-
— scillites	7. — — — tus — . 20.
— Vini I. .	6. — — — eamphora-
— — — destillatum II. .	8. — — — tus . — . 21.
Achillea millefolium . . . I.	4. Agaricus Chirurgorum . . I. . 66.
Acidum aceticum . . . II.	7. Alcali causticum . . . II. . 202.
— dilutum . — .	8. — minerale — . 248.
— — — impurum I. .	6. Alcohol. — . 21.
— citricum concretum II. .	8. — ammoniatum — . 22.
— muriaticum . . . — .	9. — dilutum — . —
— nitrico-muriaticum — .	— — — amarum — . 23.
— — — nitrosum . — .	10. — — — antiseorbicu-
— nitricum . . . — .	— — — ticum — . —
— — — dilutum . — .	— — — camphora-
— oxymuriaticum . — .	11. — — — tum — . 24.
— phosphoricum . — .	12. — — — purissimum — . —
— — — concretum — .	14. — — — vini alcoholisatum — . —
— — — dilutum . — .	12. Alisma Plantago I. . 15.
— succinicum . — .	14. Allium Cepa — . 16.
— sulphuricum . — .	15. — sativum — . 17.
— — — dilutum — .	16. Aloë persfoliata — . 19.
— Tartari crystallisatum — .	17. — spicata — . —
— tartaricum . . . — .	— Althaea officinalis — . 21.
— vitriolicum . . . — .	15. Alumen crudum — . 274.
Acipenser stellatus . . . I.	9. — ustum II. . 283.
— Sturio — .	— Alumina — . 25.
Aconitum neomontanum . — .	11. Amomum Cardamomum . I. . 22.
Acorus Calamus — .	12. — Zingiber — . —
— verus — .	— Ammonia liquida . . . II. . 26.

	Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.
Ammonium carbonicum	II.	240.	Aqua extempor.	Pimpinellæ	
— mariatum	—	148.		Anisi	33.
— muriaticum	—	144.	— fortis	—	10.
Amylum triticinum	I.	24.	— Hussonii medicata	I.	292.
Anethum Fœniculum	—	—	— Hydrargyri caustica	II.	35.
Angelica Archangelica	—	25.	— hydrosulphurata aci-		
— sativa	—	—	— dula	—	—
Anthemis nobilis	—	27.	— marina artefacta	—	36.
Antimonium crudum	—	274.	— mephitica alcalina	—	38.
— præpara-			— malina	—	245.
ratum	II.	279.	— ophthalmica cœrulea	—	226.
Apis mellifica	I.	26.	— phagedaenica	—	35.
Aqua	—	31.	— regia	—	9.
— Acidi carbonici	II.	27.	— sulphurata artefacta	—	37.
— nitrici	—	28.	— Supercarbonatis Potassæ	—	—
— sulphurici	—	29.	— Sodæ	—	38.
— acidula artefacta	—	—	— vulneraria	—	98.
— Aëris fixi	—	27.	— Aquæ acidulæ hypocaucasæ I.	—	34.
— betulina vinosa	—	30.	— Kisladowscenses	—	—
— Calcariae	—	—	— Kutomarenses	—	—
— ustæ	—	—	— Pogromnenses	—	—
— Calcis vivæ	—	—	— amaræ Pattenhoffiæ	—	36.
— cardiaca	—	33.	— Sareptenses	—	—
— depurata	—	34.	— ferratae Andreapolitanæ	—	37.
— destillata	—	—	— Kaschinenses	—	—
— Anethi Fœniculi	—	36.	— Kortsevenses	—	—
— Carvi	—	—	— Lipsienses	—	—
— corticis Citri aurantii	—	—	— Mosquenses	—	—
— Citri medicæ	—	—	— Simeonovienses	—	—
— florum Rosæ centifoliae	—	—	— Twerenses	—	—
— fructus Myrti Pimentæ	—	—	— Wisoroënses	—	—
— herbae Menthae crispæ	—	—	— fluviales	—	40.
— herbae Menthae piperitæ	—	—	— fontanæ	—	—
— herbae Menthae Pulegii	—	—	— glaciales et nivales	—	41.
— Lauri Cassiae	—	—	— marinae	—	42.
— Cinnamomi	—	—	— palustres	—	43.
— Pimpinellæ Anisi	—	—	— pluviales	—	—
— extemporanea Anethi		—	— puteales	—	44.
Fœniculi	—	33.	— salinæ Bycowcenses	—	45.
Carvi	—	—	— Dubovogrya-		
Menthae			— denses	—	—
crispæ	—	—	— Orelyense	—	—
Menthae			— stagnantes et lacustres	—	46.
piperitæ	—	—	— sulphuratae	—	273.

III

Pars.	Pagina.	Pars.	Pagina.
Aquæ sulphur.	Baldohnen-	Arctium Lappa et Bardana	I. . 49.
ses . . . I. .	47.	Argentum nativum . . .	— . 50.
Barbenenses — .	—	nitricum . . . II. .	156.
Bargusinen-	—	susum . . .	156.
ses . . . — .	—	Aries domesticus . . . I. .	51.
Constantino-	—	Aristolochia Serpentaria . .	52.
montanae . — .	—	Arnica montana . . . — .	54.
Libavienses — .	—	Arsenicum album . . . — .	196.
Sergiewienses — .	—	Artemisia Absinthium . . .	56.
Smordonia-	—	Contra . . . — .	57.
næ . . . — .	—	Judaica . . . — .	—
Turcenses — .	47.	Aspidium Filix mas . . .	58.
Arbutus uva ursi . . . — .	49.	Atropa Belladonna . . .	59.
Archangelica officinalis . — .	25.	Avena sativa . . . — .	62.

B.

Baccæ Juniperi I. .	149.	Bilis taurina I. .	67.
Balsamum Arcæi II. .	309.	—— spissata . . . II. .	39.
peruvianum . . . I. .	126.	Bismuthum nativum . . . I. .	65.
pineo-laricinum . — .	217.	—— oxydatum album II. .	255.
piceum . — .	219.	Boletus ignarius . . . I. .	66.
sylvestre . — .	—	—— præparatus II. .	40.
Sulphuris anisatum II. .	162.	Borax I. .	264.
simplex — .	—	calcinata — .	—
terebin-	—	usta — .	—
thinatum — .	—	Bos Taurus — .	66.
Baryta — .	38.	Botrys mexicana — .	87.
muriatica — .	143.	Brassica Napus — .	70.
sulphurica nativa . I. .	269.	Bubon Galbanum — .	—
Betula alba — .	63.	Butyrum insulsum — .	67.

C.

Calamus aromaticus . . . I. .	12.	Capsicum annuum . . . I. .	74.
Calcaria II. .	40.	Carbo lignarius II. .	42.
muristica — .	160.	—— Spongiae officinolis. — .	46.
sulphurata — .	278.	Carbonas Barytæ — .	—
Calcitræpa I. .	82.	—— Cálcariæ nativus . I. .	76.
Callicocca Ipecacuanha . — .	71.	Carbonas Calcarizæ præparatus II. .	46
Calx salita II. .	160.	—— Ferri præcipitatus — .	47.
viva — .	40.	Cardamomi minoris fructus I. .	22.
Camphora I. .	154.	Carduus benedictus — .	81.
Cannabis sativa — .	73.	—— stellatus — .	82.
Cantharis — .	167.	Carex arenaria — .	70.

	Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.
Carica pinguis	I.	126.	Ceratum Sabinæ	II.	55.
Caro bubula	—	66.	— <i>Saturni</i>	—	—
— <i>ovillina</i>	—	51.	— <i>simplex</i>	—	—
— <i>vitolina</i>	—	66.	— <i>Superacetatis Plumbi</i>	—	—
Carum Carvi	—	77.	Cereoli	I.	218.
Caryophyllus aromaticus	—	122.	Cerevisia amara	II.	56.
Caseus	—	66.	— <i>antiscorbutica</i>	—	—
Cassia Senna et lanceolata	—	78.	Ceromel	—	57.
Castor Fiber	—	80.	Cerussa	I.	194.
Castoreum	—	—	— <i>Cervus Elaphus</i>	—	83.
Cataplasma acetatum	II.	47.	Cetraria Islandica	—	84.
— <i>aluminatum</i>	—	48.	Chamomilla Romana	—	27.
— <i>antisepticum</i>	—	—	— <i>vulgaris</i>	—	176.
— <i>avenaceum</i>	—	—	Chelidonium majus	—	85.
— <i>Carotæ</i>	—	49.	Chenopodium Ambrosioides	—	87.
— <i>compositum</i>	—	—	Chironia Cæntaurium	—	128.
— <i>tum</i>	—	—	Cichorium Intybus	—	88.
— <i>Conii ammonia</i>	—	—	Cicuta major	—	106.
— <i>tum</i>	—	—	Cidre	—	295.
— <i>discutiens</i>	—	50.	Cinchona Condaminea	—	88.
— <i>emolliens</i>	—	—	— <i>cordifolia</i>	—	90.
Heraclei salinum	—	—	— <i>lancifolia</i>	—	—
maturans primum	—	—	— <i>officinalis</i>	—	88.
— <i>secundum</i>	—	51.	Cineres clavellati	I.	266.
Secalis muriatum	—	—	—	II.	244.
— <i>primum</i>	—	—	Citrus Aurantium	I.	98.
— <i>muriatum</i>	—	—	— <i>medica</i>	—	100.
— <i>secundum</i>	—	—	Clavelli Cinnamomi	—	159.
sinapinum	—	—	Clutia Elutheria	—	101.
— <i>aceratum</i>	—	—	Clyster acetatus	II.	57.
— <i>rum</i>	—	52.	— <i>adstringens opiatum</i>	—	—
— <i>acre</i>	—	—	— <i>alliatum</i>	—	—
Superacetatis	—	—	— <i>Aloës</i>	—	58.
Plumbi	—	53.	— <i>compositus</i>	—	—
tabacinum	—	—	— <i>Amyli</i>	—	—
Trætici	—	—	— <i>Assæ fœtidæ</i>	—	59.
— <i>cæpinum</i>	—	54.	— <i>opiatum</i>	—	—
— <i>opiatum</i>	—	—	— <i>catharticus</i>	—	—
Cayenne pepper	I.	75.	— <i>communis</i>	—	—
Centaurea benedicta	—	81.	Muriatis Soda	—	60.
— <i>Calcitrapa</i>	—	82.	— <i>nutriens</i>	—	—
Centaureum minus	—	128.	— <i>opiatum</i>	—	—
Cephaëlis Ipecacuanha	—	71.	— <i>pineo-balsameus</i>	—	61.
Care	—	28.	Sabadillæ	—	—
Ceratum Oxy-carbonatis Zincii	II.	54.	— <i>tabacinus</i>	—	—

Pars.	Pagina.	Pars.	Pagina.
Coccionella septempunctata I.	102.	Cortex Cascarillæ	I.
Cochlearia Armoracia . . . —	103.	Chinæ	88.
— officinalis . . . —	104.	Cinnamomi	159.
Colla Piscium	9.	Citri	100.
Collyrium Acetatis Ammoniæ II.	62.	Mezerei	113.
— aluminatum . . . —	—	peruvianus	88.
— Cupri compositum —	—	Quercus	231.
— — opiatum . —	63.	Coxwell's concrete salt of Le-	
Hydargyri opiatum —	—	mons . II.	9.
Hyoscyami opiatum —	—	Cremon tartari solubilis crudus I.	279.
opiatum —	64.	Crocus Antimonii	258.
Plumbi opiatum —	—	Croton Eleutheria	I.
Colomba I.	105.	Cucumis Colocynthis	111.
Colophonium —	[216.	Cuprum	112.
Conium maculatum —	219.	aceticum	II.
Convolvulus Jalappa . . . —	106.	ammoniacale	264.
— Scammonia . . . —	108.	sulphurico-ammonia-	
Cornu cervi ustum —	110.	tum	
	261.	sulphuricum	283.

D.

Daphne Mezereum et Laureola I.	113.	Decoctura Hordei nitrata	II.	72.
Daucus Carota —	115.	—— Juglandis	—	—
— sativus —	—	—— Lappæ	—	—
Decoctura Althææ II.	64.	—— Malti	—	—
—— — composita —	65.	—— composita		
—— — antiscorbutica . —	—	—— prima	—	73.
—— — Aspidii composita —	—	—— composita		
—— — Avenæ —	66.	—— secunda	—	—
—— — Cetrariae —	67.	—— Mezerei	—	—
—— — Cinchonæ —	—	—— mucilaginea prima	—	74.
—— — clarificata —	68.	—— secunda	—	—
—— — succeda-	—	—— Orchidis	—	—
—— — nea . —	69.	—— Polygalæ amaræ	—	75.
—— — Colocynthidis . —	—	—— Quassiae	—	—
—— — Furfuris —	70.	—— Quercus aluminata	—	—
—— — gallarum querna-	—	—— Salicis composita	—	
—— — rum . —	—	—— Sydenhami alba	—	76.
—— — Guajaci —	—	—— Ulmi	—	—
—— — cum Mezereo —	71.	Defrutum	I.	295.
—— — Hæmatoxyli . . . —	—	—— Digitalis purpurea	—	116.
—— — Hordei —	—			

Eau medicinale d'Husson	I.	292.	Extracta peculiariter parata	II.	94.
Elæosaccharum Anethi F.	II.	76.	— plantarum	—	83.
Caryi	—	—	Extractum Aconiti	—	266.
Chamomillæ	—	77.	— amarum	—	94.
Menthæ cri-	—	—	— Catechu	I.	1.
spæ	—	76.	— Chinæ spirituosum	II.	92.
Menthæ pi-	—	—	— gummioresi-	—	—
peritæ	—	—	— nosum	—	—
Pimpinellæ	—	—	Colocynthidis com-	—	—
Amisi	—	—	positum	—	94.
Electuarium Sennæ	—	—	— corticis Cinchonæ	—	84.
Elettaria Cardamomum	I.	22.	officinalis	—	92.
Elixir paregoricum	—	II.	corticis Cinchonæ	—	—
Emplastrum adhæsivum	—	80.	officinalis frigi-	—	—
ad strumam	—	77.	de paratum	—	91.
Conii	—	78.	corticis Citri Au-	—	—
compositum	—	—	rantiæ	—	93.
Galbani stibiatum	—	—	Clutiaæ Elu-	—	—
gummiresinosum	—	79.	theriaæ	—	84.
gummosum	—	—	Rhois Co-	—	—
Lythargyrii	—	80.	tini	—	93.
Lyttaæ	—	79.	Salicis albæ	—	85.
Meliloti	—	80.	Ferri pomatum	—	94.
mercuriale	—	81.	florum Anthemis-	—	—
Oxydi Plumbi	—	80.	dis nobilis	—	91.
resinosum	—	—	florum Matricariae	—	—
saponatum	—	81.	Chamomillæ	—	92.
simplex	—	—	foliorum Juglan-	—	—
Suboxydi Hydrat-	—	—	dis Regiae	—	85.
gyri	—	—	foliorum Menyan-	—	—
stibiatum	—	82.	thidis trifoliatae	—	—
Emulsio phosphorata	—	—	herbæ Achilleæ	—	—
resinoso composita	—	—	Millefolii	—	—
Essentia Bergamota	—	170.	Artemisiae	—	—
de Portugal	—	—	Absinthii	—	86.
Neroli	—	171.	Centaureæ	—	—
Essential Salt of Lemons	—	9.	benedictæ	—	—
Eucalyptus resinifera	I.	121.	Fumariae	—	—
Eugenia Caryophyllata	—	122.	officinalis	—	—
Extracta alcoholisata vel gum-	—	—	Gratiolæ	—	—
meoresinosa	II.	92.	officinalis	—	87.
decoctione spissata	—	83.	Marrubii	—	—
infusione spissata	—	91.	vulgaris	—	—

Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.	
Extractum herbae Tanaceti vulgaris	II.	93.	Extractum radicis Gentianæ luteæ	II.	83.
Hyoscyami	267.	—	Glycyrrhizæ glabrae	—	89.
ligni Hæmatoxyli Campechiani	37.	—	Krameriaæ	—	—
Quassiae amarae	88.	—	Leontod. Taxaci	—	90.
Quassiae excelsæ	—	—	Rhei palmati	—	—
Liquiritæ nucis Strychni vomicæ	89.	—	Tomentillæ erectæ	—	—
pulpæ Cucumeris Colocynthidis	83.	—	stipitum Solani Dulcamarae	—	91.
radicis Cichorii Intybi	93.	—	turionum Pini sylvestris	—	93.
	88.				

F.

Far avenaceum	I.	63. Flores Zinei	II.	182.
Farina Hordei	—	139. Fœniculum vulgare	I.	24.
Fil Tauri	—	67. Folia Sabinæ	—	151.
Ferrum	—	123. — Sennæ	—	78.
Imatum	II.	95. Fomentum acidum	II.	98.
sulphuricum crystallisatum	—	aluminatum	—	—
Ferula Ammon	I.	269. aromaticum	—	99.
Assa foetida	—	commune	—	—
Ficus Carica	—	124. discutiens	—	—
Flacons de desinfection	II.	126. pineo-oleosum	—	—
Flores Arnicae	I.	314. compositum	—	100.
Sulphuris	II.	54. Fructus Colocynthidis	I.	111.
salis Ammoniaci martiales	—	276.	—	—
	—	148.	—	—

G.

Gallæ quercinæ	I.	230. Gargarisma Muriatis Ammoniaæ	II.	103.
queñæ	—	— opiatum	—	—
Gallina domestica	—	211. — Oxymuriatis Hydrodrargyri	—	—
Gargarisma acidum	II.	100. — drargyri	—	—
aluminatum	—	101. — Gas azoticum oxydulatum	—	104.
ammoniatum	—	— carbonicum	—	—
antisepticum	—	102. — hydrogenium	—	—
boracicum	—	— carbonatum	—	—
commune	—	— sulphuratum	—	—

VIII

Pars.	Pagina.	Pars.	Pagina.
<i>Gas oxygenium</i>	II.	106. <i>Gratiola officinalis</i>	I. . 132.
<i>Gelatina</i>	I. .	66. <i>Guajacum officinale</i>	— . 133.
— <i>Amyli</i>	II. .	108. <i>Gummi Ammoniacum</i>	— . 137.
— <i>animalis</i>	— .	107. — <i>arabicum</i>	— . 3.
— <i>Cetariae</i>	— .	108. — <i>Assæ fœtidæ</i>	— . 124.
— <i>cornu Cervi</i>	— .	— <i>Galbani</i>	— . 70.
— <i>Ichthyocolla</i>	— .	— <i>gambiense</i>	— . 121.
<i>Gentiana Centaureum</i>	I. .	128. — <i>Guttæ</i>	— . 261.
— <i>Int'a</i>	— .	129. — <i>Kino</i>	— . 121.
— <i>rabitæ</i>	— .	— <i>Myrrhæ</i>	— . 160.
<i>Geum urbanum</i>	— .	— <i>resina Guajaci</i>	— . 133.
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	— .	131. <i>Guttifera vera</i>	— . 261.
— <i>glandulifera</i>	— .	—	

H.

<i>Hæmatoxylon Campechianum</i>	I. .	136. <i>Hordeum mundatum</i>	I. . 139.
<i>Haustus aërophorus</i>	II. .	109. — <i>perlatum</i>	— . —
— <i>camphoratus</i>	— .	— <i>præparatum Thilenii</i>	— . 140.
— <i>carbonicus</i>	— .	— <i>Humulus Lupulus</i>	— . 141.
— <i>carbonis aluminosus</i>	. 284.	<i>Hydrargyrum</i>	— . 142.
<i>Cinchonæ</i>	— .	110. — <i>depuratum</i>	II. . 111.
— <i>diaphoreticus</i>	— .	— <i>muriaticum cor-</i>	
— <i>guajacinus</i>	— .	— <i>rosivum</i>	— . 184.
— <i>opiatus</i>	— .	— <i>mite</i>	— . 250.
— <i>pineo-balsameus</i>	— .	111. — <i>oxydulatum ni-</i>	
— <i>saponatus</i>	— .	— <i>grum</i>	— . 257.
— <i>sudorifer</i>	— .	— <i>oxydatum rubrum</i>	— . 181.
<i>Heracleum gummiferum</i>	I. .	137. <i>Hydromel</i>	— . — . 115.
<i>Herba Cicutæ</i>	— .	106. <i>Hydrosulphuretum Potassæ</i>	— . 117.
<i>Hepar Sulphuris</i>	— .	116. <i>Hyoscyamus niger</i>	— . I. . 143.
<i>Hordeum distichon</i>	I. .	139. <i>Hyperoxymurias Potassæ</i>	— . II. . 117.

I. J.

<i>James's powder</i>	II. .	262. <i>Infusum opiatum</i>	II. . 121.
<i>Ichthyocolla</i>	I. .	9. — <i>Chamomillæ</i>	— . 126.
<i>Infuso decoctura Lepidii ru-</i>		— <i>kalinum</i>	— . 127.
— <i>deralis</i>	II. .	118. — <i>Chenopodii</i>	— . 126.
— <i>Padi</i>	— .	— <i>Cochlearia Armiora-</i>	
<i>Infusum Absinthii</i>	— .	— <i>cæ</i>	— . —
— <i>Angelicæ</i>	— .	— <i>Digitalis</i>	— . 121.
— <i>aromaticum</i>	— .	— <i>florum Araicæ</i>	— . 119.
— <i>bæcarum Juniperi</i>	— .	— <i>Gentianæ composi-</i>	
— <i>Calami</i>	— .	— <i>tum</i>	— . 122.
— <i>Cannabis</i>	— .	— <i>Lini</i>	— . —
— <i>Catechu</i>	— .	— <i>Mentha crispæ</i>	— . 126.

Pars.	Pagina.	Pars.	Pagina.
Infusum Menthæ Pulegii . . II.	126.	Infusum Tabaci . . . II.	124.
— Phellandrii . . . —	—	Tomentillæ compo-	
— radicis Arnicæ . . . —	119.	situm —	125.
— Rhei —	123.	Valerianæ —	—
— Rhododendri . . . —	—	Inula Helenium I.	145.
— Salviae —	126.	Juglans regia —	146.
— Sambuci —	—	Juniperus communis. . . . —	149.
— Sennæ —	123.	Lycia —	150.
— — salinum . . . —	124.	Sabina —	151.
— Serpentariae —	—	Jusculum cæpinum —	17.

L.

Lac	I.	66. Linimentum Phosphori am-	
Lapis calaminaris —	—	moniatum II.	130.
— infernalis II.	156.	resinosum —	—
Laudanum liquidum —	299.	Saponis ammoni-	
Laurus Camphora I.	154.	atum —	—
— Cassia —	159.	rubefaci-	
— Cinnamomum —	—	ens —	—
— Myrrha —	160.	rubefaci-	
Lavandula Spica —	161.	ens fortius —	131.
Leontodon Taraxacum —	162.	simplex —	—
Lepidium ruderale —	163.	stibiatum —	—
Lichen Islandicus —	84.	Suboxydi Hydrar-	
— parietinus —	164.	gyri —	132.
Lignum Campechense —	136.	volatile —	127.
— Guajaci —	133.	Lignum usitatissimum . . . I.	165.
Linimentum Acetatis Cupri. II.	126.	Liquor Ammonii acetici . . II.	3.
— acidum —	127.	— carbonici	
— — pineo-oleo-		— aquosus —	242.
suin —	—	— vinosus —	22.
— Ammoniæ —	—	— anodynus mineralis —	20.
— — campho-		— Kali acetici —	5.
ratum —	—	— carbonici —	247.
— bilis salinum pri-		— caustici —	205.
mum —	128.	— terræ foliatæ Tartari —	5.
— — se-		— van Swietenii —	230.
cundum —	—	— vini probatorius Hah-	
calcareum —	—	nemanni —	35.
Oxydi Hydrary-		— Lithargyrum I.	203.
ri rubri —	129.	Lixivium causticum saponar. II.	205.
Oxymuriatis Hy-		— Lycopodium clavatum . . I.	166.
drargyri —	—	— Lytta vesicatoria —	167.

Magnesia	II.	132.	Mistura Camphoræ	II.	135.
— aërata —	—	243.	— acetata —	—	—
— carbonica —	—	—	Carbonatis Calcariae		
— nigra I.	I.	173.	— composita —	—	136.
— pura II.	II.	132.	Ceræ adstringens —	—	—
— sulphurica I.	I.	269.	Chelidonii majoris —	—	137.
— usta II.	II.	132.	Cinchonæ —	—	—
Magnesium oxydatum nativum I.	I.	173.	Citratis Potassæ stibiata —	—	138.
Maltum hordeaceum —	—	139.	cretacea Londinensis —	—	46.
Malum Aurantiorum —	—	98.	Heraclei gummiferi —	—	138.
Manganum	—	173.	Juglandis —	—	139.
Marrubium album —	—	175.	Lycopodii I.	—	167.
— vulgare —	—	—	Magnesiæ II.	—	139.
Massa Acetatis Cupri compo-	sita II.	134.	Millefolii —	—	140.
Matricaria Chamomilla . . . I.	I.	176.	Muriatis Ammoniæ stibiata —	—	—
Mel	—	27.	Myrræ ferrata —	—	—
— despumatum II.	II.	134.	— mitior —	—	141.
— Oxyccoci —	—	115.	Nitratis Potassæ —	—	—
— rosatum —	—	—	scillina —	—	142.
Meloë vesicatorius I.	I.	167.	Strychni nucis vomicae —	—	—
Menispermum hirsutum —	—	105.	Taraxaci —	—	38.
Mentha crispa —	—	177.	— composita —	—	142.
— piperita —	—	178.	Molasses I.	—	242.
— Pulegium —	—	179.	Moschus artificialis II.	—	143.
Menyanthes trifoliata —	—	180.	moschiferus I.	—	181.
Mercurius dulcis II.	II.	250.	Mucilago Acaciæ veræ II.	—	143.
— præcipitatus ruber . . . —	—	181.	solubilis	—	144.
— sublimatus corro-	—	257.	semimum Lini —	—	—
— sivus —	—	184.	Murias Ammoniæ I.	—	184.
— vivus I.	I.	142.	— depuratus II.	—	144.
Millefolii summitates —	—	4.	ferratus —	—	148.
Mimosa Catechu —	—	1.	Barytæ —	—	—
— nilotica —	—	2.	Calcariae —	—	150.
Mistura Acetatis Potassæ juniperina II.	II.	134.	Magnesiæ —	—	151.
— Assæ festideæ —	—	—	Sodæ I.	—	185.
— compo-	—	—	Mustum I.	—	161.
— sita —	—	135.	Myroxylon peruferum —	—	295.
			Myrtus Pimenta —	—	186.
				—	187.

Pars. Pagina.

N.

Pars. Pagina.

Naphtha Vitrioli	II.	19. Nitratas Ammoniae	II.	154.
Nasturtium aquaticum	I.	258. — Argenti	—	155.
Natrum boraxatum	—	264. — — — fusus	—	156.
— carbonicum	II.	248. — Bismuthi	—	255.
— impurum	I.	267. — Hydrargyri liquidus	—	158.
— phosphoricum	II.	263. — Potassæ	I.	189.
— sulphuricum crystalli- satum —	—	— — — depuratus	II.	159.
Nicotiana Tabacum	I.	272. Nitrum depuratum	—	—
		— — — nativum	I.	189.

O.

Olea ætherea	II.	169. Oleum de Cedro	II.	171.
— adusta	—	166. — — — empyreumaticum be- — tulium I.	64.	
— cocta	—	161. — — — florum Anthemidis no-		
— empyreumatica	—	166. — — — bilis II.	172.	
— Europæa	I.	190. — — — Citri Aurantii —	171.	
— expressa	II.	162. — — — Eugeniae Cary-		
— fixa	—	161. — — — ophyllatæ —	172.	
— foetida	—	166. — — — Lavandulæ		
— pinguisa	—	161. — — — Spicæ —		
— unguinosa	—	— — — Maticariae		
— volatilia	—	169. — — — Chamomillæ —	173.	
Oleum Amomi	—	170. — — — Rosæ centifo-		
— anethinum	—	180. — — — liæ		
— animale aethereum —	—	— — — Tanaceti vul-		
— — — Dippelii	—	garis		
— baccarum Juniperi communis —	—	169. — — — foliorum Juniperi Sa-		
— — — Myrti Pi- mentæ —	—	binæ	174.	
— cannabinum	—	170. — — — Roris marini		
— Chamomillæ	—	162. — — — officinalis		
— cornu Cervi	—	161. — — — herbæ Artemisiae Ab-		
— corticis Citri Aurantii —	—	166. — — — sinthii		
— medicæ destillatum —	—	170. — — — Menthae crispæ		
— medicæ ex- pressum —	—	— — — piperitæ	175.	
— flavi Citri Au- rantii —	—	171. — — — Origani vulgaris		
— Lauri Cassiaæ —	—	— — — Thymi Serpylli		
— Cinnam. —	—	— — — hyoscyaminum	162.	
		— — — inulinum	179.	
		— — — Juglandis	164.	
		— — — Lini	163.	
		— — — myrtleum	170.	

	Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.
Oleum naphæ	II.	171.	Oleum sinapinum	II.	166.
— napinum —		164.	— Sinapis nigrae —		—
— nueum Juglandis re-			— Succini depuratum —		168.
giae —			— sulphurato-anisatum —		162.
— Oleæ Europææ			— sulphuratum —		—
— Olivarum	I.	190.	———— cum pineo-		
	II.	164.	larycino —		—
	I.	190.	———— Tartari persolutionem —		247.
— olivum	II.	164.	———— Cerебинthiæ —		175.
— papavereum —		165.	Olibanum I.		160.
— pineo-balsameum . . I.		216.	Oliva —		190.
— larycinum . . II.		175.	Omphacium —		295.
— larygnum . . —			Opium —		204.
— Pini Larycis . . —			— Orchis bifolia —		192.
— pyro-animale . . II.		166.	———— latifolia —		—
— — — — — depura-			———— mascula —		—
tum —			———— militaris —		—
— radicis Inulæ Helenii —		179.	———— Morio —		—
— — — — — Valerianæ offi-			Origanum vulgare —		193.
cialis —			Oryza sativa —		—
— seminum Anethi Fœ-			— Ovis Aries —		51.
niculi —		180.	———— Ovum —		211.
— — — — — Brassicæ Napi —		164.	Oxycarbonas Plumbi . . . —		194.
— — — — — Cannabis sati-			———— Zinci —		195.
væ —		162.	———— præparatus II.		181.
— — — — — Cari Carvi —		180.	Oxycoecus europæus . . I.		288.
— — — — — Papaveris som-			———— Oxydum Arsenici album . —		195.
niferi —		165.	———— Hydrargyri rubrum II.		181.
— — — — — Phellandrii a-			———— Plumbi semivitreum I.		203.
quatici —		180.	———— Zinci II.		182.
— — — — — Pimpinellæ			———— nativum . . I.		195.
Anisi —			Oxymel Æruginis . . . II.		126.
— — — — — Sesami orient.		165.	———— scillinum —		184.
sesaminum , —			———— simplex —		—
			Oxymarias Hydrargyri . . —		—

P.

Papaver album I.	204.	Pilulæ alliatæ II.		190.
— somniferum —		———— Aloës —		191.
Parmelia parietina —	164.	———— et Stalagmitidis —		—
Phasianus Gallus —	211.	———— foetidæ —		—
Phellandrium aquaticum . —	215.	———— amaræ ferratae . . —		192.
Phosphorus II.	188.	———— Assæ foetidæ comp.		—

Pars. Pagina.

Pilulae cathartico-diureticae	II.	192.	Polygala amara	.	.	I.	225.
— Chelidonii	—	193.	Polypodium Filix mas	.	.	—	58.
— — — compositæ	—	—	Poma	.	.	—	226.
— — — Colocynthidis ferratae	—	—	— Aurantiorum	.	.	—	93.
— — — stibiatae	—	194.	Port-wine	.	.	II.	316.
— Digitalis	—	—	Potassa fusa	.	.	—	202.
— Guajaci compositæ	—	195.	— liquida	.	.	—	205.
— gummi-resinosæ foetidæ	—	—	Potio oxygenata	.	.	—	229.
— Humuli Lupuli	—	—	Potus acidus mineralis	.	.	—	206.
— Nitratis Argenti	—	196.	— — — vegetabilis	.	.	—	207.
— Oxyuriatis Hydrargyri	—	—	— piceus	.	.	—	—
— piceæ	—	197.	— — — Bekeleyi	.	.	—	178.
— Rhei compositæ	—	—	— refocillans	.	.	—	207.
— Scillae	—	—	Prunus domestica	.	.	I.	226.
— — — compositæ primæ	—	198.	— Padus	.	.	—	227.
— — — secundæ	—	—	Pulpa Colocynthidis	.	.	—	111.
— Sodaæ	—	199.	— pomorum	.	.	II.	208.
— Submuriatis Hydrargyri	—	—	Pulvis absorbens	.	.	—	209.
— — — stibiatae	—	—	— adstringens	.	.	—	—
— Suboxydi Hydrargyri	—	200.	— Aluminis compositus	.	.	—	210.
— — — nigri	—	201.	— aromaticus	.	.	—	—
— Subsulphatis Cupri	—	—	— Aspidii compositus	.	.	—	211.
Pimpinella Anisum	I.	216.	— carbonis acidulus	.	.	—	—
Pinus Abies	—	217.	— Cinchonæ succedaneus	.	.	—	212.
— Laryx	—	—	— Doveri	.	.	—	214.
— sylvestris	—	219.	— Guajaci compositus	.	.	—	212.
Piper album	—	222.	— — — ammoniatus	.	.	—	—
— hispanicum	—	74.	— opiatus	.	.	—	213.
— indicum	—	—	— stibiatus	.	.	—	—
— jamaicense	—	187.	Jalappæ compositus	.	.	—	—
— longum	—	221.	— — — et Submuriatis	—	—	—	—
— nigrum	—	222.	— Hydrargyri	.	.	—	214.
Pix	—	219.	— Ipecacuanhae	.	.	—	—
— abiegna	—	216.	— opiatus	.	.	—	—
— alba	—	—	— stibiatus	.	.	—	214.
— burgandica	—	—	— Muriatis Ammoniae sti-	—	—	—	—
Plantago aquatica	—	15.	— biatus	.	.	—	—
Plumbum	—	223.	— Nitratis Potassæ comp.	.	.	—	216.
— aceticum	II.	280.	— pro suffitu	.	.	—	—
— oxydulatum carbo-	—	—	— Quercus compositus	.	.	—	—
nicum	I.	194.	— Rhei compositus	.	.	—	217.
Polenta avenacea	—	63.	— — — et Submuriatis Hy-	—	—	—	—
			— drargyri	.	.	—	—
			— Sabinæ compositus	.	.	—	218.

	Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.
Pulvis Salicis compositus	II.	218.	Pulvis Superatratr. Potas. comp.	II.	219
— Spongiae	—	—	—	Potassæ et	
— Submuriatis Hydrargyri				Digitalis	220.
compositus	—	219.	— Tanaceti compositus	—	—
— Sulphuris compositus	—	—	Pyrus Malus	I.	228.

Q.

Quassia amara	I.	229.	Quercus Cerris	I.	230.
— excelsa	—	—	— Robur	—	231.

R.

Radix Bardanæ	I.	49.	Resina balsami pineo-sylvestris	I.	219.
— Caryophyllatæ	—	129.	Rheum palmatum	—	233.
— Colombo	—	105.	Rhododendron Chrysanthum	—	235.
— Filicis	—	58.	Rhus Cotinus	—	237.
— Jalappæ	—	108.	Roob Carotæ	II.	221.
— Ipecacuanhæ	—	72.	— Juglandis	—	—
— Liquiritiæ	—	131.	— Juniperi	—	—
— Ratanhiaæ	—	153.	— Oxyocci	—	—
— Salab vel Salep	—	192.	Rosa centifolia	I.	238.
— Zingiberis	—	22.	— gallica	—	—
Raphanus rusticanus	—	103.	Rosmarinus officinalis	—	239.
Rasura cornu Cervi	—	83.	Rubigo Ferri præparata	II.	256.
Regulus Antimonii	II.	239.	Rubus Chamæmorus	I.	240.
Resina abiegnæ	I.	215.			

S.

Saccharum	I.	242.	Salix amygdalina	I.	245.
— lactis	—	66.	— fragilis	—	—
— officinarum	—	242.	— laurea	—	—
— Saturni	II.	280.	— pentandra	—	—
Sal ammoniacum depuratum	—	144.	— vitellina	—	—
— anglicanum	I.	270.	Salvia officinalis	—	247.
— catharticus amarus	—	269.	Sambucus nigra	—	248.
— commune	—	185.	Sapa	—	295.
— cornu Cervi	II.	116.	Sapo albus	—	249.
— gemmæ	I.	185.	— alicantinus	—	—
— mirabilis Glauberi	II.	272.	— guajacinus	II.	222.
— polychrestum Seignetti	I.	279.	— hispanicus	I.	249.
— volatile coruu Cervi	II.	240.	— massiliensis	—	—
— salis Ammoniaci	—	—	— oleosus	—	—
Salix alba	I.	245.	— piceus	II.	222.

	Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.
Sapo pineo-oleosus . . .	II.	222.	Solutio Muriatis Calcariae . . .	II.	230.
— sebaceus	I.	250.	— Nitratis Argenti	—	—
— stibiatus	II.	223.	— — — — opita	—	—
— Wologdensis	I.	250.	— Oxymuriatis Hydrat-		
Saponaria officinalis	—	251.	gyri	—	—
Saturnus	—	223.	Phosphori ætherea	—	231.
Scammonium	—	110.	Potassæ camphorata	—	—
Scilla maritima	—	253.	Saponis	—	—
Secale cereale	—	254.	Subacetatis Cupri	—	232.
Semen Anisi	—	214.	Sulphatis Zincii	—	—
— Cyna	—	57.	— — — — alumini-		
— Fœniculi	—	25.	nata	—	—
— Lini	—	165.	Superacetatis Plumbi . .	—	233.
— Lycopodii	—	166.	— — — — —		
— Santonici	—	67.	alcoholisata	—	—
Serpentaria Virginiana . . .	—	52.	Supersulphatis Zincii . .	—	234.
Serum Iactis	II.	224.	Tartratis Stibii	—	—
— — acetatum	—	—	cam-		
— — aluminatum	—	—	phorata . .	—	235.
— — sinapinum	—	225.	Spathum ponderosum . . .	I.	269.
— — vinosum	—	—	Species Althææ compositæ .	II.	236.
Sesamum orientale	I.	256.	aromaticæ	—	—
Sevum bovillum	II.	18.	Chamomillæ compo-		
— bubulum	I.	67.	sitæ	—	236.
— ovillum	I.	51.	Guajaci compositæ . .	—	—
—	II.	18.	Pini compositæ . .	II.	237.
Sinapis nigra	I.	257.	resolventes	—	—
Sisymbrium Nasturtium . . .	—	263.	sopientes	—	238.
Smellome's ointment	II.	304.	Spiritus cornu Cervi . . .	—	182.
Soda impura	I.	267.	Frumenti depuratus . .	—	22.
Solanum Dulcamara	—	258.	Mindereri	—	3.
Solutio Acetatis Cupri et Mu-			— — salis Ammoniaci aquo-		
riatis Ammoniacæ II. . .	226.		sus	—	242.
— — Zincii	—	—	causti-		
— — Arsenici et Nitratis			cus	—	25.
Potassæ	227.		volati-		
Arsenitis Potassæ . . .	228.		lis vinosus	—	22.
Assæ foetidae	—		vini camphoratus . .	—	24.
Hahnemannia sepona-			rectificatissimus . .	—	21.
cea I. . .	202.		— — vitrici	—	24.
HyperoxymuriatisPo-			— — Spongia cerata . .	—	16.
tassæ II. . .	229.		— — marina	I.	238.
Muriatis Aminoniae a-			— — usta	II.	260.
cetata	—		— — officinalis	L.	45.
Barytae	—				260.

	Pars.	pagina.		Pars.	pagina.
Stalagmitis Cambogioides	I.	261.	Suceus foliorum Hyoscyami		
Stibium	II.	239.	nigri spissatus	II.	267.
— purum			herbae Atropæ Bella-		
— oxydulatum fuscum —		258.	donnae spissatus —		268.
— sulphuratum nigrum			Chelidoniæ ma-		
lævigatum —		279.	joris spissatus		
Strychnos nux vomica	I.	263.	Oxycocci nitratus		265.
Subboras Sodaæ		264.	putaminis immaturi		
Subcarbonas Ammoniæ	II.	240.	Juglandis r. spissatus —		268.
liqui-			Sulphas Barytæ nativus	I.	269.
dus —		242.	Ferri	II.	
Magnesiæ		243.	Magnesiæ	I.	
Potassæ depura-			Potassæ	II.	271.
tus II.		244.	Sodaæ		272.
liquidus —		247.	Zinci		274.
venalis I.		266.	Sulphur auratum Antimonii —		269.
Sodaæ depuratus II.		248.	depuratum		276.
venalis I.		267.	nativum	I.	271.
Submuriæ Hydrargyri	II.	250.	stibiatum aurantia-		
Subnitras Bismuthi		255.	cum II.		259.
Hydrargyri et Am-			sublimatum		276.
moniæ		257.	Sulphuretum Calcariae		278.
Suboxydum Ferri præparatum —		256.	Stibii lævigatum —		279.
Hydrargyri cine-			nativum I.		274.
reum —		257.	Superacetas Plumbi crystalli-		
nigrum —			satus II.		280.
Stibii fuscum		258.	liquidus —		281.
hydrosul-			Supersulphas Aluminæ et Po-		
phuratum —		259.	tassæ I.		275.
Subphosphas Calcariae		261.	fusus II.		283.
stibia-			Cupri		
tus —		262.	Supertartras Potassæ	I.	277.
Sodaæ		263.	Sus Scrofa		280.
Cupri et Ammo-			Syrupus alliatus	II.	283.
niæ —		264.	Citri Aurantii		
Succi plantarum spissati		266.	Diacodii		286.
Succinum	I.	267.	Heraclei		
Suceus betulinus		63.	melassus	I.	242.
Citri		100.	opiatus	II.	286.
Cochleariae composi-			Scillæ		
tus II.		265.	implex		287.
fol. Aconiti spissat. —		266.	Zingiberis		

Pars. Pagina.

Pars. Pagina.

T.

Tanacetum vulgare I . .	280.	Tinctura Digitalis composita II . .	294.
Tartarus boraxatus — .	279.	—— Eucalypti — .	—
—— depuratus — .	277.	—— Gei urbani — .	—
—— emeticus II . .	287.	—— Gentianæ composita . .	—
—— stibiatus — .	—	—— ammoniata . .	295.
—— tartarisatus I . .	279.	—— Humuli — .	—
—— vitriolatus II . .	271.	—— Hyoscyami — .	296.
Tartras Potassæ I . .	279.	—— Lytæ — .	—
—— et Ammoniæ — .	—	—— Cantharidum — .	—
—— Sodæ — .	—	—— Moschi — .	—
—— Stibii et Potassæ . . II . .	287.	—— Whyttii — .	295.
Terebinthina argentoratensis I . .	219.	—— Muriatis Ferri . .	297.
—— cocta — .	216.	—— — — — alcoho-	—
—— communis — .	219.	lisata . .	—
—— larigna — .	217.	—— Myrræ — .	298.
Terra argillacea pura . . . II . .	25.	—— Opii — .	—
—— bolaris — .	—	—— ammoniata . .	—
—— Catechu I . .	1.	—— camphorata . .	299.
—— Japonica — .	—	—— crocata . .	—
—— ponderosa pura . . II . .	38.	—— Potassæ fusæ . .	300.
—— — — — salita . . — .	148.	—— Rhei amara . .	—
Testæ ovorum I . .	211.	—— Scillæ — .	301.
Thus — .	150.	—— Sennæ composita . .	—
Thrausma — .	137.	—— Valerianæ composita . .	302.
Thymus Serpyllum — .	281.	—— — — — ammo-	—
Tinctura Aconiti II . .	290.	niata . .	—
—— — — — composita — .	—	—— — — — campho-	—
—— — — — aromaticæ — .	—	rata . .	—
—— — — — wilhelmita — .	231.	Tomentilla erecta I . .	282.
—— — — — sulphurica — .	—	Trifolium fibrinum — .	180.
—— Assæ ammoniata — .	—	Melilotus officina-	—
—— Calami — .	—	lis . .	283.
—— Catechu — .	292.	Triticum æstivum et hyber-	—
—— Cinchonæ — .	—	num . .	284.
—— — — — composita — .	—	Trochisci Spongiæ compositi II . .	302.
—— Coccionellæ septem- punctataæ — .	293.	Turiones pineo-sylvestres I . .	219.
—— Digitalis — .	—	—— Pini — .	215.
	—	—— Tussilago Farfara — .	286.

U.

Ulmus campestris I . .	237.	Unguentum Acet. Cupri com-	
Unguentum Acetatis Cupri . . II . .	303.	pos. primum II . .	303.

XVIII

Pars.	Pagina.		Pars.	Pagina.
Unguent. Acetatis Cupri com-		Unguentum phosphoricatum II.	.	308.
pos. secundam II.	303.	—	Picis ceratum	—
—	304.	—	— sulphuratum	—
—		—	resinoso-ceratum	
betulinum	—	—	primum	309.
Conii	—	—	resinoso-ceratum	
Hydr. Cyrilli	186.	—	secundum	—
inulinum	305.	—	resinosum	—
mercuriale	310.	—	Salicis	I.
Nitratis Hydrat-		—	saturninum	II.
gyri fortius	305.	—	simplex	—
Hydrargy-		—	stibiatum	—
ri mitius	—	—	Suboxydi Hydr.	—
nitricatum fortius	306.	—	— Hydrar-	
—	—	—	gyri nigri	311.
Olivii ceratum	—	—	— Hydrargy-	
Oxydi Arsenici		—	ri nigri compos.	—
albi	—	—	sulphuratum	—
Arsenici		—	— com-	
compositum	307.	—	positum	—
Hydrargy-		—	Superacetatis	
ri aluminatum	—	—	Plumbi	—
Oxydi Hydrat-		—	Tittmanni	182.
gyri hyoscyamin.	—	—	Zinci	54.
Oxydi Hydrar.r.	—	—	Uva	I.
Hydrargy-		—	passa	295.
ri Zincique	—	—		—

V.

Vacca	I.	66. Vervex	I.	51.
Vaccinium Oxyccoccus	—	288. Vinacea	—	295.
Valeriana officinalis	—	Vinum	—	—
Vapores Acidi acetic	II.	313. — lusitanicum artefac-		
mariatici	—	— tum II.	315.	
nitrici	—	— scillites	—	
oxymuriatici	—	— juniperinum	—	316.
sulphurici	—	314. — stibiatum	—	
Vasa fumigatoria antiloimica	—	— Vitis vinifera	I.	294.
Veratrum album	I.	292. Vitriolum album	II.	274.
Sabadilla	—	293. — cœruleum	—	283.
Venus	—	229. — Martis	—	269.
Veronica Beccabunga	—	293. Vitulus	I.	66.

Z.

Zincum oxydatum album	II.	182. Zincum sulphuricum	II.	274.
-----------------------	-----	-------------------------	-----	------

I N D E X

PAGINARUM MORBOS ETORUMQUE CURATIONES SISTENTIUM.

A.

- Abortus.** I. pagina 5.
Abscessus. I. 29, 84, 127, 138, 166, 285.
 II. 79.
 — pulmonium. II. 87.
Acholia. (defectus bilis.) II. 39, 86.
Achores. I. 34, 43, 56, 134. II. 43, 219,
 227, 243, 249.
Acor primarum viarum. I. 46, 125, 129,
 232, 234. II. 30, 38, 39, 43, 88, 95, 97.
Adenemphraxis. (obstructio, induratio, in-
 farctio glandularum.) I. 5,
 8, 36, 42, 46, 126, 144,
 233. II. 279, 306.
 — mesenterica, (obstructio
 glandularum et vasorum mesenterii)
 I. 42, 86, 107.
Adiapneustia. (transpiratio suppressa.)
 I. 206.
Adusta, (Ambustura.) I. 8, 148, 191, 208,
 212. II. 32, 34, 53, 56, 127, 128, 233,
 234.
Agalactia. (defectus lactis.) I. 25, 78. II. 78.
Algema hæmorrhoidale. II. 161.
Alopecia. (defluvium capillorum.) I. 50.
Alvifluxus viridis infantum. (Prasina alvi
 excrements.) I. 234. II. 43, 243, 245,
 247.
Amavrosis. (Gutta serena.) I. 11, 55, 75,
 107, 170, 290. II. 15, 167, 187, 241,
 267.
Amenorrhœa, (Defectus menstruorum. Ca-
 tameniorum retentio, suppressio. Men-
 struatio dolorifica, tarda.) I. 20, 27, 34,
 35, 42, 48, 55, 65, 81, 125, 138, 161,
 169, 177, 179, 180, 193, 239, 256,
 259, 274, 282. II. 95, 145, 168, 218,
 228, 267.
Amnesia. (defectus memorie.) I. 239.
- Anaphrodisia.** (Impotentia virilis.) I. 39,
 40, 160. II. 128, 296.
Anasarca. vide Hydrops.
Anæsthesia. (sensibilitas imminuta.) II. 26.
Anchylosis. (Contractura membrorum.)
 I. 11, 43, 46, 152, 250. II. 167.
Anevrismæ aortæ. I. 118.
Angina. (Cynanche.) I. 8, 21, 29, 53, 127,
 148, 166, 171, 232, 239, 247,
 276. II. 102, 127.
 — gangrenosa. I. 92. II. 101.
 — maligna. II. 101, 136.
 — membranacea, polyposa, (Croup.)
 I. 118, 171.
 — parotidea. II. 77.
 — pectoris. (Stenocardia Breræ.)
 I. 118. II. 156, 261.
 — pituitosa. II. 147.
 — serosa. II. 101, 275.
 — spasmatica. I. 208.
 — stridula, trachealis. I. 118.
 — ulcerosa. I. 238. II. 101.
Anorexia. I. 23.
Anthrax. I. 127. II. 50.
Anxietas. (Angor.) I. 125, 207. II. 6.
Aphonia. (defectus vocis) I. 162.
Aphthæ. I. 8, 92, 116, 148, 235, 244,
 247, 265. II. 16, 32, 102, 115,
 245, 249, 275.
 — malignæ. II. 103.
Apoplexia. I. 33, 60, 81, 119, 170, 183,
 233, 257, 290. II. 15, 147, 153, 168,
 240, 288.
Arthritis. I. 135, 191, 257. II. 78, 189,
 223.
Arthrodynia. (dolor artuum.) I. 11, 12,
 23, 33, 39, 46, 48, 59, 64, 71, 104,
 107, 126, 129, 136, 140, 144, 152,
 157, 170, 171, 179, 183, 206, 218.

- 220, 221, 223, 229, 230, 250, 259,
274, 280, 287, 290, 299. II. 15, 33,
51, 78, 79, 96, 97, 110, 119, 131, 168,
170, 177, 192, 213, 223, 232, 241,
261, 266, 277, 278, 279, 290, 295,
296, 300, 302, 308.
- Arthropoosis. (abscessus in articulatione.)** II. 50.
- Ascites. vide Hydrops.**
- Asphyxia.** I. 174, 188, 240. II. 7, 61,
107, 147, 163.
- Asthenia muscularis. (Debilitas musculo-**
rum. *Fibræ muscularis laxitas.*) I. 39,
229. II. 36, 104.
- Asthma.** I. 16, 25, 26, 29, 53, 81, 87,
93, 102, 104, 109, 118, 135,
- I. 138, 145, 151, 151, 170, 175,
180, 182, 193, 207, 214, 226,
239, 244, 253, 257, 261, 292.
II. 7, 22, 26, 107, 135, 143,
148, 150, 178, 183, 241, 246,
260, 276, 315.
- Asthma** *arthriticum.* I. 126, 157. II. 20,
— *convulsivum. (Caducum pulmo-*
nunum.) I. 126, 156.
- *Millari.* I. 182.
- *spasmodicum.* II. 20, 135.
- Ataxia.** I. 125, 183. II. 59.

B.

- Balbuties.** I. 162.
- Bilis inertia.** I. 129.
- Eclanorrhagia. (effluvium muci activum.)** I. 21, 62, 74, 131, 166, 203, 218.
II. 163, 204, 282.
- Blennorrhœa. (effluvium muci passivum.)** I. 14, 65, 107, 151, 153, 165, 169,
186, 218, 223, 227, 231, 232, 256, II. 5, 32, 84, 96, 111, 123, 150,
158, 170, 186, 204, 223, 230, 233,
234, 275, 282, 284, 300.
- Blennorrhœa lacrymalis.** II. 275.
- Borborygmi. (inflatio flatulentia, flatus.)** I. 71, 73, 77, 87, 159, 178, 179, 180,
208, 221, 247. II. 20, 119, 161, 170,
175, 180, 192, 197, 211, 217, 243, 272.
- Bradypepsia (lenta digestio)** I. 23, 82,
109, 221, 222. II. 270.
- Bubo pestilentialis.** II. 157.
- Bubo pestilentialis.** II. 157.
- Caducum pulmonum.** I. 17, 127, 250. II. 157.
- Bradypterus syphiliticus.** I. 17, 127, 250. II. 157.

C.

- Cachexia.** I. 43, 244. II. 86, 225, 229.
- Cacochymia.** II. 140.
- Calculi ductus choledochi.** I. 46. II. 177.
- Callus.** II. 157.
- Capitis morbi.** I. 217.
- Carcinoma.** I. 50, 60, 65, 109, 206, 218,
277. II. 5, 49, 150, 186, 254, 281.
- *uteri.* II. 43.
- Cardialgia.** I. 21, 39, 43, 44, 73, 180,
228. II. 20, 21, 46, 136, 173, 245.
- Cardiotromus. (tremor cordis.)** I. 118,
144, 207. II. 267.
- Caries.** I. 13, 20, 30, 48, 94, 107, 126,
138, 152, 157, 161, 238. II. 13, 171,
172, 175, 178, 186, 298.
- Carunculae urethræ.** II. 157.
- Catalepsis.** I. 42, 93, 183, 290, 293. II. 167,
246.
- Cataracta.** I. 265. II. 267.
- Catarrhus.** I. 7, 18, 26, 34, 36, 48, 55,
68, 85, 93, 94, 131, 161, 164, 166,
171, 177, 206, 215, 226, 253, 286,
344, 207. II. 267.

- II. 26, 111, 123, 138, 141, 145, 260, Convulsio. I. 33, 93, 99, 170, 182, 183, 276, 316.
Cephalgia. (Cephalæa.) I. 3, 32, 93, 103, Cophosis. (Auditus gravis. Paracusis. Sur-
 118, 125, 157, 171, 257, 282. II. 7, ditas.) I. 17, 18, 170, 250. II. 7, 241,
 20, 26, 52, 103, 161, 163, 240, 267. Corneæ maculæ. I. 30, 69, 157, 245, 265,
Chlorosis. I. 29, 39, 69, 125, 128, 129, 291. II. 40, 150, 187, 224, 283,
 130, 161, 165, 174, 175, 179, 180, 308.
 239, 253, 259. II. 95, 96, 141, 145, ——— opacitas. II. 4.
 148, 150, 207, 228, 270. ——— proptosis. II. 129.
Cholera. I. 24, 94, 105, 207, 278. II. 46, ——— ulceræ. II. 158, 233.
 61.
Clavi. I. 19. II. 7, 79.
Cnesmus. (pruritus) I. 10, 11, 56.
Coma. I. 18, 75. II. 52,
Comnotio cerebri. I. 170.
Condyloma. (Porrus.) I. 152, 172. II. 35, 157, 284.
Congestio. (Anarrhopia.) I. 157, 171. II. 13.
Contusio. I. 8, 56, 71. II. 34, 53, 99, Cystiturhœa. I. 49. II. 61,
 127, 146, 232.

D,

- Debilis ligamentorum.** II. 36.
 ——— (imbecillitas, languor, atonia)
 ventriculi. I. 22, 102, 129, 160, 179,
 194, 221, 222, 239. II. 39, 84, 88, 95,
 119, 180, 291.
Deliria. I. 171.
Dentium vacillatio. I. 2, 83.
Diabetes. (Polyuria.) I. 2, 35, 49, 64, 63,
 101, 138, 169. II. 31, 270, 296.
Dialeipyra. (Febris intermittens.) I. 10, 11,
 13, 14, 18, 27, 41, 42, 53, 54, 55,
 68, 72, 75, 80, 82, 83, 86, 91, 101,
 102, 109, 128, 129, 130, 137, 163,
 164, 165, 177, 180, 198, 208, 213, Dolores puerperatum. (Dolores post par-
 tum.) I. 27, 81. II. 267.
 222, 227, 229, 231, 232, 233, 246, ——— spasmæ. II. 131.
 257, 261, 263, 276, 280, 283, 287, Durities ligamentorum. I. 135. II. 71.
 291. II. 6, 43, 95, 96, 110, 140, 143, 222, 227, 229, 231, 232, 233, 246, ——— telæ cellulose. I. 191.
 Dyscatabrosis. (Deglutitio difficilis) I. 209.
Diarrhœa. (cita alvus. alvi profluvium.) I. 1, Dysenteria. I. 1, 3, 10, 21, 24, 30, 33,
 3, 10, 21, 24, 25, 30, 53, 55, 62, 73, 34, 52, 53, 55, 60, 62, 63, 69, 73,
 74, 83, 85, 93, 101, 102, 105, 130, 137, 157,
 166, 171, 177, 186, 191, 192, 194, 207, 229, 234, 263, 276, 283, 285,
 274, 279, 284. II. 31, 43, 59, 61, 74, 87,

- 88, 96, 121, 136, 137, 163, 179, 211,
214, 247, 252, 263, 277, 284.
Dysmenorrhœa *yide Amenorrhœa.*
Dysodontiasis. (*Dentitio difficilis.*) I. 144,
234. II. 133.
Dy-pepsia. (*Colluvies pituitosa.* *Pituita*
primarum viarum. *Pituita adecumulatio.*)
I. 21, 23, 25, 26, 29, 39, 56, 57, 74,
77, 82, 87, 88, 105, 109, 125, 128,
129, 138, 159, 160, 174, 177, 179,
- 180, 215, 222, 229, 234, 299. II. 16,
43, 87, 96, 97, 148, 192, 197, 211,
218, 223, 228, 246, 247, 270, 273,
275, 298, 300.
Dysphagia. I. 170. II. 60, 61, 253.
Dyspepsia. (*Colluvies pituitosa.* *Pituita*
primarum viarum. *Pituita adecumulatio.*)
Dyspepsia (respiratio difficultis) I. 55, 138,
174. II. 139, 228.
Dysuria. I. 10, 21, 35, 138, 166, 188,
192. II. 29, 61, 74, 123, 161, 297,

E.

- Echymosis.** (*Echysis.* *Echymoma.* *Sugillation.*) I. 8, 32, 55, 157, 178, 179,
250. II. 24, 53, 99, 127, 146, 153, 233.
Eclampsia. I. 117, 158, 188, 300. II. 183,
204, 263.
Ecopium. II. 158.
Elluvia putrida et contagiosa. I. 8. II. 11,
12, 203, 314.
Elephantiasis. I. 199. II. 227.
Enteritis. I. 33, 171, 191, 208. II. 160.
Enterodynæ. I. 24, 25, 99, 156, 178,
188, 206, 212, 213, 229, 292. II. 59, 165,
170, 172, 175, 245, 289.
— *arthritica.* I. 229.
— *flatulenta.* I. 21, 23, 27, 78,
80, 101, 125, 148, 177, 179, 215,
234, 247, 276.
— *hæmorrhoidalis.* I. 125.
— *rheumatica.* I. 135.
— *satorina.* (*plumbea.*) I. 2, 68,
127, 186, 191, 244, 270. II. 163, 284.
— *spastica.* I. 80, 170, 290. II. 59, 61,
77, 161, 174, 254.
— *verminosa.* II. 59, 96.
- Enuresis.** (*Uracratia.*) I. 2, 40, 49, 169,
117, 125, 144, 156, 170, 183, 199,
207, 290, 292, 293. II. 5, 15, 20, 27,
96, 113, 143, 156, 157, 167, 168, 179,
189, 201, 227, 230, 246, 264, 267,
268, 275, 281, 302.
Epiphœna. I. 20, 73, 81.
Epistaxis. I. 8, 41, 118, 153.
Eruptiones cutaneæ. II. 150.
Erysipelas. I. 157, 167, 179, 248. II. 81,
209, 233, 273.
— *solaris.* I. 43.
Erythema. II. 209.
Exania. (*Prolapsus ani.*) I. 231, 232, 276.
II. 57.
Exanthemata. I. 32, 73. II. 16, 28, 168,
43, 59, 77, 181.
— *faciei chronica.* I. 36.
— *polymorpha.* II. 149.
— *retropulsa.* I. 7, 53, 144, 170,
172, 183, 274, 290. II. 52, 78, 136,
189, 212, 241.
Excrescentiæ. II. 41.
Exostosis. I. 152.
Exulceratio uteri. I. 60.
— *palpebrarum.* II. 224.

F.

- Febris sine affectione topica.** II. 34.
Febris americana flava. (*Febris tropica.*)
I. 75, II. 12.
Febris asthenica. I. 7, 91, 83. II. 4, 10,
11, 22.

- Febris biliosa.** I. 7, 141, 288, 299. II. 17, Febris petechialis. II. 16.
 —— 43, 92, 115.
 —— catarrhalis. (Febris a perfrictione.) II. 4, 145, 155, 159, 263.
 —— continua. I. 72.
 —— exanthematica. I. 183. II. 155, 160.
 —— gastrica. I. 273.
 —— hectica. (Tabes purulenta.) I. 68, 84, 102, 192. II. 16, 141, 180.
 —— hemitritaea. I. 238.
 —— inflammatoria. (hypersthenica, sthenica.) I. 266, 271, 299. II. 4, 10, 17, 115.
 —— intermittens. vide Dialeipyra.
 —— lenta. I. 286.
 —— maligna. I. 92. II. 11, 155, 252.
 —— mucosa. II. 145.
 —— nervosa. I. 169. II. 145.
- parida. I. 8, 35, 41, 53, 54, 92, 169, 276, 288, 299. II. 43, 92, 145, 153, 224, 274.
 —— remittens. I. 13, 82, 105, 229.
 —— scarlatina. I. 92.
 —— urticaria. II. 241.
- Fistula ani.** II. 21.
 —— lacrymalis. II. 158, 234.
- Fluxus cœliacus.** Morbus cœliacus. I. 5, 234.
- Fracturæ.** I. 71, 208. II. 146.
- Frambæsia.** II. 312.
- Fungus articuli.** I. 41, 138. II. 31, 146, 167.
- Furunculus.** I. 30, 166, 285. II. 50, 79, 146, 246.

G.**Ganglion.** I. 200.**Gangræna.** I. 7, 14, 53, 56, 57, 94, 157,

165, 170, 183, 232, 238, 240, 300.

Glossocarcinoma. II. 10, 28.**Glossoplegia.** (Paralysis linguæ.) I. 87,

101, 164, 170, 223. II. 147, 171.

Gono-rhœa. (Gonacrasia. Stillicidium genitum.) I. 39, 232, 276. II. 96, 296.**Gingivarum laxitas.** I. 154, 161. II. 43, 100, 101.**Glossoplegia.** (Paralysis linguæ.) I. 87,

101, 164, 170, 223. II. 147, 171.

Gonorrhœa. (Gonacrasia. Stillicidium genitum.) I. 39, 232, 276. II. 96, 296.**Gutta rosacea.** II. 32.**H.****Hæmatemesis.** I. 41, 153. II. 96, 77.**Hæmaturia.** (Mictus cruentus.) I. 73, 118,

153, 169. II. 31.

Hæmorrhagia. (Profluvium sanguinis acti-

vum.) I. 2, 3, 5, 30, 32,

39, 41, 55, 73, 118, 144,

179, 217, 239, 260. II. 15,

21, 40, 75, 96, 153, 160,

210, 224, 262, 270, 292.

ventriculi. I. 93.

Hæmorrhœa. (Profluvium sanguinis passi-

vum.) I. 92, 165, 231, 232,

276, 299.

II. 1², 177, 224.

faucium. I. 8.

Hæmorrhœa gingivarum. I. 8.

——— uteri. II. 13, 96, 267.

Hæmorrhoids. I. 2, 5, 20, 34, 35, 39, 48,

55, 65, 68, 71, 79, 118, 138, 231, 232,

265, 273, 278. II. 6, 57, 59, 96, 219,

273, 277.

Hæmoptysis. I. 2, 5, 21, 32, 55, 62, 68,

73, 85, 93, 151, 153, 171,

241, 278. II. 135, 160, 153,

160, 161, 163, 267, 280,

284.

——— angorrhagica. I. 118.

Helminthiasis. (Ascarides. Lumbrici. Ver-

mes.) I. 8, 18, 29, 39, 56, 57, 58, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,

164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,

228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,

260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,

292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,

298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,

306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,

314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,

322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,

330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,

338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,

346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,

354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,

362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,

370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,

378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 390, 391, 392, 393, 394, 395,

396, 397, 398, 399, 390, 391, 392, 393,

394, 395, 396, 397, 398, 399, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

- 69, 71, 82, 87, 93, 109, 116, 125, 128, 129, 132, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 158, 181, 191, 220, 230, 235, 244, 263, 280, 291, 293, 295. II. 32, 39, 58, 61, 66, 85, 86, 95, 96, 113, 139, 151, 153, 163, 164, 170, 173, 174, 178, 183, 186, 214, 228, 254.
- Hemicrania. I. 103, 118, 222, 290.
- Hepatemphraxis. (Obstructio hepatis.) I. 42. 56, 126, 128, 138, 226, 251, 259. II. 28, 118.
- Hepatitis. I. 171, 208. II. 10, 28, 118.
- Hernia. I. 232. II. 282. — incarcerata. I. 8, 41, 118, 157, 188, 191, 206, 270. II. 61, 146, 254, 289.
- Herpes. I. 11, 17, 18, 60, 65, 86, 94, 114, 128, 134, 140, 152, 163, 167, 169, 172, 174, 188, 199, 250, 259, 287, 292. II. 10, 11, 16, 32, 43, 49, 53, 118, 150, 153, 186, 197, 227, 242, 251, 258, 261, 275, 277, 279, 300, 304, 305, 309.
- Hirudines deglutitæ. II. 153.
- Hydrargyrosis. (Morbi ex abusu hydrargyri.) I. 48, 198, 274. II. 116.
- Hydrarthrus. (Hydrops articuli.) I. 119, 138. II. 82, 146.
- Hydrencephalus. II. 242.
- Hydrocele. II. 146, 157, 206.
- Hydrocephalus. I. 171, 183. II. 154, 253.
- Hydrops. I. 14, 17, 18, 20, 56, 64, 65, 75, 82, 86, 104, 107, 109, 119, 126, 131, 132, 135, 138, 149, 163, 164, 165, 166, 171, 180, 188, 191, 199, 218, 241, 248, 251, 253, 257, 261, 263, 278, 287, 292, 299. II. 6, 7, 23, 56, 86, 87, 96, 111, 127, 135, 139, 145, 148, 156, 177, 193, 198, 199, 207, 214, 220, 241, 253, 260, 271, 273, 284, 288, 294, 296, 300, 315, 316.
- Hydrosis. (Sudores excessivi.) I. 153, II. 210.
- Hydrorachitis. (Spina bifida.) I. 214.
- Hydrothorax. (Hydrops pectoris.) I. 111, 119, 161, 172, 253. II. 38, 69, 220.
- Hyperæsthesia. (aucta sensibilitas.) I. 230, II. 20.
- Hyperemesis. I. 207.
- Hypersarcosïs. (Caro luxurians. Caruncula fungosæ.) I. 244. II. 5, 157, 202, 283.
- Hypocondriasis. I. 5, 20, 27, 32, 42, 46, 48, 56, 69, 73, 80, 88, 93, 99, 106, 125, 129, 130, 138, 144, 163, 178, 179, 181, 207, 229, 234, 235, 251, 270, 290, 273. II. 12, 85, 86, 140, 148, 172, 179, 198, 207, 218, 237, 243, 277, 300.
- Hypopion. II. 308.
- Hysteria. I. 5, 27, 32, 46, 69, 71, 73, 80, 93, 99, 106, 125, 129, 130, 144, 148, 170, 178, 179, 181, 207, 229, 234, 256, 270, 273, 290. II. 17, 12, 15, 20, 21, 22, 27, 59, 167, 168, 172, 179, 228, 243, 246, 264, 275.
- Hysteritis. II. 123.

I. J.

- Ichthyotosis. I. 216, 287.
- Icterus. I. 20, 32, 36, 55, 56, 65, 73, 74, 86, 88, 107, 126, 127, 129, 138, 212, 251, 253, 261, 278. II. 39, 87, 96, 142, 148, 253, 268, 271, 273.
- Ileus. I. 206, 270. II. 57, 61, 113, 163, 254.
- Impetigines. (Fœditates cutis.) I. 35, 50, 65, 77, 94, 119, 133, 146, 163, 164, 274. II. 72, 74, 116, 151, 164, 223, 227, 246, 275.
- Induratio prostatae. I. 107.
- Indurationes ventriculi. II. 254.
- Indurations. I. 46. II. 82.

- I.**
- Infarctus (hypochondriacorum, Infarctus viscerum, splanchemphraxis abdominalis.) I. 29. II. 6, 237. vi-desis splanchemphraxis. — pulmonum. I. 86.
- Inflammatio faecium. I. 248. — testiculorum. I. 107. II. 4, 233.
- Inflammationes asthenicæ. II. 24. — topicæ. II. 267, 273, 282.
- II.**
- Intertigo. (Excoriatio.) I. 3, 24, 167, 212. II. 25, 32, 53, 56, 80, 128, 181, 245.
- Intestinorum intussusceptio. II. 113.
- Ischialgia. I. 171.
- Ischias nervosa. I. 11, 43, 48, 59, 169, 206, 236. II. 177, 266.
- Ischuria. (Retentio urinæ.) I. 17, 18, 33, 35, 55, 167, 218, 241. II. 31, 61, 123, 223, 245, 253, 267.

L.

- Læsio ligamentorum. I. 220. II. 178. — nervorum. I. 186, 220. II. 178. — tendinum. I. 186, 220. II. 178.
- Lepra. I. 42, 43, 94, 119, 128, 163, 169, 172, 216, 287. II. 150, 251.
- Lethargus. I. 8, 170. II. 22, 240.
- Leucoma. II. 129, 164.
- Leucophlegmatia. I. 11, 128, 129, 180. II. 6, 23, 38, 96.
- Leucorrhœa. I. 35, 39, 48, 49, 107, 151, 162, 163, 169, 179, 232, 247, 266, 269, 276. II. 67, 84, 90, 96, 150, 186, 207, 234, 280, 282, 300.
- Lichenes. I. 265.
- Lienteria. I. 1, 49, 85, 101, 179. II. 84, 121.
- Ligamentorum atonia. II. 21.
- Lochia dolorifica. I. 208.
- Lochiorum defectus. I. 177. — nimius fluxus. I. 153.
- Lumbago. I. 43, 48.
- Luxatio. I. 157, 191, 232. II. 34, 53, 146.
- Lypothimia. (Deliquium animi. Defectio animi.) I. 33, 81, 125, 162. II. 154, 168, 240.
- Lythialgia. I. 167.

M.

- Macies. I. 62, 244.
- Mammarum induratio. I. 179.
- Mania. I. 32, 60, 73, 93, 118, 144, 157, 171, 183, 292, 293. II. 6, 136, 157,
- Marasmus senilis. I. 94.
- Mariscæ hæmorrhoidales. (Tuberuli hæ-morrhoidales. Varix ani.) I. 127, 144, 265, 285.
- Mastocarcinoma. I. 93.
- Melancholia. I. 60, 73, 118, 126, 128, 144, 163, 293. II. 6, 237, 253, 267, 281, 288.
- Melæna. (Vomitus niger.) I. 75, 278.
- Menorrhagia. (Menstruorum profluvium activum.) I. 2, 5, 49, 153. II. 280.
- Menorrhœa (Menstruorum profluvium passivum.) II. 96.
- Mentis alienatio. I. 133.
- Mesenteremphraxis. (obstructio glandularum et vasorum mesenterii.) I. 42, 68, 86. II. 26, 45, 150.
- Metastases. I. 172. II. 38, 246.
- Meteorismus. I. 41, 157, 207. II. 119.
- Metroptosis. (Prolapsus uteri.) I. 231, 232, 260, 276, 283.
- Metrorrhagia. (Hæmorrhagia uteri activa.) I. 8, 32, 41, 55, 73, 93, 99, 118, 130, 152, 153, 207, 247, 256, 276.
- Mictus mucosus. II. 31.
- Morbi asthenici. I. 26. II. 6.
- chronicæ oculorum. II. 183, 187.

- M**orbi chronicis nervorum. I. 103. II. 12. Morsura serpentum. I. 114, 191. II. 22, 26, 203, 242.
 —— contagiosi. I. 26. II. 16.
 —— convulsivi. I. 93, 156.
 —— cutis. I. 50, 109. II. 37, 71, 233.
 —— inflammatorii putridi. I. 92.
 —— ossium. II. 13.
 —— pulmonum. I. 82. II. 7.
 —— asthenici. II. 198, 276.
Morbilli. I. 7, 82, 92, 156, 170, 248, 291.
Morsura animalium venenatorum. II. 157.
 —— aranearum. I. 60.
 —— aspidum. I. 60.
Beri. II. 26.
 —— Boiciningæ. I. 53.
 —— canis rabidi. II. 153, 203, 206, 242.
 —— insectorum. I. 158, 191. II. 127.
 —— scorpionum. I. 60.
- M**yodynia rheumatica. (Rheumatalgia.) I. 11, 12, 26, 40, 43, 46, 50, 53, 59, 64, 71, 103, 107, 126, 135, 141, 144, 152, 157, 164, 171, 179, 206, 215, 218, 220, 227, 236, 250, 257, 259, 261, 268, 290, 300. II. 4, 15, 20, 24, 27, 37, 42, 51, 71, 78, 79, 82, 96, 110, 119, 127, 131, 153, 160, 168, 177, 186, 192, 200, 212, 213, 214, 223, 226, 231, 232, 241, 253, 257, 261, 266, 277, 279, 280, 295, 296, 316.
- M**yositis rheumatica. (Rheumatismus. Rheumatica inflammatio.) I. 34, 118, 185. II. 20, 31, 116, 136, 153, 266.

N.

- N**ausea. I. 99, 160, 175, 229.
Nævus maternus. I. 172, 265. II. 157.
Narcotismus. II. 20, 57.
Neerosis. II. 241.
 —— digitorum. I. 208.
Nephelium. I. 30.
Nephralgia. I. 29.
Nephritis I. 42, 131, 157, 166, 191, 253. II. 74, 123, 160.

- N**erantistases asthenizæ notæ ferentes. I. 12.
 —— asthenicæ. I. 7, 21.
Nevrasthenia. (Nevroblacia. Debilitas nervorum.) I. 7, 13, 87. II. 30, 95, 225.
Nostalgia. I. 76.
Nycalopia. II. 62.

O.

- O**besitas. II. 38.
Ob-tipatio alvi. (Alvas obstructa. Alvus tarda.) I. 8, 20, 79, 93, 109, 125, 188, 191, 212, 218, 222, 226, 233, 250, 261, 270, 278. II. 6, 43, 57, 61, 111, 113, 163, 191, 192, 197, 214, 272.
Obstructio lienis. I. 42, 55, 86.
 —— ramorum venæ portarum. I. 138.
 —— uteri. I. 42.
- O**bstructiones chronicæ. I. 248.
Oculorum morbi. I. 86, 217. II. 4, —— asthenici. II. 63.
 —— panni. II. 5, 129, 187, 277, 284.
Odontalgia. I. 23, 103, 123, 144, 157, 170, 183, 206, 209, 257, 286. II. 13, 20, 101, 103, 147, 171, 175, 293.
Oedema. I. 11, 57, 86, 157, 193, 232, 240, 285. II. 32, 153, 162, 234.

- Oenomania. I. 282.
Oestromania (*Priapismus, Satyriasis, Nympomania*) I. 157.
 Ophthalmalgia. I. 93.
 Ophthalmia. (*Ophthalmitis*) I. 21, 41, 42, ————— 59, 75, 157, 171, 209, 229, 256, 276. II. 48, 62, 64, ————— 123, 146, 150, 233, 234, 262, 267, 273.
 ————— asthenica. II. 224, 234, 275, ————— palpitarum chronica. II. 282. 304.
- Opistotonus.** I. 207.
Orchiocoele. (*Testiculi induratio, Hernia pharmonalis*) I. 107, 138, 209. II. 4, 154, 170, 289.
 ————— scirrhosa. II. 249.
- Ossium et periosteal affectiones.** II. 71.
 ————— exfoliatio. II. 158.
Ostealgia (*dolor osteocopus*) I. 103. II. 261.
 ————— syphilitica. I. 114, 236. II. 200.
Otalgia. I. 34, 206. II. 101, 103.
Otorrhœa. I. 20.
Ozena. I. 42.

P.

- Panaritium.** I. 250.
Pancreatemphraxis. (*Obstructio pancreatis*) I. 42, 55, 86, 109, 119, 138. II. 245.
Paralysis. (*Resolutio membrorum*) I. 11, 26, 42, 48, 54, 64, 75, 87, 104, 107, 111, 123, 144, 162, 169, 174, 183, 199, 208, 215, 221, 300. II. 15, 20, 22, 24, 26, 37, 42, 52, 56, 79, 104, 119, 128, 131, 162, 168, 178, 225, 241, 296.
 ————— urocystidis. I. 170.
- Petechiae.** I. 92, 276, 291.
Phymosis. II. 233.
Phlegmone. I. 30, 166.
Phrenitis. I. 33, 208. II. 20, 57.
Phthiriasis. I. 34, 188, 292. II. 181, 227.
Phthisis. I. 11, 21, 30, 35, 49, 55, 68, 84, 85, 94, 116, 118, 135, 138, 140, 161, 165, 171, 186, 192, 193, 212, 214, 241, 244, 257, 286, 299. II. 31, 42, 67, 96, 105, 116, 119, 135, 140, 141, 145, 178, 226, 246, 260, 267, 270, 280, 284.
Pleuritis. I. 55, 171. II. 145, 163.
Paraphonia. (*mutatio vocis morbosæ*) I. 3, 104, 131.
Paraplegia. I. 40.
Paresis. (*Torpor.*) I. 43.
Parotis. I. 107.
Partus difficilis. I. 191.
Parulis. (*Tumor gingivæ*) I. 127.
Penphigus. II. 207, 241, 251.
Pernio. I. 71, 107, 138, 157, 220. II. 27, 48, 99, 127, 128, 146, 167, 233.
Pertussis. I. 3, 18, 23, 73, 93, 107, 118, 125, 141, 156, 165, 169, 170, 183, 188, 199. II. 20, 67, 78, 116, 143, 183, 227, 228, 241, 246, 267, 281, 316.
Pollutiones. I. 276. II. 86, 270.
Polycholia. I. 278.
Polypi. II. 167.
Porrigo. II. 227, 275.
Profluvium auris fetidum. I. 244.
Prolapsus. II. 282.

XXVIII

- Prosopalgia.** (*Dolor faciei. Gallice. Tic douloureux.*) I. 42, 48, 103, 107, 126, 135, 144. II. 186, 253.
Pseudosyphilis. II. 221, 223, 278.
Psoriasis. (*Psora. Scabies.*) I. 11, 34, 42, 60, 64, 65, 94, 107, 114, 119, 128, 134, 145, 152, 158, 163, 170, 174, 181, 188, 214, 220, 250, 259, 265, Pyrosis. (*Soda. Ardor ventriculi.*) I. 46, 272, 287, 292. II. 10, 11, 28, 32, 43. II. 16, 46, 243, 245, 233, 292.
- Psorophthalmia.** II. 158, 183, 233.
Pterygium. II. 265.

R.

- Rabies hydrophoba.** (*Hydrophobia.*) I. 15, Retentio lochiorum. I. 55, 112, 169, 170, 183, 199, 292. II. 5, Rhagades. (*Papillarum mammarum excar-
tatio, fissuræ.*) I. 212, 244. II. 35, 12, 26, 113, 246, 251.
Rachitis. I. 20, 39, 40, 42, 46, 64, 94, 109, 140, 150, 212, 232, 234. II. 6, Rigiditas articulorum. I. 237. II. 37, 204, 36, 96, 148, 153, 243, 245, 247, 249, 262, 270, 271, 273, 300.
Ranula. II. 158.
Raphania. II. 246.
Raucedo. (*Raucitas. Ravis. Asperitas fau-
cium.*) I. 3, 10, 21, 26, 104, 116, 127, 131, 138, 180, 286.
Rhegmatismus. I. 11, 26, 30, 34, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322, 326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, 454, 458, 462, 466, 470, 474, 478, 482, 486, 490, 494, 498, 502, 506, 510, 514, 518, 522, 526, 530, 534, 538, 542, 546, 550, 554, 558, 562, 566, 570, 574, 578, 582, 586, 590, 594, 598, 602, 606, 610, 614, 618, 622, 626, 630, 634, 638, 642, 646, 650, 654, 658, 662, 666, 670, 674, 678, 682, 686, 690, 694, 698, 702, 706, 710, 714, 718, 722, 726, 730, 734, 738, 742, 746, 750, 754, 758, 762, 766, 770, 774, 778, 782, 786, 790, 794, 798, 802, 806, 810, 814, 818, 822, 826, 830, 834, 838, 842, 846, 850, 854, 858, 862, 866, 870, 874, 878, 882, 886, 890, 894, 898, 902, 906, 910, 914, 918, 922, 926, 930, 934, 938, 942, 946, 950, 954, 958, 962, 966, 970, 974, 978, 982, 986, 990, 994, 998, 1002, 1006, 1010, 1014, 1018, 1022, 1026, 1030, 1034, 1038, 1042, 1046, 1050, 1054, 1058, 1062, 1066, 1070, 1074, 1078, 1082, 1086, 1090, 1094, 1098, 1102, 1106, 1110, 1114, 1118, 1122, 1126, 1130, 1134, 1138, 1142, 1146, 1150, 1154, 1158, 1162, 1166, 1170, 1174, 1178, 1182, 1186, 1190, 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1222, 1226, 1230, 1234, 1238, 1242, 1246, 1250, 1254, 1258, 1262, 1266, 1270, 1274, 1278, 1282, 1286, 1290, 1294, 1298, 1302, 1306, 1310, 1314, 1318, 1322, 1326, 1330, 1334, 1338, 1342, 1346, 1350, 1354, 1358, 1362, 1366, 1370, 1374, 1378, 1382, 1386, 1390, 1394, 1398, 1402, 1406, 1410, 1414, 1418, 1422, 1426, 1430, 1434, 1438, 1442, 1446, 1450, 1454, 1458, 1462, 1466, 1470, 1474, 1478, 1482, 1486, 1490, 1494, 1498, 1502, 1506, 1510, 1514, 1518, 1522, 1526, 1530, 1534, 1538, 1542, 1546, 1550, 1554, 1558, 1562, 1566, 1570, 1574, 1578, 1582, 1586, 1590, 1594, 1598, 1602, 1606, 1610, 1614, 1618, 1622, 1626, 1630, 1634, 1638, 1642, 1646, 1650, 1654, 1658, 1662, 1666, 1670, 1674, 1678, 1682, 1686, 1690, 1694, 1698, 1702, 1706, 1710, 1714, 1718, 1722, 1726, 1730, 1734, 1738, 1742, 1746, 1750, 1754, 1758, 1762, 1766, 1770, 1774, 1778, 1782, 1786, 1790, 1794, 1798, 1802, 1806, 1810, 1814, 1818, 1822, 1826, 1830, 1834, 1838, 1842, 1846, 1850, 1854, 1858, 1862, 1866, 1870, 1874, 1878, 1882, 1886, 1890, 1894, 1898, 1902, 1906, 1910, 1914, 1918, 1922, 1926, 1930, 1934, 1938, 1942, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026, 2030, 2034, 2038, 2042, 2046, 2050, 2054, 2058, 2062, 2066, 2070, 2074, 2078, 2082, 2086, 2090, 2094, 2098, 2102, 2106, 2110, 2114, 2118, 2122, 2126, 2130, 2134, 2138, 2142, 2146, 2150, 2154, 2158, 2162, 2166, 2170, 2174, 2178, 2182, 2186, 2190, 2194, 2198, 2202, 2206, 2210, 2214, 2218, 2222, 2226, 2230, 2234, 2238, 2242, 2246, 2250, 2254, 2258, 2262, 2266, 2270, 2274, 2278, 2282, 2286, 2290, 2294, 2298, 2302, 2306, 2310, 2314, 2318, 2322, 2326, 2330, 2334, 2338, 2342, 2346, 2350, 2354, 2358, 2362, 2366, 2370, 2374, 2378, 2382, 2386, 2390, 2394, 2398, 2402, 2406, 2410, 2414, 2418, 2422, 2426, 2430, 2434, 2438, 2442, 2446, 2450, 2454, 2458, 2462, 2466, 2470, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490, 2494, 2498, 2502, 2506, 2510, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534, 2538, 2542, 2546, 2550, 2554, 2558, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2582, 2586, 2590, 2594, 2598, 2602, 2606, 2610, 2614, 2618, 2622, 2626, 2630, 2634, 2638, 2642, 2646, 2650, 2654, 2658, 2662, 2666, 2670, 2674, 2678, 2682, 2686, 2690, 2694, 2698, 2702, 2706, 2710, 2714, 2718, 2722, 2726, 2730, 2734, 2738, 2742, 2746, 2750, 2754, 2758, 2762, 2766, 2770, 2774, 2778, 2782, 2786, 2790, 2794, 2798, 2802, 2806, 2810, 2814, 2818, 2822, 2826, 2830, 2834, 2838, 2842, 2846, 2850, 2854, 2858, 2862, 2866, 2870, 2874, 2878, 2882, 2886, 2890, 2894, 2898, 2902, 2906, 2910, 2914, 2918, 2922, 2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946, 2950, 2954, 2958, 2962, 2966, 2970, 2974, 2978, 2982, 2986, 2990, 2994, 2998, 3002, 3006, 3010, 3014, 3018, 3022, 3026, 3030, 3034, 3038, 3042, 3046, 3050, 3054, 3058, 3062, 3066, 3070, 3074, 3078, 3082, 3086, 3090, 3094, 3098, 3102, 3106, 3110, 3114, 3118, 3122, 3126, 3130, 3134, 3138, 3142, 3146, 3150, 3154, 3158, 3162, 3166, 3170, 3174, 3178, 3182, 3186, 3190, 3194, 3198, 3202, 3206, 3210, 3214, 3218, 3222, 3226, 3230, 3234, 3238, 3242, 3246, 3250, 3254, 3258, 3262, 3266, 3270, 3274, 3278, 3282, 3286, 3290, 3294, 3298, 3302, 3306, 3310, 3314, 3318, 3322, 3326, 3330, 3334, 3338, 3342, 3346, 3350, 3354, 3358, 3362, 3366, 3370, 3374, 3378, 3382, 3386, 3390, 3394, 3398, 3402, 3406, 3410, 3414, 3418, 3422, 3426, 3430, 3434, 3438, 3442, 3446, 3450, 3454, 3458, 3462, 3466, 3470, 3474, 3478, 3482, 3486, 3490, 3494, 3498, 3502, 3506, 3510, 3514, 3518, 3522, 3526, 3530, 3534, 3538, 3542, 3546, 3550, 3554, 3558, 3562, 3566, 3570, 3574, 3578, 3582, 3586, 3590, 3594, 3598, 3602, 3606, 3610, 3614, 3618, 3622, 3626, 3630, 3634, 3638, 3642, 3646, 3650, 3654, 3658, 3662, 3666, 3670, 3674, 3678, 3682, 3686, 3690, 3694, 3698, 3702, 3706, 3710, 3714, 3718, 3722, 3726, 3730, 3734, 3738, 3742, 3746, 3750, 3754, 3758, 3762, 3766, 3770, 3774, 3778, 3782, 3786, 3790, 3794, 3798, 3802, 3806, 3810, 3814, 3818, 3822, 3826, 3830, 3834, 3838, 3842, 3846, 3850, 3854, 3858, 3862, 3866, 3870, 3874, 3878, 3882, 3886, 3890, 3894, 3898, 3902, 3906, 3910, 3914, 3918, 3922, 3926, 3930, 3934, 3938, 3942, 3946, 3950, 3954, 3958, 3962, 3966, 3970, 3974, 3978, 3982, 3986, 3990, 3994, 3998, 4002, 4006, 4010, 4014, 4018, 4022, 4026, 4030, 4034, 4038, 4042, 4046, 4050, 4054, 4058, 4062, 4066, 4070, 4074, 4078, 4082, 4086, 4090, 4094, 4098, 4102, 4106, 4110, 4114, 4118, 4122, 4126, 4130, 4134, 4138, 4142, 4146, 4150, 4154, 4158, 4162, 4166, 4170, 4174, 4178, 4182, 4186, 4190, 4194, 4198, 4202, 4206, 4210, 4214, 4218, 4222, 4226, 4230, 4234, 4238, 4242, 4246, 4250, 4254, 4258, 4262, 4266, 4270, 4274, 4278, 4282, 4286, 4290, 4294, 4298, 4302, 4306, 4310, 4314, 4318, 4322, 4326, 4330, 4334, 4338, 4342, 4346, 4350, 4354, 4358, 4362, 4366, 4370, 4374, 4378, 4382, 4386, 4390, 4394, 4398, 4402, 4406, 4410, 4414, 4418, 4422, 4426, 4430, 4434, 4438, 4442, 4446, 4450, 4454, 4458, 4462, 4466, 4470, 4474, 4478, 4482, 4486, 4490, 4494, 4498, 4502, 4506, 4510, 4514, 4518, 4522, 4526, 4530, 4534, 4538, 4542, 4546, 4550, 4554, 4558, 4562, 4566, 4570, 4574, 4578, 4582, 4586, 4590, 4594, 4598, 4602, 4606, 4610, 4614, 4618, 4622, 4626, 4630, 4634, 4638, 4642, 4646, 4650, 4654, 4658, 4662, 4666, 4670, 4674, 4678, 4682, 4686, 4690, 4694, 4698, 4702, 4706, 4710, 4714, 4718, 4722, 4726, 4730, 4734, 4738, 4742, 4746, 4750, 4754, 4758, 4762, 4766, 4770, 4774, 4778, 4782, 4786, 4790, 4794, 4798, 4802, 4806, 4810, 4814, 4818, 4822, 4826, 4830, 4834, 4838, 4842, 4846, 4850, 4854, 4858, 4862, 4866, 4870, 4874, 4878, 4882, 4886, 4890, 4894, 4898, 4902, 4906, 4910, 4914, 4918, 4922, 4926, 4930, 4934, 4938, 4942, 4946, 4950, 4954, 4958, 4962, 4966, 4970, 4974, 4978, 4982, 4986, 4990, 4994, 4998, 5002, 5006, 5010, 5014, 5018, 5022, 5026, 5030, 5034, 5038, 5042, 5046, 5050, 5054, 5058, 5062, 5066, 5070, 5074, 5078, 5082, 5086, 5090, 5094, 5098, 5102, 5106, 5110, 5114, 5118, 5122, 5126, 5130, 5134, 5138, 5142, 5146, 5150, 5154, 5158, 5162, 5166, 5170, 5174, 5178, 5182, 5186, 5190, 5194, 5198, 5202, 5206, 5210, 5214, 5218, 5222, 5226, 5230, 5234, 5238, 5242, 5246, 5250, 5254, 5258, 5262, 5266, 5270, 5274, 5278, 5282, 5286, 5290, 5294, 5298, 5302, 5306, 5310, 5314, 5318, 5322, 5326, 5330, 5334, 5338, 5342, 5346, 5350, 5354, 5358, 5362, 5366, 5370, 5374, 5378, 5382, 5386, 5390, 5394, 5398, 5402, 5406, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5430, 5434, 5438, 5442, 5446, 5450, 5454, 5458, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5482, 5486, 5490, 5494, 5498, 5502, 5506, 5510, 5514, 5518, 5522, 5526, 5530, 5534, 5538, 5542, 5546, 5550, 5554, 5558, 5562, 5566, 5570, 5574, 5578, 5582, 5586, 5590, 5594, 5598, 5602, 5606, 5610, 5614, 5618, 5622, 5626, 5630, 5634, 5638, 5642, 5646, 5650, 5654, 5658, 5662, 5666, 5670, 5674, 5678, 5682, 5686, 5690, 5694, 5698, 5702, 5706, 5710, 5714, 5718, 5722, 5726, 5730, 5734, 5738, 5742, 5746, 5750, 5754, 5758, 5762, 5766, 5770, 5774, 5778, 5782, 5786, 5790, 5794, 5798, 5802, 5806, 5810, 5814, 5818, 5822, 5826, 5830, 5834, 5838, 5842, 5846, 5850, 5854, 5858, 5862, 5866, 5870, 5874, 5878, 5882, 5886, 5890, 5894, 5898, 5902, 5906, 5910, 5914, 5918, 5922, 5926, 5930, 5934, 5938, 5942, 5946, 5950, 5954, 5958, 5962, 5966, 5970, 5974, 5978, 5982, 5986, 5990, 5994, 5998, 6002, 6006, 6010, 6014, 6018, 6022, 6026, 6030, 6034, 6038, 6042, 6046, 6050, 6054, 6058, 6062, 6066, 6070, 6074, 6078, 6082, 6086, 6090, 6094, 6098, 6102, 6106, 6110, 6114, 6118, 6122, 6126, 6130, 6134, 6138, 6142, 6146, 6150, 6154, 6158, 6162, 6166, 6170, 6174, 6178, 6182, 6186, 6190, 6194, 6198, 6202, 6206, 6210, 6214, 6218, 6222, 6226, 6230, 6234, 6238, 6242, 6246, 6250, 6254, 6258, 6262, 6266, 6270, 6274, 6278, 6282, 6286, 6290, 6294, 6298, 6302, 6306, 6310, 6314, 6318, 6322, 6326, 6330, 6334, 6338, 6342, 6346, 6350, 6354, 6358, 6362, 6366, 6370, 6374, 6378, 6382, 6386, 6390, 6394, 6398, 6402, 6406, 6410, 6414, 6418, 6422, 6426, 6430, 6434, 6438, 6442, 6446, 6450, 6454, 6458, 6462, 6466, 6470, 6474, 6478, 6482, 6486, 6490, 6494, 6498, 6502, 6506, 6510, 6514, 6518, 6522, 6526, 6530, 6534, 6538, 6542, 6546, 6550, 6554, 6558, 6562, 6566, 6570, 6574, 6578, 6582, 6586, 6590, 6594, 6598, 6602, 6606, 6610, 6614, 6618, 6622, 6626, 6630, 6634, 6638, 6642, 6646, 6650, 6654, 6658, 6662, 6666, 6670, 6674, 6678, 6682, 6686, 6690, 6694, 6698, 6702, 6706, 6710, 6714, 6718, 6722, 6726, 6730, 6734, 6738, 6742, 6746, 6750, 6754, 6758, 6762, 6766, 6770, 6774, 6778, 6782, 6786, 6790, 6794, 6798, 6802, 6806, 6810, 6814, 6818, 6822, 6826, 6830, 6834, 6838, 6842, 6846, 6850, 6854, 6858, 6862, 6866, 6870, 6874, 6878, 6882, 6886, 6890, 6894, 6898, 6902, 6906, 6910, 6914, 6918, 6922, 6926, 6930, 6934, 6938, 6942, 6946, 6950, 6954, 6958, 6962, 6966, 6970, 6974, 6978, 6982, 6986, 6990, 6994, 6998, 7002, 7006, 7010, 7014, 7018, 7022, 7026, 7030, 7034, 7038, 7042, 7046, 7050, 7054, 7058, 7062, 7066, 7070, 7074, 7078, 7082, 7086, 7090, 7094, 7098, 7102, 7106, 7110, 7114, 7118, 7122, 7126, 7130, 7134, 7138, 7142, 7146, 7150, 7154, 7158, 7162, 7166, 7170, 7174, 7178, 7182, 7186, 7190, 7194, 7198, 7202, 7206, 7210, 7214, 7218, 7222, 7226, 7230, 7234, 7238, 7242, 7246, 7250, 7254, 7258, 7262, 7266, 7270, 7274, 7278, 7282, 7286, 7290, 7294, 7298, 7302, 7306, 7310, 7314, 7318, 7322, 7326, 7330, 7334, 7338, 7342, 7346, 7350, 7354, 7358, 7362, 7366, 7370, 7374, 7378, 7382, 7386, 7390, 7394, 7398, 7402, 7406, 7410, 7414, 7418, 7422, 7426, 7430, 7434, 7438, 7442, 7446, 7450, 7454, 7458, 7462, 7466, 7470, 7474, 7478, 7482, 7486, 7490, 7494, 7498, 7502, 7506, 7510, 7514, 7518, 7522, 7526, 7530, 7534, 7538, 7542, 7546, 7550, 7554, 7558, 7562, 7566, 7570, 7574, 7578, 7582, 7586, 7590, 7594, 7598, 7602, 7606, 7610, 7614, 7618, 7622, 7626, 7630, 7634, 7638, 7642, 7646, 7650, 7654, 7658, 7662, 7666, 7670, 7674, 7678, 7682, 7686, 7690, 7694, 7698, 7702, 7706, 7710, 7714, 7718, 7722, 7726, 7730, 7734, 7738, 7742, 7746, 7750, 7754, 7758, 7762, 7766, 7770, 7774, 7778, 7782, 7786, 7790, 7794, 7798, 7802, 7806, 7810, 7814, 7818, 7

- 59, 161, 167, 168, 173, 174, Stranguria. (Ardor lotii.) I. 3, 74, 103,
179, 241, 272, 291.
Spasmi ventriculi. I. 157. II. 264.
Spasmus mandibulae inferioris. I. 207.
Sphacelus. I. 7. II. 15, 43, 48, 53, 145,
172, 178.
Spina ventosa. I. 11, 107, 152, 276.
Splanchemphraxis. (Obstructio viscerum.) I. 29, 36, 46, 48, 55, 65, 68, 82, 83,
36, 88, 111, 127, 128, 129, 163, 238,
251, 258, 273. II. 6, 29, 38, 39, 86,
87, 92, 139, 145, 148, 194, 223, 237,
254, 260, 273, 279.
Splenitis. II. 123.
Stagnationes humorum. I. 162. II. 4, 246.
Staphyloma. II. 64, 129, 158, 187.
Stases abdominales. I. 180, 262. II. 271.
Steatoma. II. 154.
Sterilitas. I. 39.
Stomacace. I. 2, 8, 13, 94, 188, 283.
Stomatorrhœa. I. 8.
- nocturni. II. 284.
——— pedum fœtentis. II. 44.
——— phthisicorum. I. 66, 229, 247.
Suffocatio. II. 288.
Suppuratio renum. I. 140.
Susurrus aurium. I. 17.
Syncope. I. 8, 33. II. 7, 27.
Synocha. I. 7, 278. II. 159, 207, 273.
Synochus. II. 16.
——— miliaris. II. 207.
Syphilis. I. 11, 48, 50, 60, 77, 86, 94,
107, 114, 146, 152, 174, 208, 227,
252, 259. II. 5, 10, 72, 113, 118,
185, 201, 257, 261, 279, 310, 312.

T.

- Tabes. I. 66, 82, 84. II. 29, 67.
——— dorsalis. I. 39, 94.
——— pulmonum. I. 176.
Tænia. I. 21, 32, 57, 109, 132, 148, 213,
262, 271. II. 96, 164, 178, 211, 219,
270, 273.
Tendinum subsultus. I. 182.
Tenesmus. I. 3, 8, 10, 24, 30, 68, 94,
166, 191. II. 59, 61.
Tetanus. I. 93, 170, 183, 300. II. 189,
241, 246, 253.
——— traumaticus. II. 204.
Thyremphraxis. (Bronchocele. Struma.) I. 107, 119. II. 6, 45, 83, 128, 148,
154, 218, 254.
Tinea capitis. I. 34, 43, 56, 94, 107,
138, 140, 167, 188, 199, 217,
220, 259, 287, 292. II. 32, 43,
116, 186, 197, 249, 251, 277,
279, 309.
——— squamosa. I. 119.
- Tonsillitis. I. 239. II. 7, 101, 103.
Tophi. (Nodi syphilitici. Osteophymata.) I. 107, 141, 152. II. 53, 162, 185, 308.
Tormina. I. 101. II. 180.
Torpor hydropicus. I. 110.
——— melancholicus. I. 110.
Tracheitis. (Cynanche trachealis.) I. 118,
126, 144. II. 116, 241, 252, 260.
Tremor artuum. I. 162.
——— —— ex abuso hydrargyri.
I. 146.
Trismus. I. 43, 144, 170, 183, 290. II. 61,
241, 253.
——— neonatorum. II. 111.
——— traumaticus. I. 207.
Trichiasis. II. 183, 304, 308.
Trichoma. I. 11, 167. II. 277.
Tuberculi. II. 41.
——— pulmonum. II. 150.
Tumor albus. (Tumor genuum.) I. 58,
172, 217, 276. II. 99.

- Tumor lienis nevroblaeicus. I. 107.
 —— a stagnante lacte. (Tumor mammarum ex lacte. Mammarum durities a turgescente lacte. Lactis coagulum in mammis.) I. 30, 178, 247. II. 146, 247, 249.
- Tumores. I. 46.
 —— articulorum. II. 31, 49, 50, 146, 151.
 —— arthritici. II. 204.
 —— asthenici. II. 78, 128.
 —— cystici. (Atheroma. Meliceris. Lupia.) I. 138, 260. II. 27, 41, 146, 154, 202.
 —— epididymidis. I. 209.
 —— frigidi. I. 34/41, 178, 179, 260. II. 24, 27, 79, 81, 146, 167, 168.
 —— glandularum. I. 285. II. 6, 79, 150, 178, 241, 245, 284, 289, 300, 305.
- Tumores indurati. I. 11. II. 78, 162.
 —— inflammatorii. I. 21.
 —— lymphatici. I. 119.
 —— scirrhosi et canceratice. I. 237, II. 167, 297.
 —— scrofulosi. II. 128.
 —— tonsillarum. I. 114, 143. II. 147, 173, 174, 185, 192, 116, 125, 127, 131, 138, 145, 151, 164, 166, 175, 192, 193, 207, 212, 217, 226, 236, 244, 248, 252, 253, 285, 286, 299. II. 106, 142, 178, 264, 267, 276.
- Tussis. I. 3, 18, 21, 23, 25, 29, 55, 70, 73, 74, 85, 102, 116, 125, 127, 131, 138, 145, 151, 164, 166, 175, 192, 193, 207, 212, 217, 226, 236, 244, 248, 252, 253, 285, 286, 299. II. 106, 142, 178, 264, 267, 276.
- Tympanitis. I. 23, 125. II. 96, 228.
- Typhus. I. 26, 32, 54, 75, 80, 92, 118, 141, 155, 170, 182, 208, 232, 291, 300. II. 4, 6, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 27, 75, 119, 136, 189, 208, 251, 263, 297.
- nervosus. II. 12, 145, 241.

U.

- Ulceræ. I. 82, 86, 165, 174, 237, 287. Ulceræ fauciæ syphilitica. I. 107. II. 103, 116, 233.
- aphthosa. II. 5, 133.
- atonica. (cacoëthea, desperata, flaccida, foetida, impura, mali moris, putescentia, putidula, rebellia, sordida.) I. 6, 11, 13, 20, 32, 60, 71, 106, 114, 116, 128, 129, 138, 144, 152, 157, 187, 199, 231, 235, 260, 265, 283. II. 5, 32, 43, 48, 49, 53, 80, 98, 127, 128, 130, 157, 162, 178, 181, 186, 203, 206, 210, 229, 230, 236, 265, 275, 298.
- calliosa. II. 5, 162, 182, 186, 202, 231, 246.
- canceratica. (cancerosa, carcinomatosa.) I. 107, 116, 140, 152, 214. II. 32, 49, 158, 178, 183, 300, 305.
- fauciæ atonica. (Oris.) I. 148, 174, 175, 247. II. 101.
- fungosa. (spongiosa.) I. 153, 209. II. 5, 182, 186, 246.
- gangrænosa. I. 13, 157. II. 43, 100, 180, 304.
- herpetica. (serpiginosa.) I. 116, 126, 147, 167, 263, 265. II. 28, 183, 229, 304, 306.
- a hydrargyrosi. II. 206. vide Pseudosyphilis.
- interna. I. 161.
- intestinorum. (Exulceratio viscerum abdominalium.) I. 36. II. 31.
- inveterata. I. 35, 43, 172. II. 246.
- lingue. II. 103.
- pedum dolorifica inveterata. I. 164. II. 183, 233.
- phagedænica. (ichorosa, saniosa.) I. 13, 60, 94, 116, 152. II. 32, 80, 103, 128, 186, 210, 224, 233, 275, 305.

- Ulcera pulmonum. II. 85.
 —— psoria. II. 304.
 —— renum. II. 207, 246.
 —— scirrhosa. I. 36.
 —— scorbutica. I. 2, 30, 43, 94, 104, 147, 152, 164, 174, 181, 214, 263, 265, 294. II. 5, 43, 128, 158, 210, 275, 304.
 —— serofulosa. I. 13, 94, 126, 214. II. 126, 254. 304.
 —— syphilitica. I. 65, 94, 107, 114, 140, 147, 174, 265. II. 5, 28, 157, 158, 182, 203, 206, 232, 246, 249, 251, 254, 306.
- Ulcera urocytidis. II. 32, 207, 246.
 —— verminosa. I. 60.
- Uleuscula. II. 54.
- Urocytidis atonia. I. 241.
- Urolythiasis. (Calculi urinarii.) I. 5, 17, 18, 21, 35, 36, 46, 49, 50, 56, 64, 74, 83, 116, 127, 131, 133, 206, 213, 233, 274. II. 9, 29, 31, 38, 61, 111, 133, 177, 199, 204, 206, 246, 249, 300.
- Urinæ impedimenta. II. 6.
- Uvulæ laxitas, (prolapsus, prolongatio, relaxatio.) I. 23, 222, 232, 247, 276, 283 II. 101.

V.

- Varicellæ. II. 207.
- Varices. I. 17, 265.
- Variolæ. I. 7, 18, 82, 92, 156, 170, 171, 183, 214, 276, 291. II. 146, 189, 253, 277.
- Verminatio febris epidemicæ. I. 94.
- Verrucæ. I. 19, 86, 127, 152, 172. II. 5, 11, 35, 41, 79, 157, 202, 210, 284, 297.
- Vertigo. I. 81, 125, 144, 162, 221, 222, 229, 239, 257. II. 240.
- Vernus. I. 92.
- Vomititiones. I. 46.
- Vomitus. I. 101, 170, 179, 207, 222, II. 20, 43, 104, 174, 175, 243.
 —— chronicus. (habitualis.) I. 105. II. 35, 41.
 —— inconsuetus. I. 44.
 —— pertinax. I. 35, 41.
 —— porraceus. I. 14.
 —— puerarum. I. 27.
 —— spasmodicus. I. 78.
- Vulnera. (lacerationes.) I. 133, 153, 191, 208, 220. II. 40, 50, 80, 93, 146, 232, 233.

Z.

Zona. II. 241.

Antidotæ.

- Antidotæ contra Barytam. I. 271. II. 273.
 —— Cuprum. I. 113, 245. II. 277, 278, 284.
 —— Daphne Mezereum. I. 115.
 —— Opium. I. 209. II. 284.
 —— Oxydum Arsenici album. I. 215, 265. II. 43, 46, 116, 245, 249, 277, 279, 284.
 —— Plumbi. I. 157, 215, 224, 271. II. 116, 245, 273, 277, 279.
- Antidotæ contra Oxymuriatæm Hydrargyri. I. 212. II. 43, 249, 277.
 —— Prussicum acidum. II. 242.
 —— Salia Hydrargyri. II. 245.
 —— Sulphatæm Zinci. II. 275.
 —— venena acida. II. 245.
 —— —— —— acria. I. 68, 191.
 —— —— —— metallica. I. 48.
 —— —— —— narcotica. I. 2.
 II. 5, 276.

C r i t e r i a.

Criterium Arsenici. I. 272. II. 35.
— Cupri. II. 35.

Criterium Plumbi. I. 301. II. 16, 35.
— Stibii. II. 35.

I.


Pag.	Lin.	Errata.	Legendum,
XV.	16.	6	fomenti.
7.	35.	omenti	fomenti.
15.	6.	Попушникъ водяной;	Попушникъ; Водяной
16.	17.	concentritis	concentricis
23.	34.	confectum	conferto
38.	31.	scriptorii	scriptorii
54.	11.	fficaciores	efficaciores.
65.	23.	preventus	provenius
71.	10.	obscenæas	obscenæas
—	13.	spasinos	spasmos
79.	26.	frigide	frigidæ
82.	19.	succesu	succesu
84.	1.	bissimo	bissimo
87.	32.	electurii	electuarii
88.	27.	quiqua	quinqua-
114.	13.	instrinsecus	intrinsecus
138.	26.	hydarthro,	hydrarthro,
143.	27.	in primit.	imprimit.
144.	11.	sicut	sicut
153.	2.	considorum	concisorum
169.	1.	hæcce	hæcce-
176.	26.	xperientiam.	experientiam.
196.	16.	Arsenci	Arsenici
201.	1.	Arsenitis	Arsenitis
—	2.	Arcenici	Arsenici
—	4.	Arsenici, albo	Arsenici albo,
202.	33.	Arseni.	Arsenici
203.	5.	Bosrock).	Bostock)
204.	24.	cteus	lacteus
209.	14.	scudum	secundum
221.	20.	stomachia;	stomachæ;
222.	27.	in p imit,	imprimit,
231.	33.	borealibus	borealibus
232.	17.	ci-	cy-
251.	5.	ablonga,	oblonga,
252.	16.	Tritic.	Triticæ
296.	16.	petitur.	potitur.


II.


5.	4.	externs	externus
8.	17.	кисломая	кисломая
11.	19.	partem	partes

<i>Pag.</i>	<i>Leg.</i>	<i>Errata.</i>	<i>Legendum.</i>
13.	15.	successu	successu
39.	3.	Corbonatis	Carbonatis
43.	1.	im	in
46.	11.	porhyritem	porphyritem
51.	11.	Alli	Allii
62.	11.	obnormi	abnormi
67.	24.	tantumdem,	tantumdem, vol
84.	27.	hœæ,	rhœæ,
99.	7.	bavilla	bovilla
109.	30.	illico, dum effervescit, illico, porrígenda est.	
		ponigenda est.	
147.	24.	extractorum	extractorum
170.	26.	et	etc.
185.	24.	parallelipipedis	parallelipedis
188.	4.	Quodsi	Quodsi
190.	18.	Сабуро-Гумпозыя.	Сабуро-Гумпозыя.
200.	9.	Tartraris	Tartratis
209.	10.	abmovetur.	admovetur.
215.	30.	quod	quod
218.	17.	lateæ	luteæ
—	20.	dauſo	clauso
—	31.	jujuſlibet	eujuslibet
219.	7.	Sulphureti	Sulphureti
220.	1.	duo.	duo,
—	7.	possuut.	possunt.
221.	6.	clarifica	clarifica
223.	2.	(chronica	chronica (
—	26.	aliisque	aliisque
—	27.	Sapo, Stibiatuſ	Sapo stibiatuſ
225.	1.	Potasæ	Potassæ
229.	5.	Potassac	Potassæ
240.	24.	Aleohole	Alcohole
241.	29.	dedicimus	didicimus
245.	18.	grandularum	glandularum
251.	17.	ant.	aut
—	18.	ventricuti.	ventriculi
254.	24.	exitandum	excitandum
255.	7.	prævertende.	prævertendæ
—	23.	Injectio	Injectio
256.	17.	ab	ad
260.	1.	maio-	majo-
—	2.	ueida	acida
270.	7.	pollutionibis	pollutionibus
271.	2.	sulhuricum	sulphuricum
273.	26.	ex	et

<i>Pag.</i>	<i>Lin.</i>	<i>Errata.</i>	<i>Legendum.</i>
274.	27.	tubi	ubi
—	28.	ibus	tibus
277.	14.	pullulantium.	pullulantium
—	17.	obstructione	obstructione
280.	18.	Et	Est
283.	10.	luxuriosam	luxuriosam
286.	13.	consistentium	consistentiam







~~of~~ new

